

VACUNACION DE PACIENTES CON ASPLENIA ANATÓMICA O FUNCIONAL O EN AQUELLOS QUE VAN A SUFRIR ESPLENECTOMÍA

En el caso de esplenectomía programada, vacunar antes de las dos semanas de la fecha prevista de cirugía. En caso de esplenectomía urgente se procederá a vacunar como mínimo 2 semanas después de realizada siempre que se prevea que va a volver a consulta. En caso contrario se vacunará al alta.

Si va a recibir quimioterapia o radioterapia después de la esplenectomía, vacunar al menos 2 semanas antes de iniciarla/s o tres meses tras su finalización. Si la/s va a recibir antes de la esplenectomía, vacunar un mes después de finalizada/s. En caso de esplenectomía por motivo oncológico, habrá que valorar también las vacunas correspondientes a la patología de base del paciente.

La disfunción esplénica (drepanocitosis homocigota) y las deficiencias de complemento (C3, C5-C9, properdina, factor D o factor H) o el tratamiento con eculizumab u otros inhibidores de la activación del complemento tendrán la misma consideración.

Las vacunas abajo descritas pueden administrarse simultáneamente.

PATOLOGÍA	PAUTA
Enfermedad neumocócica	<p>Menores de 2 años. PCV13 (dosis según edad de inicio) + una dosis de PPV23 a partir de los 2 años (recomendable transcurridos 12 meses desde la última dosis de PCV13, intervalo mínimo 8 semanas) + un único recuerdo 5 años más tarde.</p> <p>Personas de entre 2 y 6 años. PCV13 (2 dosis separadas por 2 meses) + una dosis de PPV23 (recomendable transcurridos 12 meses desde la última dosis de PCV13, intervalo mínimo 8 semanas) + un único</p>

	<p>recuerdo 5 años más tarde.</p> <p>Si hubieran recibido una dosis de PPV23, recibirán una dosis de PCV13 al menos 12 meses después de la última PPV23 (intervalo mínimo 8 semanas) + un único recuerdo de PPV23 5 años más tarde.</p> <p>En los mayores de 2 años, se administrará PCV13 siempre que no la hubiera recibido en los doce meses previos a la aparición/diagnóstico.</p> <p>Mayores de 6 años y adultos. PCV13 (1 dosis) + una dosis de PPV23 (recomendable transcurridos 12 meses desde la dosis de PCV13, intervalo mínimo 8 semanas) + un único recuerdo 5 años más tarde.</p> <p>Si hubieran recibido previamente 3 o más dosis de PCV7, recibirán una dosis de PCV13 + una de PPV23 (recomendable transcurridos 12 meses desde la dosis de PCV13, intervalo mínimo 8 semanas) + un único recuerdo de PPV23 5 años más tarde.</p> <p>En caso de que hubieran recibido previamente una dosis de PPV23, se administrará una dosis de PCV13 al menos 12 meses más tarde + un único recuerdo de PPV23 dejando un intervalo de al menos 5 años desde la primera dosis de PPV23.</p> <p>En caso de que hubieran recibido previamente dos dosis de PPV23 con un intervalo de 5 años entre dosis, se administrará una única dosis de PCV13 al menos 12 meses desde la última dosis de PPV23.</p>
Enfermedad meningocócica	<p><u>Vacuna conjugada antimeningocócica ACWY (Nimenrix®).</u></p> <p>Personas de 2 a 11 meses. 2 dosis con un intervalo mínimo de 8 semanas + recuerdo a los 12-15 meses. Se administrará una dosis de recuerdo a los 5 años de</p>



	<p>completar la vacunación, posteriormente se valorarán revacunaciones periódicas cada 5 años si persiste el riesgo.</p> <p>Personas a partir de los 12 meses de vida y para adultos, independientemente de la vacunación antimeningocócica previa. 2 dosis separadas por un intervalo mínimo de 8 semanas. Se administrará una dosis de recuerdo a los 5 años de completar la vacunación, posteriormente se valorarán revacunaciones periódicas cada 5 años si persiste el riesgo.</p> <p><u>Vacuna recombinante antimeningocócica serogrupo B (Bexsero®).</u> Esquema de vacunación según la edad. Se recomienda la administración de una dosis de recuerdo 1 año después de completar la vacunación primaria y, posteriormente, una dosis cada 5 años.</p>
Enfermedad invasora por Hib	<p>Menores de 5 años. Vacunación rutinaria según edad. Se administrará una dosis adicional siempre que no la hubiera recibido en los doce meses previos a la aparición/diagnóstico de la patología en cuestión.</p> <p>Mayores de 5 años y adultos, independientemente del estado previo de vacunación. Recibirán una dosis de vacuna.</p>
Gripe	<p>Menores de 6 meses. No hay ninguna vacuna autorizada actualmente. Vacunar convivientes.</p> <p>Personas de entre 6 meses y 8 años. En caso de ser la primera temporada de vacunación, administrar dos dosis separadas por 4 semanas. Para temporadas sucesivas, administrar una dosis de vacuna por campaña. Vacunar asimismo a sus convivientes.</p> <p>Personas a partir de 9 años de edad y adultos.</p>

	Vacunación anual con una dosis por temporada junto con vacunación de sus convivientes.
COVID-19	<p>Personas de 5 a 11 años de edad. Pauta completa de primovacunación con administración de dosis de recuerdo estacional a partir de los 5 meses de la primovacunación con Comirnaty® pediátrico monovalente o bivalente según disponibilidad.</p> <p>Personas a partir de 12 años. Pauta completa de primovacunación con administración de dosis de recuerdo estacional a partir de los 5 meses de la primovacunación con vacunas bivalentes de ARNm de adulto.</p>