



Mortalidad en la Región de Murcia. Año 2000.

La tasa de **mortalidad general** de las personas residentes en la Región de Murcia y fallecidas en España, es de 8,01 fallecidos por cada mil habitantes, que corresponden a 9.204 defunciones. La tasa de mortalidad es 8,52 por mil en los hombres y de 7,15 en las mujeres.

La **mortalidad proporcional por grandes causas** de muerte (gráfico 1) sigue el siguiente orden en los hombres: enfermedades cardiocirculatorias (30,7%), neoplasias (28,8%), enfermedades respiratorias (13,0%), causas externas (7,7%) y enfermedades digestivas (5,7%). En las mujeres destacan las causas cardiocirculatorias (42,6%), las neoplasias (18,9%), las enfermedades respiratorias (10,2%), digestivas (4,7%) y de las entidades endocrino-metabólicas (4,3%).

La **esperanza de vida** al nacer es de 78,4 años, y es mayor en las mujeres (81,8 años) en 6,7 años que en los hombres (75,1 años). La esperanza de vida es siempre mayor en las mujeres en todos los grupos de edad.

La tasa de **mortalidad infantil** (<1 año) es de 6,83 fallecidos por mil nacidos vivos. La tasa de la mortalidad neonatal precoz (nacidos vivos que fallecen antes del 7º día de vida) es de 2,25 por mil, y la tasa de las muertes posneonatales (del 28º día a <1 año de vida) es de 3,45 por mil nacidos vivos. No se registran defunciones en el área del Noroeste.

Mortalidad proporcional según la edad

De 0 a 14 años, las malformaciones congénitas (33,6%) y las afecciones originadas en el período perinatal (24,7%) son las dos principales causas de muerte, seguidas de las causas externas (13,0%), y de las neoplasias (7,5%). Los niños y las niñas mantienen el orden en las cuatro primeras causas.


De 15 a 64 años la mayor contribución la presentan las neoplasias (39,2%), las causas externas (20,4%) y las enfermedades cardiocirculatorias (17,6%). Los hombres mantienen la misma jerarquía, y en las mujeres se alternan las enfermedades cardiovasculares con las causas externas.

De los 65 a más años predominan las enfermedades del aparato cardiocirculatorio (41,2%), los tumores (21,1%), las afecciones respiratorias (13,6%), y las causas digestivas (4,7%). Los hombres y las mujeres presentan la misma ordenación que el total en las cuatro primeras causas.

Mortalidad por causas específicas y sexo

La enfermedad isquémica del corazón es la primera causa de muerte en los hombres (tasa de 102,61 defunciones por cada 100.000 hombres) y la segunda en mujeres. La enfermedad cerebrovascular es la primera causa de muerte en las mujeres (tasa de 120,34 por 100.000 mujeres) y la segunda en los hombres (tabla 1), sin que las tasas de hombres y de mujeres sean comparables al no estar estandarizadas por edad. En hombres y en mujeres destacan las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, la insuficiencia cardíaca, la diabetes mellitus y el cáncer de colon. En los hombres, además, aparecen el cáncer de pulmón (tasa de 63,49), los accidentes de tráfico (tasa de 29,64), el cáncer de próstata (tasa de 20,70), y la cirrosis hepática (tasa de 19,82). En las mujeres, junto con las causas comunes antes citadas, son de mención los trastornos mentales orgánicos seniles y preseniles (tasa de 28,66), el cáncer de mama (tasas de 23,48), la enfermedad hipertensiva (tasa de 18,82) y las enfermedades del riñón y del uréter (tasa de 16,06).

Gráfico 1. Mortalidad proporcional por grandes grupos de causas. Todas las edades. Ambos sexos. Región de Murcia, 2000.



*Situación regional de las Enfermedades de Declaración Obligatoria.
Semanas 41 a 44 (del 6 de octubre al 2 de noviembre de 2002). Distribución semanal*

	Casos notificados												Casos acumulados			
	Semana 41			Semana 42			Semana 43			Semana 44			Semanas 1 a 44			
	2002	2001	Mediana	2002	2001	Mediana	2002	2001	Mediana	2002	2001	Mediana	2002	2001	Mediana	
Gripe	1980	347	345	504	347	409	688	408	500	852	378	424	991	70.362	25.397	107.700
Tuberculosis respiratoria	1980	4	1	2	4	3	3	4	3	3	0	2	2	143	155	152
Meningitis tuberculosa	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
Otras tuberculosis	1986	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	23	26	27
Legionelosis	1997	2	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	25	687	14
Hepatitis A	1997	0	2	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	20	25	25
Hepatitis B	1997	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	13	14	14
Otras hepatitis vírica	1997	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	14	13	17
Fiebres tifoidea y par.	1980	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	11	11	11
Toxiinfecciones-alimen	1983	2	1	6	0	0	4	0	17	1	0	1	3	149	290	358
Varicela	1980	17	9	9	13	20	22	26	27	27	23	32	32	9.671	9.760	7.784
Sarampión	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	12
Rubeola	1980	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	2	12
Parotiditis	1980	0	2	3	0	4	2	0	2	2	0	2	2	37	119	57
Tosferina	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	23	17
Enfermedad meningoc.	1980	0	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	21	22	32
Otras meningitis	1986	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	68	42	42
Sífilis	1982	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	24	24	20
Infección gonocócica	1982	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	14	19	15
Fiebre exantemát. med.	1981	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	8
Brucelosis	1980	0	0	0	2	0	1	3	1	1	1	0	0	34	14	28
Tétanos	1982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1
Sífilis congénita	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0
Paludismo	1980	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	2

La mediana se calcula sobre el último quinquenio. No se incluyen las enfermedades sin casos notificados en año actual.

Porcentaje de declaración ()
Semanas 41 a 44 (del 6 de octubre al 2 de noviembre de 2002).*

Municipios	Población (Proyec. 2002)	% de declaración	Municipios	Población (Proyec. 2002)	% de declaración
Abanilla	6.033	95,8	Calasparra	9.066	100,0
Abarán	12.425	100,0	Campos del Río	2.032	100,0
Águilas	28.226	100,0	Caravaca de la Cruz	22.880	91,7
Albudeite	1.371	100,0	Cartagena	183.799	100,0
Alcantarilla	34.263	98,7	Cehegín	14.383	96,9
Aledo	1.026	75,0	Ceutí	7.645	100,0
Alguazas	7.156	100,0	Cieza	32.935	100,0
Alhama de Murcia	16.225	95,0	Fortuna	6.991	100,0
Archena	15.018	37,5	Fuente Álamo de Murcia	11.371	100,0
Beniel	8.470	100,0	Jumilla	22.250	88,9
Blanca	5.803	100,0	Librilla	3.945	100,0
Bullas	11.013	100,0	Lorca	77.075	91,1

() [Núm. partes de declaración numérica recibidos / (Núm. de médicos de atención primaria en las cuatro semanas)] x 100.*

*Distribución por áreas de salud de las Enfermedades de Declaración Obligatoria.
Semanas 41 a 44 (del 6 de octubre al 2 de noviembre de 2002). Distribución semanal*

Población	Áreas de Salud												REGIÓN	
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		TOTAL	
	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.
Enfermedades														
Gripe	751	28.707	120	9.268	319	13.634	15	6.354	33	1.647	242	10.752	1.480	70.362
Tuberculosis respiratoria	6	46	4	52	2	19	0	8	0	2	0	16	12	143
Meningitis tuberculosa	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Otras tuberculosis	0	8	0	9	0	0	0	1	0	0	1	5	1	23
Legionelosis	3	19	1	2	0	2	0	0	0	0	0	2	4	25
Hepatitis A	1	16	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	20
Hepatitis B	0	7	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	13
Otras hepatitis víricas	0	10	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	14
Fiebres tifoidea y paratifoide	0	1	0	4	0	3	0	0	0	3	0	0	0	11
Toxiinfecciones-alimentarias	1	70	0	53	1	17	0	1	0	2	0	6	2	149
Varicela	34	4.495	13	1.319	19	1.854	5	521	2	479	6	1.003	79	9.671
Sarampión	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Rubeola	0	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
Parotiditis	0	20	0	6	0	3	0	4	0	0	0	4	0	37
Tosferina	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Enfermedad meningocócica	1	5	0	5	0	3	0	1	0	3	0	4	1	21
Otras meningitis	2	27	0	19	0	1	0	14	0	3	0	4	2	68
Sífilis	2	13	0	6	0	1	0	1	0	0	1	3	3	24
Infección gonocócica	4	7	1	6	0	0	0	1	0	0	0	0	5	14
Fiebre exantemática mediterránea	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Brucelosis	1	3	4	22	0	0	1	9	0	0	0	0	6	34
Tétanos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	2
Sífilis congénita	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Paludismo	0	4	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1	7

No se incluyen las enfermedades sin casos notificados en año actual.

Porcentaje de declaración ()
Semanas 41 a 44 (del 6 de octubre al 2 de noviembre de 2002).*

Municipios	Población (Proyec. 2002)	% de declaración	Municipios	Población (Proyec. 2002)	% de declaración
Lorquí	5.706	100,0	Torre Pacheco	24.152	48,1
Mazarrón	21.229	100,0	Torres de Cotillas, Las	16.394	47,2
Molina de Segura	46.252	36,0	Totana	23.756	98,3
Moratalla	8.436	86,1	Ulea	981	100,0
Mula	14.501	100,0	Unión, La	14.793	100,0
Murcia	367.189	66,2	Villanueva del Río Segura	1.569	50,0
Ojós	584	16,7	Yecla	30.872	100,0
Pliego	3.401	100,0	Santomera	11.566	100,0
Puerto Lumbreras	11.069	96,9	Alcázares, Los	8.264	100,0
Ricote	1.561	37,5			
San Javier	20.402	100,0	Total Región	1.198.015	83,4
San Pedro del Pinatar	16.269	100,0			

Tabla 1. Diez primeras causas seleccionadas de mortalidad por sexo. Región de Murcia, 2000.

HOMBRES

Causas Seleccionadas	Casos	%	Tasa
Enfermedades isquémicas del corazón	585	12,0	102,61
Enfermedades cerebrovasculares	464	9,5	81,39
Enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores (sin Asma)	370	7,6	64,90
Neoplasia maligna de tráquea, bronquios y pulmón	362	7,4	63,49
Accidentes de tráfico de vehículos a motor	169	3,5	29,64
Insuficiencia cardíaca	125	2,6	21,93
Neoplasia maligna de la próstata	118	2,4	20,70
Diabetes mellitus	115	2,4	20,17
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado	113	2,3	19,82
Neoplasia maligna del colon	112	2,3	19,64
Resto de causas	2.327	47,9	408,16
Total	4.860	100,0	852,44

MUJERES

Causas Seleccionadas	Casos	%	Tasa
Enfermedades cerebrovasculares	697	16,0	120,34
Enfermedades isquémicas del corazón	420	9,7	72,51
Insuficiencia cardíaca	314	7,2	54,21
Trastornos mentales orgánicos senil y presenil	166	3,8	28,66
Diabetes mellitus	150	3,5	25,90
Neoplasia maligna de la mama	136	3,1	23,48
Enfermedades hipertensivas	109	2,5	18,82
Enfermedades crónicas de vías respiratorias inferiores (sin Asma)	106	2,4	18,30
Neoplasia maligna del colon	99	2,3	17,09
Enfermedades del riñón y del uréter	93	2,1	16,06
Resto de causas	2.054	47,3	354,63
Total	4.344	100,0	750,00

Tasa específicas por 100.000 hombres/mujeres

Años potenciales de vida perdidos (1-70 años)

La mortalidad prematura es 15,3 años por cada persona residente en la Región de Murcia. Los hombres acumulan el 72,8% de la mortalidad precoz y las mujeres el 27,2%. En los hombres las grandes afecciones que restan más años potenciales de

vida, son los accidentes (26,2% del total), neoplasias (19,3%), enfermedades cardiocirculatorias (9,9%) y causas digestivas (5,3%). En las mujeres, los primeros lugares los ocupan las neoplasias (11,1%), las causas externas (5,4%), los trastornos cardiovasculares (2,7%) y las infecciosas (1,5%). Las causas

seleccionadas que quitan más años a la vida a los hombres son los accidentes de tráfico de vehículos a motor (18,1% del total), los suicidios y las autolesiones (5,0%), las enfermedades isquémicas del corazón (4,8%), el cáncer broncopulmonar (4,6%), y en infarto agudo de miocardio (3,5%). En las mujeres, por causas específicas, la mayor mortalidad prematura se debe a los accidentes de tráfico (3,2%) y a los cánceres de mama (2,9%), y de colon (1,0%).

Áreas de Salud

Observamos una mortalidad mayor que el promedio regional en las áreas sanitarias de Cartagena y Lorca, y menor mortalidad en las áreas de Murcia y Vega del Segura-Comarca Oriental (gráfico 2).

El exceso de mortalidad del área de Cartagena se origina por las neoplasias y las causas externas en ambos sexos. En los hombres se observa también una mayor mortalidad para todas las causas sin significarse ningún gran grupo. Las mujeres no presentan una mayor mortalidad general, pero sí en las entidades genitourinarias y las mal-definidas. En los hombres existe sobremortalidad para el cáncer del encéfalo, el síndrome mielodisplásico, la enfermedad isquémica del corazón y para el infarto agudo de miocardio. En las mujeres se manifiesta la sobremortalidad en la enfermedad hipertensiva, y submortalidad para la neumonía y la enfermedad cerebrovascular.

La mayor mortalidad en Lorca se presenta en las causas infecciosas y cardiovasculares. En las mujeres se mantiene exclusivamente la sobremortalidad en las enfermedades cardiovasculares. Entre las causas seleccionadas la mayor mortalidad se refleja entre los hombres, en el cáncer de estómago, la enfermedad hipertensiva, la enfermedad isquémica del corazón y el infarto agudo de miocardio. En las mujeres aparece un mayor índice de muerte por enfermedad cerebrovascular.

Bibliografía


Ll. Cirera y O. Cruz. Estadísticas básicas de mortalidad en la Región de Murcia en 2000. Murcia: Consejería de Sanidad y Consumo y Consejería de Economía y Hacienda; 2002. Disponible en: <http://murciasalud.es> o <http://dgep.carm.es/econet>

Autor

Lluís Cirera Suárez
Consejería de Sanidad y Consumo
Región de Murcia

Gráfico 2. Comparación de la mortalidad general de las Áreas de Salud con la Región. Todas las edades. Ambos sexos. 2000.

Áreas de Salud



Suscripción: Envío gratuito. Solicitudes: Servicio de EPIDEMIOLOGÍA
Dirección General de Salud Pública, Consejería de Sanidad y Consumo
Ronda de Levante, 11. MURCIA 30008 (Correo electrónico: bolepi@carm.es)