



### Calendario infantil de vacunaciones de la Región de Murcia, para niños nacidos a partir del 1 de julio de 2016

EDAD	Difteria	Tétanos	Tos ferina acelular	<i>H influenzae b</i> (Hib)	Hepatitis B	Poliomielitis inactivada	Neumococo <sup>1</sup>	Meningococo C	Triple vírica	Varicela	V.P.H.
<b>2 meses</b>	X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X				
<b>4 meses</b>	X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X	X			
<b>11 meses</b>	X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X <sup>2</sup>	X				
<b>12 meses</b>								X	X		
<b>15 meses</b>										X <sup>3</sup>	
<b>4 años</b>									X	X <sup>3</sup>	
<b>6 años</b>	X <sup>4</sup>	X <sup>4</sup>	X <sup>4</sup>			X <sup>4</sup>					
<b>11-12 años</b>								X <sup>5</sup>		X <sup>6</sup>	X <sup>7</sup>
<b>14 años</b>	X	X									

- 1 En los lactantes de alto riesgo la pauta será de 4 dosis (2, 4, 6 y 15 meses). En los casos de situaciones de alto riesgo en otras edades, definidas por los correspondientes protocolos del Servicio de Prevención y Protección de la Salud, se podrá administrar una pauta secuencial conjugada-polisacárida simple o una exclusiva de esta última.
- 2 En forma de vacuna hexavalente.
- 3 Para los nacidos a partir del 1 de enero de 2015.
- 4 En forma de DTPa/VPI.
- 5 Para los nacidos en 2005.
- 6 Para aquellos niños no vacunados anteriormente (0 ó 1 dosis) o con historia previa de padecimiento incierta o negativa en régimen de dos dosis separadas al menos por un mes.
- 7 VPH: virus del papiloma humano. Vacunación sistemática en régimen de dos dosis para las nacidas en 2005. Recaptación de las niñas nacidas entre 1998 y 2004 con esquema de vacunación de 0,1-2 y 6 meses para las de 15 o más años, y de 0 y 6 meses para las de 14 o menos años.