



Embarazo y vacunación en viajes internacionales

Vacuna	Utilización	Áreas de riesgo
DTP/DTPa/Td	Administrar si indicada	Todo el mundo
BCG	No	Todo el mundo
VPI	Administrar si indicada	Níger, Nigeria, Afganistán, Pakistán e India
Hepatitis A	Administrar si indicada	Todo el mundo, excepto: Canadá, EUA, Oeste y Norte de Europa, Australia, Nueva Zelanda y Japón. Determinar anticuerpos prevacunales a los de edades comprendidas entre 20 y 40 años
Hepatitis B	Administrar si indicada	Alta prevalencia: Este de Asia, Sudeste de Asia, Oriente Medio, África, Cuenca amazónica y Sudamérica. Prevalencia baja: Norteamérica, Cono sur americano, Oeste y Norte de Europa, Australia y Nueva Zelanda. El resto de áreas son de baja prevalencia
Sarampión, Rubeola, Parotiditis y Varicela	Evitar durante el embarazo	Distribución mundial
Cólera	No determinada la seguridad	Áreas tropicales de Asia, África y recientemente Sudamérica
Encefalitis Japonesa B	No determinada la seguridad	Japón (rara), Corea, China, Sudeste de Asia y Subcontinente indio
Meningococo	Administrar si indicada	Endémica en el África Subsahariana en época de lluvias, Diciembre a Junio. Requisito indispensable para peregrinos a La Meca
Rabia	Administrar si indicada	Mayor riesgo en países con rabia canina: América Central, países del norte de Sudamérica, Subcontinente indio y Sudeste de Asia. Menos riesgo, pero existe, en otros países de Asia o Sudamérica y en África
Fiebre tifoidea	No determinada la seguridad de la Ty21a y de la ViCPS	Asia, África, América Central y del Sur
Fiebre amarilla	Después de los 6 meses de embarazo y cuando el riesgo de exposición sea muy alto	África y zona tropical de Sudamérica
Gripe	Administrar si indicada y siempre que no hayan recibido la vacuna en esa temporada	De abril a septiembre en viajes a hemisferio sur y todo el año en viajes al trópico

Noviembre 2006