

V. TABLAS

1. INDICADOR ADMISIONES A TRATAMIENTO POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

TABLA 1.1. NÚMERO TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. DISTRIBUCIÓN POR CENTROS. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1996 (*)

CENTROS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total	%
CAD. MURCIA	105	125	118	135	483	36,8
CSM. CARTAGENA	107	101	94	84	386	29,4
CSM. LORCA	18	6	3	5	32	2,4
CSM. CARAVACA	3	-	2	5	10	0,8
CSM. YECLA	8	8	7	12	35	2,7
CSM. JUMILLA	4	2	13	12	31	2,4
PROGRAMA DE PRISIONES	65	56	49	53	223	17,0
CSM. CIEZA	48	15	28	23	114	8,7
REGIÓN DE MURCIA	358	313	314	329	1.314	100

(*) El protocolo 1996, recoge todas las sustancias psicoactivas. Estos datos no son comparables a años anteriores. En esta tabla se ha excluido el alcohol.

(*) Incluye tanto primeros tratamientos como tratamientos sucesivos.

Fuente: **Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM**

TABLA 1.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1996 (*)

NÚMERO DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS	1.314
DROGAS PRIMARIAS QUE INICIAN LOS TRATAMIENTOS (%)	
Heroína	66,7
Heroína + Cocaína	18,9
Cocaína	8,7
Cannabis	3,8
Otras sustancias (anfetaminas, benzodiacepinas, inhalantes)	2,1
SEXO(%)	
Hombres	89
Mujeres	11
EDAD MEDIA (AÑOS)	27,4
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO	20,2
NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO	7,2
VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL	
Oral	1,4
Fumada	22,3
Inhalada	23,3
Inyectada	42,8
Esnifada	9,2
Otras	0,2
Desconocida	0,5

(*) Incluye tanto primeros tratamientos como tratamientos sucesivos. Los valores entre corchetes, en todas las tablas son número de casos.

Fuente: **Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM**

TABLA 1.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO, POR DROGA PRINCIPAL DE CONSUMO. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1996 (*)

	Heroína	Cocaína	Heroína + Cocaína
Nº DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS	877	114	248
SEXO (%)			
Hombres	87,8	93,9	91,1
Mujeres	12,2	6,1	8,9
EDAD MEDIA (AÑOS)	27,3	27,5	28,4
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO	20,2	22,2	19,3
NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO	7,1	5,3	9,1
CONSUMO DE OTRAS DROGAS LOS 30 DÍAS ANTERIORES			
Cannabis	49,3	61,7	60,4
Heroína	-	4,9	-
Cocaína	65,3	-	-
Anfetaminas	2,0	17,3	2,9
Alcohol	24,5	68,0	32,4
Hipnóticos/sedantes	19,8	3,7	36,0
Otros Opiáceos	11,7	-	12,2
VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL			
Oral	0,3	-	-
Fumada	24,5	14,0	4,5
Inhalada	33,9	6,1	0,8
Inyectada	37,7	3,5	93,1
Esnifada	3,6	76,3	1,6

(*) Incluye tanto primeros tratamientos como tratamientos sucesivos.

Fuente: **Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM**

TABLA 1.4. DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD DE LOS CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO, POR DROGA PRINCIPAL (PORCENTAJES). REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1996 (*)

	DROGA PRINCIPAL			
	Total	Heroína	Cocaína	Heroína + Cocaína
HOMBRES				
Edad				
15 - 19	8,9	8,1	14,0	5,8
20 - 24	28,3	29,4	21,5	24,8
25 - 29	30,9	32,5	29,0	32,3
30 - 34	21,5	20,4	21,5	26,5
35 - 39	7,2	6,4	10,3	7,1
40 - 44	2,2	2,1	2,8	3,1
>=45	1,0	1,2	0,9	0,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Total casos	1168	769	107	226
MUJERES				
Edad				
15 - 19	15,9	14,0	28,6	9,1
20 - 24	30,3	36,4	28,6	13,6
25 - 29	29,7	25,2	28,6	50,0
30 - 34	18,6	20,6	-	22,7
35 - 39	2,1	1,9	14,3	-
40 - 44	2,8	0,9	-	4,5
>=45	0,7	0,9	-	-
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Total casos	145	107	7	22
AMBOS SEXOS				
Edad				
15 - 19	9,7	8,8	14,9	6,0
20 - 24	28,5	30,3	21,9	23,8
25 - 29	30,8	31,6	28,9	33,9
30 - 34	21,2	20,4	20,2	26,2
35 - 39	6,6	5,8	10,5	6,5
40 - 44	2,3	1,9	2,6	3,2
>=45	1,0	1,1	0,9	0,4
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Total casos	1313	876	110	248

NOTA: Las bases de cálculo para las distintas variables pueden ser diferentes debido a que a veces se desconoce el valor de alguna.

(*) Incluye tanto primeros tratamientos como tratamientos sucesivos.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

TABLA 1.5. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD AL PRIMER CONSUMO DE LA DROGA PRINCIPAL, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD (PORCENTAJES). REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1996 (*)

	EDAD DEL PRIMER CONSUMO						Total	Número Casos
	<15	15-17	18-20	21-23	24-26	>26		
SEXO								
Hombres	15,6	30,5	22,9	11,9	7,8	11,3	100,0	1.114
Mujeres	22,7	27,7	21,3	11,3	8,5	8,5	100,0	141
Total	16,4	30,2	22,7	11,8	7,9	11,0	100,0	1.285
EDAD								
15 - 19	44,4	45,2	10,3	-	-	-	100,0	126
20 - 24	20,1	42,9	29,9	7,1	-	-	100,0	368
25 - 29	11,8	26,6	26,9	21,0	11,3	2,6	100,0	391
30 - 34	11,7	21,5	16,8	12,0	16,4	21,5	100,0	274
35 - 39	2,4	8,3	21,4	9,5	11,9	46,4	100,0	84
40 - 44	3,6	7,1	-	7,1	7,1	75,0	100,0	28
>=45	-	-	-	7,7	-	92,3	100,0	13
Total	16,4	30,1	22,7	11,8	7,9	11,0	100,0	1.284

NOTA: La discordancia existente entre los totales de ambas variables se debe a la no cumplimentación de éstas en algunos casos.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

TABLA 1.6. DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS POR AÑOS TRANSCURRIDOS ENTRE EL PRIMER CONSUMO Y LA ADMISIÓN A TRATAMIENTO POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD (PORCENTAJES). MURCIA. 1996

	NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO											TOTAL N.º Casos
	<3	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	>20	
SEXO												
Hombres	16,6	15,6	20,2	13,5	8,7	8,8	6,0	6,5	2,3	1,3	0,6	1.144
Mujeres	21,3	24,8	17,7	7,8	4,3	7,1	7,8	3,5	4,3	-	1,4	141
Total	17,1	16,6	19,9	12,8	8,2	8,6	6,2	6,1	2,5	1,2	0,7	1.285
GRUPOS DE EDAD (años)												
15 - 19	53,2	27,8	15,1	4,0	-	-	-	-	-	-	-	126
20 - 24	20,7	23,4	30,7	14,7	5,2	3,8	1,1	0,3	-	0,3	-	368
25 - 29	10,5	13,8	18,2	16,4	13,3	15,6	8,7	2,8	0,8	-	-	391
30 - 34	10,2	8,8	12,8	9,5	8,8	9,9	12,0	17,5	8,0	1,8	0,7	274
35 - 39	7,1	9,5	11,9	14,3	7,1	7,1	6,0	16,7	8,3	8,3	3,6	84
40 - 44	-	10,7	28,6	10,7	10,7	7,1	7,1	14,3	-	-	10,7	28
>=45	15,4	23,1	-	7,7	-	7,7	15,4	7,7	-	15,4	7,7	13
Total	17,1	16,6	19,9	12,9	8,1	8,6	6,2	6,2	2,5	1,2	0,7	1.284

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

TABLA 1.7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO POR CONSUMO DE OPIÁCEOS O COCAÍNA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE REGIÓN DE MURCIA 1996 - 1994

	Año 1996	Año 1995	Año 1994
NÚMERO DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS	1.243	1075	1200
DROGAS PRIMARIAS QUE INICIAN LOS TRATAMIENTOS (%)			
Heroína	70,6	90,2	92,6
Cocaína	9,2	9,6	7,0
Otros	0,2	0,1	0,3
Heroína + Cocaína (1)	20,0		
SEXO (%)			
Hombres	89,1	90,3	87,3
Mujeres	10,9	9,6	12,79
EDAD MEDIA (AÑOS)	27,5	27,1	26,4
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO	20,2	20,3	20,1
NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO	7,2	6,8	6,4
VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL			
Oral	0,4	0,3	0,1
Fumada	19,4	35,3	29,6
Inhalada	24,5	0,3	1,5
Inyectada	45,3	54,8	57,5
Esnifada	9,8	8,7	7,6
Otras	0,1	-	-
Desconocida	0,5	0,6	3,6

(*) Incluye tanto primeros tratamientos como tratamientos sucesivos

(1) En el año 1996, con la modificación del protocolo, se ha incluido como droga principal, las admisiones a tratamiento por heroína + cocaína, en años anteriores estos casos se consideraban como heroína.

Fuente: **Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM**

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES ADMITIDOS A TRATAMIENTO POR PRIMERA VEZ POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

TABLA 1.8. NÚMERO TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO EL PRIMER TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. DISTRIBUCIÓN POR CENTROS. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1996

CENTROS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total	%
CAD. MURCIA.....	41	63	52	73	229	42,6
CSM. CARTAGENA.....	32	32	35	41	140	26,1
CSM. LORCA.....	16	2	2	3	23	4,1
CSM. CARAVACA.....	3	-	1	1	5	0,9
CSM. YECLA.....	5	5	4	6	20	3,7
CSM. JUMILLA.....	2	1	8	8	19	3,5
PROGRAMA DE PRISIONES.....	17	16	11	10	54	10,1
CSM CIEZA.....	16	10	15	6	47	8,8
REGIÓN DE MURCIA.....	132	129	128	148	537	100,0

Estos datos no son comparables a años anteriores.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

TABLA 1.9. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO PRIMER TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1996

NÚMERO DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS.....	537
DROGAS PRIMARIAS QUE INICIAN LOS TRATAMIENTOS (%)	
Heroína.....	59,2
Heroína + Cocaína.....	12,1
Cocaína.....	17,1
Cannabis.....	7,6
Otros opiáceos.....	0,6
Otras sustancias (anfetaminas, éxtasis, benzodiacepinas).....	2,2
SEXO (%)	
Hombres.....	87,7
Mujeres.....	12,3
EDAD MEDIA (AÑOS).....	26,2
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO.....	20,6
NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO.....	5,5
VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL	
Oral.....	2,8
Fumada.....	35,0
Inhalada.....	21,8
Inyectada.....	24,0
Esnifada.....	15,8
Otras.....	0,2
Desconocida.....	0,4

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

TABLA 1.10. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO PRIMER TRATAMIENTO, POR DROGA PRINCIPAL DE CONSUMO. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1996

	Heroína	Cocaína	Heroína + Cocaína
Nº DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS	318	92	65
SEXO (%)			
Hombres	85,5	93,4	90,8
Mujeres	14,5	6,6	9,2
EDAD MEDIA (AÑOS)	25,7	26,9	27,0
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO	20,6	22,0	18,9
NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO	5,1	4,9	8,0
CONSUMO DE OTRAS DROGAS LOS 30 DÍAS ANTERIORES			
Cannabis	50,9	62,7	81,1
Heroína	-	4,5	-
Cocaína	59,0	-	2,7
Anfetaminas	3,7	19,4	2,7
Alcohol	25,2	73,1	29,7
Hipnóticos/sedantes	16,8	3,0	32,4
Otros Opiáceos	5,1	-	2,7
VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL			
Oral	0,3	-	-
Fumada	40,4	10,9	10,8
Inhalada	34,7	6,5	1,5
Inyectada	22,4	2,2	84,6
Esnifada	2,2	80,4	3,1

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

TABLA 1.11. DISTRIBUCIÓN POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD DE LOS CASOS QUE HAN INICIADO PRIMER TRATAMIENTO, POR DROGA PRINCIPAL (PORCENTAJES). REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1996

	Total	Heroína	Cocaína	Heroína + Cocaína
HOMBRES				
Grupo de Edad				
15 - 19	16,2	15,1	16,3	11,9
20 - 24	32,3	33,6	25,6	32,2
25 - 29	25,5	26,2	27,9	32,2
30 - 34	17,4	19,6	16,3	11,9
35 - 39	5,7	3,7	9,3	6,8
40 - 44	1,3	0,4	3,5	3,4
>=45	1,5	1,5	1,2	1,7
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Total casos	470	271	86	59
MUJERES				
Grupo de Edad				
15 - 19	21,2	15,2	33,3	16,7
20 - 24	40,9	54,3	33,3	-
25 - 29	21,2	17,4	16,7	50,0
30 - 34	12,1	13,0	-	33,3
35 - 39	1,5	-	16,7	-
40 - 44	3,0	-	-	-
>=45	-	-	-	-
Total	100,0	100,0	100,0	100,0
Total casos	66	46	6	6

NOTA: Las bases de cálculo para las distintas variables pueden ser diferentes debido a que a veces se desconoce el valor de alguna.

Fuente: **Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM**

TABLA 1.12. DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS ADMITIDOS POR PRIMERA VEZ A TRATAMIENTO POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS SEGÚN EDAD DEL PRIMER CONSUMO DE LA DROGA PRINCIPAL, POR SEXO Y GRUPO DE EDAD. MURCIA 1996

	EDAD DEL PRIMER CONSUMO						Total	Número Casos
	<15	15-17	18-20	21-23	24-26	>26		
SEXO								
Hombres	16,6	28,8	21,3	11,0	9,0	13,3	100,0	465
Mujeres	16,7	36,4	16,7	10,6	12,1	7,6	100,0	66
Total	16,6	29,8	20,7	10,9	9,4	12,6	100,0	531
GRUPO DE EDAD								
15 - 19	40,0	50,0	10,0	-	-	-	100,0	90
20 - 24	16,9	35,6	35,6	11,9	-	-	100,0	177
25 - 29	12,1	22,0	19,7	18,9	21,2	6,1	100,0	132
30 - 34	5,6	18,0	9,0	10,1	21,3	36,0	100,0	89
35 - 39	-	11,1	14,8	3,7	11,1	59,3	100,0	27
40 - 44	12,5	12,5	-	12,5	-	62,5	100,0	8
>=45	-	-	-	14,3	-	85,7	100,0	7
Total	16,6	29,6	20,8	10,9	9,4	12,6	100,0	530

NOTA: La discordancia existente entre los totales de ambas variables se debe a la no cumplimentación de éstas en algunos casos.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

TABLA 1.13. DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS SIN TRATAMIENTO PREVIO SEGÚN LOS AÑOS TRANSCURRIDOS ENTRE EL PRIMER CONSUMO Y LA ADMISIÓN A TRATAMIENTO, POR SEXO Y GRUPO DE EDAD (PORCENTAJES). MURCIA 1996

	NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO											N.º Casos
	<3	3-4	5-6	7-8	9-10	11-12	13-14	15-16	17-18	19-20	>20	
SEXO												
Hombres	32,3	17,8	17,6	9,5	5,4	6,7	3,7	4,7	1,1	0,9	0,4	465
Mujeres	36,4	27,3	16,7	4,5	3,0	6,1	1,5	1,5	-	-	3,0	66
Total	32,8	19,0	17,5	8,9	5,1	6,6	3,4	4,3	0,9	0,8	0,8	531
GRUPOS DE EDAD (años)												
15 - 19	63,3	24,4	11,1	1,1	-	-	-	-	-	-	-	90
20 - 24	33,9	23,7	22,6	10,7	3,4	4,0	1,1	0,6	-	-	-	177
25 - 29	22,7	15,2	14,4	14,4	8,3	13,6	7,6	3,0	0,8	-	-	132
30 - 34	22,5	10,1	20,2	6,7	6,7	7,9	5,6	15,7	1,1	2,2	1,1	89
35 - 39	18,5	14,8	14,8	7,4	7,4	7,4	-	11,1	11,1	7,4	-	27
40 - 44	-	12,5	25,0	-	12,5	12,5	-	12,5	-	-	25,0	8
>=45	28,6	42,9	-	-	-	-	14,3	-	-	-	14,3	7
Total	32,8	19,1	17,5	8,9	4,9	6,6	3,4	4,3	0,9	0,8	0,8	530

NOTA: La discordancia existente entre los totales de ambas variables se debe a la no cumplimentación de éstas en algunos casos.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

TABLA 1.14. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CASOS QUE HAN INICIADO PRIMER TRATAMIENTO POR CONSUMO DE OPIÁCEOS O COCAÍNA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA 1996- 1994

	Año 1996	Año 1995	Año 1994
NÚMERO DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS	478	443	568
DROGAS PRIMARIAS QUE INICIAN LOS TRATAMIENTOS (%)			
Heroína	66,5	81,0	90,5
Heroína + Cocaína (*)	13,6		
Cocaína	19,2	18,5	9,3
Otros opiáceos	0,6	0,2	0,2
SEXO (%)			
Hombres	87,9	90,3	87,8
Mujeres	12,1	9,7	12,1
EDAD MEDIA (AÑOS)	26,2	26,4	25,5
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO	20,7	21,3	20,6
NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO	5,4	5,1	4,9
VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL			
Oral	0,6	0,4	0,3
Fumada	30,3	50,1	41,2
Inhalada	24,5	0,4	1,7
Inyectada	27,0	32,0	44,4
Esnifada	17,4	16,7	10,9
Desconocida	0,2	0,2	1,40

(*) Hasta enero de 1996, los casos de admisiones a tratamiento por heroína y cocaína, se agrupaban junto con los de heroína.

Fuente: **Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM**

2. INDICADOR URGENCIAS HOSPITALARIAS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

TABLA 2.1. NÚMERO TOTAL DE EPISODIOS DE URGENCIAS POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. DISTRIBUCIÓN POR CENTROS. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1996

CENTROS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
HOSP. GENERAL DE MURCIA	115	170	209	204	699
HOSP. STA. M. ^ª DEL ROSELL	62	104	137	116	419
REGIÓN DE MURCIA	177	274	346	320	1.118

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

TABLA 2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS ATENDIDOS EN URGENCIAS POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1996

NÚMERO DE CASOS	1.118
SEXO %	
Hombres	85,9
Mujeres	13,9
EDAD MEDIA (AÑOS)	27,0
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS RELACIONADAS CON LA URGENCIA ⁽¹⁾	
Heroína	14,7
Cocaína	10,7
Desconocida ⁽²⁾	79,2
CONSUMO HABITUAL DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS ⁽³⁾ %	
Heroína	36,6
Heroína + Cocaína	2,3
Metadona	23,3
Cocaína	25,6
MOTIVO DE CONSULTA %	
Síndrome de abstinencia	42,9
Sobredosis	7,8
Reacción orgánica aguda	29,0
Reacción Psicopatológica	7,9
Desconocido	12,2
CONDICIÓN LEGAL %	
Detenidos	13,3
No detenidos	86,4
Desconocido	0,2

⁽¹⁾ Puede existir más de una sustancia relacionada con la urgencia.

⁽²⁾ Cuando en la historia clínica de urgencias, no se especifica la droga que ocasiona la urgencia, pero se sospecha que son por opiáceos o cocaína.

⁽³⁾ Puede existir que un paciente consuma más de una droga.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

TABLA 2.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CASOS ATENDIDOS EN URGENCIAS POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LA URGENCIA. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1996

	Heroína	Cocaína	Metadona
NÚMERO DE CASOS	151	26	13
SEXO %			
Hombres	80,8	84,6	92,3
Mujeres	19,2	15,4	7,7
EDAD MEDIA (AÑOS)	26,2	26,3	25,7
MOTIVO DE CONSULTA %			
Síndrome de abstinencia	58,3	19,2	23,1
Sobredosis	19,2	26,9	53,8
Reacción orgánica aguda	10,6	26,9	-
Reacción psicopatológica	3,3	15,4	7,7
Desconocido	8,6	11,5	15,4
CONDICIÓN LEGAL %			
Detenidos	29,31	7,7	7,7
No detenidos	70,69	92,3	92,3
RESOLUCIÓN DE LA URGENCIA %			
Alta médica	85,4	92,3	84,6
Alta voluntaria	9,3	3,8	7,7
Ingreso hospitalario	4,0	3,8	-
Muerte en urgencias	-	-	-
Traslado a otro centro	0,7	-	7,7
Desconocida	0,7	-	-
VÍA MÁS RECIENTE DE CONSUMO %			
Oral	-	-	7,7
Fumada	20,5	-	-
Inhalada	1,3	7,7	-
Esnifada	0,7	30,8	-
Inyectada	60,9	38,5	7,7
Desconocida	16,6	23,1	84,6
ESTADO SEROLÓGICO FRENTE AL V.I.H %			
Positivo	23,2	23,1	23,1
Negativo	12,6	15,4	15,4
No se ha realizado análisis	1,3	-	-
Desconocido	62,9	61,5	61,5

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

TABLA 2.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS CASOS ATENDIDOS EN URGENCIAS POR CONSUMO DE OPIÁCEOS O COCAÍNA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA

	Año 1996	Año 1995	Año 1994
NÚMERO DE CASOS	1.118	1.150	1.213
SEXO %			
Hombres	85,9	84,4	81,9
Mujeres	13,9	15,5	18,1
EDAD MEDIA (AÑOS)	27,0	27,0	26,9
DROGA QUE MOTIVA LA URGENCIA %			
Heroína	(*) 14,8	43,9	38,4
Cocaína	(*) 10,9	4,3	4,7
Metadona	(*) 2,0	1,0	11,9
Desconocida	(*)	50,6	44,9
MOTIVO DE CONSULTA %			
Síndrome de abstinencia	42,9	33,3	28,1
Sobredosis	7,8	8,9	13,7
Reacción indeseable (1)	—	1,0	1,5
Problema orgánico	29,0	30,3	35,4
Problema Psicopatológico	7,9	9,8	6,7
Otros (1)	—	16,5	14,4
Desconocido	12,2		
CONDICIÓN LEGAL %			
Detenidos	13,3	23,1	15,7
No detenidos	86,4	76,8	84,2

En el año 1996, se modificó el protocolo de recogida de información.

(*) Este año se recoge las sustancias psicoactivas directamente relacionadas con la urgencia actual. Puede haber más de una sustancia relacionada con el motivo de la urgencia.

(1) Estas categorías han desaparecido en el nuevo protocolo de 1996.

Fuente: **Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM**

3. INDICADOR ADMISIÓN A TRATAMIENTO POR ALCOHOL

TABLA 3.1. NÚMERO TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO POR CONSUMO DE ALCOHOL. DISTRIBUCIÓN POR CENTROS. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1996 (*)

CENTROS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
CAD-MURCIA	32	30	25	34	121
CSM-CARTAGENA	24	38	37	28	127
CSM-LORCA	8	7	9	8	32
CSM-CARAVACA	3	2	3	5	13
CSM-YECLA	5	4	1	1	11
CSM-JUMILLA	7	2	1	5	15
CAD-CIEZA	16	8	5	9	38
REGIÓN DE MURCIA	96	91	81	90	358

(*) Incluye tanto primeros tratamientos como tratamientos sucesivos.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías SITCAM.

TABLA 3.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO POR CONSUMO DE ALCOHOL. REGIÓN DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1996 (*)

NÚMERO DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS	358
SEXO	(%)
Hombres	88,5
Mujeres	11,5
EDAD MEDIA (AÑOS)	42,2
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO	21,6
NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO	19,3
CONSUMO DE OTRAS DROGAS LOS 30 DÍAS ANTERIORES	
Cocaína	4,2
Cannabis	3,9
Heroína	0,3
Anfetaminas	0,3
MDMA	0,3
Benzodiazepinas	0,3

(*) Incluye tanto primeros tratamientos como tratamientos sucesivos.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Región de Murcia.

TABLA 3.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS ADMITIDOS A TRATAMIENTO POR ALCOHOL SEGÚN EDAD DEL PRIMER CONSUMO. POR SEXO Y GRUPO DE EDAD (PORCENTAJES). MURCIA 1996

	EDAD DEL PRIMER CONSUMO						Total	Número Casos
	<15	15-17	18-20	21-23	24-26	>26		
SEXO								
Hombres	28,8	24,8	16,4	5,1	5,1	19,7	100,0	274
Mujeres	5,3	34,2	2,6	15,8	13,2	28,9	100,0	38
Total	26,0	26,0	14,7	6,4	6,1	20,8	100,0	312
GRUPO DE EDAD (años)								
15 - 19	50,0	50,0	-	-	-	-	100,0	4
20 - 24	26,7	26,7	26,7	20,0	-	-	100,0	15
25 - 29	39,4	42,4	6,1	9,1	3,0	-	100,0	33
30 - 34	30,0	26,0	10,0	10,0	8,0	16,0	100,0	50
35 - 39	24,6	19,7	21,3	1,6	6,6	26,2	100,0	61
40 - 44	22,6	37,7	9,4	7,5	7,5	15,1	100,0	53
>=45	20,8	16,7	17,7	4,2	6,3	34,4	100,0	96
Total	26,0	26,0	14,7	6,4	6,1	20,8	100,0	312

NOTA: La discordancia existente entre los totales de ambas variables se debe a la no cumplimentación de éstas en algunos casos.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

TABLA 3.4. DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS ADMITIDOS POR PRIMERA VEZ A TRATAMIENTO SEGÚN EDAD DEL PRIMER CONSUMO DE ALCOHOL POR SEXO Y GRUPO DE EDAD (PORCENTAJES). MURCIA 1996

	EDAD DEL PRIMER CONSUMO						Total	Número Casos
	<15	15-17	18-20	21-23	24-26	>26		
SEXO								
Hombres	28,3	23,3	16,4	5,7	5,0	21,4	100,0	159
Mujeres	-	36,4	-	22,7	9,1	31,8	100,0	22
Total	24,9	24,9	14,4	7,7	5,5	22,7	100,0	181
GRUPO DE EDAD (años)								
15 - 19	33,3	66,7	-	-	-	-	100,0	3
20 - 24	23,1	30,8	23,1	23,1	-	-	100,0	13
25 - 29	47,8	34,8	8,7	4,3	4,3	-	100,0	23
30 - 34	28,6	17,9	10,7	14,3	10,7	17,9	100,0	28
35 - 39	18,8	21,9	18,8	3,1	3,1	34,4	100,0	32
40 - 44	21,4	39,3	10,7	7,1	3,6	17,9	100,0	28
>=45	18,5	14,8	16,7	5,6	7,4	37,0	100,0	54
Total	24,9	24,9	14,4	7,7	5,5	22,7	100,0	181

NOTA: La discordancia existente entre los totales de ambas variables se debe a la no cumplimentación de éstas en algunos casos.

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM

TABLA 3.5. DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS QUE HAN DEMANDADO TRATAMIENTO POR ALCOHOL. SEGÚN SITUACIÓN LABORAL PRINCIPAL EN EL MOMENTO DE LA ADMISIÓN A TRATAMIENTO. AÑO 1996. REGIÓN DE MURCIA

	N.º DE CASOS	PORCENTAJE
Con relación laboral	111	31,0
Con relación laboral temporal	64	17,9
Trabajando sin sueldo	1	0,3
Parado, no habiendo trabajado	6	1,7
Parado, habiendo trabajado	90	25,1
Incapacitado permanentemente	58	16,2
Estudiando	2	0,6
Realizando labores de hogar	15	4,2
Otras situaciones	7	2,0
Desconocido	4	1,1
Total	358	100,0

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM).

TABLA 3.6. DISTRIBUCIÓN DE LOS CASOS QUE HAN DEMANDADO TRATAMIENTO POR ALCOHOL. SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. AÑO 1996. REGIÓN DE MURCIA

	N.º DE CASOS	PORCENTAJE
No sabe leer ni escribir	18	5,0
No aprobó estudios primarios o 5.º de EGB	107	29,9
Estudios primarios o 5.º de EGB	107	29,9
Bachiller elemental o Graduado Escolar	78	21,8
Bachiller superior o BUP	29	8,1
Estudios universitarios medios	8	2,2
Estudios universitarios superiores	5	1,4
Otros títulos superiores no universitarios	4	1,1
Desconocidos	2	0,6
Total	358	100,0

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM).

4. INDICADOR ADMISIÓN A TRATAMIENTO EN EL PROGRAMA DE METADONA EN LA UNIDAD MÓVIL

TABLA 4.1. NÚMERO TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO DE METADONA EN LA UNIDAD MÓVIL. MUNICIPIO DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1996

CENTROS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
UNIDAD MÓVIL DE METADONA	66	49	56	48	300

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM).

TABLA 4.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TOTAL DE CASOS QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO DE METADONA EN LA UNIDAD MÓVIL. MUNICIPIO DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1996

NÚMERO DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS	300
DROGAS PRIMARIAS POR LAS QUE INICIAN LOS TRATAMIENTOS (%)	
Heroína	54,3
Heroína + Cocaína	45,7
SEXO (%)	
Hombres	88,3
Mujeres	11,7
EDAD MEDIA (AÑOS)	26,5
EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO	18,3
NÚMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO	8,0
ESTADO SEROLÓGICO FRENTE AL V.I.H. (%)	
Positivo	20,0
Negativo con análisis en los últimos 6 meses	23,0
Negativo sin análisis en los últimos 6 meses	17,7
Negativo sin saber fecha de análisis	17,3
Con análisis, pero pendiente de resultado	1,3
No se ha realizado análisis	12,7
Desconocido	8,0
VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL	
Fumada/Inhalada	37,4
Inyectada	59,7
Esnifada	2,7
Otras	0,3

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM).

5. INDICADOR PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN COMISARÍA

TABLA 5.1. NÚMERO TOTAL DE CASOS QUE HAN ENTRADO EN EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN COMISARÍA POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. MUNICIPIO DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1996

CENTROS	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Total
PROGRAMA COMISARÍA	31	26	31	29	117

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM)

TABLA 5.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL TOTAL DE CASOS QUE HAN ENTRADO EN EL PROGRAMA DE COMISARÍA. MUNICIPIO DE MURCIA. SITCAM: AÑO 1996

NÚMERO DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS	117
DROGAS PRIMARIAS POR LAS QUE INICIAN LOS TRATAMIENTOS (%)	
Heroína	95,0
Cocaína	3,4
Cannabis	0,9
Alcohol	0,9
SEXO (%)	
Hombres	91,5
Mujeres	8,5
VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE LA DROGA PRINCIPAL	
Oral	0,9
Fumada	19,7
Inhalada	6,8
Inyectada	63,2
Esnifada	3,4
Desconocida	6,0

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM)

TABLA 5.3. DISTRIBUCIÓN DE TODOS LOS CASOS ADMITIDOS EN EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE COMISARÍA POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. SEGÚN LA SITUACIÓN LABORAL. REGIÓN DE MURCIA. AÑO 1996

	N.º DE CASOS	PORCENTAJE
Con relación laboral o contrato indefinido o cuenta propia	5	4,3
Con contrato o relación laboral temporal	3	2,6
Trabajando sin sueldo para la familia	4	3,4
Parado, no habiendo trabajado antes	12	10,3
Parado, habiendo trabajado antes	73	62,4
Incapacitado permanente, pensionista	4	3,4
Estudiando u opositando	1	0,9
Realizando exclusivamente labores del hogar	—	—
Otras situaciones	4	3,4
Desconocida	11	9,4
Total	117	100,0

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM).

TABLA 5.4. DISTRIBUCIÓN DE TODOS LOS CASOS ADMITIDOS EN EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE COMISARÍA POR CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS. REGIÓN DE MURCIA. AÑO 1996

	N.º DE CASOS	PORCENTAJE
No sabe leer ni escribir	12	10,3
No aprobó estudios primarios o 5.º de EGB	43	36,8
Estudios primarios o 5.º de EGB	17	14,5
Bachiller elemental o Graduado Escolar	26	22,2
Bachiller superior o BUP	15	12,8
Estudios universitarios medios	—	—
Estudios universitarios superiores	—	—
Otros títulos superiores no universitarios	—	—
Desconocidos	4	3,4
Total	117	100,0

Fuente: Sistema de Información sobre Toxicomanías. (SITCAM).

VI. ANEXOS

ANEXO 3

SITCAM

HOJA DE REGISTRO INDIVIDUAL DE MUERTE
POR REACCIÓN AGUDA A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS (MUERTE RASUPSI)

1. Nombre y apellidos del fallecido

2. DNI del fallecido

3. N° de informe forense o de autopsia

4. N° de informe toxicológico

5. N° de diligencias previas

6. N° Matriz 01079

6. N° Matriz 0001079

7. Institución en la que se ha cumplimentado esta hoja

19. Estado civil

- Soltero
- Casado
- Separado legalmente/divorciado
- Viudo
- Desconocido

8. N° de juzgado que tramita el caso

8.A. Situado en la localidad de

INFORMACIÓN FÍSICA

20. Procedencia del cadáver

1. Domicilio
2. Hotel o pensión
3. Calle
4. Establecimiento público
5. Hospital
6. Cárcel
7. Otra
9. Desconocida

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA

9. Provincia de defunción (códigos al dorso)

10. Municipio de defunción

11. Fecha de defunción

21. Criterios clínicos de muerte RASUPSI que cumple el fallecido

21.A. Evidencias de consumo reciente de sustancias psicoactivas

1. Sí
2. No
9. Desconocido

12. DOS primeras letras de los dos apellidos del fallecido
(Rodear con un círculo una letra de cada abecedario)

12.A. Primera letra del primer apellido

12.B. Segunda letra del primer apellido

12.C. Primera letra del segundo apellido

12.D. Segunda letra del segundo apellido

(Transcribir en CCAA)

- Evidencias clínicas documentadas de patología aguda por consumo de sustancias psicoactivas inmediatamente antes de la muerte.
- Signos físicos de administración reciente de sustancias psicoactivas (venopunciones) o presencia de restos de sustancia psicoactiva en la boca, fosas nasales, estómago, etc.)
- Presencia de sustancias psicoactivas o utensilios (jeringuilla, papel de aluminio, bote de pastillas, etc.) en el lugar de la defunción.
- Antecedentes de consumo reciente referidos por familiares o amigos, o conocidos por el forense en peritajes médico-legales previos.

21.B. Signos de autopsia compatibles con muerte RASUPSI

1. Sí
2. No
9. Desconocido

13. Sexo

1. Hombre
2. Mujer
9. Desconocido

21.C. Diagnóstico forense de muerte RASUPSI

1. Sí
2. No

14. Fecha de nacimiento

22. Evidencias de suicidio

1. Fuertes evidencias
2. Indicios o sospecha
3. Ninguna evidencia o indicio

15. Edad

23. Signos recientes de venopunciones
(de menos de 1 semana de antigüedad)

1. Sí
2. No
9. Desconocido

16. Provincia de nacimiento (códigos al dorso)

17. Provincia de residencia (códigos al dorso)

18. Municipio de residencia

(Codificar en CCAA)

24. Muerte cuya causa básica es una patología previa importante agravada o complicada por el consumo de sustancias psicoactivas

1. Sí
2. No
9. Desconocido

ANEXO 4**RELACIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS DE LA REGIÓN DE MURCIA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DROGODEPENDENCIAS****SERVICIOS CENTRALES**

Unidad de Coordinación Regional de Drogodependencias (Información, Prevención y Planificación)	36 22 48 - 36 23 03
Sistema de Información sobre Toxicomanías. SITCAM.....	36 20 39

ÁREA DE SALUD 1 (MURCIA)

Centro de Atención de Drogodependencias (CAD)	36 22 07 - 36 22 08
Programas de Atención a Drogodependencias en Inst. Penitenciarias. (Programa II.PP.)	21 88 93
Unidad de Tratamiento con Opiáceos (UTO)	36 22 07 - 36 22 08
Unidad de Desintoxicación Hospitalaria (UDH)	25 69 00
Unidad de Agudos (Hospital Psiquiátrico «Román Alberca»).....	84 04 00

ÁREA DE SALUD 2 (CARTAGENA)

Centro de Salud Mental (CSM).....	52 91 11 - 52 91 86
Unidad de Tratamiento con Opiáceos (UTO)	52 91 11 - 52 91 86
Unidad de Desintoxicación Hospitalaria (UDH)	50 27 50
Comunidad Terapéutica (C.T.) «La Huertecica».....	53 00 11 - 51 01 92

ÁREA DE SALUD 3 (LORCA)

Centro de Salud Mental (CSM).....	46 91 79 - 46 83 00
Unidad de Tratamiento con Opiáceos (UTO)	46 91 79 - 46 83 00
Unidad de Salud Mental-Drogodependencias	41 19 56

ÁREA DE SALUD 4 (NOROESTE)

Centro de Salud Mental (CSM). Caravaca	70 83 22
Comunidad Terapéutica Betania.....	74 26 47

ÁREA DE SALUD 5 (ALTIPLANO)

Centro de Salud Mental (CSM) Jumilla	78 22 61
Centro de Salud Mental (CSM) Yecla	75 16 50
Unidad de Tratamiento con Opiáceos (UTO) Yecla	75 16 50

ÁREA DE SALUD 6 (CIEZA-MOLINA)

Centro de Salud. Unidad de Salud Mental	76 24 20
---	----------

VII. BIBLIOGRAFÍA

- Celdrán Lorente, J. Estudio de calidad del SITCAM-1988. Indicador Inicio de Tratamiento. Dirección General de Salud. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1990; 12: 27-32. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia.
- Correa Rodríguez, J. F., Navarro Sánchez, C. **Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia. Año 1989.** Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia. **Serie Documentos 1.** Murcia 1990.
- Correa Rodríguez, J. F., Navarro Sánchez, C. **Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia. Año 1995.** Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia. **Serie Documentos 2.** Murcia 1996.
- Correa Rodríguez, J. F. Consumo de opiáceos o cocaína en la Región de Murcia, 1995. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1996; 17: 53-56. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad y Política Social. Región de Murcia.
- Correa Rodríguez, J. F. Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia (SITCAM) año 1989. Indicador Inicio de Tratamiento. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1990; 12: 32-37. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia.
- Correa Rodríguez, J. F. Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia (SITCAM) año 1989 Indicador Urgencias. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1990; 12: 38-43. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia.
- Correa Rodríguez, J. F. Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia (SITCAM) año 1989. Indicador Alcohol. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1990; 12: 110-113. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia.
- Correa Rodríguez, J. F. Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia (SITCAM) Indicador Tratamiento. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1992; 13: 43-46. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia.
- Correa Rodríguez, J. F. Características de la población reclusa que ha demandado tratamiento por opiáceos o cocaína en la Región de Murcia en el período 1988-1991. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1992; 13: 69-76. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad. Región de Murcia.
- Correa Rodríguez, J. F., Egea Zapata C. Características de la población que ha acudido a urgencias por consumo de alcohol en el Hospital General Universitario de Murcia durante el período 1991-1992. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1993; 14: 111-116. Dirección General de Salud y Consumo. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Región de Murcia.
- Correa Rodríguez, J. F. Sistema de Información sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia (SITCAM) 1992. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1993; 14: 137-142. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Región de Murcia.
- Correa Rodríguez, J. F. Población admitida a tratamiento por opiáceos o cocaína en la Región de Murcia en 1993. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1994; 15: 25-30. Dirección General de Salud y Consumo. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Región de Murcia.
- Correa Rodríguez, J. F. Consumo de opiáceos o cocaína en la Región de Murcia, 1994. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1995; 16: 77-84. Dirección General de Salud y Consumo. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F. Características de la población que ha acudido a urgencias hospitalarias por consumo de opiáceos/cocaína en la Región de Murcia 1989-1994. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1995; 16: 117-122. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad y Política Social. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F. Consumo de opiáceos o cocaína en la Región de Murcia en 1995. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1996; 17: 53-56. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad y Política Social. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F. Encuesta domiciliaria sobre uso de drogas 1995. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1997; 18: 5-12. Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad y Política Social. Región de Murcia.

Correa Rodríguez, J. F. Consumo de sustancias psicoactivas en la Región de Murcia en el año 1996. **Bol. Epidemiol. Murcia** 1997; 18: Dirección General de Salud. Consejería de Sanidad y Política Social. Región de Murcia.

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1987. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1988.

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1988. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1989

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1989. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1990

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1990. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1991

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1991. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1992

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1992. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1993

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1993. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1994

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Informe del año 1994. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1995.

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal sobre Toxicomanías. Protocolo del Indicador admisiones a tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas, 1996. Madrid 1996 (Docum. mimeo).

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal sobre Toxicomanías. Protocolo del Indicador Urgencias Hospitalarias Directamente relacionadas con el consumo de Sustancias Psicoactivas, 1996. Madrid 1996 (Docum. mimeo).

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal sobre Toxicomanías. Protocolo del Indicador Mortalidad por Reacción aguda a Sustancias Psicoactivas, 1996. Madrid 1996 (Docum. mimeo).

Grupo de trabajo del SEIT. Admisiones a tratamiento por consumo de opiáceos y cocaína en España. *Gac San* 1990; 4: 4-11.

Roca J., Antó J. M. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías. Protocolo. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Ministerio de Sanidad y Consumo. Madrid 1986.

PUBLICACIONES DE LA CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL RELACIONADAS CON ESTE TEMA

Boletín Epidemiológico de Murcia. E-mail:bolepi@carm.es

Guía para maestros: Lo que debes saber sobre el tabaquismo. Murcia 1989.

SIDA y Adolescencia. Murcia 1991.

SIDA. Guía del Educador. Murcia 1992.

SERIE PLAN DE SALUD DE LA REGION DE MURCIA

Análisis de situación 1994. Murcia 1994.

Protocolo de atención al SIDA. Murcia 1994.

SERIE PLAN DE SALUD MENTAL DE LA REGION DE MURCIA

Guía para la organización, funcionamiento y evaluación de Centros de Salud Mental: Atención a Drogodependencias. Murcia 1995.

SERIE DOCUMENTOS

Sistema de información sobre toxicomanías en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 1989 (n.º 1). Murcia 1990.

Sistema de información sobre toxicomanías en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 1995 (n.º 2). Murcia 1996.

OTRAS PUBLICACIONES

Educación para la Salud en Enseñanza Secundaria. SIDA. Murcia 1992.

Plan de Salud de la Región de Murcia 1993-1996. Murcia 1992.

Plan de Salud de la Región de Murcia 1993-1996. Objetivos. Murcia 1992.

Plan Autonómico sobre Drogas 1993-1996. Murcia 1993.

Guía de Prevención. Orientaciones a los padres para prevenir las drogodependencias. Murcia 1995.

RELACIÓN DE CENTROS QUE HAN COLABORADO CON EL SITCAM

CENTRO DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS (CAD) DE MURCIA.
C/ LUIS FONTES PAGÁN, S/N. 30071 MURCIA
COORDINADORA: AMADEO VALORIA MARTÍNEZ

CENTRO DE SALUD MENTAL DE CARTAGENA. UNIDAD DROGODEPENDENCIAS
C/ REAL, 8, 30201 - CARTAGENA
COORDINADOR: JUAN JIMÉNEZ ROSET

CENTRO DE SALUD MENTAL DE LORCA
C/ ABAD DE LOS ARCOS, S/N 30800 LORCA
COORDINADOR: RAMÓN VIZÁN FERRERO

CENTRO DE SALUD MENTAL DE CARAVACA
C / ALFONSO ZAMORA , 15, 1.º PLANTA, 30400 CARAVACA
COORDINADOR: ANTONIO MICOLL TORRES

CENTRO DE SALUD MENTAL DE YECLA
C/ SAN JOSE, 8, 30510 YECLA
COORDINADOR: FERNANDO NAVARRO MATEO

CENTRO DE SALUD MENTAL DE JUMILLA
C/ BARON DEL SOLAR, S/N, 30520 JUMILLA
COORDINADORA: FERNANDO NAVARRO MATEO

PROGRAMA DE LA UNIDAD MÓVIL DE DROGODEPENDENCIAS
C/ RONDA DE LEVANTE, 11, 4.º PLANTA, S/N - 30008 MURCIA
COORDINADOR: JULIÁN OÑATE GÓMEZ

HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE MURCIA
C/ INTENDENTE JORGE PALACIOS, 1 - 30003 MURCIA

HOSPITAL SANTA MARÍA DEL ROSELL DE CARTAGENA
PASEO ALFONSO XIII, CARTAGENA

PROGRAMA DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS DE CRUZ ROJA
C/ GENERAL SAN MARTÍN, 3 MURCIA
COORDINADORA: RAMONA MUÑOZ ESPARZA

PROGRAMA DE COMISARÍA DE CRUZ ROJA
C/ GENERAL SAN MARTÍN, 3 MURCIA
COORDINADORA: RAMONA MUÑOZ ESPARZA

INSTITUTO ANATÓMICO-FORENSE DE CARTAGENA
C/ ANGEL BRUNA, CARTAGENA
DIRECTOR: EMILIO PÉREZ PUJOL

CENTRO DE MEDICINA LEGAL Y FORENSE DE MURCIA
C/ LUIS FONTES PAGAN, 2 MURCIA
DECANO DEL CENTRO: RAFAEL M^º BAÑÓN GONZÁLEZ



Región de Murcia
Consejería de Sanidad
y Política Social

Dirección General de la Salud

