



## Consumo de opiáceos o cocaína en la Región de Murcia en 1995

### Indicador admisión a tratamiento

El número total de casos admitidos a tratamiento por consumo de opiáceos o cocaína ha sido de 1.075, descendiendo un 10% respecto del año 1994. Este descenso se ha producido en todos los centros de tratamiento. Las características generales de los casos admitidos a tratamiento,<sup>1\*</sup> según hayan realizado tratamiento previo o sea el primer tratamiento, se presentan en la tabla 1.

### Características generales de TODOS LOS CASOS ADMITIDOS A TRATAMIENTO

La distribución por sexo, en el 90,3% de los casos corresponde a hombres, siendo tres puntos superior al año 94.

La edad media de estos pacientes cuando demandan tratamiento es de 27 años, siendo la edad media al iniciar el consumo de la droga principal de 20,3 años, y el número medio de años de consumo de 6,7.

Por grupos de edad, el 82% de todas las admisiones a tratamiento se encuentran entre los 20 y 34 años.

La droga principal por la que se demanda tratamiento, respecto del año 1994, se ha modificado ligeramente en porcentaje, aumentando los pacientes que demandan tratamiento por cocaína del 7% al 9,6%, siendo los valores absolutos de 84 casos en el 94 y de 103 casos en el 95; los consumidores de heroína han descendido del 92,6% (1112 casos) al 90% (970 casos).

El inicio en el consumo de cocaína se produce a mayor edad que el de heroína (22 y 20 años, respectivamente). También los consumidores de cocaína demandan tratamiento a una edad más alta que los de heroína. Sin embargo, el tiempo que tardan en demandar tratamiento los consumidores de cocaína es algo menor que el de los consumidores de heroína (7 y 5,2 años, respectivamente).

En el número de drogas secundarias consumidas al demandar tratamiento, el 40,8% de los pacientes consumían tres o más drogas. Existe un descenso del policonsumo que se empezó a observar en el año 1991, aunque en este último año se ha estabilizado.

La vía de administración de la droga principal se ha distribuido de la siguiente forma: la inyectada en el 54,8% de los consumidores, la fumada en el 35,3%, la esnifada en el 8,7% y la inhalada en el 0,3%. Ha existido un descenso en los usuarios de la vía inyectada y un aumento de las vías fumada y esnifada (gráfica 1). Según las drogas consumidas en los 30 días anteriores a las demandas de tratamiento por cocaína, se observa que las

drogas más usadas en estos pacientes son en primer lugar el alcohol y el cannabis y en tercer lugar las anfetaminas.

Los porcentajes de otras drogas consumidas en los 30 días anteriores, en los inicios de tratamiento por heroína, al comparar los pacientes que habían realizado tratamiento previo respecto a los que son el primer tratamiento, se observa que en los pacientes que demandan tratamiento por primera vez es menor el porcentaje que consume cocaína, mientras que es mayor el consumo de alcohol y cannabis, característica que ya ocurría el año anterior.

Las diferencias entre los pacientes que han realizado tratamiento por primera vez frente a los que han realizado tratamientos anteriores es que hay mayor número

	TODOS	PRIMER TRATAMIENTO	TRATAMIENTO PREVIO
<b>NUMERO DE INICIOS DE TRATAMIENTO NOTIFICADOS</b>	1.075	443	620
<b>DROGAS PRIMARIAS QUE INICIAN LOS TRATAMIENTOS (%)</b>			
Heroína	92,23	81,04	96,61
Cocaína	9,60	18,51	3,39
Metadona	0,10	0,22	-
Otros opiáceos	0,10	0,22	-
<b>SEXO (%)</b>			
Hombres	90,33	90,29	90,16
Mujeres	9,67	9,71	9,84
<b>EDAD MEDIA (AÑOS)</b>	27,07	26,47	27,41
<b>EDAD MEDIA AL INICIO DEL CONSUMO</b>	20,31	21,37	19,52
<b>NUMERO MEDIO DE AÑOS DE CONSUMO</b>	6,78	5,12	7,92
<b>NUMERO DE DROGAS CONSUMIDAS (%)</b>			
Cinco o más	3,08	3,39	2,92
Cuatro	10,74	10,84	10,86
Tres	26,98	25,28	28,53
Dos	32,12	30,93	33,23
Una	27,08	29,57	24,47
<b>VIA DE ADMINISTRACION DE LA DROGA PRINCIPAL</b>			
Oral	0,28	0,45	0,16
Fumada	35,35	50,11	25,16
Inhalada	0,28	0,45	0,16
Inyectada	54,79	32,05	70,97
Esnifada	8,74	16,70	3,23
Otras	-	-	-
Desconocida	0,55	0,22	0,32


Enfermedades	Casos notificados												Casos acumulados		
	Semana 29			Semana 30			Semana 31			Semana 32			Semanas 1 a 32		
	1996	1995	Mediana	1996	1995	Mediana	1996	1995	Mediana	1996	1995	Mediana	1996	1995	Mediana
Fiebre tifoidea y paratifoidea...	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	11	20	20
Disenteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	1
Toxi-Infecc. alimentarias	22	5	7	17	16	32	3	85	12	13	13	13	379	325	325
Otros procesos diarreicos	2.169	1.936	2.073	2.144	1.979	2.093	2.060	1.778	1.967	2.530	1.888	1.972	65.280	65.898	60.880
I.R.A. In. Resp. agudas	8.402	7.136	7.294	8.127	6.669	7.089	6.422	6.065	6.163	6.743	5.986	5.986	493.056	485.781	467.480
Gripe	101	104	112	91	63	86	118	67	91	125	149	115	68.050	65.768	51.215
Neumonía	49	41	40	50	34	38	44	32	35	51	32	32	3.356	3.108	2.620
Tuberculosis respiratoria	4	2	7	2	3	6	6	2	3	2	2	2	156	130	146
Sarampión	1	1	1	0	0	3	0	0	1	0	1	1	41	54	64
Rubéola	2	0	0	2	0	1	3	1	1	0	0	3	228	22	96
Varicela	153	183	253	103	142	142	66	74	112	48	39	56	7.002	7.425	7.425
Escarlatina	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	130	63	77
Brucelosis	4	0	1	2	2	2	1	3	1	2	2	2	33	65	60
Fiebre exantemática Medit.	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	1	7	2	5
Sífilis	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	1	0	9	22	21
Infección gonocócica	0	2	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	8	14	23
Infección meningocócica	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	33	21	38
Hepatitis	3	2	3	1	0	5	1	0	6	4	2	2	152	89	169
Fiebre reumática	0	3	1	0	1	1	3	2	3	4	3	2	32	51	51
Parotiditis	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	29	25	53
Tosferina	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	8	2	8
Otras meningitis	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	25	28	40
Otras tuberculosis	3	0	0	0	3	1	1	2	0	0	0	0	18	24	22
Otras E.T.S.	15	10	16	19	13	15	13	19	19	13	15	17	696	481	481
Hidatidosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Paludismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Municipios	Población (Proyec. 1996)	% de declaración	Municipios	Población (Proyec. 1996)	% de declaración
Abanilla	5.279	79,2	Calasparra	8.580	75,0
Abarán	12.130	93,8	Campos del Río	1.853	100,0
Aguilas	26.953	100,0	Caravaca de la Cruz	19.990	96,7
Albudeite	1.304	100,0	Cartagena	166.969	85,5
Alcantarilla	33.568	100,0	Cehegín	12.282	100,0
Aledo	921	100,0	Ceutí	6.927	100,0
Alguazas	7.425	85,0	Cieza	31.510	76,3
Alhama de Murcia	14.511	15,6	Fortuna	5.903	100,0
Archena	13.958	87,5	Fuente Álamo de Murcia	7.786	100,0
Beniel	8.134	100,0	Jumilla	19.405	32,7
Blanca	5.479	100,0	Librilla	3.802	58,3
Bullas	9.910	87,5	Lorca	66.192	97,1

Población	Áreas de Salud												REGION	
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		Total	
	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.
Enfermedades:														
Fiebre tifoidea y paratifoidea	0	5	0	4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	11
Disentería	0	1	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	10
Toxi-Infec. alimentarias	13	79	5	127	0	2	2	6	2	49	14	116	55	379
Otros procesos diarreicos	2.492	23.755	1.919	12.107	1.453	9.699	981	5.414	729	4.236	1.329	10.069	8.903	65.280
I.R.A. In. Resp. agudas	9.303	187.333	6.675	91.272	4.529	67.908	2.812	41.059	1.563	30.175	4.812	75.309	29.694	493.056
Gripe	184	20.371	127	9.735	84	17.378	11	5.631	0	3.914	29	11.021	435	68.050
Neumonía	67	1.236	44	572	36	558	6	176	14	157	27	657	194	3.356
Tuberculosis respiratoria	5	81	6	44	0	5	1	2	0	0	2	24	14	156
Sarampión	0	16	1	1	0	3	0	0	0	0	0	11	1	41
Rubéola	2	113	1	91	0	4	0	3	0	1	4	16	7	228
Varicela	163	3.690	79	1.669	46	501	21	333	28	120	33	689	370	7.002
Escarlatina	0	50	0	62	0	0	0	0	0	0	0	18	0	130
Brucelosis	0	7	2	7	3	9	2	5	1	1	1	4	9	33
Fiebre exantemática Medit.	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7
Sífilis	0	1	1	7	0	0	0	1	0	0	0	0	1	9
Infec. gonocócica	1	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
Infec. meningocócica	0	7	0	8	0	3	0	0	0	5	0	10	0	33
Hepatitis	1	25	4	74	2	34	0	1	0	1	2	17	9	152
Fiebre reumática	2	7	1	5	4	5	0	0	0	2	0	13	7	32
Parotiditis	1	17	0	6	0	3	0	0	0	1	0	2	1	29
Tosferina	2	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8
Otras meningitis	0	16	0	5	0	1	0	0	0	0	0	3	0	25
Otras tuberculosis	3	13	0	2	0	1	0	0	0	0	1	2	4	18
Otras E.T.S.	26	204	9	164	4	21	1	6	0	15	20	286	60	696
Hidatidosis	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Lepra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Paludismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Tétanos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1


Municipios	Población (Proyec. 1996)	% de declaración	Municipios	Población (Proyec. 1996)	% de declaración
Lerqui	5.393	100,0	Torre Pacheco	17.603	100,0
Mazarrón	16.131	100,0	Torres de Cotillas, Las	15.504	96,9
Molina de Segura	40.816	47,8	Totana	21.251	98,2
Moratalla	7.952	65,6	Ulea	1.025	50,0
Mula	13.042	90,9	Unión, La	13.238	100,0
Murcia	353.955	67,2	Villanueva del Río Segura	1.596	25,0
Ojós	704	100,0	Yecla	28.253	98,4
Pflego	3.223	66,7	Santomera	9.290	100,0
Puerto Lumbreras	10.518	100,0	Alcázares, Los	4.751	62,5
Ricote	1.622	87,5			
San Javier	15.973	100,0	Total Región	1.085.907	81,1
San Pedro del Pinatar	13.296	100,0			

**Gráfica 1. Vía de administración de la droga principal en el grupo de 15-39 años en la Región de Murcia.**



..... INFORMACION DE CONSUMIDORES

**Gráfica 2. Tasa anual de admisiones a tratamiento por consumo de cocaína en la Región de Murcia, 1995.**



..... TASA ANUAL POR AREA

de cocainómanos (18,5% frente a 3,4%); llevan menos años consumiendo la droga principal 5,1 frente a 7,9 años, la vía de administración de la droga principal, en el 32% se la inyectan frente al 71% y el 50% la fuman frente al 25%.

La tasa global de admisiones a tratamiento durante 1995 en la Región de Murcia fue de 98,2 casos por 100.000 habitantes. La tasa trunca para el grupo de edad entre 15-39 años de 232,6 casos por 100.000 habitantes.

La tasa global de admisiones a tratamiento para España en 1994 fue de 101,2 casos por 100.000 habitantes y la tasa trunca para el grupo de 15-39 años de 254,7 casos por 100.000 habitantes.

Las tasas por Área de Salud de los pacientes admitidos a tratamiento durante el año 1995 se presentan en la gráfica 2: siendo el Área de Salud 2 de Cartagena

la que tiene una tasa mayor, 141,3 por 100.000 habitantes; el Área 1 de Murcia, 106,4; el Área 5, 92,3; el Área 6, 69,5; el Área 3 de Lorca, 61,5, y la más baja el Área 4 del Noroeste, con 8,4.

**Indicador urgencias hospitalarias**

El número de urgencias hospitalarias por opiáceos o cocaína en los hospitales monitorizados ha sido de 1.150 episodios, descendiendo un 5% respecto del año 1994.

Con relación al tipo de droga por la que se producen las urgencias, ha aumentado el porcentaje de urgencias que acuden por heroína respecto del año anterior del 38% al 44%. Los casos de cocaína se han mantenido en el mismo porcentaje. Los episodios en los que se desconoce la droga que motiva la urgencia suponen el 50,6%.

Según el sexo, el 84% de los episodios se ha producido en hombres.

Los principales motivos de consulta son el síndrome de abstinencia (33%), los problemas orgánicos (30%), seguidos de otros problemas inespecíficos (16,5%), los problemas psicopatológicos (9,8%), las sobredosis (8,9) y en último lugar las reacciones indeseables (1%).

El 76,8% de los episodios de urgencias se producen en la condición legal de "no detenido".

**Indicador mortalidad**

Solamente se consideran los fallecidos en los que el consumo de opiáceos o cocaína ha sido la causa fundamental de la muerte.

El número de fallecidos en la Región ha sido de 17 casos. La edad media ha sido de 25,5 años. Por sexo, el 88% de los casos ha ocurrido en hombres. En el 53% el municipio de defunción fue Cartagena. El lugar de procedencia, donde se ha encontrado al fallecido, en el 42% ha sido en el domicilio, 23% en la calle, el 17% han fallecido en el hospital y en el 12% en algún hotel.

En el 95% de los casos existían antecedentes de consumo de drogas, por familiares, presencia de droga o de utensilios en el lugar de defunción, etc. En todos los casos al realizarle la autopsia, se encontraron hallazgos compatibles con muerte por drogas, como congestión visceral, edema agudo de pulmón, etc.

Los resultados toxicológicos en sangre muestran que en el 82% de los casos se ha encontrado heroína/morfina o algún metabolito, en el 65% se ha encontrado alcohol, en el 29% se ha encontrado metabolitos de la cocaína y en el 23% metadona.

**Bibliografía**

- (1) Consumo de opiáceos o cocaína en la Región de Murcia en el año 1994. Boletín Epidemiológico de Murcia 1995, 16: 77-84.
- (2) Sistema de Información sobre Toxicomanías en la C.A. de Murcia (SITCAM). Serie Documentos 2. Consejería de Sanidad y Política Social. Murcia 1996. (En prensa.)
- (3) Proyecciones de la población de derecho de la Región de Murcia y sus áreas de salud. Periodo 1986-2000. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud y Consumo. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Murcia 1995.
- (4) Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. Sistema Estatal de Información sobre Toxicomanías (SEIT). Informe Año 1994. Ministerio de Justicia e Interior. Madrid 1995.

Juan Fco. Correa Rodríguez  
 SITCAM. Servicio de Epidemiología  
 Servicio Murciano de Salud/Dirección General de Salud  
 Consejería de Sanidad y Política Social