



MORTALIDAD EN LA  
REGION DE MURCIA  
EN 1992

**Región de Murcia**

En el año 1992 fallecieron 8.083 personas residentes en la Región de Murcia, que corresponden a una tasa de mortalidad de 7,67 fallecidos por cada 1.000 murcianos, que es, a su vez, de 8,18 en los hombres y de 7,18 en las mujeres. La esperanza de vida al nacer es de 77,8 años, siendo mayor en 7 años en las mujeres (81,4 años), que para los hombres (74,4 años).

Las principales causas de muerte para ambos sexos son las enfermedades del aparato cardiocirculatorio, con una tasa de 311,43 defunciones por 100.000 habitantes, después vienen las enfermedades del aparato respiratorio con 77,17, seguidas de las enfermedades del aparato digestivo con 41,67, y a poca distancia las causas externas (circunstancias de los traumatismos

y envenenamientos) 35,59. Los hombres siguen la misma ordenación que el total, menos en las dos últimas causas que se invierten. Las mujeres mantienen la misma graduación, pero en cuarto lugar aparecen las enfermedades del aparato digestivo, seguidas de las endocrino-inmunológicas.

**Mortalidad proporcional por grandes causas y edad**

Hasta los 14 años (1,9% de las muertes para todas las edades) encontramos que las afecciones originadas en el período perinatal, las anomalías congénitas y las causas externas, son las tres primeras causas de defunción en Murcia (gráfica 1.1). El sexo masculino y el femenino mantienen la misma ordenación que en ambos sexos, aunque en los hombres hay una mayor mortalidad proporcional (57,9% frente al 42,1%). En el grupo de edad de 15 a 64 años (21% de todas las edades), la graduación es la misma para cada sexo y en el total (gráfica 1.2), siendo los tumores la mayor causa de muerte, seguidos de las enfermedades del aparato circulatorio y del variado grupo de los accidentes. Los

hombres tienen una proporción mayor de muertes, que las mujeres (70% contra el 30%). La ordenación por grandes causas se mantiene homogénea si partimos el grupo de edad en dos, de los 15 a 39 años y de los 40 a 60 años.

En el grupo de más de 64 años de edad (77,1% de las muertes en todas las edades) (gráfica 1.3), las principales causas de fallecimientos son en los hombres y mujeres, las enfermedades cardiocirculatorias, los tumores, y las enfermedades del aparato respiratorio. Las mujeres presentan mayor mortalidad proporcional que los hombres (53,5% y 47,5%).

**Mortalidad por causas específicas**

La enfermedad cerebrovascular es la primera causa de muerte en la Comunidad Autónoma, seguida de cerca por la enfermedad isquémica del corazón, a mitad de camino el grupo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y atines (bronquitis, el enfisema, asma...), y en un grupo más o menos compacto: el cáncer tráqueo-broncopulmonar, la diabetes y la cirrosis hepática. Los hombres mantienen la ordena-

HOMBRES	Casos	%	Tasa	MUJERES	Casos	%	Tasa
Enfermedades cerebrovasculares	477	11,3	92,02	Enfermedades cerebrovasculares	673	17,5	125,75
Enfermedades isquémicas del corazón	462	10,9	89,13	Enfermedades isquémicas del corazón	414	10,8	77,36
Bronquitis, enfisema, asma...	339	8,0	65,40	Diabetes	159	4,1	29,21
Cáncer de pulmón	300	7,1	57,57	Cáncer de mama	139	3,6	25,97
Cirrosis y otras	146	3,4	28,17	Bronquitis, enfisema, asma...	119	3,1	22,24
Accidentes de vehículos a motor	126	3,0	24,31	Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis	90	2,3	16,82
Cáncer de próstata	104	2,5	20,06	Arteriosclerosis	85	2,2	15,88
Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis	86	2,0	16,59	Enfermedad hipertensiva	65	1,7	12,15
Diabetes	77	1,8	14,85	Cáncer de estómago	63	1,6	11,77
Cáncer de estómago	70	1,7	13,50	Neumonía	52	1,4	9,72
Resto de causas	2.053	48,4	396,06	Resto de causas	1.984	51,6	370,72
<b>Total</b>	<b>4.240</b>	<b>100,0</b>	<b>817,96</b>	<b>Total</b>	<b>3.843</b>	<b>100,0</b>	<b>718,07</b>


Tasas específicas por 100.000 habitantes. En una columna no consta la edad

Enfermedades	Casos notificados												Casos acumulados		
	Semana 29			Semana 30			Semana 31			Semana 32			Semanas 01 a 32		
	1994	1993	Mediana	1994	1993	Mediana	1994	1993	Mediana	1994	1993	Mediana	1994	1993	Mediana
Fiebre tifoidea y Paratif.	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	16	14	30
Disenteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	9	1	1
Toxi-Infec. alimentaria	2	7	22	38	21	21	12	7	11	0	2	17	291	249	329
Otros procesos diarreicos	2.078	2.193	2.050	2.093	2.081	2.094	2.055	1.967	1.965	1.885	2.013	2.013	62.627	56.181	56.181
I.R.A. In. Resp. aguda	7.294	7.918	7.391	6.770	7.204	7.089	6.416	5.942	5.942	6.044	6.077	5.743	430.734	482.455	423.475
Gripe	91	112	135	80	130	120	104	55	128	115	84	124	44.918	64.109	64.109
Neumonia	45	36	37	24	41	41	29	43	35	37	44	31	2.374	2.801	2.614
Tuberculosis respiratoria	9	7	7	6	3	7	3	1	5	2	0	4	156	106	161
Sarampión	0	5	5	0	3	3	1	2	4	0	0	1	42	1.280	78
Rubéola	1	0	1	2	1	8	0	3	3	0	4	4	96	110	294
Varicela	268	205	214	140	137	144	112	86	86	56	36	66	12.915	6.796	8.406
Escarlatina	0	0	2	2	0	0	3	1	1	2	0	1	70	77	115
Brucelosis	1	1	1	2	1	2	1	0	1	3	4	2	71	52	57
Fiebre exantemática Medit.	1	0	0	2	1	1	1	3	2	1	2	1	5	9	9
Sífilis	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	16	24	13
Infección gonocócica	2	1	1	0	1	1	2	0	0	0	1	1	11	32	31
Infección meningocócica	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	17	39	52
Hepatitis	1	5	5	1	5	7	6	5	5	0	0	5	87	169	219
Fiebre reumática	0	1	1	4	1	1	4	3	2	1	1	2	35	62	65
Parotiditis	2	0	3	2	1	1	0	0	1	0	0	2	53	42	70
Tosterina	0	0	0	0	2	2	0	2	1	0	0	1	7	8	32
Otras meningitis	0	0	1	0	1	2	0	1	1	0	2	1	27	97	66
Otras tuberculosis	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	19	27	22
Otras E.T.S.	16	27	18	13	41	21	16	27	27	16	17	19	422	580	498
Hidatidosis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Carbunco	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	3	1
Leishmaniasis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1
Tétanos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2

Municipios	Población (Proyec. 1994)	% de declaración	Municipios	Población (Proyec. 1994)	% de declaración
Abanilla	5.586	95,0	Calasparra	8.649	91,7
Abarán	12.028	87,5	Campos del Río	1.892	75,0
Aguilas	26.119	100,0	Caravaca de la Cruz	20.509	98,3
Albudeite	1.346	100,0	Cartagena	167.447	66,2
Alcantarilla	32.165	88,2	Cehegín	12.803	72,5
Aledo	947	100,0	Ceuti	6.718	56,3
Alguazas	7.226	80,0	Cieza	31.265	78,9
Athama de Murcia	14.380	96,4	Fortuna	5.945	70,0
Archena	13.773	40,0	Fuente Álamo de Murcia	7.982	96,4
Beniel	7.758	100,0	Jumilla	19.684	50,0
Blanca	5.595	100,0	Librilla	3.788	100,0
Bullas	9.953	100,0	Lorca	66.105	96,7

Enfermedades	Áreas de Salud												REGIÓN	
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		Total	
	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.
Fiebre tifoidea y Paratíf.	0	4	1	6	0	2	0	1	0	2	0	1	1	16
Disenteria	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Toxi-Infecc. alimentarias	3	167	39	71	0	0	0	5	7	27	3	21	52	291
Otros procesos diarreicos	2.685	24.163	1.508	13.871	1.397	7.381	739	4.879	483	4.031	1.099	8.302	8.111	62.627
I.H.A. (n. Resp. agudas)	9.471	164.193	5.421	82.037	4.028	61.208	2.472	35.715	1.555	26.237	3.577	61.344	26.524	430.734
Gripe	200	16.459	37	8.041	77	9.641	35	3.779	7	1.536	34	5.462	390	44.918
Neumonia	47	935	27	418	19	345	13	142	5	197	24	337	135	2.374
Tuberculosis respiratoria	11	53	1	56	2	6	0	6	1	6	5	29	20	156
Sarampión	0	28	1	6	0	2	0	1	0	0	0	5	1	42
Rubéola	3	40	0	17	0	10	0	5	0	0	0	24	3	96
Varicela	197	6.372	93	2.002	174	2.011	54	925	3	72	55	1.533	576	12.915
Escarlatina	6	44	0	10	0	1	1	5	0	1	0	9	7	70
Brucelosis	2	15	1	17	1	18	2	17	1	3	0	1	7	71
Fiebre exantemática Medit.	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Sífilis	1	4	1	8	0	0	0	0	0	1	0	3	2	16
Infecc. gonocócica	1	5	2	4	0	0	0	0	0	0	1	2	4	11
Infecc. meningocócica	0	7	1	6	0	1	0	0	0	0	0	3	1	7
Hepatitis	5	43	2	26	0	8	1	6	0	2	0	2	8	87
Fiebre reumática	3	22	2	4	1	2	0	1	0	0	3	6	9	35
Parotiditis	1	15	2	14	0	5	0	6	0	0	1	3	4	53
Tosferina	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7
Otras meningitis	0	14	0	10	0	0	0	1	0	2	0	0	0	27
Otras tuberculosis	0	13	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	19
Otras E.T.S.	12	106	10	100	16	41	4	14	1	46	18	115	61	422
Hidatidosis	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Carbunco	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Leishmaniasis	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Tétanos	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1


Municipios	Población (Proyec. 1994)	% de declaración	Municipios	Población (Proyec. 1994)	% de declaración
Lorquí	5.368	100,0	Torre Pacheco	17.187	100,0
Mazarrón	15.502	100,0	Torres de Cotillas, Las	14.945	86,1
Molina de Segura	39.598	45,7	Totana	20.941	94,2
Moratalá	8.349	61,1	Ulea	1.044	50,0
Mula	13.051	90,9	Unión La	13.519	100,0
Murcia	343.494	67,9	Villanueva del Río Segura	1.623	50,0
Ojos	694	25,0	Yocla	27.903	100,0
Piñogo	3.266	75,0	Santomera	8.976	75,0
Puerto Lumbreras	10.295	100,0	Alcazares, Los	4.292	100,0
Ricote	1.649	50,0			
San Javier	15.455	100,0	Total Región	1.069.604	77,6
San Pedro del Pinatar	12.790	100,0			




1.1. Mortalidad proporcional por grandes grupos de causas, hasta los 14 años



1.2. Mortalidad proporcional por grandes grupos de causas, de 15 a 64 años



1.3. Mortalidad proporcional por grandes grupos de causas, mayores de 64 años



1.4. Mortalidad proporcional por grandes grupos de causas, Todas las edades

ción para las mismas causas, menos en el quinto lugar, que lo ocupa la cirrosis hepática, seguida de los accidentes de vehículos a motor (tabla 1). En las mujeres se mantienen las dos primeras causas, a continuación se encuentra la EPOC y afines, la diabetes y el cáncer de mama (tabla 1). Destaca en las mujeres, la elevada tasa de mortalidad por enfermedades cerebrovasculares, en relación a los hombres.

### Mortalidad prematura

Los años potenciales de vida perdidos expresan la mortalidad prematura en la Comunidad Autónoma, que en promedio, es de 14 años menos por persona residente fallecida antes de los 70 años. La mortalidad prematura es bastante menor en las mujeres (29,2%) que en los hombres (70,8%).

Las causas que restan más años a la vida, son los tumores (30,8%) y las causas externas (24,6%) seguidas de las enfermedades cardiocirculatorias (17,5%). En los hombres, las causas externas ocupan el primer lugar (20,4%), seguidas de los tumores (10,7%) son la primera causa de años perdidos, seguidos de

las enfermedades cardiovasculares (5,0%) y las causas externas (4,3%). Al profundizar por causas más específicas observamos que los accidentes de vehículos a motor se llevan el mayor porcentaje (12,1%) de años perdidos, afectando más a los hombres que a las mujeres (10,5% y 1,6%, respectivamente), a continuación viene la enfermedad isquémica del corazón (7,0%), el cáncer de tráquea-bronquios-pulmón (9,6%), y el SIDA (4,7%), siempre afectado más a los hombres.

### Áreas de Salud

Al comparar la mortalidad de las áreas sanitarias con el conjunto de la Región de Murcia (razón de mortalidad estándar -RME-) observamos que existe un exceso de mortalidad por grandes grupos de causas en el Área de Salud de Cartagena (II) y una menor mortalidad en el Área de Salud de La Vega del Segura-Comarca Oriental (VI).

La mayor mortalidad del área de Cartagena afecta tanto a los hombres como a las mujeres, y es debida a los tumores en general. En los hombres se produce una mayor mortalidad diferencial, principal-

mente por SIDA.

En las Áreas de Salud de Murcia (II) y de Cartagena (III) se produce el 67% de las muertes prematuras (años potenciales de vida perdidos), siendo los hombres los principales afectados.

### Evolución de la mortalidad general en la Región de Murcia y España

En la tabla 2 se puede apreciar que, año a año y en ambos sexos, la mortalidad en la Región de Murcia es comparativamente mayor que la española. Tendremos que esperar a la publicación de las defunciones de los residentes murcianos fallecidos en toda España, para confirmar el aumento de la mortalidad por todas las causas en la Región de Murcia, que se evidencia en 1992, respecto a los años precedentes.

### BIBLIOGRAFÍA

1. Estadísticas básicas de mortalidad en la Región de Murcia en 1992. Murcia: Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y Consejería de Fomento y Trabajo; 1994.
2. Proyecciones de la población de derecho en la Región de Murcia y sus Áreas de Salud, por edad y sexo. Período: 1986 al 2000. Murcia: D.G. de Salud y Consumo, Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales; 1995 (en prensa).
3. Instituto Nacional de Estadística. Defunciones según la causa de muerte (1989, 1990 y 1991). Tomo II. Resultados por Comunidades Autónomas. Madrid: INE; 1992, 1993 y 1994. Movimiento Natural de la Población.
4. Instituto Nacional de Estadística. Defunciones según la causa de muerte (1989, 1990 y 1991). Tomo I. Resultados básicos. Madrid: INE; 1992, 1993 y 1994. Movimiento Natural de la Población.

Lluís Cirera Suárez  
Servicio de Epidemiología  
D.G. de Salud y Consumo  
Consejería de Sanidad y AA. Sociales  
Región de Murcia

	1989		1990		1991		1992
	R. Murcia	España	R. Murcia	España	R. Murcia	España	R. Murcia*
Ambos sexos	8,33	7,33	8,31	7,35	8,05	7,52	8,46
Hombres	10,06	9,54	10,10	9,61	9,58	9,27	10,30
Mujeres	6,67	5,58	6,79	5,57	6,76	5,92	6,8*

\* Datos de residentes murcianos fallecidos en extranjero  
(1) Por el método directo a la población estándar europea

© 1995 por el Servicio de Epidemiología, D.G. de Salud y Consumo, Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, Región de Murcia

Suscripción: Envío gratuito, siempre que sea dirigido a cargo oficial. Solicitudes: Servicio de EPIDEMIOLOGIA  
Dirección General de Salud y Consumo, Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales  
Ronda de Levante, 11. MURCIA 30008