

Características

- de la población
- que ha acudido
- a urgencias
- hospitalarias por
- consumo de
- opiáceos/cocaína
- en la Región de Murcia
- en 1989-1994

Introducción

Las urgencias hospitalarias provocadas/relacionadas por el uso

de opiáceos o cocaína (indicador de urgencias) es uno de los indicadores indirectos utilizados, junto con las admisiones a tratamiento ambulatorio por opiáceos/cocaína y los fallecimientos relacionados con estas sustancias, para estimar el consumo de éstas en la población. En la Región de Murcia se empezó a recoger el indicador de urgencias en el año 1989.


Durante el período 1989-1994 se han recogido las urgencias producidas por Opiáceos / Cocaína en los hospitales monitorizados en la Región de Murcia (Hospital General Universitario de Murcia y Hospital Sta. M^a del Rosell de Cartagena) con los objetivos de: conocer la evolución temporal de la magnitud del abuso de opiá-

ccos y cocaína, conocer las características de la población adicta, los motivos por los que se produjo la urgencia, así como la tendencia evolutiva en el tipo de drogas consumidas en dicho período.

Material y método

Se ha definido como caso todo paciente que acude a un servicio de urgencias hospitalarias al que se abre una historia clínica en la que consta que ha consumido opiáceos o cocaína, o hace referencia de alguna expresión como ADVP, toxicómano, UDVP, drogadicto, etc. en la que se sospecha el consumo, aunque en la historia clínica no figure el tipo de droga que produce el episodio de la urgencia.

Gráfico 1. Distribución por grupos de edad de los episodios de urgencias por opiáceos o cocaína en la Región de Murcia en el período 1989-1994.



	Casos notificados												Casos acumulados		
	Semana 25			Semana 26			Semana 27			Semana 28			Semanas 01 a 28		
	1995	1994	Mediana	1995	1994	Mediana	1995	1994	Mediana	1995	1994	Mediana	1995	1994	Mediana
Enfermedades:															
Fiebre tifoidea y Parat.	1	1	1	1	0	1	0	0	2	1	1	1	17	15	24
Toxi-Infecc. alimentarias	5	4	4	43	2	10	35	4	27	6	18	18	200	239	259
Otros procesos diarreicos	1.967	1.856	1.856	1.974	1.916	1.973	1.902	1.986	1.986	1.975	1.964	2.037	57.975	54.516	56.109
S.R.A. en Resp. agudas	10.554	10.305	10.305	10.060	9.437	9.817	9.172	8.596	8.718	8.746	7.952	7.952	468.215	404.210	404.210
Gripe	258	164	267	149	94	193	210	107	173	113	95	143	65.243	44.528	50.737
Neumonías	51	47	47	41	47	47	30	43	43	23	32	40	2.953	2.239	2.239
Tuberculosis respiratoria	4	3	2	8	2	4	5	2	5	5	3	4	114	136	132
Sarampión	1	0	4	2	3	3	0	1	2	1	1	2	52	41	63
Rubéola	1	1	5	0	5	5	1	4	4	0	3	6	21	93	102
Varicela	494	637	455	415	570	450	425	462	348	255	373	355	6.690	12.339	8.004
Escarlatina	4	2	2	1	6	5	0	2	2	0	2	3	62	63	107
Brucelosis	3	0	1	2	2	2	1	2	1	5	0	2	57	64	50
Fiebre exantemática Medit.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	3
Sifilis	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	19	14	14
Infección gonocócica	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	11	7	24
Infección meningocócica	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	21	16	38
Hepatitis	5	2	4	4	0	5	2	3	3	0	1	3	85	79	154
Fiebre reumática	3	1	0	3	1	1	3	1	1	1	1	1	42	26	55
Parotiditis	2	2	3	2	0	1	1	2	3	1	1	3	25	49	51
Tosferina	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	7	13
Otras meningitis	3	0	1	0	0	1	0	0	2	1	2	2	27	27	46
Otras tuberculosis	1	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	1	16	19	20
Otras E.T.S.	18	15	15	19	10	12	26	14	14	13	7	17	421	361	383
Leishmaniasis	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2
Paludismo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

Municipios	Población (Proyec. 1995)	% de declaración	Municipios	Población (Proyec. 1995)	% de declaración
Abaril a	5.431	100,0	Calasparra	8.615	91,7
Abarán	12.080	87,5	Campos del Río	1.872	50,0
Aguilas	26.534	100,0	Caravaca de la Cruz	20.249	100,0
Albuñeite	1.325	100,0	Cartagena	167.218	73,3
Alcantarilla	32.861	100,0	Cenegin	12.540	80,0
Aleco	934	75,0	Ceuti	6.822	93,8
Alguazas	7.325	80,0	Ceza	31.389	96,1
Alhama de Murcia	14.446	68,8	Fortuna	5.925	85,0
Archer a	13.866	75,0	Fuente Alamo de Murcia	7.884	100,0
Beniel	7.944	100,0	Jumilla	19.545	75,0
Blanca	5.537	100,0	Librilla	3.795	100,0
Bullas	9.932	95,8	Lorca	66.152	95,8

	Áreas de Salud												REGION	
	Murcia		Carragone		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		Total	
	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	Casos Acumul.	
Enfermedades:														
-Febre tifoidea y Paratit.	0	8	2	6	0	0	0	1	0	0	1	2	3	17
-Toxis Infecc. alimentarias	80	127	4	20	1	32	1	7	2	3	1	1*	89	200
-Otros procesos diarreicos:	2.779	23.463	1.412	9.946	1.021	7.491	663	4.703	635	3.743	1.308	8.629	7.818	57.975
-I.R.A. In. Resp. agudas	13.791	178.961	6.250	79.812	5.697	64.484	3.433	38.648	2.832	27.230	6.529	69.080	38.532	458.215
-Gripe	328	20.938	99	9.664	123	13.571	28	3.780	129	4.700	23	12.590	730	65.243
-Neumonía	52	909	19	500	24	520	12	212	10	171	28	641	145	2.953
-Tuberculosis respiratoria	10	52	4	39	1	4	0	1	2	3	5	15	22	114
-Sarampión	2	34	0	7	0	1	2	3	0	0	0	7	4	52
-Rubéola	1	15	0	2	0	0	1	1	0	0	0	3	2	21
-Varicela	411	1.843	369	1.397	376	1.369	78	271	196	901	159	1.109	1.589	6.890
-Escarlatina	3	38	1	9	0	1	0	8	0	0	1	6	5	62
-Brucelosis	5	16	2	13	2	9	1	6	0	3	1	8	11	57
-Fiebre exantemática y Medit.	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
-Sífilis	1	2	0	16	0	0	0	0	0	1	0	0	1	19
-Infecc. gonocócica	0	6	1	2	0	0	0	0	0	0	1	3	2	11
-Infecc. meningocócica	0	9	1	10	0	1	0	1	0	0	0	0	1	21
-Hepatitis	10	58	1	14	0	3	0	0	0	2	0	8	1*	85
-Fiebre reumática	7	14	1	8	1	1	0	2	0	0	1	17	10	42
-Parotiditis	2	9	2	8	1	4	0	0	0	0	1	4	6	25
-Toxfermia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
-Otras meningitis	3	12	1	10	0	1	0	2	0	0	0	2	4	27
-Otras tuberculosis	0	5	1	5	0	0	0	0	0	0	0	6	1	16
-Otras E.T.S.	21	100	21	132	11	23	2	4	7	26	14	136	76	421
-Leishmaniasis	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
-Paludismo	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Municipios	Población (Proyec. 1995)	% de declaración	Municipios	Población (Proyec. 1995)	% de declaración
Lorquí	5.381	100,0	Torre Pacheco	17.395	100,0
Mazarrón	15.814	100,0	Torres de Cotillas, Las	15.223	100,0
Molina de Segura	40.205	57,6	Totana	21.097	100,0
Moratalá	8.149	83,3	Ulea	1.035	100,0
Mula	13.047	88,6	Unión, La	13.378	100,0
Murcia	348.705	69,2	Villanueva del Río Segura	1.609	100,0
Ojós	699	75,0	Yecla	28.079	100,0
Piegi	3.245	55,6	Sanomera	9.132	100,0
San Juan de los Ríos	10.407	100,0	Acázares, Los	4.516	87,5
Ricote	1.635	50,0			
San Javier	15.713	100,0	Total Región	1.077.726	82,7
San Pedro del Pinatar	13.041	100,0			

	Hombres %	Mujeres %	Total %
Sobredosis	15.2	10.8	14.5
Reacción indeseable	1.2	1.2	1.2
Síndrome de abstinencia	37.3	29.8	36.1
Problemas orgánicos	17.6	31.3	19.8
Problemas psicopatológicos	4.4	4.2	4.4
Otros	24.2	22.6	24
Total	100 %	100 %	100 %
Número de episodios	4824	895	5719

Se ha recogido el número de urgencias por patologías provocadas o relacionadas con estas sustancias en el Hospital General Universitario de Murcia y en el Hospital Sta. María del Rosell de Cartagena durante 6 años completos (1989 - 1994). La recogida de datos durante el año 1990 y 1991 se realizó de forma pasiva, siendo durante los años

1989, y el periodo 1992-1994 de forma activa.

Se revisaron todas las historias de urgencias y se seleccionó las que cumplieran los criterios de caso. Las variables que se recogieron fueron: número de historia clínica de urgencias, fecha de atención del episodio, centro de tratamiento, edad del paciente, sexo, motivo de la urgencia, dro-

ga principal por la que acude a urgencias, drogas secundarias, condición legal del paciente (dotenido o no).

Se ha realizado un análisis de los datos para el periodo y otro según el año en que se produjo la urgencia para ver los cambios en el uso/consumo de estas drogas y las características de estos pacientes en los años en que se produjo la urgencia.

Características generales

El número de urgencias hospitalarias registradas para el periodo 89-94 en los hospitales monitorizados han sido de 5.849 provocadas o relacionadas por Heroína, Cocaína, Metadona y Otros Opiáceos.

Durante el periodo, el 84 % de los episodios de urgencias fueron en hombres y el 15 % en mujeres. En la distribución por grupos de edad, el 67 % de los episodios ocurrieron en pacientes

Gráfico 1. Episodios por número de urgencias por drogas o sustancias en la Región de Murcia durante el periodo 1989-1994





Tabla 2

AÑO	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Número de Episodios	621	834	853	1219	1109	1213
Sexo						
Hombres	% 86.4	87.8	86.6	82	84.3	81.9
Mujeres	% 13.5	12.2	13.3	18	15.7	18
Edad Media	24.5	24.2	25.2	25.6	26.7	26.8

con edad entre 20-29 años; el 14.8 % entre 30-34 años y el 11 % entre 15-19 años; como grupos más importantes. (Gráfica 1). La edad media para ambos sexos de los pacientes cuando acudieron a Urgencias fue de 25.7 años.



- Por sexo hay un ligero aumento, de las mujeres, pasando del 13.5 % en el 89, al 18.1 % en el 94. (Gráfica 3)

- La edad media de los pacientes atendidos ha aumentado, de 24.5 años a 26.8 años.

- Las urgencias producidas por la cocaína, se han incrementado de 17 episodios en el 89, a 57 en el 94. Siendo los episodios desencadenados por la heroína, o situaciones en que se sospecha, que es esta droga, los que producen el mayor número de casos, siendo en el año 1994 de 1011 casos. Las urgencias en que la droga principal es la metadona ha aumentado en los años 93 y 94, pero se ha visto que en el 30-40 % de los casos, el motivo es la búsqueda de fármacos, y en otro porcentaje no despreciable podría darse en pacientes en tratamiento, que la asocian a otras drogas, lo que le ocasionarían la urgencia. (Gráfica 4)

- El motivo de consulta, en el período esta cambiando, están descendiendo el síndrome de abstinencia (del 39 % en el 89 al 28 % en el 94) y la categoría de otros (del 28 % al 14 %) y están aumentando los problemas orgánicos (del 10.6 % al 35.5 %) de manera mas acentuada en los dos últimos años. El resto de los motivos, se encuentran en porcentajes similares, las sobredosis (14 %), los problemas psicopatológicos (6 %), y las reacciones indeseables (2 %) (Gráfica 5). Al comparar por sexo, se encuentran diferencias, como que las sobredosis se dan en mayor porcentaje en los hombres; mientras que en las mujeres es mayor el porcentaje de problemas orgánicos para todo el período.

- Los episodios de urgencias en heroínómanos por grupos de edad para el periodo 91-94 están descendiendo en los grupos de 15-19 y de 20-24 a lo largo de estos años, pasando del 16 % en

el año 91 al 9.6 % en el 94 para el grupo entre 15-19 años; y del 38.4 % al 28.3 % para el de 20-24 años. A la vez que aumentan el porcentaje de episodios en los grupos de 35-29 años y sobre todo en los de 30-34 y 35-39 años, estos datos son constatables en mayor medida en los hombres.

- En el grupo de edad entre 15-19 años el porcentaje de sobredosis esta disminuyendo (del 20.4 % en el 89 al 5.8 %)

- Según la condición legal de las personas atendidas, se ha estabilizado desde el año 92.

Bibliografía:

- Informe anual del Sistema de Información sobre Toxicomanías en la C.A. de Murcia. (SITCAM) Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 y 1994. (Documentos mimeografiados)

Juan Fco. Correa Rodríguez
SITCAM
Servicio de Epidemiología
Dirección General de Salud.