



Región de Murcia
Consejería de Sanidad y Política Social
Dirección General de Salud Pública

Servicio de Epidemiología
Ronda de Levante 11
30008 Murcia
☎ 968 36 20 39 ☎ 968 36 66 56
✉ epidemiologia@carm.es

Informes Epidemiológicos 6 / 2013
<http://www.murciasalud.es/epidemiologia>

INCIDENCIA Y TENDENCIA DE LOS CÁNCERES RELACIONADOS CON EL TABACO. REGIÓN DE MURCIA, 1983-2007

Diciembre / 2013

Edita:
Servicio de Epidemiología
Dirección General de Salud Pública
Consejería de Sanidad y Política Social
Región de Murcia

RESUMEN:

En el análisis realizado con los casos nuevos diagnosticados de tumores malignos relacionados con el tabaco en las últimas décadas en la región de Murcia, se observa un claro patrón diferenciado por sexo.

En hombres, los tumores relacionados con el tabaco o no aumentan a lo largo de las 3 últimas décadas analizadas (esófago y vejiga), o disminuyen, como el cáncer de cavidad oral y faringe, que inicia su descenso a partir del 2000, o el de laringe, que muestra un descenso del 2% anual a lo largo del periodo de estudio; o bien presentan un leve ascenso, como el de pulmón que aumenta menos del 1% anualmente.

En mujeres, aumenta la incidencia de tumores relacionados con el tabaco, así el cáncer de pulmón muestra un aumento del 4% anual, el de cavidad oral y faringe de un 2,5%, el de laringe del 3% y el de vejiga un 2%, todos estos incrementos significativos. En el sexo femenino, el cáncer de esófago es el único de los analizados que, aunque presenta tendencia negativa, no es significativa.

Mención especial merece el cáncer de páncreas, que muestra incremento de su tendencia en un 3% anual en ambos sexos. En cáncer de páncreas existen otros factores de riesgo conocidos que podrían estar influyendo en mayor medida en la tendencia que el tabaco.

La información sobre incidencia y patrón evolutivo de los cánceres relacionados con el tabaco permite conocer de forma indirecta los resultados en salud de las medidas de control del tabaquismo. Con la información continua, sistemática y de calidad, se monitoriza adecuadamente el problema del cáncer y aporta elementos objetivos que ayudan a su control. El claro componente evolutivo observado por sexo refleja, en gran medida, el patrón de consumo de tabaco por género.

Cita recomendada:

Salmerón D, Chirlaque MD, Cruz MJ, Valera I, Párraga ME, Tortosa J, Navarro C. Incidencia y tendencia de los tumores relacionados con el tabaco. Región de Murcia, 1983-2007. Murcia: Consejería de Sanidad y Política Social, 2013. Informes Epidemiológicos 6/13.

Índice

INTRODUCCIÓN	7
MÉTODOS	7
RESULTADOS	8
CONCLUSIONES	12
Tabla 1. Cáncer de pulmón en hombres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	15
Tabla 2. Cáncer de pulmón en hombres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	15
Tabla 3. Cáncer de pulmón en mujeres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	16
Tabla 4. Cáncer de pulmón en mujeres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	16
Tabla 5. Cáncer de cavidad oral y faringe en hombres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	17
Tabla 6. Cáncer de cavidad oral y faringe en hombres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	17
Tabla 7. Cáncer de cavidad oral y faringe en mujeres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	18
Tabla 8. Cáncer de cavidad oral y faringe en mujeres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	18
Tabla 9. Cáncer de laringe en hombres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	19
Tabla 10. Cáncer de laringe en hombres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	19
Tabla 11. Cáncer de laringe en mujeres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	20
Tabla 12. Cáncer de laringe en mujeres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	20
Tabla 13. Cáncer de esófago en hombres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	21
Tabla 14. Cáncer de esófago en hombres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	21
Tabla 15. Cáncer de esófago en mujeres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	22
Tabla 16. Cáncer de esófago en mujeres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	22
Tabla 17. Cáncer de páncreas en hombres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	23
Tabla 18. Cáncer de páncreas en hombres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	23

Tabla 19. Cáncer de páncreas en mujeres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	24
Tabla 20. Cáncer de páncreas en mujeres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	24
Tabla 21. Cáncer de vejiga en hombres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	25
Tabla 22. Cáncer de vejiga en hombres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	25
Tabla 23. Cáncer de vejiga en mujeres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	26
Tabla 24. Cáncer de vejiga en mujeres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	26
Tabla 25. Cáncer de pulmón en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	28
Tabla 26. Cáncer de pulmón en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	28
Tabla 27. Cáncer de pulmón en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	29
Tabla 28. Cáncer de pulmón en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	29
Tabla 29. Cáncer de cavidad oral y faringe en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	30
Tabla 30. Cáncer de cavidad oral y faringe en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	30
Tabla 31. Cáncer de cavidad oral y faringe en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	31
Tabla 32. Cáncer de cavidad oral y faringe en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	31
Tabla 33. Cáncer de laringe en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	32
Tabla 34. Cáncer de laringe en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	32
Tabla 35. Cáncer de laringe en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	33
Tabla 36. Cáncer de laringe en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	33
Tabla 37. Cáncer de esófago en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	34
Tabla 38. Cáncer de esófago en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	34
Tabla 39. Cáncer de esófago en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	35

Tabla 40. Cáncer de esófago en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	35
Tabla 41. Cáncer de páncreas en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	36
Tabla 42. Cáncer de páncreas en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	36
Tabla 43. Cáncer de páncreas en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	37
Tabla 44. Cáncer de páncreas en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	37
Tabla 45. Cáncer de vejiga en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	38
Tabla 46. Cáncer de vejiga en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	38
Tabla 47. Cáncer de vejiga en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	39
Tabla 48. Cáncer de vejiga en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.	39
Gráfico 1. Cáncer de pulmón en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.	41
Gráfico 2. Cáncer de pulmón en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.	41
Gráfico 3. Cáncer de de cavidad oral y faringe en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.	42
Gráfico 4. Cáncer de de cavidad oral y faringe en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.	42
Gráfico 5. Cáncer de laringe en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.	43
Gráfico 6. Cáncer de laringe en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.	43
Gráfico 7. Cáncer de esófago en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.	44
Gráfico 8. Cáncer de esófago en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.	44
Gráfico 9. Cáncer de páncreas en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.	45
Gráfico 10. Cáncer de páncreas en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.	45
Gráfico 11. Cáncer de vejiga en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.	46
Gráfico 12. Cáncer de vejiga en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.	46

INTRODUCCIÓN

El Registro de Cáncer de Murcia monitoriza la incidencia de cáncer en la comunidad Autónoma de la región de Murcia desde hace más de 25 años con el propósito de difundir y facilitar a los profesionales del área de cáncer, y a la población en general, la información disponible en nuestra comunidad y que ésta pueda ser útil para mejorar el nivel de salud de los ciudadanos¹.

Los tumores malignos de pulmón, cavidad oral, faringe, laringe, esófago, páncreas, vejiga urinaria y otros menos frecuentes están asociados con el consumo de tabaco, importante carcinógeno en humanos (IARC)².

La fracción atribuible poblacional (FAP) para los tumores relacionados con el tabaco se ha obtenido en un estudio realizado en la cohorte EPIC³ (European prospective investigation into cancer and nutrition). La FAP más elevada se observa para el cáncer de laringe (84%) y de pulmón (82%). Un 49-50% de los cánceres de orofaringe y de vejiga y vías urinarias que se diagnostican en la población son atribuibles al tabaco. El cáncer de cavidad oral y el cáncer de esófago se atribuyen en un 33-34% al tabaco y el cáncer de páncreas, en un 13%. En el resto de tumores relacionados con el tabaco, la FAP oscila entre un 25 y un 8%.

La exposición combinada al tabaco y alcohol tiene un efecto multiplicativo en el riesgo de padecer cáncer del tracto aero-digestivo superior, que incluye cáncer de cavidad oral, faringe, laringe y esófago. El consumo de alcohol junto al consumo de tabaco es el principal factor de riesgo atribuyéndose 3 de cada 4 casos de tumor maligno del tracto aero-digestivo superior a estos dos hábitos en los países desarrollados⁴.

El objetivo de este informe es estudiar las tasas de incidencia de los cánceres de pulmón, cavidad oral y faringe, laringe, esófago, páncreas y vejiga durante el periodo 1983-2007 en la región de Murcia y analizar si se han producido cambios en la tendencia a lo largo del periodo estudiado.

MÉTODOS

La fuente de datos utilizada es el Registro de Cáncer de Murcia. Éste es un registro de base poblacional que registra desde 1982 todos los nuevos casos de cáncer diagnosticados en

residentes de la región de Murcia. Los datos sobre la población de la región se han obtenido de las estadísticas del INE (Instituto Nacional de Estadística).

En este informe se presentan las series tanto de casos incidentes como de tasas de incidencia de los cánceres relacionados con el tabaco, entre 1983 y 2007. Se han calculado las tasas de incidencia por 100.000 habitantes, por grupo de edad (de 0-4 hasta 85+), sexo, tipo de tumor, año y periodo, y se han ajustado por edad a la población europea estándar. El análisis de tasas y casos se ha realizado por años desde 1983 a 2007 y por 5 periodos de 5 años: 1983-87, 1988-92, 1993-97, 1998-02, 2003-07. Para la clasificación del tumor se ha usado la Clasificación Internacional de Enfermedades 10ª edición (CIE-10): Pulmón (C33, C34), Cavidad oral y faringe (C1-C14), Laringe (C32), Esófago (C15), Páncreas (C25) y Vejiga (C67, D09, D41). El registro de cáncer sólo codifica tumores primarios de forma que los casos incluidos en el presente análisis son tumores primarios de los órganos seleccionados. La tendencia de las tasas de incidencia ajustadas por edad se mide con el porcentaje de cambio anual (PCA) y su intervalo de confianza del 95% (IC 95%). Para esto se ha usado el programa Joinpoint desarrollado por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (<http://surveillance.cancer.gov/joinpoint/>). Este programa estadístico estima además la existencia de cambios significativos en la tendencia de las tasas. El resultado es una regresión compuesta de varios segmentos lineales, donde cada segmento corresponde a un periodo con una tendencia concreta. Los puntos de unión (joinpoints) entre segmentos representan los momentos en que se producen los cambios de tendencia. Dicho programa comienza ajustando una línea y realiza un test estadístico para añadir puntos de inflexión (joinpoints). Cuando no hay cambios significativos en la tendencia ($p\text{-valor} > 0,05$), se representa la tendencia global de todo el periodo 1983-2007.

RESULTADOS

Los resultados se presentan en tablas por tipo de tumor incluido en el estudio, edad, sexo, año calendario y periodo (tablas 1-48).

Cáncer de pulmón

Los casos de cáncer de pulmón en la región de Murcia en varones han ido incrementándose paulatinamente desde 1983 hasta 2004, año a partir del cual se ha estabilizado, e incluso descendido (tabla 1). En el último periodo (2003-2007) se han diagnosticado más de 500 nuevos casos cada año (tabla 2).

Las tasas de incidencia se han incrementado un 0,87% anualmente (gráfico 1) de forma significativa (IC 0,52; 1,23). En los años 80, las tasas se situaban entre 50-60/100000 y en la primera década del 2000 se sitúan alrededor de 75/100000 (tabla 25 y 26).

Las tasas de incidencia empiezan a elevarse a partir de los 35 años de edad, los mayores de 50 se presentan tasas mayores a 100/100000, y se alcanzan tasas superiores a 400/100000 en los grupos de edad de 70 y más años (tabla 25).

En las mujeres, el número de casos de cáncer de pulmón no ha disminuido y los últimos datos disponibles muestran que se diagnostican más de 80 casos nuevos al año (tabla 3 y 4).

Si analizamos todos los grupos de edad, las tasas de incidencia en mujeres ajustadas por edad se han duplicado a lo largo de los 25 años analizados, partiendo de tasas de 5/10000 y se alcanzando tasas de 12/100000 (tabla 26 y 27). El porcentaje de aumento medio anual es de un 4% (gráfico 2) estadísticamente significativo.

Cáncer de cavidad oral y faringe

En cáncer de cavidad oral y faringe en hombres, aunque el número medio de casos anual aumenta de 60 en el primer periodo a 90 en el último (tablas 5 y 6), las tasas ascienden desde 1983 a 2000 un 1,22% anualmente de forma significativa, y a partir del 2000 disminuyen también significativamente un 5,22% anual (gráfico 3). Las tasas oscilan principalmente entre 12 y 16 casos/100000 y el rango de edad con tasas más elevadas es el de 60-79 años (tablas 29 y 30).

El número de casos de cáncer de cavidad oral y faringe en mujeres es bajo, oscilando entre 10 casos diagnosticados al año a inicios del periodo de estudio a 30 casos al año a finales del periodo de estudio (tablas 7 y 8).

Las tasas (tablas 31 y 32), aunque bajas (entre 2 y 5/100000) presentan un incremento significativo a lo largo del periodo de estudio, con un incremento relativo anual de 2,5% (IC 0,95; 4,02) (gráfico 4). Las personas de 70 y más años son las que presentan las tasas más elevadas.

Las tasas en mujeres son aproximadamente 5 veces más bajas que en hombres, pero van en aumento en mujeres y en descenso en varones.

Cáncer de laringe

La incidencia de cáncer de laringe presenta un patrón evolutivo opuesto en hombres y en mujeres. Mientras en los primeros las tasas disminuyen un 1,7% anualmente, en las segundas aumenta un 2,9%, ambos cambios significativos sin mostrar modificaciones en la tendencia (gráfico 5 y 6). Sin embargo, las tasas en los varones son elevadas (18/00000 de media) y en mujeres muy bajas (0,6/100000) (tablas 33-36).

El número de casos es muy bajo en mujeres, con una media anual de 3 casos, y elevado en varones, con una media de 100 casos nuevos diagnosticados cada año (tablas 9-12).

Cáncer de esófago

El cáncer de esófago alcanza los 5 casos al año en mujeres y los 30 en varones (tablas 13-16), es 6 veces menos frecuente en mujeres que en hombres y las tasas oscilan entre 0,7 y 0,9 en las primeras, y entre 5 y 6 en los segundos (tablas 37-40). El grupo de edad que presenta la mayor incidencia en hombres es el grupo de 80-84 años, con una tasa de 35/100000, y en mujeres, las mayores de 84 años, con una tasa de 9/100000.

El porcentaje de cambio anual de las tasas de incidencia, aunque es negativo en ambos sexos, no alcanzan la significación estadística, de forma que no se observa tendencia decreciente, ni puntos de cambio, ni patrón diferenciado por sexo (gráficos 7 y 8).

Cáncer de páncreas

El cáncer de páncreas presenta una media de 44 casos en hombres de la región de Murcia, y de 35 en mujeres. Los casos al inicio del periodo de estudio se situaban en una media de 24/año y al final del periodo en 72 en varones (tablas 17-20). En mujeres eran 20/año al inicio del periodo y

56 al final. Hasta los 20 años de edad, no se ha presentado ningún caso en la región en los 25 años estudiados.

Las tasas de cáncer de páncreas son ligeramente más elevadas en varones que en mujeres, pero las diferencias no son tan elevadas como en el resto de los tumores incluidos en el presente trabajo (tablas 41-44). La tasa global en varones es de 7,5/100000 con TASS al inicio del periodo de 5 y al final de 11. En mujeres la tasa global es de 6, con 4 en el periodo 1983-87 y 8 en el periodo 2003-07. Los grupos de edad que presentan las tasas mas elevadas son el de 80-84 años en hombres (tasa 78/100000) y en mujeres el de 85+ (70/100000).

No se observa un patrón diferenciado por sexo en la tendencia de cáncer de páncreas (gráficos 9 y 10) pues tanto en hombres como en mujeres aumenta la incidencia desde 1983 a 2007 de forma continuada, con un porcentaje de incremento anual del 3% significativo.

Cáncer de vejiga urinaria

El cáncer de vejiga urinaria es el cuarto tumor más frecuente en varones, con una media de 300 casos diagnosticados cada año. En mujeres, no figura entre los tumores más frecuentes y se diagnostican unos 40 casos anualmente en la región de Murcia (tablas 21-24).

Las tasas de incidencia en hombres oscilan entre 30 y 55/100000, y en mujeres entre 5 y 10, lo que supone que el cáncer de vejiga es 6 veces mas frecuente en hombres. Los varones de 80 y más años tiene unas tasas superiores a 400/100000 y las mujeres superiores a 60 Tablas 45-48).

La tendencia relativa anual presenta un punto de cambio en varones, de forma que se produce un incremento significativo de la tendencia desde 1983 hasta 1998 con un incremento anual del 3,5%. A partir de 1998 se estabiliza la tendencia con un porcentaje de cambio anual negativo pero no significativo (gráfico 11). Sin embargo, las mujeres presentan un incremento del 2% anual a lo largo de todo el periodo (gráfico 12), significativo, partiendo de tasa de 28/100000 en 1983 y alcanzando tasas de 57/100000 en 2007.

CONCLUSIONES

El cáncer de pulmón, el segundo en frecuencia en hombres tras el cáncer de próstata y el noveno en frecuencia en mujeres, presenta una tendencias ascendente significativa mucho más marcada en mujeres, con un 4% anual, que en varones, con un 1%. Sigue observándose una diferencia importante entre las tasas por sexo: en 2007, los hombres presentaban tasas de 70/100000 y las mujeres de 12/100000. Por ello, aunque las medidas de control del tabaquismo podrían estar mostrando su efecto, todavía sigue incrementándose la tendencia del cáncer de pulmón, y sobre todo en las mujeres.

Los canceres de cavidad oral, faringe y laringe, disminuyen en los hombres y aumentan en las mujeres, todos ellos de forma significativa. Estos tumores están claramente relacionados con el consumo de tabaco y en su magnitud y tendencia se puede apreciar de forma indirecta el consumo de tabaco.

El cáncer de esófago no presenta tendencia en ningún sexo y el de páncreas incrementa un 3% anualmente sus tasas en hombres y mujeres. En estos dos tipos de tumores, existen otros factores de riesgo implicados que podrían justificar el patrón evolutivo observado.

El cáncer de vejiga asciende en los años 80 y 90 en varones, pero en la primera década del 2000 se estabiliza. Sin embargo, aunque con tasas muy inferiores, las mujeres presentan una tendencia ascendente en todo el periodo, con un incremento medio anual del 2%. En la etiología del cáncer de vejiga, además de la exposición al humo del tabaco, están implicadas exposiciones ocupacionales a sustancias químicas de las cuales, cada vez se tiene mayor conocimiento como seguros, posibles o probables carcinógenos en humanos y se han establecido en las últimas décadas medidas de control.

Si bien es cierto que los datos no son totalmente actualizados, tan bien es cierto que la tendencia de los tumores malignos se modifican de forma lenta a lo largo del tiempo, siendo importante su monitorización para conocer el patrón evolutivo, su magnitud y el efecto de las medidas de control implementadas que afectan principalmente a los factores de riesgo conocidos.

1. Navarro C, Valera I, Tortosa J, Párraga E, Garrido S, Chirlaque MD. Manual de procedimiento del Registro de Cáncer de Murcia. Murcia: Consejería de Sanidad. Dirección General de Salud Pública; 2003.
2. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. 1986, Lyon, International Agency for Research on Cancer. Tobacco smoking. Vol 38.
3. Agudo A, Bonet C, Travier N, González CA, Vineis P, Bueno-de-Mesquita HB, Trichopoulos D, Boffetta P, Clavel-Chapelon F, Boutron-Ruault MC, Kaaks R, Lukanova A, Schütze M, Boeing H, Tjønneland A, Halkjaer J, Overvad K, Dahm CC, Quirós JR, Sánchez MJ, Larrañaga N, Navarro C, Ardanaz E, Khaw KT, Wareham NJ, Key TJ, Allen NE, Trichopoulou A, Lagiou P, Palli D, Sieri S, Tumino R, Panico S, Boshuizen H, Büchner FL, Peeters PH, Borgquist S, Almquist M, Hallmans G, Johansson I, Gram IT, Lund E, Weiderpass E, Romieu I, Riboli E. Impact of cigarette smoking on cancer risk in the European prospective investigation into cancer and nutrition study. *J Clin Oncol*. 2012 20;30(36):4550-7.
4. Pelucchi C, Gallus S, Garavello W, Bosetti C, La Vecchia C. Alcohol and tobacco use, and cancer risk for upper aerodigestive tract and liver. *Eur J Cancer Prev*. 2008 ;17(4):340-4.

Tablas. Distribución de casos

Tabla 1. Cáncer de pulmón en hombres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	0	0	1	0	2	8	6	27	33	44	29	37	30	12	8	237
1984	0	0	0	0	0	0	0	2	5	14	24	29	51	37	43	27	17	7	256
1985	0	0	0	0	0	0	4	2	5	12	23	35	38	33	46	43	21	7	269
1986	0	0	0	0	0	0	2	3	5	13	23	50	58	42	43	26	18	9	292
1987	0	0	0	0	0	0	1	3	7	9	22	28	58	48	43	29	18	9	275
1988	0	0	0	0	0	0	0	4	7	13	25	34	54	64	40	38	20	6	305
1989	0	0	0	0	0	0	1	1	9	9	19	33	61	59	37	32	23	8	292
1990	0	0	0	1	0	0	0	2	3	11	22	52	32	68	45	36	10	7	289
1991	0	0	0	0	0	0	1	0	7	9	21	32	57	78	57	39	14	9	324
1992	0	0	0	0	0	0	1	8	10	12	22	41	70	65	48	23	21	4	325
1993	0	0	0	0	0	0	2	4	11	19	22	24	52	69	65	41	24	18	351
1994	0	0	0	0	0	0	1	4	6	11	21	25	56	74	56	36	15	18	323
1995	0	0	0	0	0	0	2	5	10	12	19	37	61	76	75	39	37	18	391
1996	0	0	0	0	0	0	0	4	11	11	27	42	62	67	78	49	24	11	386
1997	0	0	0	0	1	0	0	7	6	17	31	33	59	86	99	64	32	13	448
1998	0	0	0	0	0	0	1	5	14	18	28	41	67	81	70	62	20	15	422
1999	0	0	0	0	0	0	0	2	6	14	27	30	51	76	76	53	41	25	401
2000	0	0	0	0	0	1	0	1	7	18	34	24	65	73	80	60	36	7	406
2001	0	0	0	0	1	1	1	2	13	14	29	40	53	65	83	59	47	14	422
2002	0	0	0	0	0	0	0	4	14	19	43	46	66	84	76	70	41	20	483
2003	0	0	0	0	0	0	2	5	5	17	40	52	59	79	80	67	42	18	466
2004	0	0	0	0	0	2	3	1	13	17	34	56	56	89	90	83	57	33	534
2005	0	0	0	0	0	1	2	4	9	21	43	54	60	86	97	91	44	21	533
2006	0	0	0	0	0	0	1	5	14	17	33	64	57	74	106	86	49	24	530
2007	0	0	0	0	0	0	4	5	9	20	30	55	66	73	96	86	45	20	509

Tabla 2. Cáncer de pulmón en hombres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	0	0	1	7	12	30	54	119	175	249	189	212	155	86	40	1329
1988-92	0	0	0	1	0	0	3	15	36	54	109	192	274	334	227	168	88	34	1535
1993-97	0	0	0	0	1	0	5	24	44	70	120	161	290	372	373	229	132	78	1899
1998-02	0	0	0	0	1	2	2	14	54	83	161	181	302	379	385	304	185	81	2134
2003-07	0	0	0	0	0	3	12	20	50	92	180	281	298	401	469	413	237	116	2572

Tabla 3. Cáncer de pulmón en mujeres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	2	5	7	4	1	2	30
1984	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	3	5	5	4	2	24
1985	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	3	3	0	2	5	2	2	20
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3	1	2	3	4	1	17
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	5	3	1	4	4	2	26
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	2	4	4	4	3	3	27
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	3	4	3	3	3	2	24
1990	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	2	0	4	1	3	6	7	3	29
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	5	9	2	10	1	0	2	31
1992	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	5	5	10	3	2	3	35
1993	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	4	2	7	8	3	2	32
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	7	4	5	4	4	3	32
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	3	3	3	5	3	4	1	24
1996	0	0	0	0	0	0	1	2	1	4	5	6	5	4	6	5	4	3	46
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	3	6	11	5	4	3	42
1998	0	1	0	0	0	0	1	3	1	2	3	1	1	5	6	6	2	3	35
1999	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	4	6	6	8	3	8	5	5	50
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	2	4	7	7	4	6	4	2	42
2001	0	0	0	0	0	1	1	2	7	3	2	2	5	7	10	9	5	9	63
2002	0	0	0	0	1	0	0	2	3	4	5	9	5	6	7	6	9	2	59
2003	0	0	0	0	0	0	1	1	2	3	1	6	5	7	9	6	8	5	54
2004	0	0	0	0	0	0	1	0	1	6	8	4	10	7	10	10	3	5	65
2005	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	7	2	3	7	9	8	9	3	59
2006	0	0	0	0	0	0	3	0	4	7	9	6	9	7	14	8	5	6	78
2007	0	0	0	0	0	1	0	3	5	8	12	6	11	5	14	8	7	3	83

Tabla 4. Cáncer de pulmón en mujeres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	0	1	0	1	1	3	3	5	14	15	12	17	21	15	9	117
1988-92	0	0	0	0	0	0	1	2	2	9	5	13	23	16	30	17	15	13	146
1993-97	0	0	0	0	0	0	1	3	6	9	12	14	22	19	34	25	19	12	176
1998-02	0	1	0	0	1	1	3	8	17	12	16	22	24	33	30	35	25	21	249
2003-07	0	0	0	0	0	1	5	6	16	29	37	24	38	33	56	40	32	22	339

Tabla 5. Cáncer de cavidad oral y faringe en hombres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	0	1	2	1	0	3	7	11	7	9	7	6	3	0	2	59
1984	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	7	10	8	8	4	3	2	0	50
1985	0	0	0	0	1	0	1	0	2	5	10	11	12	9	5	1	3	1	61
1986	0	0	0	0	0	1	0	0	2	4	8	9	13	8	7	2	3	3	60
1987	0	0	0	1	1	0	0	4	6	7	11	14	7	7	7	8	0	3	76
1988	0	0	0	0	0	0	1	1	4	12	12	14	17	13	3	6	3	4	90
1989	0	0	0	0	0	1	1	3	1	8	10	12	14	7	7	3	0	0	67
1990	0	0	0	0	0	0	0	3	9	5	10	17	20	7	9	1	1	0	82
1991	0	0	0	0	0	2	2	2	9	6	6	10	17	8	5	8	2	1	78
1992	0	0	0	1	0	1	1	1	6	6	8	12	16	4	9	5	2	2	74
1993	0	0	0	0	0	1	1	1	2	8	14	11	13	13	8	3	3	1	79
1994	0	0	0	0	0	0	1	3	7	5	12	12	15	12	3	2	3	0	75
1995	0	0	0	1	0	0	0	5	5	9	15	9	13	12	6	8	3	1	87
1996	0	0	1	0	0	0	1	1	8	11	10	16	12	16	16	3	3	1	99
1997	0	0	0	1	0	1	1	5	7	12	13	10	12	10	10	5	3	1	91
1998	0	0	0	0	1	0	1	5	1	5	10	14	20	13	11	2	7	0	90
1999	0	0	0	0	0	2	0	3	6	10	8	15	19	15	9	6	0	2	95
2000	0	0	0	1	1	0	2	4	5	9	12	14	14	20	12	8	3	1	106
2001	0	0	0	1	0	0	2	1	3	7	17	8	14	16	12	7	0	6	94
2002	0	0	0	0	0	1	2	1	9	10	6	16	14	18	8	10	9	0	104
2003	0	0	0	0	0	0	1	0	2	13	10	14	16	11	5	10	2	3	87
2004	0	0	0	1	1	0	0	3	6	12	17	8	15	16	6	9	6	0	100
2005	0	0	0	0	1	0	0	1	6	9	13	9	7	7	19	12	3	4	91
2006	0	0	0	0	0	1	1	2	8	8	8	13	15	11	7	7	2	3	86
2007	0	0	0	0	0	3	1	3	8	10	11	11	13	8	11	8	5	1	93

Tabla 6. Cáncer de cavidad oral y faringe en hombres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	1	3	3	2	7	16	25	47	51	49	39	29	17	8	9	306
1988-92	0	0	0	1	0	4	5	10	29	37	46	65	84	39	33	23	8	7	391
1993-97	0	0	1	2	0	2	4	15	29	45	64	58	65	63	43	21	15	4	431
1998-02	0	0	0	2	2	3	7	14	24	41	53	67	81	82	52	33	19	9	489
2003-07	0	0	0	1	2	4	3	9	30	52	59	55	66	53	48	46	18	11	457

Tabla 7. Cáncer de cavidad oral y faringe en mujeres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	2	2	0	10
1984	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	1	0	2	4	0	1	14
1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	5
1986	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	1	1	2	2	1	10
1987	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	3	1	3	3	0	3	2	1	20
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	1	0	4	1	2	13
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	1	1	3	1	3	2	17
1990	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	0	1	2	1	3	2	0	0	14
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	5	3	2	3	2	6	4	29
1992	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	4	4	3	3	5	0	22
1993	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	0	3	2	2	1	2	2	1	19
1994	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	7	1	2	3	3	23
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	4	1	1	1	1	14
1996	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	2	1	2	2	2	3	3	21
1997	0	0	0	1	0	0	1	2	1	1	1	1	4	2	1	1	2	3	21
1998	0	0	0	1	0	1	1	0	1	2	2	1	5	5	4	2	2	1	28
1999	0	0	0	0	1	1	0	0	2	3	1	1	0	6	7	5	1	1	29
2000	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	2	3	3	2	3	4	0	24
2001	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	4	0	3	6	3	3	3	28
2002	0	0	0	0	1	1	0	2	3	3	4	1	2	5	6	4	4	3	39
2003	0	0	0	1	1	0	1	1	2	1	3	0	1	1	4	3	0	1	20
2004	0	0	0	0	0	2	1	1	1	2	2	2	2	4	3	3	3	5	31
2005	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	1	0	9	7	4	3	31
2006	0	0	1	2	0	1	0	1	1	0	3	5	1	3	7	4	7	2	38
2007	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	2	4	1	8	1	5	4	36

Tabla 8. Cáncer de cavidad oral y faringe en mujeres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	1	0	1	3	0	1	4	7	6	5	5	3	12	8	3	59
1988-92	0	0	1	0	0	1	0	2	2	4	4	13	12	9	12	12	15	8	95
1993-97	0	0	1	1	0	2	3	4	6	6	5	8	9	17	6	8	11	11	98
1998-02	0	0	0	1	2	3	2	4	9	13	9	9	10	22	25	17	14	8	148
2003-07	0	0	1	3	1	3	2	5	5	7	16	12	9	9	31	18	19	15	156

Tabla 9. Cáncer de laringe en hombres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	0	0	0	1	1	4	6	12	19	15	13	8	10	4	6	99
1984	0	0	0	0	0	0	0	1	4	8	15	20	17	21	9	3	3	0	101
1985	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	11	19	10	6	12	6	1	0	71
1986	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	9	14	17	12	10	3	6	3	87
1987	0	0	0	0	0	0	0	2	3	8	9	9	28	18	11	5	3	1	97
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	11	17	19	24	6	4	5	2	97
1989	0	0	0	0	0	0	1	2	2	7	14	18	22	25	11	4	2	0	108
1990	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2	8	15	22	18	7	9	4	2	94
1991	0	0	0	0	0	0	0	2	3	7	8	15	19	28	8	9	8	0	107
1992	0	0	0	0	0	0	0	1	4	7	16	9	21	8	14	7	3	4	94
1993	0	0	0	0	0	0	1	2	2	4	16	13	18	18	15	5	3	4	101
1994	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	9	13	21	12	20	4	2	0	92
1995	0	0	0	0	0	0	0	1	5	9	14	10	22	15	15	3	6	2	102
1996	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	13	17	18	22	12	8	4	1	105
1997	0	0	0	0	0	0	0	2	1	10	8	16	17	25	11	9	8	3	110
1998	0	0	0	0	0	0	0	1	3	7	14	13	17	20	16	6	5	1	103
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	3	15	8	12	18	29	19	16	5	1	126
2000	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5	4	15	15	14	15	16	4	2	94
2001	0	0	0	0	1	0	0	1	4	16	10	13	17	26	11	7	1	2	109
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	9	12	22	20	8	11	4	1	98
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	8	20	9	19	13	11	7	3	100
2004	0	0	0	0	0	1	0	1	6	12	14	13	11	13	15	13	4	5	108
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	9	13	15	17	11	12	3	1	95
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	9	19	14	9	12	14	9	3	101
2007	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	15	13	19	10	15	13	4	0	94

Tabla 10. Cáncer de laringe en hombres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	0	0	0	1	8	17	31	56	81	87	70	50	27	17	10	455
1988-92	0	0	0	0	0	0	3	8	14	29	57	74	103	103	46	33	22	8	500
1993-97	0	0	0	0	0	0	1	7	11	39	60	69	96	92	73	29	23	10	510
1998-02	0	0	0	0	1	0	0	4	13	53	45	65	89	109	69	56	19	7	530
2003-07	0	0	0	0	0	1	0	2	15	43	55	78	68	68	66	63	27	12	498

Tabla 11. Cáncer de laringe en mujeres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	4
1987	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1989	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1991	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	4
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	5
1995	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	3
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	5
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	4
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	0	5
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	4
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
2002	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
2004	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	0	1	1	1	0	1	9
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	1	0	1	0	0	0	7
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	1	6
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	6

Tabla 12. Cáncer de laringe en mujeres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	2	2	0	1	1	0	1	1	12
1988-92	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	7
1993-97	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	3	3	5	1	3	0	20
1998-02	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	0	6	1	2	1	1	1	19
2003-07	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	3	2	6	3	3	1	2	30

Tabla 13. Cáncer de esófago en hombres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	3	4	0	3	0	4	2	1	20
1984	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	2	3	2	1	3	1	0	19
1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	4	7	1	6	2	0	2	27
1986	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	5	1	3	0	1	1	2	1	17
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	7	2	3	5	2	3	1	2	33
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	7	3	1	5	1	0	0	26
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	5	2	1	1	2	2	19
1990	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	4	6	4	2	1	1	3	0	27
1991	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	8	8	10	8	3	2	1	44
1992	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	8	5	4	2	2	0	1	27
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	3	5	4	7	1	0	28
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	2	1	2	1	1	3	1	21
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	7	7	6	4	4	1	0	35
1996	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	4	5	2	1	1	34
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	7	2	8	6	4	3	3	1	37
1998	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	2	5	4	4	4	2	2	29
1999	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3	6	3	6	4	1	0	1	27
2000	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	3	4	2	3	3	2	2	0	27
2001	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	6	1	4	5	6	1	1	2	29
2002	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	3	3	6	5	6	7	1	0	38
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	5	8	5	2	2	3	36
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	6	0	4	5	6	2	34
2005	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	5	6	1	4	4	4	0	30
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	6	4	3	4	2	3	1	32
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	5	7	9	6	5	3	3	1	47

Tabla 14. Cáncer de esófago en hombres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	0	0	1	0	2	6	7	25	13	16	11	10	13	6	6	116
1988-92	0	0	0	0	0	0	2	2	4	9	13	33	25	19	17	8	7	4	143
1993-97	0	0	0	0	0	0	0	1	5	11	23	20	25	23	18	17	9	3	155
1998-02	0	0	0	0	0	0	2	3	5	15	17	16	20	23	23	15	6	5	150
2003-07	0	0	0	0	0	0	0	1	5	18	19	25	30	18	22	16	18	7	179

Tabla 15. Cáncer de esófago en mujeres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3
1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	4
1985	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	2	0	6
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3	6
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
1988	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	6
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	5
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	0	1	2	1	8
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	2
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	0	4
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	1	0	1	7
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	3	1	0	8
1998	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	3	1	0	7
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	1	6
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	3
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	5
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	1	4
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	1	1	2	0	0	0	7
2007	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	6

Tabla 16. Cáncer de esófago en mujeres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	2	4	2	4	4	21
1988-92	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	4	1	5	7	2	23
1993-97	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	3	4	9	3	1	25
1998-02	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	4	0	1	1	7	3	2	22
2003-07	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	3	1	1	2	5	2	5	25

Tabla 17. Cáncer de páncreas en hombres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	2	5	5	2	0	0	18
1984	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	0	3	1	4	3	2	2	20
1985	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	6	4	4	7	5	5	1	35
1986	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	1	0	2	6	5	2	2	26
1987	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	3	4	3	1	1	1	2	20
1988	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	6	2	4	5	3	0	27
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	4	8	5	1	7	3	2	33
1990	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	7	12	3	1	4	1	35
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	3	5	1	2	0	19
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10	7	5	4	2	3	1	33
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	6	9	7	5	6	3	39
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	3	4	6	5	4	7	4	42
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	5	5	3	6	3	2	1	30
1996	0	0	0	0	0	1	0	0	2	2	2	7	2	11	8	11	7	0	53
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	1	8	4	4	7	8	3	0	41
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	8	9	7	6	4	2	0	43
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	6	6	6	12	9	6	1	52
2000	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	3	8	8	7	10	7	5	2	55
2001	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	1	7	3	10	12	11	6	5	60
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	5	6	9	8	6	3	3	48
2003	0	0	0	0	0	0	0	5	5	2	5	7	5	9	11	12	7	0	68
2004	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	5	13	12	13	11	6	6	75
2005	0	0	0	0	0	1	0	1	5	1	3	3	7	8	11	10	8	4	62
2006	0	0	0	0	0	0	1	1	4	7	5	5	8	12	13	12	10	4	82
2007	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	5	5	5	11	11	16	9	2	72

Tabla 18. Cáncer de páncreas en hombres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	0	0	2	0	6	4	5	7	11	13	15	23	16	10	7	119
1988-92	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	7	23	31	27	17	16	15	4	147
1993-97	0	0	0	0	0	1	0	0	10	12	7	24	21	33	33	31	25	8	205
1998-02	0	0	0	0	0	0	1	1	6	11	16	34	32	39	48	37	22	11	258
2003-07	0	0	0	0	0	2	2	10	18	15	21	25	38	52	59	61	40	16	359

Tabla 19. Cáncer de páncreas en mujeres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	2	1	2	5	3	1	18
1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	2	2	15
1985	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	6	4	5	7	0	26
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	0	1	4	3	2	15
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	9	3	4	2	24
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6	5	5	3	3	24
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	3	3	2	5	23
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	3	5	5	6	3	28
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	0	3	7	2	19
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	6	7	4	2	24
1993	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	2	4	3	10	4	3	31
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	7	5	7	8	7	5	43
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	6	5	6	3	3	29
1996	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	8	8	14	4	3	41
1997	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	1	2	4	3	11	6	3	3	36
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	8	9	4	0	4	35
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2	5	5	12	3	5	36
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	3	8	8	7	5	2	38
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	4	1	4	3	7	3	6	33
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	7	7	7	7	12	49
2003	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	4	7	10	7	7	8	48
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	5	5	9	14	12	9	62
2005	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	5	4	4	6	12	8	12	54
2006	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	4	2	5	9	12	6	11	9	62
2007	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	5	9	14	10	8	3	55

Tabla 20. Cáncer de páncreas en mujeres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2	7	7	10	20	23	19	7	98
1988-92	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	11	20	19	23	22	15	118
1993-97	0	0	0	0	1	0	0	2	1	3	5	10	16	26	34	44	21	17	180
1998-02	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	9	13	13	32	32	37	18	29	191
2003-07	0	0	0	0	0	0	2	3	3	7	9	13	23	34	51	49	46	41	281

Tabla 21. Cáncer de vejiga en hombres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	0	0	1	0	1	2	2	7	17	29	19	19	20	11	6	134
1984	0	0	0	0	1	2	2	1	4	3	13	23	26	15	18	26	10	2	146
1985	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	15	20	18	25	28	22	9	9	153
1986	0	0	0	0	0	0	2	3	4	4	10	19	21	25	26	23	11	5	153
1987	0	0	0	0	0	2	0	1	4	2	18	16	31	29	27	19	13	5	167
1988	0	0	0	0	0	2	1	2	3	9	16	22	30	32	34	26	15	3	195
1989	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4	12	16	19	40	34	38	17	12	195
1990	0	0	0	0	1	1	0	0	3	8	13	24	17	38	35	27	17	8	192
1991	0	0	1	0	0	1	0	2	2	9	16	26	38	33	34	36	15	8	221
1992	0	0	0	0	0	2	1	2	6	6	10	24	38	52	45	20	15	12	233
1993	0	0	0	0	1	0	0	1	6	5	6	27	35	45	40	37	31	16	250
1994	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9	20	18	31	43	51	28	14	14	233
1995	0	0	0	0	0	0	0	3	4	11	17	24	41	41	54	26	16	15	252
1996	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9	24	19	35	62	64	40	22	18	297
1997	0	0	0	0	0	1	0	3	7	11	22	25	38	55	49	47	21	19	298
1998	0	0	0	0	0	2	2	1	5	9	17	20	43	65	60	46	43	25	338
1999	0	0	0	0	0	2	1	1	6	9	18	20	41	46	60	60	31	17	312
2000	0	0	0	1	0	1	1	4	6	7	24	28	39	57	71	53	30	14	336
2001	0	0	0	0	0	0	0	1	5	7	19	30	44	44	53	53	30	20	306
2002	0	0	0	0	1	0	0	5	6	11	29	23	43	47	61	51	45	9	331
2003	0	0	0	0	0	2	2	3	6	12	21	39	37	52	72	62	46	16	370
2004	0	0	0	0	2	2	1	3	3	19	25	25	44	57	66	68	50	23	388
2005	0	0	0	0	1	1	2	3	6	10	24	30	35	51	62	76	37	30	368
2006	0	0	0	0	0	0	0	3	5	15	18	31	56	61	80	69	41	29	408
2007	0	0	0	0	0	1	3	4	4	19	21	34	43	47	61	68	58	25	388

Tabla 22. Cáncer de vejiga en hombres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	0	1	5	4	6	17	15	63	95	125	113	118	110	54	27	753
1988-92	0	0	1	0	1	6	3	6	16	36	67	112	142	195	182	147	79	43	1036
1993-97	0	0	0	0	1	1	0	10	23	45	89	113	180	246	258	178	104	82	1330
1998-02	0	0	0	1	1	5	4	12	28	43	107	121	210	259	305	263	179	85	1623
2003-07	0	0	0	0	3	6	8	16	24	75	109	159	215	268	341	343	232	123	1922

Tabla 23. Cáncer de vejiga en mujeres. Distribución de casos por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	3	3	2	12
1984	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	4	7	8	3	5	0	29
1985	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1	4	3	7	1	0	20
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	4	3	5	6	8	10	2	42
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	7	6	3	5	33
1988	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	2	1	5	5	4	4	25
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	4	5	5	4	27
1990	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	6	4	7	2	2	2	27
1991	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	4	4	7	2	4	3	29
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	6	4	8	5	4	3	37
1993	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	6	5	3	3	6	5	6	40
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	5	4	8	7	5	7	40
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	5	7	6	7	5	6	40
1996	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	2	14	4	7	5	6	42
1997	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	3	4	9	11	5	7	6	50
1998	0	0	0	0	0	1	1	0	1	2	1	1	3	6	11	6	6	11	50
1999	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	4	2	5	5	10	11	6	4	51
2000	0	0	0	0	0	1	0	2	1	1	1	1	2	5	7	3	5	8	37
2001	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	5	8	9	20	8	7	61
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	2	5	8	7	5	10	11	55
2003	0	0	0	0	1	2	0	1	2	0	3	1	4	3	5	11	6	7	46
2004	0	0	0	0	1	1	0	1	2	5	1	3	3	5	8	12	8	8	58
2005	0	0	0	1	0	2	0	1	1	2	2	5	6	10	10	13	11	4	68
2006	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	9	11	14	10	66
2007	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	1	4	3	8	12	12	14	11	71

Tabla 24. Cáncer de vejiga en mujeres. Distribución de casos por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	0	1	0	1	1	1	4	3	8	14	20	25	27	22	9	136
1988-92	1	0	0	0	0	0	2	1	1	2	5	10	20	18	31	19	19	16	145
1993-97	0	0	0	0	1	1	3	2	4	5	4	12	21	37	32	32	27	31	212
1998-02	0	0	0	0	0	3	2	3	5	8	8	8	20	32	44	45	35	41	254
2003-07	0	0	0	3	2	5	2	4	5	10	12	18	21	31	44	59	53	40	309

Tablas. Tasas de incidencia

Tabla 25. Cáncer de pulmón en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	0	0	3,00	0	7,34	32,25	22,18	97,09	129,50	227,47	210,39	314,20	358,17	260,30	333,89	49,10
1984	0	0	0	0	0	0	0	7,16	20,11	52,90	86,09	111,87	245,84	263,27	365,18	314,14	359,33	280,79	52,46
1985	0	0	0	0	0	0	13,14	7,00	19,76	46,60	82,58	133,00	173,45	224,96	391,39	488,80	433,71	268,61	54,56
1986	0	0	0	0	0	0	6,38	10,33	19,20	51,90	83,12	187,89	253,62	270,15	365,58	290,86	361,52	331,37	58,69
1987	0	0	0	0	0	0	3,08	10,22	26,06	36,45	80,92	104,28	245,53	289,16	362,50	321,94	349,79	318,13	54,85
1988	0	0	0	0	0	0	0	13,45	25,36	52,88	94,07	125,78	223,57	359,03	332,72	419,70	375,23	203,74	60,39
1989	0	0	0	0	0	0	2,85	3,30	31,78	36,49	73,21	121,80	248,10	309,68	299,72	351,92	417,27	261,35	57,37
1990	0	0	0	2,04	0	0	0	6,47	10,36	43,71	87,30	192,20	128,09	338,38	347,65	394,52	176,06	219,78	56,37
1991	0	0	0	0	0	0	2,65	0	23,79	34,62	85,69	119,03	225,12	371,87	415,85	424,88	241,09	272,81	62,64
1992	0	0	0	0	0	0	2,55	24,31	33,59	44,59	90,76	155,01	273,07	299,73	329,04	247,63	356,48	117,13	62,11
1993	0	0	0	0	0	0	4,92	11,67	36,39	68,56	90,68	92,66	200,82	310,25	416,48	433,82	402,48	506,61	66,32
1994	0	0	0	0	0	0	2,38	11,15	19,46	38,67	85,91	98,56	214,82	325,75	336,60	369,57	248,55	486,36	60,38
1995	0	0	0	0	0	0	4,58	13,34	31,72	41,25	75,98	149,74	233,43	327,94	427,28	380,52	607,05	472,07	72,38
1996	0	0	0	0	0	0	0	10,19	34,04	37,19	105,49	171,60	235,20	279,49	416,07	464,54	388,10	277,50	71,34
1997	0	0	0	0	1,98	0	0	17,14	17,69	55,77	115,25	139,22	225,79	351,47	513,81	549,59	509,80	311,08	81,74
1998	0	0	0	0	0	0	2,05	11,83	39,41	57,89	99,03	174,74	259,04	325,71	349,21	492,77	309,02	346,58	75,95
1999	0	0	0	0	0	0	0	4,54	15,96	44,23	91,66	123,35	205,65	301,62	368,20	391,81	610,39	566,76	70,97
2000	0	0	0	0	0	1,83	0	2,12	17,30	54,67	113,37	95,00	268,09	288,58	379,93	413,86	516,61	153,59	69,65
2001	0	0	0	0	1,76	1,69	1,77	3,91	29,91	40,47	94,73	153,48	218,73	257,32	384,57	384,84	628,34	299,98	69,64
2002	0	0	0	0	0	0	0	7,30	30,47	51,94	135,42	167,50	277,99	332,68	343,40	440,49	499,70	422,61	76,91
2003	0	0	0	0	0	0	3,26	8,71	10,42	43,88	122,53	178,99	248,30	314,97	353,33	405,67	474,44	368,06	72,14
2004	0	0	0	0	0	2,95	4,68	1,68	25,79	41,17	101,39	183,73	225,01	366,04	390,96	485,61	595,67	648,78	80,35
2005	0	0	0	0	0	1,41	2,95	6,43	16,88	47,53	122,89	172,63	228,93	356,25	416,86	517,85	426,21	391,79	77,58
2006	0	0	0	0	0	0	1,43	7,85	25,04	36,53	90,58	200,46	209,02	303,40	454,54	474,73	446,77	417,90	75,53
2007	0	0	0	0	0	0	5,58	7,69	15,39	41,26	78,81	166,90	229,14	303,19	410,33	462,01	393,31	321,57	71,22

Tabla 26. Cáncer de pulmón en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	0	0	0,55	4,58	8,44	23,46	41,86	85,98	133,40	229,52	253,17	359,76	354,57	353,79	306,75	53,97
1988-92	0	0	0	0,41	0	0	1,65	9,64	24,99	42,41	86,18	142,74	219,77	335,22	346,00	367,30	311,84	213,77	59,79
1993-97	0	0	0	0	0,40	0	2,29	12,78	27,70	48,17	95,08	129,68	222,08	319,11	424,77	443,51	432,02	406,04	70,50
1998-02	0	0	0	0	0,37	0,72	0,75	5,85	26,60	49,75	107,27	143,00	245,76	301,10	365,08	423,23	516,15	356,89	72,64
2003-07	0	0	0	0	0	0,87	3,58	6,50	18,79	41,97	102,47	180,48	227,60	328,68	405,54	469,80	463,31	424,92	75,34

Tabla 27. Cáncer de pulmón en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	0	0	0	0	3,56	3,87	3,57	3,44	18,53	9,29	28,23	43,46	31,08	12,18	39,71	6,01
1984	0	0	0	0	0	0	3,30	0	0	0	3,44	3,62	8,79	16,74	30,95	38,21	47,20	38,15	4,76
1985	0	0	0	0	2,37	0	0	0	0	0	6,90	10,69	12,56	0	12,36	37,64	22,98	36,68	3,93
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	3,72	3,80	0	3,52	12,05	5,25	12,34	22,30	44,95	17,61	3,31
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	3,61	3,86	3,53	13,96	19,36	15,08	6,15	29,46	44,01	33,74	5,02
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	3,51	7,77	0	13,93	7,53	19,09	24,41	29,27	32,31	48,34	5,18
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,66	3,64	6,97	11,07	18,07	18,03	21,85	31,62	30,79	4,57
1990	0	0	0	0	0	0	0	6,38	0	3,82	7,46	0	14,53	4,30	17,51	43,51	72,19	44,19	5,48
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,40	0	17,56	32,30	8,27	56,14	7,21	0	28,42	5,81
1992	0	0	0	0	0	0	2,54	0	3,28	3,57	7,76	7,11	17,79	19,98	53,65	21,40	19,82	41,29	6,49
1993	0	0	0	0	0	0	0	2,89	3,24	6,95	3,89	3,61	14,16	7,78	35,61	56,28	29,25	26,51	5,88
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	3,19	3,39	7,75	3,67	24,71	15,26	24,08	27,57	38,46	38,20	5,83
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	3,13	0	3,80	11,25	10,58	11,25	22,96	20,03	38,00	12,27	4,33
1996	0	0	0	0	0	0	2,29	5,05	3,08	13,22	18,59	22,67	17,45	14,58	26,03	32,51	37,21	34,68	8,27
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	5,92	6,45	10,63	11,75	10,57	21,56	46,66	30,12	36,38	32,53	7,48
1998	0	2,98	0	0	0	0	2,13	7,18	2,83	6,35	10,13	3,99	3,55	17,69	24,55	34,13	17,65	31,08	6,17
1999	0	0	0	0	0	0	2,09	2,31	5,35	3,14	13,08	23,20	22,06	27,99	11,90	43,07	43,05	50,16	8,69
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,08	6,11	6,49	14,94	26,19	24,59	15,55	30,39	33,72	19,45	7,16
2001	0	0	0	0	0	1,90	1,95	4,19	16,58	8,85	6,41	7,26	18,71	24,65	38,17	43,15	40,44	85,47	10,45
2002	0	0	0	0	1,96	0	0	3,96	6,79	11,26	15,56	30,97	19,18	21,10	26,24	27,89	67,86	18,60	9,51
2003	0	0	0	0	0	0	1,83	1,89	4,37	7,96	3,04	19,57	19,29	24,78	33,06	27,08	56,50	45,63	8,49
2004	0	0	0	0	0	0	1,78	0	2,10	14,95	23,78	12,50	36,96	25,56	36,28	43,75	20,01	44,69	9,99
2005	0	0	0	0	0	0	0	3,59	8,04	11,72	20,12	6,12	10,59	25,77	32,58	34,13	56,21	26,16	8,86
2006	0	0	0	0	0	0	5,03	0	7,74	15,55	25,03	18,02	30,69	25,66	50,58	33,47	29,51	50,45	11,48
2007	0	0	0	0	0	1,68	0	5,19	9,25	17,10	32,03	17,53	35,53	18,69	50,53	32,91	39,97	23,62	11,95

Tabla 28. Cáncer de pulmón en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	0	0,48	0	0,64	0,68	2,27	2,23	3,47	10,02	12,62	12,91	21,01	31,69	34,58	32,92	4,60
1988-92	0	0	0	0	0	0	0,54	1,27	1,35	6,78	3,73	9,11	16,77	13,85	34,64	24,61	30,95	38,47	5,51
1993-97	0	0	0	0	0	0	0,47	1,59	3,74	6,01	9,03	10,47	15,50	14,19	31,24	33,03	35,90	28,97	6,37
1998-02	0	0,60	0	0	0,40	0,40	1,21	3,50	8,55	7,25	10,37	16,39	17,79	23,22	23,39	35,62	41,37	41,03	8,43
2003-07	0	0	0	0	0	0,34	1,73	2,16	6,43	13,66	21,17	14,74	26,84	24,12	40,64	34,29	40,19	37,79	10,19

Tabla 29. Cáncer de cavidad oral y faringe en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	0	2,47	6,00	3,44	0	12,09	25,88	39,55	27,47	46,53	50,78	50,95	35,82	0	83,47	12,22
1984	0	0	0	0	0	0	0	10,74	12,07	7,56	25,11	38,57	38,56	56,92	33,97	34,90	42,27	0	10,25
1985	0	0	0	0	2,33	0	3,29	0	7,91	19,42	35,90	41,80	54,77	61,35	42,54	11,37	61,96	38,37	12,37
1986	0	0	0	0	0	2,64	0	0	7,68	15,97	28,91	33,82	56,85	51,46	59,51	22,37	60,25	110,46	12,06
1987	0	0	0	2,08	2,21	0	0	13,63	22,34	28,35	40,46	52,14	29,63	42,17	59,01	88,81	0	106,04	15,16
1988	0	0	0	0	0	0	2,97	3,36	14,49	48,81	45,16	51,79	70,38	72,93	24,95	66,27	56,29	135,82	17,82
1989	0	0	0	0	0	2,44	2,85	9,90	3,53	32,43	38,53	44,29	56,94	36,74	56,70	32,99	0	0	13,16
1990	0	0	0	0	0	0	0	9,70	31,07	19,87	39,68	62,83	80,05	34,83	69,53	10,96	17,61	0	15,99
1991	0	0	0	0	0	4,58	5,30	6,30	30,58	23,08	24,48	37,20	67,14	38,14	36,48	87,16	34,44	30,31	15,08
1992	0	0	0	2,00	0	2,21	2,55	3,04	20,15	22,29	33,00	45,37	62,42	18,45	61,69	53,83	33,95	58,57	14,14
1993	0	0	0	0	0	2,15	2,46	2,92	6,62	28,87	57,71	42,47	50,20	58,45	51,26	31,74	50,31	28,15	14,93
1994	0	0	0	0	0	0	2,38	8,36	22,70	17,58	49,09	47,31	57,54	52,82	18,03	20,53	49,71	0	14,02
1995	0	0	0	1,97	0	0	0	13,34	15,86	30,94	59,99	36,42	49,75	51,78	34,18	78,06	49,22	26,23	16,11
1996	0	0	2,51	0	0	0	2,25	2,55	24,75	37,19	39,07	65,37	45,52	66,74	85,35	28,44	48,51	25,23	18,30
1997	0	0	0	2,08	0	2,06	2,12	12,24	20,64	39,36	48,33	42,19	45,92	40,87	51,90	42,94	47,79	23,93	16,60
1998	0	0	0	0	1,95	0	2,05	11,83	2,81	16,08	35,37	59,67	77,32	52,27	54,88	15,90	108,16	0	16,20
1999	0	0	0	0	0	3,94	0	6,80	15,96	31,59	27,16	61,68	76,62	59,53	43,60	44,36	0	45,34	16,81
2000	0	0	0	2,28	1,85	0	3,77	8,47	12,36	27,34	40,01	55,42	57,74	79,06	56,99	55,18	43,05	21,94	18,18
2001	0	0	0	2,34	0	0	3,55	1,96	6,90	20,23	55,53	30,70	57,78	63,34	55,60	45,66	0	128,56	15,51
2002	0	0	0	0	0	1,59	3,38	1,82	19,59	27,34	18,90	58,26	58,97	71,29	36,15	62,93	109,69	0	16,56
2003	0	0	0	0	0	0	1,63	0	4,17	33,55	30,63	48,19	67,33	43,86	22,08	60,55	22,59	61,34	13,47
2004	0	0	0	2,41	1,80	0	0	5,04	11,90	29,06	50,69	26,25	60,27	65,80	26,06	52,66	62,70	0	15,05
2005	0	0	0	0	1,83	0	0	1,61	11,25	20,37	37,15	28,77	26,71	29,00	81,65	68,29	29,06	74,63	13,25
2006	0	0	0	0	0	1,41	1,43	3,14	14,31	17,19	21,96	40,72	55,01	45,10	30,02	38,64	18,24	52,24	12,26
2007	0	0	0	0	0	4,33	1,39	4,62	13,68	20,63	28,90	33,38	45,13	33,23	47,02	42,98	43,70	16,08	13,01

Tabla 30. Cáncer de cavidad oral y faringe en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	0,42	1,40	1,65	1,31	4,92	12,51	19,38	33,96	38,88	45,17	52,24	49,21	38,89	32,91	69,02	12,43
1988-92	0	0	0	0,41	0	1,89	2,74	6,42	20,13	29,06	36,37	48,32	67,37	39,14	50,30	50,29	28,35	44,01	15,23
1993-97	0	0	0,48	0,80	0	0,83	1,84	7,99	18,26	30,97	50,71	46,72	49,78	54,04	48,97	40,67	49,09	20,82	16,00
1998-02	0	0	0	0,91	0,74	1,09	2,62	5,85	11,82	24,57	35,31	52,94	65,92	65,15	49,31	45,94	53,01	39,65	16,65
2003-07	0	0	0	0,48	0,74	1,16	0,90	2,92	11,27	23,72	33,59	35,33	50,41	43,44	41,51	52,33	35,19	40,29	13,39

Tabla 31. Cáncer de cavidad oral y faringe en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	2,23	0	0	3,35	0	0	3,57	6,87	3,71	0	0	0	15,54	24,37	0	2,00
1984	0	0	0	0	0	0	3,30	0	0	3,63	6,88	7,25	4,39	0	12,38	30,57	0	19,08	2,78
1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,19	5,44	0	7,53	22,98	0	0,98
1986	0	0	0	0	0	2,64	0	0	0	0	0	7,03	0	5,25	6,17	14,87	22,48	17,61	1,95
1987	0	0	0	0	0	0	3,06	0	3,61	7,72	10,58	3,49	11,62	15,08	0	22,09	22,01	16,87	3,86
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,58	6,97	7,53	4,77	0	29,27	10,77	32,23	2,49
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	3,43	0	0	17,43	3,69	4,52	18,03	7,28	31,62	30,79	3,24
1990	0	0	2,19	0	0	0	0	6,38	3,36	3,82	0	3,49	7,27	4,30	17,51	14,50	0	0	2,65
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,09	3,83	17,56	10,77	8,27	16,84	14,42	60,61	56,84	5,44
1992	0	0	0	0	0	2,26	0	0	0	0	7,76	0	14,23	15,98	16,09	21,40	49,55	0	4,08
1993	0	0	2,34	0	0	0	2,46	0	6,49	6,95	0	10,82	7,08	7,78	5,09	14,07	19,50	13,26	3,49
1994	0	0	0	0	0	2,16	2,39	0	3,19	3,39	3,88	3,67	3,53	26,70	4,82	13,79	28,84	38,20	4,19
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	3,13	3,33	7,60	3,75	3,53	15,00	4,59	6,68	9,50	12,27	2,53
1996	0	0	0	0	0	2,14	0	5,05	3,08	3,30	3,72	7,56	3,49	7,29	8,68	13,00	27,90	34,68	3,78
1997	0	0	0	2,21	0	0	2,20	4,91	2,96	3,22	3,54	3,92	14,09	7,19	4,24	6,02	18,19	32,53	3,74
1998	0	0	0	2,28	0	2,13	2,13	0	2,83	6,35	6,76	3,99	17,73	17,69	16,37	11,38	17,65	10,36	4,93
1999	0	0	0	0	2,05	2,09	0	0	5,35	9,41	3,27	3,87	0	20,99	27,77	26,92	8,61	10,03	5,04
2000	0	0	0	0	0	0	0	4,41	2,52	9,16	3,25	7,47	11,22	10,54	7,78	15,19	33,72	0	4,09
2001	0	0	0	0	0	0	1,95	0	4,74	5,90	3,20	14,52	0	10,56	22,90	14,38	24,26	28,49	4,65
2002	0	0	0	0	1,96	1,82	0	3,96	6,79	8,45	12,44	3,44	7,67	17,58	22,49	18,59	30,16	27,91	6,29
2003	0	0	0	2,58	1,97	0	1,83	1,89	4,37	2,65	9,12	0	3,86	3,54	14,70	13,54	0	9,13	3,14
2004	0	0	0	0	0	3,44	1,78	1,84	2,10	4,98	5,95	6,25	7,39	14,61	10,88	13,13	20,01	44,69	4,76
2005	0	0	0	0	0	0	0	1,80	0	0	8,62	9,18	3,53	0	32,58	29,87	24,98	26,16	4,65
2006	0	0	2,73	5,11	0	1,68	0	1,76	1,94	0	8,34	15,02	3,41	11,00	25,29	16,74	41,31	16,82	5,59
2007	0	0	0	0	0	0	0	1,73	1,85	8,55	13,35	5,84	12,92	3,74	28,88	4,11	28,55	31,49	5,18

Tabla 32. Cáncer de cavidad oral y faringe en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	0,44	0	0,55	1,93	0	,76	2,97	4,85	4,29	4,21	5,38	3,71	18,11	18,44	10,97	2,32
1988-92	0	0	0,44	0	0	0,48	0	1,27	1,35	3,01	2,98	9,11	8,75	7,79	13,85	17,37	30,95	23,67	3,59
1993-97	0	0	0,51	0,43	0	0,86	1,40	2,12	3,74	4,01	3,76	5,99	6,34	12,70	5,51	10,57	20,78	26,56	3,54
1998-02	0	0	0	0,48	0,80	1,19	0,81	1,75	4,53	7,85	5,83	6,70	7,41	15,48	19,49	17,30	23,17	15,63	5,01
2003-07	0	0	0,54	1,54	0,41	1,02	0,69	1,80	2,01	3,30	9,16	7,37	6,36	6,58	22,50	15,43	23,86	25,77	4,69

Tabla 33. Cáncer de laringe en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	0	0	0	3,44	3,67	16,13	22,18	43,15	74,56	77,55	94,31	67,93	119,39	86,77	250,42	20,51
1984	0	0	0	0	0	0	0	3,58	16,09	30,23	53,80	77,15	81,95	149,42	76,43	34,90	63,41	0	20,70
1985	0	0	0	0	0	0	0	7,00	7,91	7,77	39,49	72,20	45,65	40,90	102,10	68,21	20,65	0	14,40
1986	0	0	0	0	0	0	0	6,88	15,36	27,95	32,53	52,61	74,34	77,19	85,02	33,56	120,51	110,46	17,49
1987	0	0	0	0	0	0	0	6,82	11,17	32,40	33,10	33,52	118,53	108,43	92,73	55,51	58,30	35,35	19,35
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	10,87	24,40	41,39	62,89	78,67	134,63	49,91	44,18	93,81	67,91	19,21
1989	0	0	0	0	0	0	2,85	6,60	7,06	28,38	53,94	66,44	89,48	131,22	89,10	43,99	36,28	0	21,22
1990	0	0	0	0	0	0	5,49	9,70	6,91	7,95	31,75	55,44	88,06	89,57	54,08	98,63	70,42	62,79	18,33
1991	0	0	0	0	0	0	0	6,30	10,19	26,92	32,64	55,79	75,04	133,49	58,36	98,05	137,76	0	20,69
1992	0	0	0	0	0	0	0	3,04	13,44	26,01	66,00	34,03	81,92	36,89	95,97	75,37	50,93	117,13	17,97
1993	0	0	0	0	0	0	2,46	5,83	6,62	14,43	65,95	50,19	69,51	80,94	96,11	52,90	50,31	112,58	19,08
1994	0	0	0	0	0	0	0	2,79	3,24	31,64	36,82	51,25	80,56	52,82	120,21	41,06	33,14	0	17,20
1995	0	0	0	0	0	0	0	2,67	15,86	30,94	55,99	40,47	84,19	64,72	85,46	29,27	98,44	52,45	18,88
1996	0	0	0	0	0	0	0	2,55	6,19	23,67	50,79	69,46	68,28	91,77	64,01	75,84	64,68	25,23	19,41
1997	0	0	0	0	0	0	0	4,90	2,95	32,80	29,74	67,50	65,06	102,17	57,09	77,29	127,45	71,79	20,07
1998	0	0	0	0	0	0	0	2,37	8,44	22,51	49,52	55,41	65,73	80,42	79,82	47,69	77,26	23,11	18,54
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	7,98	47,39	27,16	49,34	72,58	115,09	92,05	118,28	74,44	22,67	22,30
2000	0	0	0	0	0	0	0	4,23	4,94	15,19	13,34	59,38	61,87	55,34	71,24	110,36	57,40	43,88	16,13
2001	0	0	0	0	1,76	0	0	1,96	9,20	46,25	32,67	49,88	70,16	102,93	50,97	45,66	13,37	42,85	17,99
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	2,18	27,34	28,34	43,70	92,66	79,21	36,15	69,22	48,75	21,13	15,60
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	4,17	20,65	24,51	68,84	37,88	75,75	57,42	66,60	79,07	61,34	15,48
2004	0	0	0	0	0	1,47	0	1,68	11,90	29,06	41,75	42,65	44,20	53,47	65,16	76,06	41,80	98,30	16,25
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	3,75	27,16	25,72	41,56	57,23	70,42	47,27	68,29	29,06	18,66	13,83
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	8,94	15,04	24,70	59,51	51,34	36,90	51,46	77,28	82,06	52,24	14,39
2007	0	0	0	0	0	0	0	1,54	0	8,25	39,41	39,45	65,96	41,53	64,11	69,84	34,96	0	13,15

Tabla 34. Cáncer de laringe en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	0	0	0	0,65	5,63	13,29	24,03	40,46	61,74	80,19	93,77	84,85	61,76	69,94	76,69	18,48
1988-92	0	0	0	0	0	0	1,65	5,14	9,72	22,78	45,07	55,01	82,61	103,38	70,12	72,15	77,96	50,30	19,48
1993-97	0	0	0	0	0	0	0,46	3,73	6,93	26,84	47,54	55,58	73,52	78,92	83,13	56,16	75,28	52,06	18,93
1998-02	0	0	0	0	0,37	0	0	1,67	6,40	31,76	29,98	51,35	72,43	86,60	65,43	77,96	53,01	30,84	18,04
2003-07	0	0	0	0	0	0,29	0	0,65	5,64	19,61	31,31	50,10	51,94	55,74	57,07	71,66	52,78	43,96	14,59

Tabla 35. Cáncer de laringe en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	0	0	0	0	0	7,75	0	0	0	0	0	6,21	0	0	0	0,60
1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,58	0	0	0	0	0,20
1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,56	0	0	0	0	0	0	0,20
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	3,72	0	3,47	3,52	0	0	0	0	0	17,61	0,78
1987	0	0	0	0	0	2,56	0	0	0	0	3,53	0	0	0	0	0	11,00	0	0,58
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,77	0	0	0	0	0	0,19
1989	0	0	0	0	0	0	0	3,24	3,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,38
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,25	0	0	0,19
1991	0	0	0	0	0	0	2,62	0	0	0	0	3,51	0	4,13	0	0	0	0	0,56
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1993	0	0	0	0	0	0	2,46	0	3,24	0	0	0	0	0	5,09	0	9,75	0	0,73
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,67	3,53	3,81	4,82	0	9,61	0	0,91
1995	0	0	0	0	0	0	0	2,65	0	3,33	0	0	0	3,75	0	0	0	0	0,54
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,34	6,50	9,30	0	0,54
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,05	3,59	8,48	0	0	0	0,89
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,55	3,54	4,09	5,69	0	0	0,70
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,14	3,27	0	7,35	0	3,97	0	0	0	0,87
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,22	0	0	0	8,43	0	0,68
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,20	0	0	0	0	0	0	9,50	0,33
2002	0	0	0	0	0	0	0	1,98	0	2,82	6,22	0	0	0	0	0	0	0	0,65
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,08	0	0	0	0	0,31
2004	0	0	0	0	0	0	0	1,84	2,10	4,98	2,97	0	0	3,65	3,63	4,38	0	8,94	1,38
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	2,01	4,69	2,87	3,06	3,53	0	3,62	0	0	0	1,05
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,78	6,01	3,41	3,67	0	0	0	8,41	0,88
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,47	3,61	8,23	5,71	0	0,86

Tabla 36. Cáncer de laringe en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	0	0	0,55	0	0	2,27	0	1,39	1,43	0	1,08	1,24	0	2,31	3,66	0,47
1988-92	0	0	0	0	0	0	0,54	0,63	0,68	0	0	0,70	0,73	0,87	0	1,45	0	0	0,26
1993-97	0	0	0	0	0	0	0,47	0,53	0,62	0,67	0	0,75	2,11	2,24	4,59	1,32	5,67	0	0,72
1998-02	0	0	0	0	0	0	0	0,44	0	1,21	2,59	0	4,45	0,70	1,56	1,02	1,65	1,95	0,64
2003-07	0	0	0	0	0	0	0	0,36	0,80	1,88	1,72	1,84	1,41	4,39	2,18	2,57	1,26	3,44	0,90

Tabla 37. Cáncer de esófago en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	0	0	3,00	0	3,67	0	3,70	10,79	15,70	0	21,76	0	47,76	43,38	41,74	4,14
1984	0	0	0	0	0	0	0	0	4,02	3,78	17,93	7,71	14,46	14,23	8,49	34,90	21,14	0	3,89
1985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,95	15,20	31,95	6,82	51,05	22,74	0	76,75	5,48
1986	0	0	0	0	0	0	0	3,44	3,84	3,99	18,07	3,76	13,12	0	8,50	11,19	40,17	36,82	3,42
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	14,89	16,20	25,75	7,45	12,70	30,12	16,86	33,30	19,43	70,70	6,58
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	3,62	12,20	18,81	25,90	12,42	5,61	41,59	11,04	0	0	5,15
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	3,53	4,05	0	14,76	20,34	10,50	8,10	11,00	36,28	65,34	3,73
1990	0	0	0	0	0	0	2,74	3,23	6,91	7,95	15,87	22,18	16,01	9,95	7,73	10,96	52,82	0	5,27
1991	0	0	0	0	0	0	0	3,15	0	3,85	8,16	29,76	31,60	47,68	58,36	32,68	34,44	30,31	8,51
1992	0	0	0	0	0	0	2,55	0	0	7,43	8,25	30,25	19,51	18,45	13,71	21,53	0	29,28	5,16
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	3,31	3,61	8,24	15,44	11,59	22,48	25,63	74,07	16,77	0	5,29
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,06	24,54	7,88	3,84	8,80	6,01	10,27	49,71	27,02	3,93
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,88	16,00	28,33	26,79	25,89	22,79	39,03	16,41	0	6,48
1996	0	0	0	0	0	0	0	2,55	6,19	10,14	15,63	20,43	22,76	16,69	26,67	18,96	16,17	25,23	6,28
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	5,90	3,28	26,02	8,44	30,62	24,52	20,76	25,76	47,79	23,93	6,75
1998	0	0	0	0	0	0	2,05	0	2,81	6,43	7,07	8,52	19,33	16,08	19,96	31,79	30,90	46,21	5,22
1999	0	0	0	0	0	0	1,99	0	0	6,32	10,18	24,67	12,10	23,81	19,38	7,39	0	22,67	4,78
2000	0	0	0	0	0	0	0	2,12	9,89	9,11	10,00	15,83	8,25	11,86	14,25	13,80	28,70	0	4,63
2001	0	0	0	0	0	0	0	1,96	0	5,78	19,60	3,84	16,51	19,79	27,80	6,52	13,37	42,85	4,79
2002	0	0	0	0	0	0	0	1,82	0	16,40	9,45	10,92	25,27	19,80	27,11	44,05	12,19	0	6,05
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	2,08	7,74	9,19	13,77	21,04	31,90	22,08	12,11	22,59	61,34	5,57
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	3,97	7,27	8,95	9,84	24,11	0	17,38	29,25	62,70	39,32	5,12
2005	0	0	0	0	0	0	0	1,61	0	2,26	11,43	15,98	22,89	4,14	17,19	22,76	38,75	0	4,37
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	1,79	8,59	10,98	18,79	14,67	12,30	17,15	11,04	27,35	17,41	4,56
2007	0	0	0	0	0	0	0	0	1,71	14,44	13,14	21,24	31,25	24,92	21,37	16,12	26,22	16,08	6,58

Tabla 38. Cáncer de esófago en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	0	0	0,55	0	1,41	4,69	5,43	18,06	9,91	14,75	14,73	16,97	29,74	24,68	46,01	4,71
1988-92	0	0	0	0	0	0	1,10	1,28	2,78	7,07	10,28	24,53	20,05	19,07	25,91	17,49	24,81	25,15	5,57
1993-97	0	0	0	0	0	0	0	0,53	3,15	7,57	18,22	16,11	19,14	19,73	20,50	32,92	29,46	15,62	5,75
1998-02	0	0	0	0	0	0	0,75	1,25	2,46	8,99	11,33	12,64	16,28	18,27	21,81	20,88	16,74	22,03	5,11
2003-07	0	0	0	0	0	0	0	0,32	1,88	8,21	10,82	16,06	22,91	14,75	19,02	18,20	35,19	25,64	5,24

Tabla 39. Cáncer de esófago en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,64	0	6,21	0	12,18	0	0,60
1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,39	5,58	6,19	0	11,80	0	0,79
1985	0	0	0	0	0	0	0	0	3,82	0	3,45	0	0	0	6,18	7,53	22,98	0	1,18
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,25	6,17	7,43	0	52,84	1,17
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,53	0	0	0	0	0	0	16,87	0,39
1988	0	0	0	0	0	2,50	0	0	0	0	0	0	0	0	6,10	7,32	21,54	16,11	1,15
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,69	4,52	0	14,57	10,54	0	0,95
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,82	3,73	0	0	8,61	0	7,25	20,63	14,73	1,51
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,13	0	0	10,10	0	0,37
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,13	9,91	0	0,37
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,61	0	0	0	7,03	9,75	0	0,55
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,39	0	0	0	0	0	13,79	9,61	0	0,73
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,75	0	7,50	9,18	6,68	0	12,27	1,26
1996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,64	0	13,00	0	0	0,54
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	2,96	0	0	0	3,52	0	8,48	18,07	9,10	0	1,43
1998	0	0	0	0	0	0	0	4,78	0	0	0	0	0	0	0	5,69	8,83	0	0,70
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,50	0	5,38	0	0	0,35
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,49	3,74	0	0	0	15,19	8,43	0	1,19
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,59	0	9,50	0,50
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,32	0	0	3,75	0	7,54	9,30	0,97
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,04	0	0	0	0	0	0	18,25	0,47
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,25	0	0	0	8,75	0	8,94	0,77
2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,69	0	0	0	0	0	4,27	0	8,72	0,60
2006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,44	0	3,00	3,41	3,67	7,23	0	0	0	1,03
2007	0	0	0	0	0	0	1,63	0	0	0	0	0	0	0	0	8,23	11,42	7,87	0,86

Tabla 40. Cáncer de esófago en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	0	0	0	0	0	0,76	0	1,39	0	1,68	2,15	4,94	3,02	9,22	14,63	0,83
1988-92	0	0	0	0	0	0,48	0	0	0	0,75	0,75	0	0,73	3,46	1,15	7,24	14,45	5,92	0,87
1993-97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,62	0,67	0	1,50	0,70	2,24	3,68	11,89	5,67	2,41	0,90
1998-02	0	0	0	0	0	0	0	0,87	0	0	1,30	2,98	0	0,70	0,78	7,12	4,96	3,91	0,75
2003-07	0	0	0	0	0	0	0,35	0	0	1,88	0,57	1,84	0,71	0,73	1,45	4,29	2,51	8,59	0,75

Tabla 41. Cáncer de páncreas en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	0	0	6,00	0	0	0	0	3,60	3,92	10,34	36,27	42,46	23,88	0	0	3,73
1984	0	0	0	0	0	0	0	7,16	4,02	3,78	3,59	0	14,46	7,12	33,97	34,90	42,27	80,22	4,10
1985	0	0	0	0	0	0	0	3,50	3,95	3,88	0	22,80	18,26	27,27	59,56	56,84	103,26	38,37	7,10
1986	0	0	0	0	0	0	0	3,44	3,84	11,98	10,84	3,76	0	12,86	51,01	55,93	40,17	73,64	5,23
1987	0	0	0	0	0	0	0	6,82	3,72	0	7,36	11,17	16,93	18,07	8,43	11,10	19,43	70,70	3,99
1988	0	0	0	0	0	0	0	3,36	0	0	11,29	11,10	24,84	11,22	33,27	55,22	56,29	0	5,35
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	3,53	8,11	0	14,76	32,54	26,24	8,10	76,98	54,43	65,34	6,48
1990	0	0	0	0	0	0	0	3,23	3,45	3,97	3,97	11,09	28,02	59,71	23,18	10,96	70,42	31,40	6,83
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,16	11,16	11,85	14,30	36,48	10,89	34,44	0	3,67
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,13	37,81	27,31	23,06	27,42	21,53	50,93	29,28	6,31
1993	0	0	0	0	0	0	0	0	3,31	3,61	0	3,86	23,17	40,47	44,85	52,90	100,62	84,44	7,37
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	9,73	7,03	16,36	11,83	15,34	26,41	30,05	41,06	115,99	108,08	7,85
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	6,34	10,31	0	20,23	19,13	12,94	34,18	29,27	32,81	26,23	5,55
1996	0	0	0	0	0	2,07	0	0	6,19	6,76	7,81	28,60	7,59	45,89	42,67	104,29	113,20	0	9,80
1997	0	0	0	0	0	0	0	0	5,90	13,12	3,72	33,75	15,31	16,35	36,33	68,70	47,79	0	7,48
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,22	21,22	34,10	34,80	28,15	29,93	31,79	30,90	0	7,74
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	5,32	3,16	10,18	24,67	24,19	23,81	58,14	66,53	89,33	22,67	9,20
2000	0	0	0	0	0	0	1,89	0	7,42	3,04	10,00	31,67	33,00	27,67	47,49	48,28	71,75	43,88	9,43
2001	0	0	0	0	0	0	0	1,96	2,30	8,67	3,27	26,86	12,38	39,59	55,60	71,75	80,21	107,14	9,90
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,67	9,45	18,21	25,27	35,64	36,15	37,76	36,56	63,39	7,64
2003	0	0	0	0	0	0	0	8,71	10,42	5,16	15,32	24,09	21,04	35,88	48,58	72,66	79,07	0	10,53
2004	0	0	0	0	0	0	0	3,36	3,97	4,84	8,95	16,40	52,24	49,35	56,47	64,36	62,70	117,96	11,29
2005	0	0	0	0	0	1,41	0	1,61	9,38	2,26	8,57	9,59	26,71	33,14	47,27	56,91	77,49	74,63	9,02
2006	0	0	0	0	0	0	1,43	1,57	7,15	15,04	13,72	15,66	29,34	49,20	55,74	66,24	91,18	69,65	11,69
2007	0	0	0	0	0	1,44	1,39	1,54	3,42	6,19	13,14	15,17	17,36	45,69	47,02	85,95	78,66	32,16	10,07

Tabla 42. Cáncer de páncreas en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	0	0	1,10	0	4,22	3,13	3,88	5,06	8,39	11,98	20,09	39,03	36,60	41,14	53,68	4,83
1988-92	0	0	0	0	0	0	0	1,28	1,39	2,36	5,53	17,10	24,86	27,10	25,91	34,98	53,15	25,15	5,73
1993-97	0	0	0	0	0	0,42	0	0	6,30	8,26	5,55	19,33	16,08	28,31	37,58	60,04	81,82	41,64	7,61
1998-02	0	0	0	0	0	0	0,37	0,42	2,96	6,59	10,66	26,86	26,04	30,98	45,52	51,51	61,38	48,47	8,78
2003-07	0	0	0	0	0	0,58	0,60	3,25	6,76	6,84	11,95	16,06	29,02	42,62	51,02	69,39	78,20	58,61	10,52

Tabla 43. Cáncer de páncreas en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	0	0	0	0	3,56	0	0	3,44	7,41	9,29	5,65	12,42	38,85	36,55	19,86	3,61
1984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,58	24,76	45,85	23,60	38,15	2,98
1985	0	0	0	0	0	2,75	0	0	0	0	3,45	0	8,37	32,66	24,71	37,64	80,41	0	5,11
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,80	0	7,03	8,03	0	6,17	29,74	33,72	35,22	2,92
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,47	3,87	10,05	55,33	22,09	44,01	33,74	4,64
1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,89	0	0	3,77	28,64	30,51	36,58	32,31	48,34	4,60
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,64	3,49	14,76	18,07	18,03	21,85	21,08	76,97	4,38
1990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,82	3,73	0	14,53	12,91	29,19	36,26	61,88	44,19	5,29
1991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,51	3,59	20,67	0	21,62	70,71	28,42	3,56
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	3,28	0	3,88	0	3,56	7,99	32,19	49,94	39,64	27,53	4,45
1993	0	0	0	0	0	0	0	2,89	0	0	3,89	10,82	7,08	15,56	15,26	70,35	39,01	39,77	5,70
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,75	7,33	24,71	19,07	33,71	55,14	67,30	63,66	7,83
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	3,13	0	3,80	7,50	7,05	22,50	22,96	40,07	28,50	36,82	5,24
1996	0	0	0	0	0	0	0	2,53	0	3,30	0	3,78	3,49	29,16	34,71	91,02	37,21	34,68	7,37
1997	0	0	0	0	2,08	0	0	0	0	6,45	3,54	7,83	14,09	10,78	46,66	36,14	27,29	32,53	6,41
1998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,17	6,76	11,98	14,19	28,31	36,83	22,75	0	41,44	6,17
1999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,81	3,87	7,35	17,50	19,84	64,61	25,83	50,16	6,26
2000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,52	3,05	3,25	7,47	11,22	28,11	31,10	35,45	42,15	19,45	6,47
2001	0	0	0	0	0	0	0	0	7,11	0	6,41	14,52	3,74	14,08	11,45	33,56	24,26	56,98	5,48
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,63	3,11	10,32	11,51	24,61	26,24	32,54	52,78	111,62	7,90
2003	0	0	0	0	0	0	1,83	1,89	0	0	3,04	6,52	15,43	24,78	36,74	31,60	49,44	73,01	7,55
2004	0	0	0	0	0	0	0	0	2,10	7,48	2,97	9,38	18,48	18,26	32,65	61,25	80,04	80,44	9,53
2005	0	0	0	0	0	0	1,72	0	0	2,34	2,87	15,30	14,12	14,73	21,72	51,20	49,96	104,65	8,11
2006	0	0	0	0	0	0	0	1,76	1,94	4,44	11,13	6,01	17,05	32,99	43,35	25,11	64,91	75,67	9,12
2007	0	0	0	0	0	0	0	1,73	1,85	2,14	5,34	2,92	16,15	33,64	50,53	41,14	45,69	23,62	7,92

Tabla 44. Cáncer de páncreas en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	0	0	0,55	0	0,68	0	0,74	1,39	5,01	5,89	10,76	24,71	34,71	43,81	25,61	3,85
1988-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,68	1,51	2,24	1,40	8,02	17,31	21,94	33,30	45,40	44,39	4,46
1993-97	0	0	0	0	0,42	0	0	1,06	0,62	2,00	3,76	7,48	11,27	19,42	31,24	58,14	39,68	41,05	6,51
1998-02	0	0	0	0	0	0	0	0	2,01	2,42	5,83	9,68	9,64	22,51	24,95	37,65	29,79	56,66	6,47
2003-07	0	0	0	0	0	0	0,69	1,08	1,21	3,30	5,15	7,98	16,24	24,85	37,01	42,00	57,77	70,43	8,45

Tabla 45. Cáncer de vejiga en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	0	0	3,00	0	3,67	8,06	7,39	25,17	66,71	149,93	137,84	161,35	238,78	238,61	250,42	27,76
1984	0	0	0	0	2,40	5,72	6,73	3,58	16,09	11,34	46,63	88,72	125,33	106,73	152,87	302,50	211,37	80,22	29,92
1985	0	0	0	0	0	0	0	0	11,86	15,53	53,85	76,00	82,16	170,43	238,24	250,09	185,87	345,36	31,03
1986	0	0	0	0	0	0	6,38	10,33	15,36	15,97	36,14	71,40	91,83	160,80	221,05	257,30	220,93	184,09	30,75
1987	0	0	0	0	0	5,12	0	3,41	14,89	8,10	66,21	59,59	131,23	174,70	227,62	210,92	252,62	176,74	33,31
1988	0	0	0	0	0	5,00	2,97	6,72	10,87	36,61	60,21	81,39	124,21	179,51	282,81	287,17	281,43	101,87	38,61
1989	0	0	0	0	0	0	2,85	0	7,06	16,22	46,24	59,06	77,28	209,95	275,42	417,90	308,42	392,03	38,31
1990	0	0	0	0	2,11	2,37	0	0	10,36	31,79	51,59	88,71	68,05	189,09	270,40	295,89	299,30	251,18	37,45
1991	0	0	2,09	0	0	2,29	0	6,30	6,80	34,62	65,28	96,71	150,08	157,33	248,05	392,20	258,31	242,50	42,72
1992	0	0	0	0	0	4,42	2,55	6,08	20,15	22,29	41,25	90,74	148,24	239,79	308,47	215,33	254,63	351,39	44,53
1993	0	0	0	0	2,04	0	0	2,92	19,85	18,04	24,73	104,24	135,17	202,34	256,30	391,49	519,87	450,32	47,24
1994	0	0	0	0	0	0	0	2,79	12,97	31,64	81,82	70,96	118,92	189,29	306,55	287,44	231,98	378,28	43,56
1995	0	0	0	0	0	0	0	8,00	12,69	37,81	67,98	97,13	156,90	176,91	307,64	253,68	262,51	393,39	46,65
1996	0	0	0	0	0	0	0	5,09	6,19	30,43	93,77	77,63	132,77	258,64	341,39	379,22	355,76	454,09	54,89
1997	0	0	0	0	0	2,06	0	7,35	20,64	36,08	81,79	105,47	145,43	224,77	254,31	403,61	334,55	454,65	54,37
1998	0	0	0	0	0	4,06	4,10	2,37	14,07	28,94	60,13	85,24	166,25	261,37	299,33	365,60	664,40	577,63	60,83
1999	0	0	0	0	0	3,94	1,99	2,27	15,96	28,43	61,11	82,23	165,33	182,56	290,68	443,56	461,52	385,40	55,22
2000	0	0	0	2,28	0	1,83	1,89	8,47	14,83	21,26	80,03	110,84	160,85	225,33	337,19	365,58	430,51	307,19	57,64
2001	0	0	0	0	0	0	0	1,96	11,50	20,23	62,07	115,11	181,59	174,19	245,57	345,70	401,07	428,54	50,50
2002	0	0	0	0	1,74	0	0	9,12	13,06	30,07	91,33	83,75	181,12	186,14	275,63	320,93	548,45	190,17	52,71
2003	0	0	0	0	0	3,06	3,26	5,22	12,50	30,97	64,33	134,24	155,71	207,32	318,00	375,39	519,63	327,16	57,28
2004	0	0	0	0	3,59	2,95	1,56	5,04	5,95	46,02	74,55	82,02	176,80	234,43	286,70	397,85	522,52	452,18	58,39
2005	0	0	0	0	1,83	1,41	2,95	4,82	11,25	22,63	68,59	95,90	133,54	211,26	266,45	432,49	358,41	559,70	53,56
2006	0	0	0	0	0	0	0	4,71	8,94	32,23	49,41	97,10	205,36	250,10	343,05	380,89	373,83	504,96	58,15
2007	0	0	0	0	0	1,44	4,18	6,16	6,84	39,20	55,17	103,18	149,29	195,20	260,73	365,31	506,93	401,96	54,29

Tabla 46. Cáncer de vejiga en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	0	0,47	2,75	2,61	4,22	13,29	11,63	45,52	72,42	115,22	151,36	200,24	251,63	222,15	207,06	30,58
1988-92	0	0	0,41	0	0,42	2,83	1,65	3,85	11,10	28,27	52,97	83,26	113,89	195,71	277,41	321,39	279,94	270,36	40,35
1993-97	0	0	0	0	0,40	0,42	0	5,33	14,48	30,97	70,52	91,02	137,84	211,03	293,81	344,73	340,38	426,86	49,38
1998-02	0	0	0	0,45	0,37	1,81	1,50	5,01	13,79	25,77	71,29	95,60	170,89	205,76	289,22	366,15	499,41	374,52	55,25
2003-07	0	0	0	0	1,11	1,74	2,39	5,20	9,02	34,21	62,05	102,12	164,21	219,66	294,86	390,17	453,53	450,56	56,30

Tabla 47. Cáncer de vejiga en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por año y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983	0	0	0	0	0	0	0	0	3,87	0	0	0	9,29	0	6,21	23,31	36,55	39,71	2,40
1984	0	0	0	0	0	0	3,30	3,48	0	0	0	0	17,58	39,07	49,52	22,93	59,00	0	5,75
1985	0	0	0	0	2,37	0	0	0	0	3,71	0	7,13	4,19	21,77	18,53	52,70	11,49	0	3,93
1986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,41	3,47	14,07	12,05	26,26	37,01	59,47	112,38	35,22	8,18
1987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,05	6,98	15,49	20,11	43,03	44,19	33,01	84,36	6,38
1988	0	0	0	0	0	0	5,90	0	0	0	0	6,97	7,53	4,77	30,51	36,58	43,08	64,45	4,80
1989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,64	3,49	7,38	22,58	24,04	36,41	52,70	61,58	5,14
1990	0	0	0	0	0	0	0	3,19	0	3,82	7,46	0	21,80	17,21	40,86	14,50	20,63	29,46	5,10
1991	3,06	0	0	0	0	0	0	0	3,31	0	3,83	7,02	14,36	16,54	39,29	14,42	40,40	42,63	5,44
1992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,57	3,88	17,77	21,35	15,98	42,92	35,67	39,64	41,29	6,87
1993	0	0	0	0	2,13	0	2,46	2,89	3,24	3,47	3,89	21,64	17,70	11,67	15,26	42,21	48,76	79,53	7,35
1994	0	0	0	0	0	0	0	0	3,19	3,39	0	7,33	17,65	15,26	38,52	48,25	48,07	89,13	7,28
1995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,98	3,80	0	17,64	26,25	27,55	46,74	47,50	73,64	7,22
1996	0	0	0	0	0	2,14	2,29	0	3,08	0	0	3,78	6,98	51,03	17,35	45,51	46,51	69,36	7,55
1997	0	0	0	0	0	0	2,20	2,45	2,96	0	7,09	11,75	14,09	32,35	46,66	30,12	63,67	65,07	8,91
1998	0	0	0	0	0	2,13	2,13	0	2,83	6,35	3,38	3,99	10,64	21,23	45,01	34,13	52,96	113,95	8,81
1999	0	0	0	0	0	2,09	2,09	0	5,35	0	13,08	7,73	18,38	17,50	39,68	59,23	51,66	40,13	8,87
2000	0	0	0	0	0	2,00	0	4,41	2,52	3,05	3,25	3,74	7,48	17,57	27,22	15,19	42,15	77,79	6,30
2001	0	0	0	0	0	0	0	2,10	0	2,95	0	7,26	18,71	28,17	34,35	95,90	64,70	66,48	10,12
2002	0	0	0	0	0	0	0	0	2,26	11,26	6,22	6,88	19,18	28,13	26,24	23,24	75,40	102,32	8,87
2003	0	0	0	0	1,97	3,53	0	1,89	4,37	0	9,12	3,26	15,43	10,62	18,37	49,65	42,38	63,89	7,23
2004	0	0	0	0	2,01	1,72	0	1,84	4,19	12,46	2,97	9,38	11,09	18,26	29,02	52,50	53,36	71,50	8,91
2005	0	0	0	2,58	0	3,38	0	1,80	2,01	4,69	5,75	15,30	21,17	36,82	36,20	55,47	68,70	34,88	10,21
2006	0	0	0	5,11	0	0	0	0	0	0	13,91	15,02	17,05	18,33	32,51	46,03	82,62	84,08	9,71
2007	0	0	0	0	0	0	3,26	1,73	0	6,41	2,67	11,69	9,69	29,90	43,31	49,37	79,95	86,59	10,22

Tabla 48. Cáncer de vejiga en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. por periodo y grupo de edad. Región de Murcia. Años 1983-2007.

	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	>=85	Total
1983-87	0	0	0	0	0,48	0	0,64	0,68	0,76	2,97	2,08	5,73	11,77	21,52	30,89	40,74	50,72	32,92	5,35
1988-92	0,60	0	0	0	0	0	1,09	0,63	0,68	1,51	3,73	7,01	14,58	15,58	35,79	27,51	39,21	47,35	5,48
1993-97	0	0	0	0	0,42	0,43	1,40	1,06	2,49	3,34	3,01	8,98	14,79	27,64	29,40	42,28	51,01	74,85	7,67
1998-02	0	0	0	0	0	1,19	0,81	1,31	2,51	4,83	5,18	5,96	14,82	22,51	34,31	45,79	57,92	80,10	8,60
2003-07	0	0	0	1,54	0,82	1,71	0,69	1,44	2,01	4,71	6,87	11,05	14,83	22,66	31,93	50,58	66,57	68,72	9,29

Figuras

Gráfico 1. Cáncer de pulmón en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.




Gráfico 2. Cáncer de pulmón en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.




Gráfico 3. Cáncer de de cavidad oral y faringe en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.




Gráfico 4. Cáncer de de cavidad oral y faringe en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.




Gráfico 5. Cáncer de laringe en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.




Gráfico 6. Cáncer de laringe en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.




Gráfico 7. Cáncer de esófago en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.




Gráfico 8. Cáncer de esófago en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.




Gráfico 9. Cáncer de páncreas en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.




Gráfico 10. Cáncer de páncreas en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.




Gráfico 11. Cáncer de vejiga en hombres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.




Gráfico 12. Cáncer de vejiga en mujeres. Tasas de incidencia anual por 100.000 hab. ajustadas por edad a la población europea estándar. Región de Murcia. Años 1983-2007.

