



COMUNIDAD AUTONOMA
DE LA REGION DE MURCIA
CONSEJERIA DE SANIDAD,
CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES

DIRECCION REGIONAL DE SALUD

Boletín Epidemiológico de Murcia

Vol. 8. Nº 389. Pág. 55-58
Datos correspondientes a las semanas nº 25 y 26
Período comprendido entre el 15 y 28 de junio de 1986
Sección de Epidemiología - Ronda Levante, 11 30008-MURCIA - Telfs: 24 52 12 - 23 08 50

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL (E.T.S.) EN LA REGION DE MURCIA

Desde 1981 se incluyeron la Infección Gonocócica y la Sífilis primaria dentro del Sistema de Información Sanitaria de las Enfermedades de Declaración Obligatoria (E.D.O.). A partir de 1982 estas mismas enfermedades se incluyeron a nivel de todo el Estado español.

En las tablas 1 y 2 se muestran el número de casos y tasa por 100.000 hab. en Murcia y España desde entonces hasta el año 1985. En ellas observamos un paulatino incremento en el número de casos notificados que es de difícil valoración dada la carencia de datos históricos, incluso aproximativos, ya que en nuestro medio los estudios existentes se basan en la morbilidad atendida en Centros Asistenciales especializados que son de difícil extrapolación a la población general.

AÑO	MURCIA		ESPAÑA	
	Nº casos	Tasa	Nº casos	Tasa
1981	24	2,5	—	—
1982	58	6,1	1.752	4,6
1983	94	9,8	3.332	8,7
1984	72	7,5	4.017	10,3
1985	64	6,7	3.979	10,1

TABLA 1: Incidencia de Sífilis primaria en MURCIA y ESPAÑA. Número de casos según registro E.D.O. y tasa por 100.000 hab. Período 1981-1985.

A la hora de valorar estos datos hay que tener en cuenta que las fuentes de información son los médicos de asistencia primaria y, salvo raras excepciones como el Dispensario de Dermatología y E.T.S. de la Consejería de Sanidad, los especialistas en Dermatología y E.T.S., Urólogos y Tocoginecólogos de ambulatorios y centros hospitalarios no suelen estar incluidos dentro de esta dinámica, esto puede conllevar un sesgo que suponga una infradeclaración importante. Tampoco disponemos de datos sobre el estudio de los contactos sexuales con enfermos de E.T.S., única vía para lograr controlar la difusión de estas enfermedades por medio de la localización de enfermos asintomáticos y de los que no acceden al Sistema Sanitario en busca de tratamiento.

La participación de estos colectivos sanitarios en la notificación, la investigación de contactos y el análisis de los resultados de esta investigación parece una tarea imprescindible para avanzar en el conocimiento de la importancia de estas enfermedades en nuestro medio y sentar las bases de su control.

Distribución temporo-espacial: No se ha encontrado un predominio estacional en la notificación de los casos de estas enfermedades en el período considerado.

En cuanto a la distribución espacial en el mapa 1 se representa, para la sífilis primaria, la distribución comarcal de la incidencia media del período 1981-1985. En el mapa 2 se representa la incidencia media para la infección gonocócica.


ca. Es de destacar que ambos mapas no son superponibles, lo que puede ser índice de una baja calidad en los datos suministrados.

Se ha estudiado las diferencias de incidencia entre distintas zonas de la Región, no hallándose diferencia entre la incidencia de E.T.S. entre la franja costera y el resto de la Región.

continua en última pág.

AÑO	MURCIA		ESPAÑA	
	Nº casos	Tasa	Nº casos	Tasa
1981	429	44,8	—	—
1982	682	71,2	10.380	27,4
1983	770	80,3	23.411	61,8
1984	874	91,6	27.884	71,6
1985	978	102,4	31.250	79,4

TABLA 2: Incidencia de Infección Gonocócica en MURCIA y ESPAÑA. Número de casos según registro E.D.O. y tasas por 100.000 hab. Período 1981-1985.



MAPA 1: Distribución comarcal de la incidencia media de Sífilis primaria en el período 1981-1985. Tasa media regional 7,5 casos por 100.000 hab.

Situación regional de las enfermedades de declaración obligatoria de la semana 25 (del 15 al 21 de junio de 1986)

Enfermedades (según lista de E.D.O. O. 26-11-1985)	Código C.I.E. - O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 25		Casos acumulados semana 25		Mediana 79-85	
		1986	1985	1986	1985	semana 25	acumul.
		Fiebre tifoidea	002	3	0	56	84
Disenteria	004	0	0	4	4	0	22
5 Toxi-infec. alimentaria	003-005	59	0	170	424	0	200
5 Procesos diarreicos	006-009	1.894	1.713	31.319	34.701	1.102	18.096
5 I.R.A. inf. resp. aguda	460-466	5.996	5.227	257.887	227.117	1.991	77.684
Gripe	487	743	912	129.979	84.256	153	50.951
5 Neumonía	480-486	3	10	397	367	4	100
Tuberculosis respiratoria	011-012	3	4	77	67	1	67
Sarampión	055	87	58	1.047	686	66	1.131
Rubeola	056	242	153	4.654	2.692	101	1.123
Varicela	052	410	538	8.494	10.697	356	6.602
Escarlatina	034.1	6	6	217	135	7	135
Brucelosis	023	4	3	52	81	4	112
5 Sífilis	091	2	0	30	17	1	17
5 Infección gonocócica	098.0,098.1	15	33	333	545	11	334
Infección meningocócica	036	6	1	58	70	1	118
Hepatitis	070	14	24	256	552	12	235
Parotiditis	072	46	321	1.554	7.090	81	1.865
Tosferina	033	44	59	893	926	50	761
* Otras meningitis	047.9,320.8	6	0	50	0		
* Otras tuberculosis	003-018	1	0	3	0		

* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana por ser de notificación posterior a 1981.
5 Datos correspondientes al último quinquenio.

Distribución comarcal de los casos de enfermedades de declaración obligatoria

Comarca	Población	Noroeste	Altiplano	Lorca	Cartagena	Mula	Alcantar.	Cieza	Molina	Fort/Aban.	Murcia cap.
		61.821	45.970	110.866	238.201	21.820	41.265	47.996	76.636	26.327	284.585
Tasa: 1 caso por 100.000 h.		1,61	2,17	0,90	0,41	4,58	2,42	2,08	1,30	3,79	0,35
Fiebre CA	CA	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1
Tifoidea AC	AC	2	3	3	22	0	1	3	13	0	9
Procesos CA	CA	237	293	60	352	19	68	96	251	42	476
Diarreicos AC	AC	2.692	4.564	1.738	6.112	294	783	1.584	3.806	679	9.067
I.R.A. CA	CA	553	474	524	1.200	33	263	627	332	354	1.636
In. resp. aguda AC	AC	18.087	21.275	23.099	51.462	1.986	15.868	27.289	28.900	10.515	59.406
Gripe CA	CA	58	1	147	130	1	40	3	148	7	208
Gripe AC	AC	12.912	5.648	21.051	23.085	2.203	6.989	6.274	15.614	2.237	33.966
Neumonía CA	CA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Neumonía AC	AC	4	14	15	67	0	28	13	24	9	223
Tuberculosis CA	CA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Tuberculosis AC	AC	5	2	8	18	0	3	3	1	2	35
Sarampión CA	CA	22	0	25	5	0	8	0	18	0	9
Sarampión AC	AC	152	2	81	190	16	67	27	204	23	285
Rubeola CA	CA	4	1	2	20	7	33	1	11	11	152
Rubeola AC	AC	98	16	100	215	55	709	24	634	152	2.651
Varicela CA	CA	27	21	49	23	3	36	3	26	22	200
Varicela AC	AC	974	273	477	1.439	442	980	167	719	233	2.790
Escarlatina CA	CA	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3
Escarlatina AC	AC	2	0	8	51	10	11	3	74	21	37
Brucelosis CA	CA	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Brucelosis AC	AC	9	2	14	11	0	2	2	7	1	4
Sífilis CA	CA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Sífilis AC	AC	1	0	1	10	0	3	1	4	1	9
Infección CA	CA	5	1	0	2	0	0	1	1	2	3
Gonocócica AC	AC	53	3	31	94	2	22	16	49	19	44
Infección CA	CA	1	0	0	1	0	1	0	1	0	2
Meningocócica AC	AC	4	3	2	9	3	3	1	5	1	27
Hepatitis CA	CA	0	0	0	7	0	0	0	2	0	5
Hepatitis AC	AC	39	11	16	58	24	8	15	15	3	67
Parotiditis CA	CA	0	5	2	3	0	0	0	24	7	5
Parotiditis AC	AC	7	107	20	82	7	38	9	977	37	270
Tos CA	CA	2	0	3	5	0	0	3	1	0	30
Ferina AC	AC	37	7	42	118	6	37	43	140	25	438
Otras CA	CA	2	0	0	0	0	1	0	1	0	2
Meningitis AC	AC	4	0	0	4	1	3	6	15	1	16
Otras CA	CA	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Tuberculosis AC	AC	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0

CA = nº de casos en esta semana AC = nº de casos acumulados desde la primera semana del año.

Estado de las enfermedades de declaración obligatoria de baja incidencia

Enfermedades (según lista de E.D.O. O. 26-11-1985)	Código C.I.E. - O.M.S. (1975)	Casos declarados semana 25		Casos acumulados semana 25	
		1986	1985	1986	1985
		5 Fiebre exant. Mediterránea	082.1	0	0
Fiebre reumática	390-392	0	2	24	46
5 Leishmaniasis	085	0	0	2	0
Paludismo	084	0	0	1	1
Tétanos	037,771.3	0	0	2	1

De las restantes no se ha recibido ninguna notificación en este año.

Enfermedades (según lista de E.D.O. O. 26-11-1985)	Codigo C.I.E. - O.M.S. (1975)	Casos declarados		Casos acumulados		semana 26	acumul.
		semana 26	1985	semana 26	1985		
Fiebre tifoidea	002	5	4	61	88	3	88
Disenteria	004	0	2	4	6	2	22
5 Toxi-infec. alimentaria	003-005	15	0	185	424	0	200
5 Procesos diarreicos	006-009	2.054	2.187	33.373	36.888	1.032	19.128
5 I.R.A. inf. resp. aguda	460-466	6.102	5.216	263.989	232.333	1.810	79.494
Gripe	487	482	630	130.461	84.886	200	51.160
5 Neumonía	480-486	9	8	406	375	1	101
Tuberculosis respiratoria	011-012	4	2	81	69	2	69
Sarampión	055	102	71	1.149	757	97	1.259
Rubeola	056	197	125	4.851	2.817	68	1.183
Varicela	052	397	505	8.891	11.202	192	6.731
Escarlatina	034.1	12	3	229	138	4	138
Brucelosis	023	8	2	60	83	4	119
5 Sífilis	091	1	2	31	19	0	19
5 Infección gonocócica	098.0,098.1	18	32	351	577	17	351
Infección meningocócica	036	2	2	60	72	0	118
Hepatitis	070	9	15	265	567	12	247
Parotiditis	072	69	275	1.623	7.365	112	1.977
Tosferina	033	38	91	931	1.017	38	799
* Otras meningitis	047.9,320.8	3	0	53	0		
* Otras tuberculosis	003-018	0	0	3	0		

* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana por ser de notificación posterior a 1981.

5 Datos correspondientes al último quinquenio.

Distribución comarcal de los casos de enfermedades de declaración obligatoria (semana 26 de 1986)

Comarca	Población	Noroeste	Altiplano	Lorca	Cartagena	Mula	Alcantar.	Cieza	Molina	Fort/Aban.	Murcia cap.
		61.821	45.970	110.866	238.201	21.820	41.265	47.996	76.636	26.327	284.585
Tasa: 1 caso por 100.000 h.		1,61	2,17	0,90	0,41	4,58	2,42	2,08	1,30	3,79	0,35
Fiebre CA	CA	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2
Tifoidea AC	AC	2	3	3	24	0	1	3	14	0	11
Procesos CA	CA	154	323	76	416	30	124	155	263	72	441
Diarreicos AC	AC	2.846	4.887	1.814	6.528	324	907	1.739	4.069	751	9.508
I.R.A. CA	CA	377	567	487	1.391	57	249	353	996	391	1.234
In. resp. aguda AC	AC	18.464	21.842	23.586	52.853	2.043	16.117	27.642	29.896	10.906	60.640
Gripe CA	CA	59	5	39	55	0	19	1	109	5	190
AC	AC	12.971	5.653	21.090	23.140	2.203	7.008	6.275	15.723	2.242	34.156
Neumonía CA	CA	0	0	1	0	0	0	0	1	1	6
AC	AC	4	14	16	67	0	28	13	25	10	229
Tuberculosis CA	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Respiratoria AC	AC	5	2	8	18	0	3	3	1	2	39
Sarampión CA	CA	13	0	37	6	0	3	0	30	1	12
AC	AC	165	2	118	196	16	70	27	234	24	297
Rubeola CA	CA	0	1	9	16	6	26	1	31	11	96
AC	AC	98	17	109	231	61	735	25	665	163	2.747
Varicela CA	CA	31	23	62	48	9	28	2	24	16	154
AC	AC	1.005	296	539	1.487	451	1.008	169	743	249	2.944
Escarlatina CA	CA	0	0	0	4	0	1	0	1	3	3
AC	AC	2	0	8	55	10	12	3	75	24	40
Brucelosis CA	CA	0	1	0	1	0	0	0	4	0	2
AC	AC	9	3	14	12	0	2	2	11	1	6
Sífilis CA	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
AC	AC	1	0	1	10	0	3	1	4	1	10
Infección CA	CA	4	0	0	3	0	1	2	5	0	3
Gonocócica AC	AC	57	3	31	97	2	23	18	54	19	47
Infección CA	CA	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Meningocócica AC	AC	4	3	2	9	3	3	2	6	1	27
Hepatitis CA	CA	0	0	0	5	1	0	0	1	0	2
AC	AC	39	11	16	63	25	8	15	16	3	69
Parotiditis CA	CA	0	12	3	1	1	1	0	25	7	19
AC	AC	7	119	23	83	8	39	9	1.002	44	289
Tos CA	CA	5	0	2	6	0	0	3	4	0	18
Ferina AC	AC	42	7	44	124	6	37	46	144	25	456
Otras CA	CA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
AC	AC	4	0	0	5	1	3	6	16	1	17
Meningitis CA	CA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AC	AC	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0

CA = nº de casos en esta semana

AC = nº de casos acumulados desde la primera semana del año.

Estado de las enfermedades de declaración obligatoria de baja incidencia

Enfermedades (según lista de E.D.O. O. 26-11-1985)	Codigo C.I.E. - O.M.S. (1975)	Casos declarados		Casos acumulados	
		semana 26	1985	semana 26	1985
5 Fiebre exant. Mediterránea	082.1	2	1	3	2
Fiebre reumática	390-392	1	0	25	46
5 Leishmaniasis	085	0	0	2	0
Paludismo	084	0	0	1	1
Tétanos	037,771.3	0	0	2	1

De las restantes no se ha recibido ninguna notificación en este año.

Porcentaje de declaración semanal (semana 25 de 1986)

Total Regional: 76,00%

Municipios con menos del 80,0%:

ABANILLA	50,0%	MORATALLA	20,0%
ALBUDEITE	0,0%	MURCIA	75,4%
BENIEL	33,3%	RICOTE	0,0%
CARTAGENA	45,3%	SAN JAVIER	25,0%
CEUTI	33,3%	SAN PEDRO DEL PINATAR	0,0%
JUMILLA	50,0%	VILLANUEVA R. SEGURA	0,0%
LORCA	46,1%		

Porcentaje de declaración semanal (semana 26 de 1986)

Total Regional: 77,28%

Municipios con menos del 80,0%:

ABANILLA	50,0%	LORCA	50,0%
BENIEL	33,3%	MORATALLA	20,0%
BLANCA	66,6%	MURCIA	74,1%
CARAVACA DE LA CRUZ	77,7%	SAN JAVIER	25,0%
CARTAGENA	43,7%	VILLANUEVA R. SEGURA	0,0%
CEUTI	33,3%		

viene de la primera pág.

También se ha estudiado la incidencia en las poblaciones que cruzan las carreteras Alicante-Granada y Cartagena-Madrid a su paso por la Región, ejes tradicionales de clubs nocturnos que pueden constituir grupos de riesgo, hallándose únicamente un aumento de la incidencia para la infección gonocócica en el tramo Murcia-Yecla (143,5 casos por 100.000 hab. para esa zona en 1984, el total de la Región era 91,6 y 188,4 frente a 102,4 para el total regional).


COMENTARIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAL

Fiebre botonosa. Esta semana han sido notificados 2 casos de Fiebre Exantemática Mediterránea.

Caso 1: Varón de 80 años, residente en Fuente Alamo, con síndrome febril, exantema y puerta de entrada clara. Reacción de Weil-Felix negativa.

Caso 2: Mujer de 28 años, residente en Mazarrón, que presentaba síndrome febril, mialgias, exantema maculo-papuloso que respetaba palmas, plantas y cara. Trabajadora del campo convivía con perros parasitados con garrapatas.

Brote de brucelosis. Esta semana han sido comunicados cuatro casos de brucelosis en el Llano de Molina, posteriores averiguaciones sitúan el número de casos nuevos en cinco. Se trata de una familia, padres y una hija de 12 años, ganaderos y que poseen una carnicería; los otros dos casos también corresponden a ganaderos con domicilio próximo a los anteriores. Se está pendiente de la elaboración de la encuesta epidemiológica y el subsiguiente saneamiento de la cabaña, por parte del Servicio de Producción Animal de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca.



MAPA 2: Distribución comarcal de la incidencia media de Infección Gonocócica en el periodo 1981-1985. Tasa media regional 86,4 casos por 100.000 hab.

BOLETIN QUINCENAL

Suscripción: envío gratuito, siempre que sea dirigido a cargo oficial. Solicitudes: Sección EPIDEMIOLOGIA. Dirección Regional de Salud, Consejería de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales. Ronda Levante, 11. MURCIA 30008.