



Región de Murcia
Consejería de Sanidad
y Consumo

Dirección General de Salud
Pública

Volumen 21. Número 612. Septiembre 2000

Datos correspondientes a las semanas 29 a 32.
Período comprendido entre el 16 de julio
al 12 de agosto de 2000.

Servicio de Epidemiología
Ronda Levante, 11. 30008 Murcia
Tel.: 968 36 20 39 Fax: 968 36 66 56
Correo electrónico: bolepi@carm.es
<http://www.carm.es/csan/dgs/se/bem/bem.htm>

Estadísticas de Mortalidad en la Región de Murcia en 1998

La tasa de mortalidad por todas las causas de las personas residentes en la Región de Murcia (fallecidas en España) es de 8,12 fallecidos por cada mil habitantes, con un total de 9.057 defunciones. La tasa de mortalidad es de 8,8 por mil en los hombres y de 7,5 por mil en las mujeres. Las principales causas de muerte en la región son las enfermedades cardiovasculares (36,8% sobre todas las muertes), las neoplasias (23,9%) y las enfermedades respiratorias (11,1%) (gráfico 1). Tanto en hombres como en mujeres, estos tres grupos de enfermedades son responsables de aproximadamente un 70% de las muertes, destacando la elevada proporción de muertes provocadas por las enfermedades cardiocirculatorias en las mujeres de la región (43,5%).

La esperanza de vida al nacer es de 78,65 años en la región, siendo mayor en las mujeres (82,27 años) en 7,15 años que en los hombres (75,12 años). La esperanza de vida es siempre mayor en las mujeres respecto a los hombres en todos los grupos quinqueniales de edad.

La tasa de mortalidad infantil (menores de 1 año) es de 5,86 fallecidos por mil nacidos vivos. La tasa de mortalidad perinatal (muertes fetales con más de 28 semanas de gestación y nacidos vivos fallecidos con menos de 7 días de vida) es de 6,85.

Mortalidad proporcional por grupos de edad

De 0 a 14 años, las anomalías congénitas (36,6%) y enfermedades del periodo perinatal (27,7%) son las principales causas de muerte.

De 15 a 64 años, la mayor contribu-

ción la presentan las neoplasias (38,6%), las enfermedades cardiocirculatorias (19,5%) y los accidentes (19,1%).

Mayores de 64 años, predomina la mortalidad por enfermedades del aparato cardiocirculatorio (41,4%), seguida de las neoplasias (20,8%) y de las enfermedades respiratorias (12,7%).

Mortalidad por causas específicas

Las enfermedades cerebrovasculares y las isquémicas del corazón son, un año más, las dos primeras causas específicas de mortalidad en ambos sexos (tablas 1 y 2). La enfermedad isquémica del corazón es la primera causa de muerte en los

hombres y la enfermedad cerebrovascular en las mujeres.

Años potenciales de vida perdidos (APVP)

El indicador años potenciales de vida perdidos expresa una aproximación a la mortalidad prematura y tiene en cuenta los años que una persona deja de vivir si fallece a una edad que no es la habitual de defunción fijada teóricamente. El valor de este indicador en la Región de Murcia es de 14,76 años menos por persona residente fallecida. Los hombres representan el 72,20% de la mortalidad precoz y las mujeres el 27,80% restante.

Las causas de mortalidad específica

Tabla 1. Primeras causas de mortalidad hombres Región de Murcia, 1998.

CAUSAS	CASOS	%	TASA
1 Enfermedades isquémicas del corazón	545	11,3	98,85
2 Enfermedades cerebrovasculares	471	9,7	85,43
3 EPOC y afines	406	8,4	73,64
4 Cáncer broncopulmonar	397	8,2	72,01
5 Accidentes de vehículos a motor	173	3,6	31,38
6 Cáncer de próstata	137	2,8	24,85
7 Cirrosis hepática	130	2,7	23,58
8 Cáncer de intestino grueso	98	2,0	17,77
9 Diabetes	95	2,0	17,23
10 Suicidio	90	1,9	16,32
Resto de causas	2.293	47,4	415,89
Total	4.835	100,0	876,95

Tasa específica por 100.000 hombres.

Tabla 2. Primeras causas de mortalidad mujeres Región de Murcia, 1998.

CAUSAS	CASOS	%	TASA
1 Enfermedades cerebrovasculares	653	15,5	115,84
2 Enfermedades isquémicas del corazón	444	10,5	78,76
3 Diabetes	175	4,1	31,04
4 Cáncer de mama	153	3,6	27,14
5 EPOC y afines	129	3,1	22,88
6 Enfermedades hipertensivas	108	2,6	19,16
7 Nefritis, síndrome nefrótico, nefrosis	98	2,3	17,38
8 Cáncer de intestino grueso	91	2,2	16,14
9 Neumonía	75	1,8	13,30
10 Cáncer de estómago	58	1,4	10,29
Resto de causas	2.238	53,0	379,44
Total	4.222	100,0	748,95

Tasa específica por 100.000 mujeres.

Situación regional de las Enfermedades de Declaración Obligatoria.

Semanas 29 a 32 (del 16 de julio al 12 de agosto de 2000). Distribución semanal

Enfermedades	Casos notificados												Casos acumulados			
	Semana 29				Semana 30				Semana 31				Semana 32		Semanas 1 a 32	
	2000	1999	Mediana	2000	2000	1999	Mediana	2000	1999	Mediana	2000	1999	Mediana	2000	1999	Mediana
Gripe	1980	46	48	102	46	22	63	35	33	67	10	18	112	89.306	145.864	99.873
Tuberculosis respiratoria	1980	5	3	2	5	2	3	0	2	2	1	0	2	119	79	130
Meningitis tuberculosa	1997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
Otras tuberculosis	1986	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	17	20	22
Legionelosis	1997	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	6
Hepatitis A	1997	0	0	1	0	1	1	0	6	0	0	1	1	15	33	33
Hepatitis B	1997	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5	15
Otras hepatitis víricas	1997	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	6	12	15
Fiebres tifoidea y par.	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	10
Disentería	1982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Toxiinfecciones-Alimen.	1983	4	15	5	0	7	7	11	14	8	4	15	13	397	241	292
Varicela	1980	90	163	163	90	90	114	20	52	66	35	24	39	6.265	10.603	7.425
Sarampión	1980	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	11	32
Rubeola	1980	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	10	22
Parotiditis	1980	0	2	0	1	1	1	1	0	0	1	2	1	37	35	31
Tosferina	1980	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12	12	11
Enfermedad meningoc.	1980	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	31	38	33
Otras meningitis	1986	5	0	0	4	1	0	5	0	0	4	0	0	183	34	33
Sífilis	1982	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	9	10	11
Infección gonocócica	1982	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	0	8	11	11
Fiebre exantemática med.	1981	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	9	7
Brucelosis	1980	1	1	1	0	1	2	0	0	2	0	3	2	10	20	33
Paludismo	1980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1

La mediana se calcula sobre el último quinquenio. No se incluyen las enfermedades sin casos notificados en año actual.

Porcentaje de declaración ()*

Semanas 29 a 32 (del 16 de julio al 12 de agosto de 2000).

Municipios	Población	% de	Municipios	Población	% de
	(Proyec. 1999)	declaración		(Proyec. 1999)	declaración
Abanilla	4.921	75,0	Calasparra	8.601	100,0
Abarán	12.462	100,0	Campos del Río	1.823	66,7
Águilas	28.662	100,0	Caravaca de la Cruz	19.512	83,3
Albudeite	1.261	100,0	Cartagena	168.649	100,0
Alcantarilla	36.304	98,6	Cehegín	11.706	75,0
Aledo	897	62,5	Ceutí	7.358	100,0
Alguazas	7.846	100,0	Cieza	32.339	78,9
Alhama de Murcia	14.920	100,0	Fortuna	5.925	100,0
Archena	14.447	85,0	Fuente Álamo de Murcia	7.608	100,0
Beniel	8.859	100,0	Jumilla	19.268	31,3
Blanca	5.386	100,0	Librilla	3.877	100,0
Bullas	9.988	96,4	Lorca	67.277	94,0

() [Núm. partes de declaración numérica recibidos / (Núm. de médicos de atención primaria en las cuatro semanas) x 100].*

*Distribución por áreas de salud de las Enfermedades de Declaración Obligatoria.
Semanas 29 a 32 (del 16 de julio al 12 de agosto de 2000). Distribución semanal*


Población	Áreas de Salud										REGIÓN			
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		TOTAL	
	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.
Enfermedades														
Gripe	24	34.068	12	16.184	12	14.248	0	7.486	0	3.587	89	13.733	137	89.306
Tuberculosis respiratoria	3	33	5	27	2	26	0	3	0	2	1	28	11	119
Meningitis tuberculosa	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Otras tuberculosis	1	6	0	7	0	2	0	0	0	0	0	2	1	17
Legionelosis	0	7	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	9
Hepatitis a	0	3	0	8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	15
Hepatitis b	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	1	2	1	7
Otras hepatitis víricas	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6
Fiebres tifoidea y paratifoidea	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	5
Disenteria	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Toxiinfecciones-alimentarias	4	214	7	76	4	55	0	13	1	2	3	37	19	397
Varicela	54	2.752	68	1.002	69	1.358	10	358	11	344	23	451	235	6.265
Sarampión	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Rubeola	0	2	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	2	6
Parotiditis	2	15	0	10	0	1	0	4	0	1	1	6	3	37
Tosferina	0	2	2	8	0	1	0	0	0	0	0	1	2	12
Enfermedad meningocócica	1	8	1	12	0	4	0	0	0	1	0	6	2	31
Otras meningitis	8	99	6	39	0	3	0	15	1	5	3	22	18	183
Sífilis	2	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9
Infección gonocócica	2	5	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8
Fiebre exantemática mediterránea	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Brucellosis	0	3	0	2	1	2	0	2	0	1	0	0	1	10
Paludismo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

No se incluyen las enfermedades sin casos notificados en año actual.


Porcentaje de declaración ()
Semanas 29 a 32 (del 16 de julio al 12 de agosto de 2000).*

Municipios	Población	% de	Municipios	Población	% de
	(Proyec. 1999)	declaración		(Proyec. 1999)	declaración
Lorquí	5.507	100,0	Torre Pacheco	18.508	71,2
Mazarrón	17.370	100,0	Torres de Cotillas, Las	16.618	77,8
Molina de Segura	43.329	55,0	Totana	22.038	100,0
Moratalla	7.497	71,9	Ulea	1.011	87,5
Mula	13.217	100,0	Unión, La	13.012	100,0
Murcia	375.577	62,0	Villanueva del Río Segura	1.578	50,0
Ojós	730	50,0	Yecla	29.201	68,8
Pliego	3.207	75,0	Santomera	9.921	100,0
Puerto Lumbreras	11.018	100,0	Alcázares, Los	5.612	100,0
Ricote	1.605	75,0			
San Javier	17.025	100,0	Total Región	1.127.772	81,7
San Pedro del Pinatar	14.295	100,0			

Gráfica 1. Mortalidad proporcional por grandes grupos de causas. Todas las edades. Ambos sexos. Región de Murcia, 1998.



Mapa 1. Comparación de la mortalidad general de las áreas de salud con el total regional. Ambos sexos. Región de Murcia, 1998:



que restan más años de vida son, en los hombres, los accidentes de tráfico (14,01% sobre el número total de APVP), el cáncer broncopulmonar (5,59%), los suicidios y autolesiones (5,28%), la enfermedad isquémica del corazón (4,67%). En las mujeres, la mayor mortalidad prematura es debida al cáncer de mama (3,30%) y a los accidentes de tráfico (2,56%).

Mortalidad en las áreas de salud

Al comparar la mortalidad general de las áreas de salud con el conjunto regional, observamos mayor mortalidad en el área de Cartagena y menor mortalidad en La Vega del Segura (mapa 1).

En el **área de salud de Murcia** se observa una menor mortalidad masculina por causas externas respecto

a la media regional, siendo explicado este hecho, en parte, por la menor mortalidad por accidentes de vehículo a motor que presentan los hombres de esta área en relación a los del resto de la región.

El exceso de mortalidad general que presenta el **área de Cartagena** es especialmente significativo en los hombres. Están aumentadas las defunciones por enfermedades del aparato genitourinario, endocrino-inmunitarias y accidentales. Por causas específicas destaca la sobremortalidad por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, cáncer de piel, insuficiencia renal y accidentes de vehículo a motor.

El **área de salud de Lorca** presenta menor mortalidad por enfermedades endocrino-inmunitarias en hombres. En las mujeres se observa una mortalidad aumentada para el cáncer de intestino grueso y, por el contrario, disminuida por EPOC y afines.

El **área del Noroeste** presenta menor mortalidad por enfermedades del aparato digestivo, más marcada en hombres - la cual se explica, en parte, por una menor mortalidad por cirrosis hepática – y por enfermedades del aparato genitourinario, especialmente en mujeres. También existen menos defunciones causadas por trastornos mentales, en hombres, y por enfermedades isquémicas del corazón, en mujeres. En el **área del Altiplano** existe mayor mortalidad por trastornos mentales (especialmente en hombres), las enfermedades del aparato respiratorio (destacando la sobremortalidad por EPOC y afines que presentan los hombres) y las enfermedades del sistema osteomuscular (en mujeres). También existe un exceso de muertes por tumores malignos de hígado. Por contra, existe una menor mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón, neumonía y cáncer broncopulmonar (en hombres, en este último caso).

En La **Vega del Segura - Comarca Oriental** existe un menor índice de mortalidad general y del sexo masculino, al igual que ocurrió el año anterior. La menor mortalidad por enfermedades del aparato cardiovascular, más significativa en hombres y concretamente por enfermedades isquémicas del corazón, explica una parte de esta diferencia.

José García Rodríguez

Servicio de Epidemiología
D.G. de Salud Pública
Consejería de Sanidad y Consumo

Suscripción: Envío gratuito, siempre que sea dirigido a cargo oficial. **Solicitudes:** Servicio de EPIDEMIOLOGÍA
Dirección General de Salud Pública, Consejería de Sanidad y Consumo
Ronda de Levante, 11. MURCIA 30008 (Correo electrónico: bolepi@car.m.es)