



## Vigilancia Epidemiológica del SIDA en la Región de Murcia.

Situación a 31 de diciembre de 2000.

### INTRODUCCIÓN

El número de casos acumulados de SIDA en el mundo notificados a la OMS desde el comienzo de la pandemia hasta finales del año 2000 asciende a 2.312.860, siendo su distribución por regiones la siguiente: *América*: 1.030.391 casos (44,6% del total), de los que el 71,2% corresponden a Estados Unidos; *África*: 876.009 casos (37,9%); *Europa*: 229.350 casos (9,9%), de los cuales el 24,6% corresponden a España; *Región del Sureste Asiático*: 140.246 (6,1%); *Región del Pacífico Occidental*: 28.872 casos (1,2%); y *Región del Mediterráneo Oriental*: 7.992 casos (0,3%) (1,2).

Los casos de SIDA notificados no incluyen casos de infección VIH que no han alcanzado el estadio de SIDA, presentando además ciertas limitaciones, como el hecho de provenir de sistemas de vigilancia de calidad variable. Así, globalmente se estima que sólo aproximadamente un 10 % de los casos de SIDA han sido notificados, variando esta proporción muy ampliamente – desde menos de un 10% en muchos de los países en vías de desarrollo más fuertemente afectados por la epidemia, hasta aproximadamente un 90% en algunos países con sistemas de información bien desarrollados. De esta forma, la inmensa mayoría de los casos de

SIDA notificados hasta la fecha provienen, o bien de países industrializados (969.420, un 42% del total), o bien del África Subsahariana (875.599, un 37,9% del total), reflejando, por una parte, el elevado nivel de exhaustividad en la notificación en los países industrializados, y, por otra, la elevada carga que supone la enfermedad en muchos países africanos. Desde finales de 1999 se han notificado 111.399 nuevos casos de SIDA, en todo el mundo, compensándose el descenso en los países industrializados con el aumento observado en los países en desarrollo, particularmente en el África Subsahariana.

En Europa, la incidencia de SIDA ha sido fuertemente modificada por los efectos de los tratamientos anti-retrovirales altamente activos (HAART), por lo que ha perdido fiabilidad como indicador de la transmisión pasada del VIH. La información proveniente de los nuevos diagnósticos de infección VIH aportan una imagen más actualizada de la situación de la infección y no está directamente influida por la HAART. Sin embargo, estos datos deben ser interpretados con cautela, ya que no representan la incidencia de la infección y los sistemas de información aún no están suficientemente desarrollados en los países más severamente afectados del oeste de Europa (3).


El patrón epidemiológico de la enfermedad es distinto en las tres áreas en que puede dividirse Europa (Este, Centro y Oeste). El **área occidental**, en la que se incluye España, aún contabiliza cerca del 90% de los nuevos casos de SIDA notificados en la Región Europea, con una incidencia global de 25 casos por millón en 1999, aproximadamente 8 veces mayor que el Centro y Este del continente. El descenso en la incidencia, que comenzó en 1996, continuó en 1999, aunque a un ritmo menor

(29% en 1997, 24% en 1998 y 13% en 1999). El descenso en la incidencia del SIDA ha sido observado en todos los grupos de transmisión; sin embargo, ha sido más acusado en hombres homo/bisexuales (25%) y en usuarios de drogas por vía parenteral (22%), que en personas infectadas por contacto heterosexual (9%), de forma que este último grupo ha incrementado su peso relativo en el porcentaje de nuevos casos de SIDA, pasando de representar un 18 % de los casos en 1995 a un 28 % en 1999. El descenso en la incidencia del SIDA ha sido observado en todos los países de Europa Occidental, salvo en Portugal, donde la epidemia comenzó más tardíamente. Portugal tiene actualmente las tasas más altas del continente (88 casos por millón en 1999), seguido de España (71 casos por millón). Las mujeres representan el 27% de todos los casos diagnosticados en adolescentes o adultos en esta región, habiendo sido infectadas el 54% por contacto heterosexual. En el **Este de Europa** el número de casos de VIH notificados se ha incrementado dramáticamente desde 1995, debido a epidemias de rápida propagación entre usuarios de droga por vía parenteral, las cuales comenzaron en Ucrania y han alcanzado ahora a otros países. El **centro de Europa** ha permanecido relativamente libre de la epidemia. En 1999 la incidencia global de SIDA se mantuvo baja (3 casos por millón de hab.). Los casos pediátricos representan el 28% de los casos de infección VIH notificados en el periodo 1997-99 en el centro de Europa.

### RESULTADOS Y COMENTARIOS

Los datos a nivel regional proceden del Registro Regional de casos de SIDA de esta Consejería, entre cuyas actividades se encuentran la revisión de los protocolos de caso

**Gráfica 1. Tasas de SIDA por millón de habitantes Región de Murcia y España. Periodo 1981-1999.**



Fuente: Registro de casos de SIDA. Situación a 31/12/00.

Los casos registrados hasta la fecha con diagnóstico en 2000 (44 en Región de Murcia y 1974 en España) no se incluyen en la gráfica por no ser aun compatibles al resto de la serie debido al retraso en las notificaciones. No consta el año de diagnóstico en 104 de los casos registrados en España.

notificados, su remisión al Registro Nacional, la actualización del estado vital de los casos registrados como vivos, el control de calidad y análisis de la información y la elaboración de informes de situación global que son remitidos periódicamente a las fuentes de información. La información a nivel estatal procede del Registro Nacional de casos de SIDA (4).

En todos los comentarios y gráficas, se especifica si la información corresponde al total de casos acumulados registrados desde el inicio de la epidemia hasta el 31 de diciembre de 2000 o a otro periodo de tiempo específico.

La definición de caso utilizada para la vigilancia epidemiológica del SIDA desde el 1 de enero de 1994 es la definición europea de caso de SIDA según revisión de 1993 (5).

### Situación global

Desde 1981 hasta el 31 de diciembre de 2000 se han registrado 59.466 casos de SIDA en España. En la Región de Murcia, los casos acumulados registrados son 1.041, de los cuales 540 (51,9%) constan como fallecidos. Según la información proporcionada por el Registro Nacional de SIDA, la incidencia anual en España presentó una tendencia creciente hasta 1994 y desde 1995 se observa una tendencia descendente, discreta en 1995 y 1996 y más acentuada en 1997 y 1998. Según estimaciones corregidas por retraso en la notificación, realizadas por el Registro Nacional de SIDA, en 1999 y


2000 la tendencia descendente, aun siendo importante, estaría suavizándose. Así durante el año 2000 se estima que se diagnosticaron en España 2.511 casos nuevos de SIDA, lo que supone una disminución del 13% respecto al año anterior. Globalmente, el número de casos ha descendido un 64% en los últimos 5 años, debido al conjunto de avances de la lucha contra el SIDA, tanto en prevención como en asistencia sanitaria, pero fundamentalmente este descenso es atribuible a los nuevos tratamientos antiretrovirales.

La vía de transmisión más frecuente en los casos diagnosticados en el año 2000 ha sido el compartir material de inyección para la administración parenteral de drogas (56%), tanto en hombres (59%),

como en mujeres (48%). La transmisión por relaciones heterosexuales no protegidas asciende al 22%, pero adquiere especial relevancia en las mujeres, donde representa el 39% de los casos. Además, esta categoría es la única en la que en el año 2000 no ha descendido el número de casos respecto a 1999. La incidencia de casos de SIDA de transmisión madre-hijo también ha descendido en el año 2000 y contabiliza una caída global del 85% desde 1995. No obstante, en 2000 todavía se han detectado algunos casos de SIDA por transmisión madre-hijo, lo que resalta la necesidad de mantener las medidas específicas para prevenir este mecanismo de transmisión.


En todas las Comunidades Autónomas se han observado descensos importantes en el número de nuevos diagnósticos en los últimos años, aunque los descensos son más espectaculares en aquellas comunidades que partían de tasas más elevadas. En la Región de Murcia, la incidencia anual entre 1994-1996 no presentó este descenso, sino un ligero aumento, siendo a partir de 1997 cuando se inició la tendencia descendente. Además en nuestra comunidad se constata un descenso más lento en la incidencia de SIDA que el observado a nivel nacional. Así, si en 1989 la tasa nacional era de 8 casos por 100.000 habitantes y la regional de 3,4 casos por 100.000 hab., diez años después (en 1999), la incidencia nacional y la regional han pasado a ser muy similares (6,6 en Murcia y 6,8 en España).

**Gráfica 2. SIDA. Distribución por Áreas de Salud. N.º de casos acumulados e incidencia acumulada por 100.000 hab. Periodo 1984-2000.**



Fuente: Registro de casos de SIDA. Dirección General de Salud Pública. Murcia. Nota: Situación a 31/12/00.

**Gráfica 3. SIDA. Distribución porcentual de casos según edad a la fecha de diagnóstico. Región de Murcia y España. Periodo 1981-31/12/00.**




Fuente: Registro de casos de SIDA.

En la gráfica 1 se presenta la evolución de las tasas anuales de incidencia de nuevos casos de SIDA, según año de diagnóstico de la primera enfermedad indicativa de

España y 44 en Murcia.  
**Áreas de Salud**

La distribución por Áreas de Salud de los casos acumulados de SIDA

**Gráfica 4. Incidencia acumulada por 100.000 hab. según edad a la fecha de diagnóstico. Región de Murcia y España. Periodo 1994-2000.**




Fuente: Registro de casos de SIDA.

SIDA, desde 1981 a 1999. Los datos de 2000 no son comparables al resto de la serie, debido al retraso en la notificación. Los casos diagnosticados en 2000 registrados hasta el 31 de diciembre de 2000 son 1.744 en

registrados en la Región, según residencia habitual al inicio de la enfermedad se muestra en la gráfica 2. El 85,9% de los casos con área de residencia conocida corresponden a residentes en las Áreas de Salud 1

**Gráfica 5. SIDA. Distribución porcentual de casos según sexo.**



(Murcia) y 2 (Cartagena). Aunque el área de Murcia presenta el mayor número de casos acumulados, se observa que la incidencia acumulada (casos acumulados/habitantes) es superior en el área de Cartagena.

**Edad y sexo**

La edad que se considera es la que tenía el caso a la fecha del diagnóstico de la primera enfermedad indicativa de SIDA. El mayor porcentaje de los casos acumulados desde 1981 se encuentra entre los 25 y 39 años, observándose una distribución de casos por edad muy similar en la Región de Murcia y en España. (Gráfica 3).

Al comparar los casos diagnosticados a partir de 1994 con el conjunto de datos acumulados (gráfica 3) se mantiene la tendencia observada en años anteriores hacia un ligero desplazamiento de los casos más recientes a edades superiores, aumentando el porcentaje relativo de casos diagnosticados entre 30 y 54 años de edad. La media de edad de los casos diagnosticados en el año 2000 es similar en España (37,4) y en la Región de Murcia (37,2).

En la gráfica 4 se presenta la incidencia acumulada por grupo de edad en el periodo 1994 a 2000. Se observa que la incidencia por cada 100.000 habitantes en la Región de Murcia es inferior a la incidencia media en España en todos los grupos de edad, excepto en los menores de 15 años y en los mayores de 45 años, grupos de población en los que la incidencia en la Región es similar a la incidencia media en España.

Según las notificaciones realizadas al Registro de SIDA, desde el 1 de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 2000, se han diagnosticado 11 casos de SIDA en menores de 15 años en la Región: 8 casos en 1994, 2 en 1995 y 1 en 1999. De estos 11 casos, 10 corresponden a hijos de madre de riesgo.

En la distribución por sexo de los casos acumulados de SIDA, la razón hombre/mujer es de 5,3 hombres por mujer en la Región, siendo esta razón de 4,2 a nivel estatal. En el análisis de la distribución por sexo de los casos diagnosticados a partir de enero de 1994, se observa que la razón hombre/mujer es de 4,4 en la Región de Murcia y 3,9 en España. (Gráfica 5).

*Situación regional de las Enfermedades de Declaración Obligatoria.  
Semanas 1 a 4 (del 31 de diciembre al 27 de enero de 2001). Distribución semanal*

Enfermedades	Casos notificados												Casos acumulados			
	Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4			Semanas 1 a 4			
	2001	2000	Mediana	2001	2000	Mediana	2001	2000	Mediana	2001	2000	Mediana	2001	2000	Mediana	
Gripe	1980	1789	7.569	7.204	1.755	14.226	8.345	1.834	16.827	10.899	1.727	15.985	13.783	7.105	54.607	37.219
Tuberculosis respiratoria	1980	4	3	2	7	3	3	4	2	3	3	3	3	18	11	12
Otras tuberculosis	1986	3	0	0	1	0	0	2	2	1	0	0	0	6	2	2
Legionelosis	1997	2	1	1	1	1	0	0	4	1	1	0	1	4	6	3
Hepatitis A	1997	0	0	1	4	1	1	0	0	1	0	0	1	4	1	2
Otras hepatitis víricas	1997	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	2
Toxiinfecciones-Alimen	1983	14	7	1	4	0	4	0	0	0	0	10	5	18	17	11
Varicela	1980	104	67	78	104	61	106	123	74	112	193	111	123	524	313	446
Parotiditis	1980	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	2	3	3
Tosferina	1980	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	2	0	1	4	0
Enfermedad meningoc	1980	0	2	2	1	2	2	2	2	2	2	3	1	5	9	6
Otras meningitis	1986	1	1	1	0	1	1	1	2	2	2	1	1	4	5	5
Sífilis	1982	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	1	1
Brucelosis	1980	1	0	0	1	0	0	2	0	1	0	0	0	4	0	2
Paludismo	1980	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0

*La mediana se calcula sobre el último quinquenio. No se incluyen las enfermedades sin casos notificados en año actual.*

*Porcentaje de declaración (\*)  
Semanas 1 a 4 (del 31 de diciembre al 27 de enero de 2001).*

Municipios	Población (Proyec. 2001)	% de declaración	Municipios	Población (Proyec. 2001)	% de declaración
Abanilla	6.153	95,8	Calasparra	8.934	83,3
Abarán	12.177	100,0	Campos del Río	2.005	100,0
Águilas	26.773	100,0	Caravaca de la Cruz	22.269	100,0
Albudeite	1.376	100,0	Cartagena	177.709	100,0
Alcantarilla	32.982	100,0	Cehegín	14.077	100,0
Aledo	1.005	75,0	Ceutí	7.153	100,0
Alguazas	7.021	100,0	Cieza	31.725	100,0
Alhama de Murcia	15.640	66,7	Fortuna	6.652	100,0
Archena	14.398	80,0	Fuente Álamo de Murcia	9.606	100,0
Beniel	7.974	100,0	Jumilla	20.573	50,0
Blanca	5.706	100,0	Librilla	3.873	100,0
Bullas	10.677	100,0	Lorca	70.689	93,6

*(\*) [Núm. partes de declaración numérica recibidos / (Núm. de médicos de atención primaria en las cuatro semanas) x 100.*

*Distribución por áreas de salud de las Enfermedades de Declaración Obligatoria.  
Semanas 1 a 4 (del 31 de diciembre al 27 de enero de 2001). Distribución semanal*


Población	Áreas de Salud												REGIÓN	
	Murcia		Cartagena		Lorca		Noroeste		Altiplano		Oriental		TOTAL	
	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.	Casos	Acumul.
<b>Enfermedades</b>														
Gripe	2.630	2.630	971	971	1.603	1.603	139	139	103	103	1.659	1.659	7.105	7.105
Tuberculosis respiratoria	6	6	5	5	1	1	1	1	0	0	5	5	18	18
Otras tuberculosis	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	6	6
Legionelosis	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4
Hepatitis A	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Otras hepatitis víricas	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Toxiinfecciones-Alimen	3	3	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
Varicela	73	73	269	269	63	63	75	75	12	12	32	32	524	524
Parotiditis	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Tosferina	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Enfermedad meningoc	2	2	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	5	5
Otras meningitis	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Sífilis	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
Brucelosis	0	0	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4
Paludismo	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

*No se incluyen las enfermedades sin casos notificados en año actual.*

*Porcentaje de declaración (\*)  
Semanas 1 a 4 (del 31 de diciembre al 27 de enero de 2001).*

Municipios	Población (Proyec. 2000)	% de declaración	Municipios	Población (Proyec. 1999)	% de declaración
Lorquí	5.527	100,0	Torre Pacheco	21.937	63,5
Mazarrón	17.478	100,0	Torres de Cotillas, Las	15.617	97,2
Molina de Segura	43.097	57,0	Totana	21.973	100,0
Moratalla	8.574	68,8	Ulea	956	62,5
Mula	13.632	100,0	Unión, La	14.386	100,0
Murcia	353.504	83,5	Villanueva del Río Segura	1.555	62,5
Ojós	589	62,5	Yecla	28.772	57,8
Pliego	3.401	100,0	Santomera	10.594	100,0
Puerto Lumbreras	10.658	100,0	Alcázares, Los	6.877	100,0
Ricote	1.579	50,0			
San Javier	18.267	100,0	Total Región	1.131.128	89,3
San Pedro del Pinatar	15.008	100,0			

**Gráfica 6. SIDA. Distribución porcentual de casos según categoría de transmisión. Región de Murcia y España. Periodo 1981-2000**




### Categoría de transmisión

Según categoría de transmisión, el mayor porcentaje de casos acumulados en la Región corresponde a usuarios de drogas por vía parenteral-UDVP (57,3%) y en segundo lugar


aparecen los casos en varones atribuidos a transmisión homo/bisexual (17,1%) y los casos atribuidos a transmisión heterosexual (17%). En España se observa una distribución parecida, pero con mayor peso relativo de los casos en UDVP (65,2%)

**Gráfica 7. SIDA. Distribución porcentual de casos según categoría de transmisión. Región de Murcia y España. Periodo 1994-2000**



Fuente: Registro de casos de SIDA. Dirección General de Salud Pública. Murcia.  
Nota: Situación a 31/12/00

**Gráfica 8. SIDA. Distribución porcentual de casos por sexo según categoría de transmisión. Región de Murcia. Periodo 1994-2000.**



Fuente: Registro de casos de SIDA. Dirección General de Salud Pública. Murcia.  
Nota: Situación a 31/12/00

y menor peso relativo de los casos por transmisión sexual. (Gráfica 6). En el análisis de la distribución anual según categoría de transmisión, en España la transmisión heterosexual pasa a ser la segunda categoría en importancia desde 1994 y en la Región de Murcia desde 1995. En la gráfica 7 se muestra la distribución porcentual según categoría de transmisión para los casos diagnosticados a partir de 1994. La transmisión heterosexual se registra en segundo lugar en frecuencia, tanto en la Región de Murcia (20,7% de los casos) como en España (16,5%).

En la gráfica 8 se presenta la distribución porcentual según categoría de transmisión, por sexo, para los casos nuevos diagnosticados a partir de 1994.

En la tabla 1 se presentan los casos acumulados en la Región de Murcia por edad de diagnóstico, según categoría de transmisión.

En la tabla 2 se muestra el número de casos de SIDA según el año de diagnóstico y categoría de transmisión.

### Tipo de Diagnóstico

De las 28 enfermedades indicativas de SIDA que se consideran en la vigilancia de casos, las enfermedades presentes en el momento de la notificación en, al menos, un 10% de los casos diagnosticados en adultos y adolescentes entre 1994 y 2000 son por orden de frecuencia: candidiasis esofágica, neumonía por pneumocistis carinii, tuberculosis diseminada o extrapulmonar, tuberculosis pulmonar, síndrome caquético por VIH y toxoplasmosis cerebral. En España, la ordenación sería: neumonía por pneumocistis carinii, tuberculosis pulmonar, tuberculosis diseminada o extrapulmonar, candidiasis esofágica y síndrome caquético por VIH. Considerando la tuberculosis globalmente (tuberculosis pulmonar más tuberculosis diseminada o extrapulmonar), esta enfermedad es la enfermedad indicativa de SIDA más frecuente en el momento de la notificación tanto en los casos registrados en la Región como en España.

En la tabla 3 se presenta la distribución de los casos acumulados en la Región de Murcia, por centro notificador.

## Resumen año 2000

Hasta el 31 de diciembre de 2000 han sido notificados en la Región de Murcia 44 casos en los que la enfermedad indicativa de SIDA fue diagnosticada en el año 2000. Esta cifra es provisional debido al retraso existente en la notificación. Las características fundamentales de estos casos son las siguientes: 32 son hombres (72,7%) y 12 mujeres (27,3%), lo que supone una razón hombre/mujer de 2,7. La edad media al diagnóstico es de 37,2 años, siendo más jóvenes las mujeres en el momento del diagnóstico (32 años) que los hombres (39,1). El 95,4% de los casos diagnosticados en el año 2000 tienen su residencia en las áreas de salud 1 (25 casos) ó 2 (17 casos). En cuanto a la categoría de transmisión a la que pertenecen los casos, existen diferencias en cuanto al sexo, de forma que en los hombres las categorías más frecuentes son: usuarios de drogas por vía parenteral (43,7%) y varones homo/bisexuales (28,1%). En las mujeres los mayores porcentajes corresponden a las categorías de transmisión heterosexual (50%) y usuarios de drogas por vía parenteral (41,7%). En el año 2000 no se ha notificado ningún caso de transmisión madre-hijo en la Región.

## BIBLIOGRAFÍA

- 1.- Global AIDS surveillance Part I. Wkly Epidemiol Rec 2000; 75:379-83.
- 2.- Global AIDS surveillance Part II. Wkly Epidemiol Rec 2000; 75:386-92.
- 3.- European Centre for the Epidemiological Monitoring of AIDS: HIV/AIDS Surveillance in Europe, End-year report 1999, nº 62, June 2000.
- 4.- Registro Nacional de SIDA. Instituto de Salud Carlos III. Madrid. Vigilancia del SIDA en España. Situación a 31 de Diciembre de 2000. Informe 4/00.
- 5.- Centro Nacional de Epidemiología. Nueva definición de caso de SIDA para la Vigilancia Epidemiológica. Bol Epidemiol Microbiol 1993; 5: 81-82.
- 6.- Centro Nacional de Epidemiología. Vigilancia Epidemiológica del SIDA en España. Situación a 30 de junio de 2000. Bol Epidemiol Semanal 2000; 8:21-24.

Tabla 1. Número de casos acumulados de SIDA por edad a la fecha del diagnóstico, según categoría de transmisión y sexo, en la Región de Murcia. (Actualización a 31/12/00).

EDAD	CATEGORÍA DE TRANSMISIÓN Y SEXO																	
	HOMO		UDVP		HOMO + UDVP		R. HEMOD.		R. TRANS.		HMR		TRANS. HETER.		OTROS		DESCON	
	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M	V	M
0 - 4											9	6						
5 - 9							4				1							
10 - 14									1									
15 - 19			4				3						1					
20 - 24	1	45	15		3	4						3	5	1			1	1
25 - 29	18	139	34		6	1			1			13	11		1		3	2
30 - 34	34	177	30		7							32	19		1		6	
35 - 39	26	87	11		5	2						18	9				4	1
40 - 44	28	25	1		1	1						14	3		1		8	
45 - 49	26	1	1		1	1		1				16	3				2	
50 - 54	11	1			2							13	1	1			5	1
55 - 59	18											6					4	1
=>60	16				1	1		2				6	4				6	
No consta			1															1
<b>Total</b>	<b>178</b>	<b>480</b>	<b>92</b>		<b>25</b>	<b>17</b>		<b>4</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>121</b>	<b>56</b>	<b>2</b>	<b>3</b>		<b>40</b>	<b>6</b>

Fuente: Registro de casos de SIDA.

Tabla 2. Número de casos de SIDA por año de diagnóstico según categoría de transmisión en la Región de Murcia. (Actualización a 31/12/00).

A O de Dx	CATEGORÍA TRANSMISIÓN										TOTAL
	HOMO	UDVP	HOMO+ UDVP	R HEMOD	R TRANS	HMR	TRA HET	OTROS	DESCON		
1984				1							1
1985	1			1			1				3
1986	1			2							3
1987	4	8		3		1	1				17
1988	7	10	1	2			3				23
1989	7	16	2	2			5	2	1		35
1990	14	22	2			2	7		3		50
1991	13	36	5	2	2		6		1		65
1992	21	55	3		1	2	6		8		96
1993	14	54	3	1	1	1	14	1	3		92
1994	19	75			1	7	15	2	2		121
1995	14	78	2			2	21		6		123
1996	20	77	2				31		3		133
1997	10	46	1				24		8		89
1998	10	41	2	1			16		3		73
1999	14	35		1		1	16		6		73
2000*	9	19	2	1			11		2		44
<b>Total</b>	<b>178</b>	<b>572</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>177</b>	<b>5</b>	<b>46</b>		<b>1041</b>

Fuente: Registro de casos de SIDA. (\*) Los datos de 2000 no son comparables al resto de la serie debido al retraso de las notificaciones.

Tabla 3. Número de casos acumulados de SIDA en la Región de Murcia por Centro Notificador. (Actualización a 31/12/00).

CENTRO NOTIFICADOR	Nº Casos	%
Hospital Virgen de la Arrixaca	309	29,7
Hospital Sta. M <sup>a</sup> del Rosell	307	29,5
Hospital General Universitario	246	23,6
Hospital Morales Meseguer	76	7,3
Hospital Rafael Méndez	18	1,7
Hospital Virgen del Castillo	12	1,2
Hospital Comarcal Caravaca	5	0,5
Hospital Los Arcos	3	0,3
Hospital Naval	2	0,2
Clínica Virgen de la Vega	2	0,2
Sanatorio San Carlos	1	0,1
Consejería Sanidad y Consumo	1	0,1
Hospital de la Cruz Roja	1	0,1
Centros de salud	2	0,2
Hospitales de otras Comunidades Autónomas	30	2,9
Instituciones Penitenciarias	26	2,5
<b>Total</b>	<b>1041</b>	<b>100,0</b>

Fuente: Registro de casos de SIDA.

**XIX** *Murcia*  
del 17 al 19 de octubre de 2001  
**Reunión Científica de la  
Sociedad Española de  
Epidemiología**

**Ética, medio ambiente  
y comunicación:  
punto de encuentro  
de la epidemiología  
en el siglo XXI**



**Región de Murcia**  
Consejería de Sanidad y Consumo



**SOCIEDAD  
ESPAÑOLA DE  
EPIDEMIOLOGÍA**

**Sede**

**Auditorio y Centro de Congresos**

**Secretaría Técnica**

**Alquibla Congresos**

Tel 968 22 50 20 Fax 968 22 51 54  
info@alquibla.com

[www.um.es/siu/congre/see-murcia2001/](http://www.um.es/siu/congre/see-murcia2001/)

**Suscripción: Envío gratuito. Solicitudes: Servicio de EPIDEMIOLOGÍA  
Dirección General de Salud Pública, Consejería de Sanidad y Consumo  
Ronda de Levante, 11. MURCIA 30008 (Correo electrónico: bolepi@carm.es)**