

1. **¿Cuáles son los tres parámetros que mide la escala de Glasgow para el coma?:**
- A) Respuesta sensitiva, Respuesta motora, Respuesta cognitiva.
 - B) Respuesta cognitiva, Respuesta neurológica, Respuesta metabólica.
 - C) Apertura ocular, Respuesta verbal, Respuesta motora.
 - D) Expresión verbal, Coordinación motriz, Respuesta neurológica.
2. **¿En qué tipo de estudio epidemiológico se incluyen los estudios de Cohortes?:**
- A) Estudios descriptivos.
 - B) Estudios observacionales.
 - C) Estudios experimentales.
 - D) Estudios ecológicos.
3. **La dieta pobre en oxalatos está indicada en:**
- A) Pacientes que presentan diverticulosis.
 - B) Pacientes que padezcan gota.
 - C) Pacientes que padezcan cálculos.
 - D) Pacientes con esteatorrea.
4. **¿Cuánto debe durar un procedimiento como máximo, para ser susceptible de realizarse cirugía mayor ambulatoria?:**
- A) Una hora.
 - B) Dos horas.
 - C) Tres horas.
 - D) Cuatro horas.
5. **Una intervención de cuidados esencial en un paciente con estatus epiléptico es:**
- A) Proteger la vía aérea.
 - B) Acolchar las barandillas de la cama.
 - C) Sujetar al paciente.
 - D) Proporcionar intimidad.
6. **En un niño con galactosemia en el screening neonatal, hemos de eliminar de la dieta:**
- A) Lactosa.
 - B) Fructosa.
 - C) Gliadina.
 - D) Glucosa.
7. **Dentro de los alimentos cariogénicos no encontramos:**
- A) Dulces.
 - B) Miel.
 - C) Uvas.
 - D) Leche.
8. **Entre las maniobras que se efectúan a todos los bebés después del nacimiento y que permiten diagnosticar una displasia de cadera, encontramos:**
- A) Maniobra de Barlow.
 - B) Maniobra de Addson.
 - C) Maniobra de Ortelani.
 - D) Las respuestas A y C son correctas.

9. **¿Qué tipo de aprendizaje instrumental se aplica cuando un niño limpia su habitación y su madre le deja saltarse las verduras de la cena?:**
- A) Reforzador positivo.
 - B) Castigo positivo.
 - C) Reforzador negativo.
 - D) Castigo negativo.
10. **De los siguientes ritmos cardíacos, ¿en cuál no es útil la desfibrilación?:**
- A) Taquicardia Ventricular sin pulso.
 - B) Fibrilación Ventricular.
 - C) Asistolia.
 - D) En ninguna de las anteriores respuestas.
11. **En la fase preoperatoria del proceso quirúrgico, ¿cuál es el primer paso para elaborar un correcto plan de cuidados?:**
- A) Efectuar explicaciones al enfermo sobre las prestaciones del hospital.
 - B) Generarle el máximo sosiego para evitar el estado de ansiedad e incertidumbre a su ingreso.
 - C) Informar al paciente sobre horarios del día de su atención.
 - D) Realizar una valoración integral.
12. **El bebé está predispuesto a la obstrucción de las vías respiratorias superiores debido a:**
- A) Presentan una disminución del número de alveolos.
 - B) Presentan un control termostático inmaduro.
 - C) Presentan un aumento del índice metabólico.
 - D) Tienen un diámetro muy pequeño en la vía aérea.
13. **Dentro de los diferentes niveles de desinfección que se pueden llevar a cabo en un hospital, aquel que destruye bacilos de Koch y esporas se denomina:**
- A) De nivel intermedio.
 - B) De alto nivel.
 - C) De bajo nivel.
 - D) De nivel final.
14. **¿Qué autora señala tres niveles de actuación en la relación enfermera-paciente?:**
- A) Virginia Henderson.
 - B) Hildegarde Peplau.
 - C) Sor Callista Roy.
 - D) Martha Rogers.
15. **Dentro de los signos de embarazo que aparecen en el cuello uterino no encontraremos:**
- A) Signo de Chadwick.
 - B) Signo de Oslander.
 - C) Signo de Battle.
 - D) Signo de Goodell.
16. **¿Cuál de las siguientes, forma parte del proceso administrativo de la gestión?:**
- A) Planificación.
 - B) Ejecución.
 - C) Control.
 - D) Todas son ciertas.

E128

E178

E180

E105

E058

E038

E072

E047

- 17. Según la Dra Kubler-Ross las fases del duelo son:**
- A) Cólera, negación, negociación, depresión y aceptación.
 - B) Depresión, negación, aislamiento, cólera, negociación y aceptación.
 - C) Aislamiento, negociación, cólera, depresión y aceptación.
 - D) Negación, cólera, negociación, depresión y aceptación.
- 18. ¿Cómo se denominan los índices estadísticos que definen a las poblaciones?:**
- A) Parámetros.
 - B) Muestras.
 - C) Estadísticas.
 - D) Datos.
- 19. Al fenómeno de masas limitado en el tiempo e ilimitado en el espacio, se le denomina:**
- A) Endemia.
 - B) Pandemia.
 - C) Epidemia.
 - D) Enzootia.
- 20. ¿Cómo se denomina el tipo de fractura que se produce en niños, en la que un lado del hueso se rompe y el otro se dobla?:**
- A) Oblicua.
 - B) Epifisaria.
 - C) En tallo verde.
 - D) Segmentaria.
- 21. En Atención Primaria, en el modelo de organización, cada enfermera se ocupa de un programa específico. Se le denomina:**
- A) Unidad básica asistencia (UBA).
 - B) Por actividades o programas.
 - C) Por sectores de población.
 - D) Libre elección enfermera.
- 22. ¿Cuál es el Real Decreto que regula la receta médica y las órdenes de dispensación?:**
- A) Real Decreto 42/2010, de 9 de septiembre.
 - B) Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre.
 - C) Real Decreto 19/2006, de 26 de julio.
 - D) Real Decreto 24/2008, de 21 de noviembre.
- 23. Señale la falsa:**
- A) En el lóbulo occipital del cerebro se encuentra la capacidad de comprensión de la escritura.
 - B) En el lóbulo parietal se encuentra el centro propioceptivo.
 - C) En el lóbulo temporal se encuentra la comprensión del lenguaje, área de Broca.
 - D) En el lóbulo frontal se encuentra la capacidad de la escritura.
- 24. En un audiograma en el que las dos curvas están por debajo de la normalidad, con un gap que desaparece en las frecuencias agudas, cuya pérdida es mayor de 60dB, se corresponde con:**
- A) Hipoacusia de percepción.
 - B) Hipoacusia de transmisión.
 - C) Hipoacusia mixta.
 - D) Audición normal.

- 25. La necrosis tubular aguda es causada principalmente por dos de los siguientes factores:**
- A) Mioglobina y medicamentos nefrotóxicos.
 - B) Hipoperfusión y mioglobina.
 - C) Mioglobina y hemoglobina.
 - D) Medicamentos nefrotóxicos e hipoperfusión.
- 26. Señala uno de los principios en los que se inspira la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia:**
- A) La atención a las personas en situación de dependencia de forma integral e integrada.
 - B) La valoración de las necesidades de las personas, atendiendo a criterios de equidad para garantizar la igualdad real.
 - C) El carácter público de las prestaciones del sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
 - D) Todas son correctas.
- 27. A nivel de evidencia obtenido por opiniones de autoridades respetadas, basadas en la experiencia clínica no cuantificada, o en informes de comités de expertos, se le clasifica según SIGN como:**
- A) Nivel de evidencia I.
 - B) Nivel de evidencia II.
 - C) Nivel de evidencia III.
 - D) Nivel de evidencia IV.
- 28. Dentro de las fases de la lactancia materna, la que se encarga de la iniciación de la secreción láctea se denomina:**
- A) Eyección láctea.
 - B) Lactogénesis.
 - C) Mamogénesis.
 - D) Galactopoyesis.
- 29. La calidad en el Sistema Sanitario debe responder a tres factores optimizados:**
- A) Eficacia.
 - B) Efectividad.
 - C) Eficiencia.
 - D) Todas son ciertas.
- 30. ¿Cuál es el marco territorial de la Atención Primaria de la Salud (APS)?:**
- A) La zona de la salud.
 - B) El equipo de atención primaria.
 - C) E área de salud.
 - D) El centro de salud.
- 31. Aquella situación en la que los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes, durante un periodo de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y para la comunidad, se define como:**
- A) Guía de la buena prescripción.
 - B) Proceso de prescripción razonada.
 - C) Uso racional de medicamentos.
 - D) Proceso del buen uso de medicamentos.

E156

E191

E051

E087

E034

E020

E103

32. ¿Qué no se valora en la Escala Norton?:

- A) Exposición a la humedad.
- B) Movilidad.
- C) Sensibilidad.
- D) Estado mental.

E189

33. En la clínica del edema agudo de pulmón encontramos:

- A) El paciente presenta polaquiuria y taquicardia.
- B) El paciente tendrá hipotensión y bradipnea.
- C) El paciente presenta disnea, taquipnea y pulso filiforme.
- D) El paciente presenta caída baja saturación de oxígeno y hematuria.

E136

34. El tercer eje de la taxonomía NANDA es:

- A) Localización.
- B) Sujeto.
- C) Descriptor.
- D) Unidad de cuidado.

E040

35. Entre los consejos que recomendaríamos para la lactancia materna, no se encuentra:

- A) Contacto piel con piel.
- B) La lactancia debe ser a demanda.
- C) Establecer horarios fijos para la alimentación al pecho.
- D) Alternar el pecho en cada toma.

E086

36. Según la Asociación Española de Pediatría, el tratamiento farmacológico de elección ante una convulsión febril en la infancia es:

- A) Clonazepan.
- B) Gabapentina.
- C) Midazolán.
- D) Diazepan rectal.

E111

37. Según el actual calendario de vacunación infantil de la Región de Murcia, a un niño de 12 meses le vacunamos de:

- A) Triple vírica y varicela.
- B) Meningococo y triple vírica.
- C) Triple vírica y polio inyectable.
- D) Ninguna.

E003

38. La carencia de fibra dietética en la alimentación se relaciona como factor de riesgo para el desarrollo de las siguientes patologías, excepto:

- A) Cáncer de colon.
- B) Obesidad.
- C) Enfermedad diverticular de colon.
- D) Litiasis renal.

E076

39. La valoración de Enfermería que se realiza habitualmente al paciente se organiza según:

- A) Los "patrones funcionales de Salud" (Mayory Gordon).
- B) El "Modelo de las Necesidades básicas" (Virginia Henderson).
- C) La Escuela de la Gestalt.
- D) Las respuestas A y B son correctas.

E181

40. Según el modelo de Prochaska y Diclemente, para determinar el grado de motivación en el que se encuentra una persona para cambiar sus hábitos de vida, ¿qué intervención profesional sería la correcta en la fase pre-contemplativa?:
- A) Trabajar balances beneficios/costos.
 - B) Identificar los aspectos positivos, lo que el paciente considera logros en su situación.
 - C) No aconsejar aún medidas de acción a tomar.
 - D) Prevenir la recaída y considerarla como parte del proceso de recuperación.
41. La nutrición parenteral consiste en:
- A) Introducir complejos dietéticos directamente en el estómago.
 - B) Administrar los nutrientes que el paciente necesite.
 - C) Administrar fórmulas dietéticas por vía intravenosa con el fin de mantener la síntesis de proteínas.
 - D) Todas las anteriores son correctas.
42. ¿Cuál de las siguientes autoras considera la enfermería como un proceso interpersonal y terapéutico?:
- A) Dorothea Orem.
 - B) Sor Callista Roy.
 - C) Hildegarde Peplau.
 - D) Betty Newman.
43. Actualmente, la cuarentena sólo se aplica en el caso de:
- A) Fiebre tifoidea (durante 5 días).
 - B) Sepsis Meningocócica (durante 3 días).
 - C) Fiebre amarilla, (durante 6 días).
 - D) Rabia (durante 6 días).
44. En la educación grupal, los grupos de discusión son considerados una técnica de:
- A) Análisis.
 - B) Investigación en el aula.
 - C) Desarrollo de habilidades.
 - D) Expositiva.
45. Según el PANA (Programa de Atención al Niño y al Adolescente) sobre el consumo de alcohol en la adolescencia, es falso que:
- A) En la sociedad española existe una gran permisividad social en el consumo de alcohol.
 - B) La edad de inicio se sitúa, en la actualidad, en los 16 años.
 - C) Se tiende a identificar divertirse con beber.
 - D) El consumo de alcohol predispone a consumir otras sustancias tóxicas.
46. Cuando valoramos la presencia de una úlcera y el paciente nos refiere que presenta prurito en la extremidad afectada, es más probable que se trate de una:
- A) Úlcera por presión.
 - B) Úlcera arterial.
 - C) Úlcera venosa.
 - D) Úlcera neuropática.

E101

E082

E037

E016

E012

E112

E006

47. Según la OMS, al conjunto de influencias externas, físicas, químicas, biológicas y sociales que ejercen un efecto significativo y perceptivo sobre la salud y el bienestar del individuo en la comunidad se define como:
- A) Concepto de medio ambiente.
 - B) Concepto de ecología.
 - C) Concepto de demoecología.
 - D) Ninguna es correcta.
48. De las siguientes, excepto una, son reacciones clásicas del paciente ante una enfermedad crónica grave:
- A) De huida o negación.
 - B) De agresión o rechazo activo.
 - C) De sumisión.
 - D) De racionalización.
49. El acto médico que consiste en administrar en una situación terminal un tratamiento para aliviar un síntoma aun a costa de adelantar la muerte se conoce como:
- A) Eutanasia activa directa.
 - B) Eutanasia pasiva.
 - C) Principio del doble efecto.
 - D) A y C son correctas.
50. Con respecto a los cuidados de enfermería al recién nacido en la sala de partos, realizamos:
- A) Limpieza de secreciones de boca y nariz.
 - B) Mantener al recién nacido seco y caliente.
 - C) Profilaxis de Credé.
 - D) Todas son correctas.
51. Si hay una pérdida de acomodación de la visión en el enfoque a distancia corta, se trata de:
- A) Anisometropía.
 - B) Hipermetropía.
 - C) Astigmatismo.
 - D) Presbicia.
52. ¿Cuál de los siguientes síntomas no corresponde con los propios del hipertiroidismo?:
- A) Piel caliente.
 - B) Hiperglucemia.
 - C) Aumento de peso.
 - D) Aumento de la sudoración.
53. La Inmunoglobulina más abundante es:
- A) IgG.
 - B) IgM.
 - C) IgE.
 - D) IgA.
54. Al elegir un punto de inserción de un catéter a un lactante de tres meses, ¿cuál sería el primer lugar de elección?:
- A) Cuello.
 - B) Cráneo.
 - C) Dorso de la mano.
 - D) Dorso del pie.

E071

E002

E123

E093

E167

E171

E004

E066

- 55. Según la Ley Orgánica 11/2015 de 21 de septiembre, ¿cuál de los siguientes supuestos es falso?:**
- A) Todas las mujeres mayores de 18 años pueden elegir abortar libremente, siempre que sea una causa justificada, dentro de las 12 semanas.
 - B) En circunstancias excepcionales el embarazo puede interrumpirse hasta la semana 22.
 - C) Los profesionales sanitarios directamente implicados en el proceso tienen derecho a la objeción de conciencia.
 - D) Las extranjeras en situación irregular, que deseen abortar por propia voluntad, solo podrán acceder al aborto a través de un centro privado autorizado.
- 56. El trabajo de fin de Grado orientado a la evaluación de las competencias asociadas al título:**
- A) Deberá realizarse en la primera mitad del plan de estudios.
 - B) Podrá homologarse por prácticas externas.
 - C) Tendrá entre 6 y 30 créditos.
 - D) Constará de entre 3 y 30 créditos.
- 57. De las siguientes afirmaciones, señale la incorrecta:**
- A) El suicidio es excepcional en menores de 14 años.
 - B) El número de intentos de suicidio es mayor en las mujeres.
 - C) El número de suicidios consumados es mayor en hombres.
 - D) El número de suicidios disminuye con la edad.
- 58. El tejido fibroso excesivo benigno con cicatriz que excede de los límites de la herida, se denomina:**
- A) Cicatriz dehiscente.
 - B) Cicatriz hipertrófica.
 - C) Queloides.
 - D) Ninguna de las opciones anteriores es correcta.
- 59. ¿Cuál de los siguientes pacientes se beneficiará más de la terapia antitrombótica?:**
- A) Paciente de 45 años con dolor torácico que cede con 3 comprimidos de nitroglicerina.
 - B) Paciente de 50 años con elevación del ST en dos derivaciones contiguas.
 - C) Paciente de 80 años con dolor torácico de 15 minutos de duración.
 - D) Paciente de 60 años con depresión del ST en la derivación II.
- 60. Las enfermedades pulmonares obstructivas están asociadas a:**
- A) Disminución de la expansión pulmonar.
 - B) Disminución de la elasticidad pulmonar.
 - C) Disminución del flujo de aire inspirado.
 - D) Disminución del flujo de aire espirado.
- 61. ¿Cuál es el nombre del tipo de vendaje que se utiliza para vendar miembros y en el que cada vuelta se superpone parcialmente a la anterior?:**
- A) Vendaje en espiral.
 - B) Vendaje en vuelta circular.
 - C) Vendaje en ocho.
 - D) Venda en espiral invertida.
- 62. Indica una de las conductas que provocan un daño especial en la salud física de los mayores:**
- A) La adicción al tabaco.
 - B) El uso de múltiples medicamentos.
 - C) Las respuestas A y B son correctas.
 - D) El ejercicio físico.

E117

E195

E131

E185

E139

E140

E159

E193

- 63. En el estudio de la transmisión e infección del VHC, señale cuál es la falsa:**
- A) La prevalencia de transmisión en los trabajadores sanitarios es similar a la población normal.
 - B) La transmisión vertical es del 28%.
 - C) La coinfección con VIH y VHB favorece la evolución a cirrosis.
 - D) El VHC ARN se ha detectado en la saliva, orina, semen y líquido ascítico.
- 64. La principal vía, (no fuente), de transmisión de la infección por Legionella es:**
- A) Las torres de refrigeración.
 - B) La manipulación inadecuada de cabezales de ducha.
 - C) El contagio por portadores inaparentes.
 - D) La inhalación de aerosoles líquidos que contengan bacterias.
- 65. El principal indicador de deterioro neurológico es:**
- A) La alteración del nivel de la capacidad de respuesta.
 - B) La respuesta motora.
 - C) La respuesta pupilar.
 - D) Los signos vitales alterados.
- 66. En el modelo de Triage de Manchester en urgencias, ¿en cuántos estados se clasifica?:**
- A) 3.
 - B) 6.
 - C) 5.
 - D) 4.
- 67. Según la OMS, se considera prematuro:**
- A) Aquel que nace antes de las 39 semanas de gestación.
 - B) Aquel que nace antes de la 37 semana y pesa menos de 1500 grs.
 - C) Aquel que nace antes de las 37 semanas de gestación.
 - D) Aquel que nace entre la 38 y la 39 semana de gestación.
- 68. Un paciente que presenta unas heces de un color negro, de consistencia pegajosa y con mal olor, se denomina:**
- A) Melenas.
 - B) Sangre oculta en heces.
 - C) Vómitos.
 - D) Hematoquecia.
- 69. De las siguientes características, ¿cuál NO pertenece a la Bioética?:**
- A) Multidisciplinar.
 - B) Aconfesional.
 - C) Individualista.
 - D) Racional.
- 70. En la prevención de los trastornos de la ingesta en la adolescencia, señale la afirmación correcta con respecto a la bulimia:**
- A) Tiene un inicio más precoz que la anorexia.
 - B) La pérdida de peso que presentan suele ser muy llamativa.
 - C) Tienen las reglas regulares.
 - D) Ocasionalmente toman laxantes.

71. Dentro del Programa de Salud Bucodental Infantil (BUCOSAN), los niños entre 6 y 8 años se benefician de las siguientes prestaciones, excepto:
- A) Educación para la salud individual.
 - B) Aplicación tópica de flúor.
 - C) Tratamientos de ortodoncia.
 - D) Obturación de molares permanentes.
72. Según la FDA (Food Drug Administration), los fármacos se clasifican en cinco clases en función de sus efectos teratogénos. ¿A qué categoría pertenecen los fármacos que están siempre contraindicados en gestantes?:
- A) X.
 - B) C.
 - C) A.
 - D) B.
73. Entre los requisitos que han de reunir los enfermeros en el ámbito de los cuidados especializados para obtener la acreditación para la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios se incluye:
- A) Haber adquirido las competencias necesarias para indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.
 - B) Estar en posesión del título de graduado en enfermería o equivalente.
 - C) Estar en posesión del título de enfermero especialista.
 - D) Todas son correctas.
74. Interprete los resultados de la gasometría arterial siguiente: pH (7,38), PaCO₂ (38mmHg), HCO₃ (23 mEq/l), PaO₂ (90 mmHg):
- A) Acidosis respiratoria.
 - B) Alcalosis metabólica.
 - C) Acidosis metabólica.
 - D) Gasometría normal.
75. Según la OMS, es falso que:
- A) El preservativo masculino es el método anticonceptivo más usado y protege eficazmente contra las ETS.
 - B) Tras los métodos quirúrgicos, el método más eficaz para evitar un embarazo no deseado son los anticonceptivos orales.
 - C) La anticoncepción de emergencia no debe usarse como método anticonceptivo habitual.
 - D) El método anticonceptivo debe acomodarse a la individualidad de cada persona.
76. Etapa de la visita domiciliaria, ¿dónde se analiza la documentación previa disponible?:
- A) Planificación de la visita.
 - B) Desarrollo de la visita.
 - C) Registro de la visita.
 - D) Cierre de la visita.
77. El síntoma principal en la bronquitis crónica es:
- A) Tos.
 - B) Mínima producción de esputos.
 - C) Aspecto de malnutrición.
 - D) Respiración superficial.

E099

E069

E104

E141

E115

E019

E142

78. **¿Cuál de las siguientes reacciones adversas puede ser causada por la vacuna para el sarampión y la rubeola?:**
- A) Síndrome de Turner.
 - B) Síndrome de Edwards.
 - C) Adenopatías generalizadas.
 - D) Epilepsia.
79. **Los objetivos del Consejo Dietético Intensivo se clasifican en varios grupos. ¿Cuál es el fin de los objetivos generales?:**
- A) Objetivos de salud.
 - B) Objetivos educativos.
 - C) Objetivos conductuales.
 - D) Objetivos afectivos y psicomotores.
80. **Son funciones de las comisiones clínicas (último Real Decreto):**
- A) Establecer los indicadores, criterios y estándares.
 - B) Realizar la formación continuada del centro.
 - C) Acordar objetivos con los profesionales.
 - D) Todas son correctas.
81. **En la exploración de un niño, la mejor descripción del signo de Kerning positivo es:**
- A) Flexión involuntaria de las rodillas y las caderas con la flexión pasiva del cuello del niño.
 - B) Resistencia y quejas de dolor con la flexión pasiva de la pierna inferior mientras está en la posición supina con las piernas flexionadas.
 - C) Resistencia y quejas de dolor en la espalda con la extensión pasiva de la pierna en la rodilla mientras está en posición supina con las caderas flexionadas.
 - D) Aumento de la irritabilidad mientras se coge al niño.
82. **¿Qué intervención (NIC) debe efectuarse a nivel de Enfermería para el control del miedo o temor ante una intervención?:**
- A) Educación sanitaria.
 - B) Apoyo emocional.
 - C) Apoyo en toma de decisiones.
 - D) Conocimientos deficientes.
83. **El movimiento de flexión de caderas y rodillas al flexionar el cuello se denomina:**
- A) Kerning.
 - B) Babinski.
 - C) Brudzinski.
 - D) Kerninsky.
84. **En una conjuntivitis, ¿cuáles son los síntomas más habituales?:**
- A) Visión borrosa.
 - B) Picor.
 - C) Las respuestas A y B son correctas.
 - D) Sequedad ocular.
85. **De los siguientes elementos, señale cuál NO es una característica adecuada del entrevistador:**
- A) Empatía.
 - B) Complacencia.
 - C) Asertividad.
 - D) Respeto.

E055

E079

E045

E108

E182

E153

E164

E001

- 86. ¿Cuál de las siguientes actitudes indica escucha activa en la atención a un enfermo?:**
- A) Tomarle la tensión a la vez que escuchamos, tenemos poco tiempo.
 - B) Escuchar con los brazos cruzados.
 - C) Inclinars hacia adelante y mantener contacto visual.
 - D) Inclinar el cuerpo hacia atrás y colocarnos a un metro de la cama.
- 87. Al valorar una herida, ¿qué no se tendrá en cuenta?:**
- A) Aspecto.
 - B) Día de la semana que apareció.
 - C) Presencia de inflamación.
 - D) Dolor producido.
- 88. La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante:**
- A) El primer mes de vida.
 - B) 6 meses.
 - C) 9 meses.
 - D) 1 año.
- 89. En la Atención a víctimas de violencia de género podemos afirmar que:**
- A) La violencia psicológica no es tan grave como la física.
 - B) Las mujeres y los hombres maltratan por igual, según las estadísticas.
 - C) La violencia de género conlleva un abordaje multidisciplinar y no solo sanitario.
 - D) Los hombres que maltratan han sido víctimas de maltrato.
- 90. ¿Cuál de las siguientes patologías NO es una enfermedad de declaración obligatoria?:**
- A) Escarlatina.
 - B) Gripe.
 - C) Rubeola.
 - D) Tiña Capitis.
- 91. La Insuficiencia cardíaca congestiva, la hemorragia y el shock son ejemplos de posibles factores etiológicos de la insuficiencia renal:**
- A) Pre-renal.
 - B) Intra-renal.
 - C) Post-renal.
 - D) Pre-renal y post-renal.
- 92. Respecto a la selección del catéter periférico para la administración de la quimioterapia, debemos seleccionar:**
- A) El catéter más corto y calibre más pequeño.
 - B) El catéter más largo y calibre más pequeño.
 - C) El catéter más largo y calibre más grande.
 - D) El catéter más corto y calibre más grande.
- 93. La prioridad al seleccionar el lugar de acceso venoso para implantar una vía periférica en un paciente sería:**
- A) Porción inferior del antebrazo.
 - B) Región tenar de la mano.
 - C) En la fosa antecubital.
 - D) Porción inferior del brazo.

94. Entre las actividades del responsable en los puntos de vacunación, se encuentra la de comprobar diariamente que las temperaturas máxima y mínima que marca el termómetro y registra el termógrafo se encuentren entre:
- A) 10° y 12° C.
 - B) 3° y 10° C.
 - C) 2° y 8° C.
 - D) 12° y 14° C.
95. El shunt fisiológico normal varía entre:
- A) 0% y 5% del gasto cardíaco.
 - B) 5% y 20% del gasto cardíaco.
 - C) 10% y 30% del gasto cardíaco.
 - D) 20 % y 40% del gasto cardíaco.
96. Carmen es una niña de dos años hospitalizada a la que hay que cambiarle el catéter intravenoso. Al prepararla para el procedimiento, ¿qué técnica sería más útil?:
- A) Mostrar la inserción intravenosa en una muñeca.
 - B) Explicar el procedimiento en un grupo con otros niños.
 - C) Sedarla con diazepam.
 - D) Sujetarla.
97. Los cambios dermatológicos que se producen durante el embarazo, ¿con qué síntomas se manifiestan?:
- A) Cloasma o melasma.
 - B) Estrías.
 - C) Arañas vasculares.
 - D) Todas son correctas.
98. Al administrar un medicamento para evitar errores siempre tendremos en cuenta la regla de los cinco correctos. ¿Cuál de las siguientes opciones no se encuentra en esta regla?:
- A) Administrar el fármaco correcto.
 - B) Administrar la dosis correcta.
 - C) Administrar el fármaco en el espacio correcto.
 - D) Administrar el fármaco al paciente correcto.
99. Alfaro clasifica los tipos de diagnósticos enfermeros en:
- A) Real, de riesgo y posible.
 - B) Real, de riesgo, potencial y de síndrome.
 - C) Real, de riesgo, de promoción de la salud y de síndrome.
 - D) Real, de riesgo y de promoción.
100. La “razón de consulta” es el motivo que, según el paciente, justifica el contacto con el profesional y puede clasificarse utilizando:
- A) CIAP (Clasificación Internacional de Atención Primaria).
 - B) OMI-AP.
 - C) NANDA.
 - D) CIE-P.

E054

E143

E110

E084

E100

E041

E052

101. De las siguientes afirmaciones, señale la falsa:

- A) En la eutanasia pasiva el profesional deja seguir el proceso.
- B) La eutanasia activa directa equivale, legalmente, con el homicidio rogado.
- C) La distanasia conlleva actuaciones terapéuticas con la finalidad de mantener con vida al enfermo terminal.
- D) La distanasia se aplica siempre a petición familiar.

E125

102. El modelo de Orem, parte de una teoría general compuesta por tres teorías:

- A) Autocuidado, déficit de autocuidado y sistemas de enfermería.
- B) Autocuidado, agencia de autocuidado y sistemas de enfermería.
- C) Autocuidado, déficit de autocuidado y agencia de enfermería.
- D) Agencia de autocuidado, déficit de autocuidado y sistemas de enfermería.

E036

103. A tenor de la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, la capacidad de controlar, afrontar y tomar , por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria, define el concepto de:

- A) Emancipación.
- B) Independencia.
- C) Autonomía.
- D) Autogestión.

E192

104. Un paciente al que sometemos a una gastrectomía, presentará carencias vitamínicas por falta de:

- A) Vitamina B1.
- B) Vitamina C.
- C) Vitamina B12.
- D) Vitamina A.

E163

105. Según la NANDA, “la pérdida de orina inferior a 50 mililitros al aumentar la presión abdominal”, estaría incluida dentro del diagnóstico enfermero de:

- A) Incontinencia urinaria funcional.
- B) Incontinencia urinaria de esfuerzo.
- C) Incontinencia urinaria refleja.
- D) Incontinencia urinaria total.

E030

106. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es causa del aumento de la resistencia a los antibióticos?:

- A) El exceso en la prescripción de antibióticos.
- B) El uso de antibióticos en la cría de ganado y pescado para uso alimentario.
- C) Control inadecuado de las infecciones nosocomiales.
- D) Completar los tratamientos antibióticos.

E122

107. Respecto a la recogida de los residuos sanitarios se recomienda adoptar los siguientes criterios excepto uno, indique cuál:

- A) Deberá atender a los criterios de segregación, asepsia e inocuidad.
- B) Se debe de llevar a cabo lo antes posible.
- C) Se debe almacenar en envases de un solo uso.
- D) Se deben compactar hasta el momento de su eliminación.

E062

108. **¿Cuál de las siguientes NO es un elemento que interviene en el proceso de comunicación?:**
- A) Público.
 - B) Decodificación.
 - C) Receptor.
 - D) Canal.
109. **La menopausia significa la desaparición definitiva de la menstruación. Su definición es:**
- A) 12 meses consecutivos de amenorrea.
 - B) 10 meses consecutivos de amenorrea.
 - C) 12 meses alternativos de amenorrea.
 - D) 18 meses consecutivos de amenorrea.
110. **Si un paciente responde correctamente al estímulo diurético, aumentando con ello la producción urinaria, ¿qué tipo de seguimiento habría que anticipar?:**
- A) Necesita hemodiálisis.
 - B) Es candidato a diálisis peritoneal.
 - C) Se debe continuar con diuréticos a altas dosis.
 - D) Reposición de líquidos y continuar con diuréticos.
111. **En la sospecha al ingreso de una meningitis y/o sepsis meningocócica debe procederse a:**
- A) Aislamiento respiratorio en la sepsis y estricto en la meningitis.
 - B) Aislamiento respiratorio en la meningitis y estricto en la sepsis.
 - C) Aislamiento respiratorio en ambas circunstancias.
 - D) Aislamiento estricto en ambas circunstancias.
112. **¿Quién empleó por primera vez el término “diagnóstico de Enfermería”?:**
- A) Campell.
 - B) Carpenito.
 - C) Johnson y Abdellah.
 - D) Vera Fry.
113. **¿Cuál es la diferencia entre un DEA (Desfibrilador Externo Automático) y un DESA (Desfibrilador Externo Semiautomático)?:**
- A) Ninguna. Se emplea indistintamente un término u otro para hablar del mismo equipo.
 - B) Los DEA suministran el choque de forma automática mientras los DESA requieren que el operador oprima el botón de descarga.
 - C) Los DEA tienen electrodos adhesivos y los DESA disponen de palas por estar diseñados para ser usados por personal sanitario.
 - D) Los DEA son de muy pequeño tamaño, son de uso individual y van instalados normalmente en el tejido subcutáneo del paciente. Los DESA se instalan en sitios de pública concurrencia y están diseñados para ser usados por operadores mínimamente entrenados.
114. **Entre los métodos de evaluación utilizados cuando hablamos de calidad en los servicios prestados, nos referimos a:**
- A) El análisis de los resultados.
 - B) El análisis del proceso.
 - C) El análisis de la estructura.
 - D) Todas las respuestas anteriores son correctas.

- 115. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la razón por la que el bebé está más predispuesto a sufrir una lesión cerebral traumática?:**
- A) El flujo cerebral es menor en el bebé, lo cual altera la función sensorio-motora.
 - B) La proporción tamaño/peso del cerebro es mayor en el bebé.
 - C) El espesor del cráneo es mayor en el bebé.
 - D) La función nervioso-craneal es incompleta, lo cual altera el equilibrio.
- 116. ¿Qué mecanismo controla el volumen cerebral?:**
- A) El flujo sanguíneo cerebral.
 - B) El desplazamiento del LCR.
 - C) La barrera hematoencefálica.
 - D) La vasoconstricción.
- 117. Las siguientes vacunas se obtienen a partir de virus vivos atenuados, excepto una, señálela:**
- A) Poliomielitis tipo Sabin.
 - B) Poliomielitis tipo Salk.
 - C) Rubeola.
 - D) Sarampión.
- 118. ¿Cuál no es un método de determinación de prioridades en la planificación sanitaria?:**
- A) Método Hanlon.
 - B) Método Simplex.
 - C) Método Complex.
 - D) Método de ponderación de criterios.
- 119. El objetivo de la gestión clínica es:**
- A) Identificar los procesos clave y elaborar un mapa de procesos.
 - B) Lograr un mayor compromiso del profesional en la toma de decisiones, no solo clínicas, sino también de distribución de recursos.
 - C) Distribuir la responsabilidad y la autoridad a todos los niveles de la jerarquía de la organización.
 - D) Implantar una dirección por objetivos.
- 120. ¿Cuál de las siguientes situaciones patológicas es una complicación aguda de la Diabetes Mellitus?:**
- A) Nefropatía diabética.
 - B) Descompensación hiperosmolar.
 - C) Cetoacidosis diabética.
 - D) Las opciones B y C son correctas.
- 121. ¿Cuál de los siguientes alimentos no proporcionarías a un paciente con estreñimiento?:**
- A) Verduras.
 - B) Pan integral.
 - C) Arroz.
 - D) Hortalizas.
- 122. El síntoma más frecuente de la menopausia son los sofocos, que son producidos por:**
- A) Aumento de la prolactina.
 - B) Aumento de la progesterona.
 - C) Disminución de los estrógenos.
 - D) Todas son correctas.

E107

E135

E053

E048

E043

E170

E160

E089

123. ¿Cuándo ha sido revisado por última vez el Código Ético del Consejo Internacional de Enfermería?:

- A) 1953.
- B) 1989.
- C) 2005.
- D) 2012.

E024

124. ¿Qué escala es de específica aplicación en los pacientes con demencia tipo Alzheimer?:

- A) Escala de Norton.
- B) Índice de Bathel.
- C) Escala de Lawton y Brody.
- D) Escala de GDS/ FAST de Reisberg.

E129

125. ¿Cuál de las siguientes fuentes de datos pertenecen a la demografía estática?:

- A) Natalidad.
- B) Registro Civil.
- C) Fertilidad.
- D) Mortalidad.

E005