

Evolución del consumo de sustancias psicoactivas en escolares de la Región de Murcia en 2021

Introducción

Durante el año 2021 se ha realizado una nueva edición de la encuesta ESTUDES (Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias), que se enmarca en la serie de encuestas que vienen realizándose en España de forma bienal desde el año 1994, y que tienen como objetivo conocer la situación y las tendencias del consumo de drogas entre los estudiantes de 14-18 años que cursan Enseñanzas Secundarias en la Comunidad Autónoma de Murcia.

A partir de este objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos:

- Conocer la prevalencia de consumo de las distintas sustancias psicoactivas.
- Conocer las características sociodemográficas más importantes de los consumidores.
- Conocer algunos patrones de consumo relevantes.
- Estimar las opiniones, conocimientos, percepciones y actitudes ante determinados aspectos relacionados con el abuso de drogas (disponibilidad percibida, riesgo percibido ante diversas conductas de consumo) y algunos factores relacionados con el consumo.
- Estimar el grado de exposición y receptividad de los estudiantes a determinadas intervenciones.

Con esta información estaremos en disposición de diseñar y evaluar políticas dirigidas a prevenir el consumo de drogas y los problemas derivados del mismo, que se orientan principalmente al medio familiar y/o escolar.

ARTÍCULO

Evolución del consumo de sustancias psicoactivas en escolares de la Región de Murcia en 2021.

NOTICIAS BREVES

- Recomendaciones de Salud Pública y Atención Sanitaria de la población desplazada de Ucrania en la Región de Murcia.

Semanas epidemiológicas EDO:

Semanas 9 a 16 de 2022.



Material y Método

La información que presentamos se obtiene de la Encuesta Nacional ESTUDES 2021. En este artículo se presentan los resultados obtenidos en la Comunidad Autónoma de Murcia. Es un estudio descriptivo, donde la muestra está formada por estudiantes de 14 a 18 años de centros educativos (públicos y concertados) que cursan Enseñanzas Secundarias (3º y 4º de Enseñanza Obligatoria, 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos de Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional).

El periodo de recogida de información ha sido del 8 de Marzo de 2021 al 18 de Mayo de 2021. Se ha realizado un muestreo por conglomerados bietápico, donde en primera instancia se han seleccionado aleatoriamente centros educativos (unidades de primera etapa) y en segundo lugar aulas (unidades de segunda etapa), proporcionando el cuestionario a todos los alumnos presentes en las mismas.

Para la selección de los centros educativos, se han utilizado listados del Registro de Centros Docentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. La muestra final asciende a 1.131 alumnos pertenecientes a 26 colegios y 85 aulas. En cuanto a la división de la muestra por género, se busca una presencia similar para poder realizar una adecuada comparación entre ambos sexos. Este año contamos con 606 alumnos del sector masculino lo que representa 53,6% del alumnado y 525 del sector femenino que supone un 46,4% de la muestra total.

El error muestral máximo para un nivel de confianza del 95,5% y $p=q=0,5$ es del 2,9% para los estudiantes de 14 a 18 años en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Resultados

El alcohol es la sustancia psicoactiva más extendida entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14 a 18 años. En la Región de Murcia, el 69,8% ha consumido bebidas alcohólicas en alguna ocasión en su vida, y casi 5 de cada 10

alumnos (48,5%) admite haber tomado alcohol en los últimos 30 días, confirmando en ambos casos un descenso en comparación con la anterior encuesta ESTUDES de 2018, que presentaba unos valores de 74,9% para el tramo temporal de alguna vez en la vida y 58% para el último mes. Ver Gráfico 1.

La segunda sustancia de mayor prevalencia entre los estudiantes es el tabaco, con un porcentaje de 38,1% (37,9% en 2018) para los que han fumado tabaco alguna vez en la vida, y aproximadamente 1 de cada 5 alumnos lo han hecho en los 30 días previos a la realización de la encuesta, 23,6% en 2018. Cifras prácticamente mantenidas donde continúa percibiéndose que este hábito de consumo es ligeramente más común en las chicas con el 38,8%, frente al 37% de chicos.


Se ha incrementado el uso del cigarrillo electrónico de forma muy importante en estos últimos años, situándose la Región de Murcia como la segunda comunidad autónoma con mayor prevalencia.

El cannabis constituye la tercera droga más consumida y la sustancia ilegal con mayor prevalencia. El 24,5% de los alumnos admiten haber consumido cannabis en alguna ocasión, respecto a 2018 este valor baja tres puntos porcentuales (27,9%). Aquellos que consumieron el último mes representan el 10,8% del alumnado.

Por su parte, la prevalencia de los hipnosedantes (tranquilizantes/somníferos) resulta la cuarta más elevada de entre las sustancias psicoactivas analizadas. El 20,4% de los estudiantes en la comunidad ha tomado sustancias de este tipo en alguna ocasión y el 8,1% en los últimos 30 días, registrando un ligero incremento respecto a 2018, que tenía unos valores de 19,6% y 6,8%, respectivamente a las referencias anteriormente indicadas. Adquiere mayor dimensión entre las chicas, pues en la Región de Murcia, el 17,2% de las chicas y el 11,7% de chicos los ha tomado en los últimos 12 meses.

Abordando en qué medida los estudiantes han consumido alguna vez en la vida el resto de sustancias analizadas (cocaína, alucinógenos, anfetaminas, éxtasis, GHB, Inhalables volátiles, heroína) se observa que las prevalencias se mantienen

Gráfico 1. Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, últimos 12 meses y en los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). Región de Murcia, 2021.



Fuente: Observatorio de Drogas y Adicciones de la Región de Murcia. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

cada una por debajo del 3%, siendo las más consumidas entre los jóvenes el éxtasis y la cocaína.

El alcohol y el tabaco son, con diferencia, las sustancias más accesibles para los estudiantes de 14 a 18 años. En este sentido, más del 90% de ellos no aprecia ninguna dificultad para conseguirlos, escenario que se contempla tanto en la comunidad autónoma como a nivel nacional. Ver Gráfico 2.

Del mismo modo, la tercera sustancia más accesible en la Región de Murcia es el cannabis, que es la droga ilegal que se considera más fácil de alcanzar, específicamente en la comunidad el 58,1% de los estudiantes perciben fácil o relativamente fácil su acceso.

Finalmente, para los hipnosedantes, el 46,3% de los estudiantes consideran que es una sustancia que podrían conseguir de manera fácil o muy fácil.

Alcohol

Desde el año 2012 se observa una tendencia decreciente del uso de alcohol entre los estudiantes de 14 a 18 años de Enseñanzas Secundarias para


todos sus tipos de consumo, con la prevalencia de 69,8% en el año 2021 para la variable de alguna vez en la vida, 65,7% en el último año y 48,5% en el último mes (Gráfico 3).

La edad de inicio al consumo de alcohol se sitúa en 14 años. En función del sexo, no se observan diferencias entre la prevalencia registrada entre los chicos y las chicas (alguna vez en la vida 71,4% y 68% respectivamente). Existe un aumento progresivo de la prevalencia según va creciendo esta población en toda la práctica del consumo. El 43,4% de los estudiantes de 14 años han consumido bebidas alcohólicas y prácticamente 9 de cada 10 mayores de edad lo han hecho alguna vez en su vida.

Se observa que aproximadamente el 45%, del alumnado de 14 a 18 años en la Región de Murcia se ha emborrachado alguna vez. La proporción de chicas que se ha emborrachado en los últimos 30 días (21,8%), es ligeramente superior al porcentaje contemplado en el segmento masculino (17,4%).


Respecto al "binge drinking" o consumo de atracción, baja desde 2016, con el 6,8% de los chicos

Gráfico 2. Disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de 14-18 años (%). Región de Murcia vs España, 2021.




Fuente: Observatorio de Drogas y Adicciones de la Región de Murcia. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

Gráfico 3. Evolución temporal del consumo de alcohol entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años (%). Región de Murcia 1994-2021.




Fuente: Observatorio de Drogas y Adicciones de la Región de Murcia. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

Gráfico 4. Evolución temporal del consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años(%). Región de Murcia, 1994-2021.



Fuente: Observatorio de Drogas y Adicciones de la Región de Murcia. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

Gráfico 5. Prevalencia del uso de cigarro electrónico alguna vez en la vida, entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años(%). Región de Murcia, 2014-2021.



Fuente: Observatorio de Drogas y Adicciones de la Región de Murcia. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.


y el 13,1% de las chicas de 14 años que reconocen este patrón, porcentaje que se incrementa de forma relevante en el segmento de 16 años (20,9% chicos y 37,7% chicas). Finalmente, prácticamente la mitad del alumnado de 18 años reconoce haberlo hecho en el último mes (44,8% chicos y 49,4% chicas).

Al igual que en la pasada edición de la encuesta ESTUDES, si analizamos el consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas durante los 7 días previos a la realización de la encuesta, el cubata (26,3%) sigue siendo la bebida más consumida, seguido de la cerveza (23,3%, anteriormente al año 2016 ocupaba el primer puesto) y los licores fuertes (14,4%).

Tabaco

En la Región de Murcia, por término medio, el primer consumo de tabaco se produce a los 14,1 años. Con una prevalencia superior del sexo femenino en todos los tramos de edad, exceptuando los 18 años, presentando una media del 22,2% en chicos y 24,4% en chicas que han fumado en el último mes. Atendiendo a esa misma referencia temporal, aproximadamente 1 de cada 4 estudiantes fumaron tabaco (23,2%), registrándose un consumo diario en menos de la mitad de estos estudiantes (8,6%). El 38,1% refieren haberlo consumido alguna vez en la vida. Cifras muy similares a 2018, (Gráfico 4).

Gráfico 6. Evolución temporal del consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años(%). Región de Murcia, 1994-2021.



Fuente: Observatorio de Drogas y Adicciones de la Región de Murcia. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

Se ha incrementado el uso del cigarrillo electrónico de forma muy importante en estos últimos años, pasando del 15,8% en 2016, 45,2% en 2018 hasta llegar en 2021 al 47,1%, para la referencia temporal de alguna vez en la vida tal y como se observa en el Gráfico 5, situándose la Región de Murcia como la segunda comunidad autónoma con mayor prevalencia. Es más habitual entre los chicos (52%) que entre las chicas (41,3%).

Cannabis

Tras el patrón creciente que registró entre 2014 y 2018, precedido de un cambio de progresión de ascendente a descendente en 2004, en los resultados de la presente edición se evidencia una nueva declinación en sus porcentajes (Gráfico 6).

Por término medio, en la Región de Murcia, se inicia su consumo a los 15,1 años. El nivel de consumo se va incrementando según aumenta la edad de los alumnos y mantiene su prevalencia en el sexo masculino, hasta registrar un porcentaje entre los mayores de edad de 63,5% para los chicos y 38,6% para las chicas. Dato que reafirma que esta sustancia se encuentra más extendida entre los chicos.

En los últimos 30 días, los estudiantes que confirman un consumo de cannabis representan el 10,8% y refieren haber fumado 4 porros en el mismo día por término medio. El porcentaje de consumidores problemáticos es del 16,3% entre la población estudiada, según la escala CAST-Cannabis Abuse Screening Test (Legleye *et al.*, 2007). Por último, el consumo diario de cannabis se sitúa en el 1% (1,9% en chicos y 0% en chicas).

Hipnosedantes (con/sin receta)


En la Región de Murcia, la edad media de inicio de consumo se sitúa en los 14,4 años.

Los estudiantes que han consumido este tipo de sustancias alguna vez en la vida representan el 20,4% del alumnado, Gráfico 7.

Se observa un uso más común entre las chicas pues el 17,2% de las chicas y el 11,7% de chicos los ha tomado en los últimos 12 meses.


En cuanto a la edad de los estudiantes en la región, la mayor prevalencia se da en el segmento de 16 años en el que los estudiantes que han consumido en dicho periodo representan el 20,2%. Ver Gráfico 8.

Gráfico 7. Prevalencia de consumo de los hipnosedantes (con/sin receta) entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años(%). Región de Murcia, 2014-2021.



Fuente: Observatorio de Drogas y Adicciones de la Región de Murcia. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

Gráfico 8. Prevalencia de consumo de los hipnosedantes (con/sin receta) en los últimos 12 meses entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14-18 años(%). Región de Murcia, 2014-2021.



Fuente: Observatorio de Drogas y Adicciones de la Región de Murcia. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

Discusión / Conclusiones

La sustancia más consumida en los escolares es el **alcohol**, con una prevalencia de 69,8% para la variable de alguna vez en la vida en el año 2021 aunque se mantiene una tendencia descendente desde 2012.

Le sigue el **tabaco**, cuyo consumo alguna vez en la vida (38,6%) y uso diario (8,6%), son similares a encuestas anteriores. Se mantiene una mayor prevalencia de consumo en las chicas (22,2% en chicos y 24,4% en chicas han fumado en el último mes).

El **cigarrillo electrónico** ha incrementado su uso de forma muy importante alguna vez en la vida en estos últimos años (15,8% en 2016, 45,2% en 2018 y 47,1% en 2021).

En el consumo de **cannabis**, que es la droga ilegal de mayor uso, se produce una ligera reducción respecto al año 2018 en todas las referencias temporales, poniendo de ejemplo que baja del 27,9% al 24,5% en 2021 en el consumo de alguna vez en la vida.

Para los **hipnosedantes (con /sin receta)**, figuran como la cuarta droga de mayor prevalencia de consumo entre las analizadas. Se mantiene un uso más elevado por parte de las chicas, y hay un incremento ligero en su uso respecto a la pasada edición. El resto de sustancias por las que se les pregunta tienen una incidencia muy baja.

La **edad de inicio** en las tres principales sustancias más prevalentes se establece entre los 14 y los 15,1 años. Cuando se analiza su consumo por edad, se

observa un incremento según avanzan los años de los estudiantes.

En función del **género**, en la Región de Murcia no hay apenas diferencia atendiendo al consumo de alcohol. En cuanto al consumo de tabaco se percibe una prevalencia ligeramente mayor en el segmento femenino, a la inversa del cannabis, donde hay un predominio masculino.

En relación a la **disponibilidad percibida** por los escolares para conseguir estas sustancias, en las de mayor prevalencia consideran que es muy fácil su adquisición.

La **percepción de riesgo** está generalizada para sustancias como la heroína, la cocaína o el éxtasis (todas ellas con una percepción superior al 97% para su consumo habitual), pero baja en las drogas más predominantes, siendo curioso destacar que el menor riesgo percibido recae en los cigarrillos electrónicos o dispositivos susceptibles de liberación de nicotina que cursan un rápido desarrollo de este nuevo mercado.

La **monitorización y seguimiento** a través de encuestas siguiendo un patrón metodológico similar sobre el consumo de sustancias, conductas relacionadas, opiniones, percepciones y actitudes en el consumo sirve para conocer la evolución de estos parámetros en los escolares de la región y poder

actuar, diseñando programas y planes de acción en distintos ámbitos para prevenir o modificar estas conductas y promocionar hábitos saludables.

Autoría

Correa JF, Ballesta M, Rosa I, Moreno L, Chirlaque MD. Observatorio de Drogas y Adicciones de la Región de Murcia. Servicio de Epidemiología. Dirección General de Salud Pública y Adicciones. Consejería de Salud. Región de Murcia.

Bibliografía

1. Informe Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en la Región de Murcia. ESTUDES 2021
[502615-ie.2022.02.pdf \(murciasalud.es\)](#)
2. Informe Encuesta sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias en la Región de Murcia 2018
[Microsoft Word - ESTUDES 2018.docx \(murciasalud.es\)](#)
3. Informe sobre Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en Escolares de la Región de Murcia en 2016
[418780-MODELO PLANILLA Informe ESTUDES2016.pdf \(murciasalud.es\)](#)

Situación regional. Semanas 9 a 12 (Del 28/02/2022 al 27/03/2022).

ENFERMEDAD	CASOS NOTIFICADOS												CASOS NOTIFICADOS		
	SEMANA 9			SEMANA 10			SEMANA 11			SEMANA 12			SEMANA 9 a 12		
	2022	2021	MEDIANA	2022	2021	MEDIANA	2022	2021	MEDIANA	2022	2021	MEDIANA	2022	2021	MEDIANA
Tox infecciones alimentarias	0	0	1	0	0	0	7	2	0	0	6	1	7	8	8
Gripe	26	11	633	24	9	422	36	5	248	67	8	95	153	33	1516
Legionelosis	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1
Otras meningitis	0	0	1	3	1	0	0	0	1	1	1	1	4	2	3
Parotiditis	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	2	0	2
Varicela	2	5	57	4	5	39	2	6	61	1	4	32	9	20	189
Infección gonocócica	4	1	1	4	6	1	7	3	1	8	8	1	23	18	5
Sífilis	1	4	1	2	0	2	2	3	2	1	2	2	6	9	6
Hepatitis A	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
Otras hepatitis víricas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0
Leishmaniasis	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	4	2
Tuberculosis	1	4	2	2	1	3	6	1	1	6	3	3	15	9	9

La mediana se calcula sobre el último quinquenio. No se incluyen las enfermedades sin casos notificados en la cuatrisesmana actual.

Distribución por áreas de salud. Semanas 9 a 12 (Del 28/02/2022 al 27/03/2022).

ENFERMEDAD	MURCIA OESTE		CARTAGENA		LORCA		NOROESTE		ALTIPLANO		VEGA MEDIA DEL SEGURA		MURCIA ESTE		MAR MENOR		VEGA ALTA DEL SEGURA		TOTAL	
	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.
	Población (Padrón 2021)	270856		289512		181653		69958		61317		273580		204834		111801		54975		1518486
Tox infecciones alimentarias	0	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	8
Gripe	28	86	22	96	12	26	16	32	15	23	24	65	16	44	18	42	2	6	153	420
Legionelosis	1	5	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0	2	11
Otras meningitis	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	4	6
Parotiditis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	2	3
Varicela	0	5	1	7	1	8	0	3	2	2	3	5	1	7	1	2	0	0	9	39
Infección gonocócica	8	26	0	8	0	3	1	2	0	1	5	18	4	13	3	6	2	4	23	81
Sífilis	1	10	0	1	0	1	0	0	0	0	2	8	0	4	3	3	0	1	6	28
Hepatitis A	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
Otras hepatitis víricas	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Leishmaniasis	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	1	1	5
Tuberculosis	1	4	5	6	2	4	1	1	0	1	2	7	3	9	1	2	0	0	15	34

No se incluyen las enfermedades sin casos notificados en la cuatrisesmana actual.

Situación regional. Semanas 13 a 16 (Del 28/03/2022 al 24/04/2022).

ENFERMEDAD	CASOS NOTIFICADOS												CASOS NOTIFICADOS		
	SEMANA 13			SEMANA 14			SEMANA 15			SEMANA 16			SEMANA 13 a 16		
	2022	2021	MEDIANA	2022	2021	MEDIANA	2022	2021	MEDIANA	2022	2021	MEDIANA	2022	2021	MEDIANA
Shigelosis	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0
Toxinfecciones alimentarias	0	2	2	0	3	1	4	3	1	0	0	0	4	8	9
Gripe	91	3	38	85	2	41	53	2	27	74	2	40	303	9	153
Legionelosis	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2
Otras meningitis	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	3
Parotiditis	1	0	1	0	2	2	0	1	1	1	0	1	2	3	7
Varicela	2	2	54	6	2	54	4	7	45	6	5	39	18	16	192
Infección gonocócica	9	1	1	9	6	1	8	4	1	5	3	0	31	14	3
Sífilis	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	7	3	3
Hepatitis B	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1
Fiebre exantemática mediterránea	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
Leishmaniasis	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	2
Tuberculosis	5	1	2	3	5	3	2	3	1	2	1	3	12	10	10

La mediana se calcula sobre el último quinquenio. No se incluyen las enfermedades sin casos notificados en la cuatrisesmana actual.

Distribución por áreas de salud. Semanas 13 a 16 (Del 28/03/2022 al 24/04/2022).

ENFERMEDAD	MURCIA OESTE		CARTAGENA		LORCA		NOROESTE		ALTIPLANO		VEGA MEDIA DEL SEGURA		MURCIA ESTE		MAR MENOR		VEGA ALTA DEL SEGURA		TOTAL	
	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.	Casos	Acum.
Población (Padrón 2021)	270856		289512		181653		69958		61317		273580		204834		111801		54975		1518486	
Shigelosis	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2
Toxinfecciones alimentarias	0	0	4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	12
Gripe	76	162	50	146	6	32	9	41	4	27	72	137	53	97	24	66	9	15	303	723
Legionelosis	0	5	0	2	0	1	0	0	0	0	1	1	0	2	0	1	0	0	1	12
Otras meningitis	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0	1	7
Parotiditis	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	0	0	2	5
Varicela	3	8	4	11	1	9	1	4	0	2	7	12	2	9	0	2	0	0	18	57
Infección gonocócica	12	38	3	11	0	3	2	4	2	3	4	22	5	18	3	9	0	4	31	112
Sífilis	2	11	0	1	1	2	0	1	1	1	2	9	0	3	1	4	0	1	7	33
Hepatitis B	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Fiebre exantemática mediterránea	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	2
Leishmaniasis	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	1	6
Tuberculosis	2	6	2	8	1	5	1	2	0	1	3	11	2	11	1	3	0	0	12	47

No se incluyen las enfermedades sin casos notificados en la cuatrisesmana actual.



Región de Murcia
Consejería de Salud

Dirección General de Salud Pública
y Adicciones

Recomendaciones de Salud Pública y Atención Sanitaria de la población desplazada de Ucrania en la Región de Murcia

Ante la llegada de personas desplazadas procedentes de Ucrania en el contexto de petición de asilo debido al conflicto bélico desencadenado, y dentro de la normativa europea que se aplica para la atención sanitaria de la población refugiada, según su Directiva 2001/55/EC, Artículo 13, los Estados Miembros deben proveer la asistencia necesaria en términos de bienestar social y atención médica.

Desde la Dirección General de Salud Pública y Adicciones de la región, se han publicado las recomendaciones para la prevención y control de enfermedades infecciosas de relevancia para la Salud Pública y actuaciones básicas de atención sanitaria a población ucraniana desplazada a la Región de Murcia:

- Atención a la población adulta y a los procesos infecciosos más relevantes en Salud Pública y con alta prevalencia/incidencia en Ucrania.
 - Tuberculosis y COVID-19
 - Situación epidemiológica y medidas de prevención y control ante enfermedades transmisibles relevantes en Salud Pública en la población desplazada: poliomielitis, sarampión, rubeola, hepatitis, virales, VIH, difteria/tosferina/tétanos, meningitis meningocócica, enfermedad invasora por Haemophilus influenza tipo B (Hib) y neumococo, infecciones de transmisión sexual (ITS), escabiosis, pediculosis, rabia.
- Atención a la población infantil.
- Atención a la mujer.
- Vacunación.
 - Recomendaciones generales de vacunación.
 - Recomendaciones de vacunación en la Región de Murcia.

Disponible en:

https://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/502624-Recomendaciones.y.Anexo_A.S._UCRANIA_v2.1_17052022.pdf

Edita:

Servicio de Epidemiología
D.G. de Salud Pública y Adicciones
Consejería de Salud
Ronda de Levante, 11. 30008 Murcia
Tel.: 968 36 20 39
Fax: 968 36 66 56
bolepi@carm.es
<http://www.murciasalud.es/bem>

Comité Editorial:

M.ª Dolores Chirlaque,
M.ª Isabel Barranco, Lluís Cirera,
Juan Francisco Correa,
Jesús Humberto Gómez,
Olga Monteagudo, Carmen Santiuste.

Coordinadora de Edición:

M.ª Dolores Chirlaque

Coordinadora Administrativa:

Bárbara Lorente García

Suscripción: Envío Gratuito

Solicitudes: bolepi@carm.es

e-issn: 2173-9269 Bol Epidemiol Murcia

D.L. MU-395-1987