



# Inicio 6 de octubre



Región de Murcia  
Consejería de Salud

Dirección General de Salud  
Pública y Adicciones

Servicio  
**Murciano**  
de Salud

Programa de vacunaciones



## Grupos con recomendación de vacunación antigripal y/o dosis estacional frente a COVID-19

### GRIPE + COMIRNATY® BIVALENTE ORIGINAL/ÓMICRON BA.4-5

LA CAMPAÑA ESTACIONAL COMIENZA CON COMIRNATY® BIVALENTE ORIGINAL/ÓMICRON BA.4-5, PERO A LO LARGO DE LA MISMA SE PODRÁ DISPONER IGUALMENTE DE SPIKEVAX® BIVALENTE ORIGINAL/ÓMICRON BA.1

- $\geq 60$  años de edad.
- $\geq 12$  años institucionalizado.
- 12-59 años con condiciones de riesgo\*.
- Trabajadores sanitarios y socio-sanitarios.
- Mujeres embarazadas.
- Convivientes y cuidadores de grandes inmunodeprimidos.

### GRIPE + COMIRNATY® MONOVALENTE PEDIÁTRICO

- 5-11 años institucionalizado.
- 5-11 años con condiciones de riesgo\*.
- Convivientes de grandes inmunodeprimidos.

- 5 meses desde dosis anterior.
- Desde infección registrada mínimo 4 semanas, recomendable 3 meses  $\geq 80$  años, grupo 7 o institucionalizados, resto 5 meses. Se puede adelantar si, por cualquier motivo, se ve dificultada la vacunación con posterioridad.

### GRIPE

- 6 meses-4 años institucionalizado.
- 6 meses-4 años con condiciones de riesgo\*.
- 6 meses-2 años prematuros 32 SG.
- Hábito tabáquico a cualquier edad.
- 6 meses-18 años en tratamiento prolongado con ác. acetilsalicílico.
- Convivientes y cuidadores de grupos de riesgo no inmunodeprimidos.
- Trabajadores esenciales.
- Trabajadores con cerdos o aves.

### \*Condiciones de riesgo:

- Enfermedades crónicas del sistema cardiovascular.
- Enfermedad respiratoria crónica, incluye asma, displasia broncopulmonar, fibrosis quística y patología pulmonar confirmada tras COVID-19.
- Enfermedades neurológicas y neuromusculares graves, que dificulten movilización de secreciones o con riesgo de aspiración.
- Enfermedades metabólicas crónicas (incluyendo diabetes mellitus).
- Obesidad mórbida (IMC  $\geq 40$  en adultos,  $\geq 35$  en adolescentes o  $\geq 3$  DS en la infancia).
- Enfermedad renal crónica y síndrome nefrótico.
- Enfermedad hepática crónica, incluyendo alcoholismo crónico.
- Asplenia o disfunción esplénica grave.
- Hemoglobinopatías y anemias.
- Trastornos de coagulación y trastornos hemorrágicos crónicos, receptores de hemoderivados/transfusiones múltiples.
- Cáncer y hemopatías malignas.
- Inmunosupresión primaria, por VIH o por fármacos, receptores de trasplantes y déficit del complemento.
- Enfermedad celíaca.
- Portadores de implantes cocleares o en espera.
- Fístula de líquido cefalorraquídeo.
- Enfermedad inflamatoria crónica.
- Trastornos o enfermedades con disfunción cognitiva (Síndrome de Down, parálisis cerebral, demencias y otras).