

Causas de no vacunación y formación de bolsas de susceptibles

Cohorte de 2002

José Luis Olivares Martínez*

M^a Mar Albero Villaescusa

Daniel Fenoll Brotons

Eduardo González Martínez-La Cuesta

Jaime Pérez Martín

*vacunas.sanidad@ayto-murcia.es

Premio a la Mejor
Comunicación Oral
en el 3^{er} Congreso
de la Asociación
Española de
Vacunología, Madrid
10-12 de noviembre
de 2005

48 insuficientemente vacunados

- Falta solo TV 28.....58,33%.

TV 94 %

- Falta TV y DTP 17.....35,41%

- Falta solo DTP 3..... 6,25%

- Ninguna dosis 2 casos

Distribución por zonas de salud

- Vistabella. 13 casos. 27,1%.
- Beniajan. 4 casos. 8,3%.
- El Carmen. 4 casos. 8,3%.

Por barrios

La Paz	20,8%
Torreagüera	8,3%

Nivel de estudios.

- Sin estudios o primarios **71%** padres y **75%** de las madres.
- Medios y superiores **12,5%** padres y **8,4%** de las madres.

Estado civil madres

- Casadas 70%.
- Solteras 10%.
- Divorciadas 17 %.
- Abuelas 3%.

País origen de los padres

- 88% España.
- 8% África (Argelia, Marruecos, Senegal).
- 4% Ecuador.

96% nacidos en España

Etnias

- Gitanos 33%.
- No gitanos 67%.
- La cobertura en población gitana en esta cohorte es del 93%

Situación vacunal de los hermanos

- Bien vacunados 47 51%
- **Mal vacunados 46 49%**
- Acumulación de susceptibles en el entorno familiar y social.
- Consecuencias epidemiológicas . Caso Almería

Posición de los hermanos y riesgo de no vacunación

	1°	2°	3°-8°
Bien vacunados	64%	46%	24%
Mal vacunados	36%	54%	76%

Causas de no vacunación

- Los dejan sin vacunar **conscientemente:**
- 29 casos. 60,41%.
- Los dejan sin vacunar **inconscientemente:**
- 19 casos. 39,58%.

- Miedo a las reacciones adversas 31%.
- Olvido ,descuido, 16%.
- Siempre esta malo 11%.
- Padres adictos a drogas 11%
- Error profesional 8%.
- Reacciones adversas previas 6%
- Naturistas y med alternativas 4%
- Enfermedades crónicas retrasan 4%
- Falsa alergia huevo 2%
- Administrativas 2%
- Contraindicación real 2%

Como lo expresaron ellas

- Siempre esta malo.secuencia:
- 1º pido cita.
- 2º cuando llega el día esta malo y la doctora me dice que hasta que no pasen ocho días.
- 3º Luego se me paso y cuando fui a llevarlo se me puso malo otra vez.
- 4º lo fui dejando y se me olvido.como siempre esta malo.

Miedo a las reacciones adversas

- Se quedaba "pasá", como muerta y dije no la vacuno hasta que no sea más grande, me da miedo. Sigue sin vacunar.
- Han "salió" tantas cosas en la tele, uno que se quedo cojo y "to".
- La suegra que esta presente: No le pongo una vacuna si fuera "pa"la madre decía: no se , "me se abra olvidao"

¿cuántos se han vacunado durante y después?

- En total se han vacunado 19 (**37,5%**).
- 6 de los 29 que habían tomado **conscientemente** la decisión de no vacunar (**20%**).
- 13 de los 19 que no los habían vacunado **inconscientemente** (**68,42**).

Coberturas finales

-TV 99,17%.

-Tres dosis 99,55%.

Conclusiones

- Las principales causas son : miedo a las reacciones adversas unido al siempre esta malo y al simple despiste, olvido..
- Los componentes étnico ,familiar ,social y cultural son la base de la formación de bolsas de susceptibles . Acumulación de hermanos y en barrios
- Es posible reducir la cantidad y tamaño de estas bolsas mediante vigilancia y control.
- Siempre en busca de la excelencia.