



## INDICADORES DE VARIABILIDAD – AREA VII

A continuación, se muestran las fichas de aquellos indicadores extraídos del Acuerdo de Gestión del AREA VII asociados a factores de Variabilidad

### 2.2.7 Cuidados hospitalarios.

| 2.2.7.1        | Plan de Acogida al ingreso                                                                                                                                                                                            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Pacientes ingresados más de 24 horas que tienen registrada la realización correcta del Plan de Acogida en una unidad de hospitalización x 100 / Pacientes ingresados más de 24 horas en una unidad de hospitalización |
| <b>Fuente</b>  | SELENE                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Meta</b>    | ≥80%                                                                                                                                                                                                                  |

| 2.2.7.2.       | Valoración temprana del riesgo de Úlceras por presión (UPP)                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Pacientes que tiene registro de la valoración de riesgo de padecer UPP mediante la escala Braden, en las primeras 24 horas de su ingreso en una unidad de hospitalización x 100 / Pacientes ingresados más de 24 horas en una unidad de hospitalización |
| <b>Fuente</b>  | SELENE                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Meta</b>    | ≥ 85%                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 2.2.7.3        | Desarrollo de úlceras por presión (UPP) durante la estancia hospitalaria                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Pacientes con registro en su historia clínica de al menos una UPP desarrollada durante su estancia hospitalaria x 100 / Pacientes ingresados más de 48 horas |
| <b>Fuente</b>  | SELENE                                                                                                                                                       |
| <b>Meta</b>    | ≤ 1%                                                                                                                                                         |



| 2.2.7.5 | Desarrollo de úlceras por presión (UPP) durante la estancia hospitalaria en pacientes identificados en riesgo                                                         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fórmula | Pacientes identificados de riesgo moderado- alto de UPP y que desarrollan una UPP durante su ingreso x 100 / Pacientes identificados de riesgo moderado - alto de UPP |
| Fuente  | SELENE                                                                                                                                                                |
| Meta    | ≤2,5%                                                                                                                                                                 |

| 2.2.7.6 | Úlceras por presión en UCI (UPP)                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| Fórmula | Pacientes ingresados en UCI con UPP x 100 / Pacientes ingresados en UCI |
| Fuente  | Historia clínica                                                        |
| Meta    | ≤ 8%                                                                    |

| 2.2.7.7 | Valoración temprana del riesgo de Caídas                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fórmula | Pacientes que tienen registro de la valoración de riesgo de caídas, mediante la escala Downton, en las primeras 24 horas de su ingreso en una unidad de hospitalización x 100/ Pacientes ingresados más de 24 horas en una unidad de hospitalización |
| Fuente  | SELENE                                                                                                                                                                                                                                               |
| Meta    | ≥ 85%                                                                                                                                                                                                                                                |

| 2.2.7.8 | Flebitis catéter venoso periférico                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fórmula | Pacientes con catéter venoso periférico y el motivo de retirada es por flebitis x 100 / Pacientes con catéter venoso periférico |
| Fuente  | SELENE                                                                                                                          |
| Meta    | ≤8%                                                                                                                             |

| 2.2.7.9 | Extravasaciones catéter venoso periférico                                                                                            |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fórmula | Pacientes con catéter venoso periférico y el motivo de retirada es por extravasación x 100 / Pacientes con catéter venoso periférico |
| Fuente  | SELENE                                                                                                                               |
| Meta    | ≤10%                                                                                                                                 |

| 2.2.7.10 | Informes de continuidad de cuidados al alta                                                       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fórmula  | Altas hospitalarias con Informe de continuidad de cuidados realizados x 100 / Altas hospitalarias |
| Fuente   | SELENE                                                                                            |
| Meta     | ≥60%                                                                                              |



## 2.3 Cuidados Paliativos.

| <b>2.3.1</b>   | <b>Fallecimientos en domicilio en el Programa de Cuidados Paliativos</b>                                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | $\frac{\text{Pacientes en el Programa de Cuidados Paliativos fallecidos en domicilio} \times 100}{\text{Pacientes en el Programa de Cuidados Paliativos fallecidos}}$ |
| <b>Fuente</b>  | ESAD-ESAH                                                                                                                                                             |
| <b>Meta</b>    | ≥80%                                                                                                                                                                  |

### 2.5.1 Atención al niño.

| <b>2.5.1.1</b> | <b>Primera revisión en recién nacidos en los 10 días siguientes al parto</b>                                                                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | $\frac{\text{Recién nacidos a los que se le ha realizado la primera revisión en los 10 días siguientes al parto} \times 100}{\text{Recién nacidos en CIVITAS}}$ |
| <b>Fuente</b>  | OMI, CIVITAS                                                                                                                                                    |
| <b>Meta</b>    | ≥50%                                                                                                                                                            |

| <b>2.5.1.2</b> | <b>Mantenimiento de la lactancia materna durante los 6 primeros meses de vida</b>                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | $\frac{\text{Niños/as que han cumplido los 6 meses que son alimentados con lactancia materna} \times 100}{\text{Niños/as de 6 meses}}$ |
| <b>Fuente</b>  | OMI                                                                                                                                    |
| <b>Meta</b>    | ≥35%                                                                                                                                   |

| <b>2.5.1.4</b> | <b>Seguimiento del sobrepeso/obesidad en la infancia</b>                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | $\frac{\text{Niños/as entre las edades de 2 a 14 años con diagnóstico de sobrepeso/obesidad incluidos en el Programa de sobrepeso/ obesidad infantil en Atención Primaria} \times 100}{\text{Niños/as de 2 a 14 años con diagnóstico de sobrepeso/obesidad}}$ |
| <b>Fuente</b>  | OMI                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Meta</b>    | ≥25%                                                                                                                                                                                                                                                          |



| <b>2.5.1.5</b> | <b>Control de tensión arterial (TA) en los 6 primeros años de vida</b>                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Niños/as de 6 años que cuentan con al menos un registro en la historia clínica de TA x 100 / Niños/as de 6 años |
| <b>Fuente</b>  | OMI                                                                                                             |
| <b>Meta</b>    | ≥70%                                                                                                            |

| <b>2.5.1.6</b> | <b>Revisión de salud a los 11 años de edad. Programa de Atención al Niño y Adolescente (PANA)</b> |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Niños/as con la revisión de salud de los 11 años realizada x 100/ Niños/as de 11 años de edad     |
| <b>Fuente</b>  | OMI                                                                                               |
| <b>Meta</b>    | ≥50%                                                                                              |

## **2.5.2 Atención al puerperio.**

| <b>2.5.2.1</b> | <b>Visita puerperal en los 10 días siguientes al parto</b>                                                                                                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Mujeres que tienen registro de parto en OMI a las que se realiza anamnesis y exploración en la visita puerperal en los 10 días siguientes al parto x 100 / Mujeres que tienen registro de parto en OMI |
| <b>Fuente</b>  | OMI                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Meta</b>    | ≥60%                                                                                                                                                                                                   |

## **2.5.3 Atención a pacientes con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.**

| <b>2.5.3.1</b> | <b>Adecuación diagnóstica de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica ( EPOC)</b>                                                                                                                                                         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Pacientes mayores de 40 años con diagnóstico nuevo de EPOC en los últimos 12 meses con FEV1/FCV inferior a 0,7 en espirometría postbroncodilatación x 100 / Pacientes mayores de 40 años con diagnóstico de EPOC en los últimos 12 meses |
| <b>Fuente</b>  | OMI                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Meta</b>    | ≥80%                                                                                                                                                                                                                                     |



| 2.5.3.2        | Entrenamiento/Adiestramiento en terapia inhalatoria                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Pacientes mayores de 40 años diagnosticados de EPOC que han recibido adiestramiento en la técnica de inhaladores en los últimos 12 meses x 100 / Pacientes mayores de 40 años diagnosticados de EPOC |
| <b>Fuente</b>  | OMI                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Meta</b>    | ≥50%                                                                                                                                                                                                 |

| 2.5.3.3        | Vacunación frente a la gripe en EPOC                                                                                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Pacientes mayores de 40 años diagnosticados de EPOC que han sido vacunados contra la gripe en los últimos 12 meses x 100 / Pacientes mayores de 40 años diagnosticados de EPOC |
| <b>Fuente</b>  | OMI                                                                                                                                                                            |
| <b>Meta</b>    | ≥60%                                                                                                                                                                           |

| 2.5.3.4        | Prevalencia de tabaquismo en pacientes con EPOC                                                                                                                                   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Pacientes mayores de 40 años diagnosticados de EPOC con registro de consumo de tabaco positivo en los últimos 12 meses x 100/ Pacientes mayores de 40 años diagnosticados de EPOC |
| <b>Fuente</b>  | OMI                                                                                                                                                                               |
| <b>Meta</b>    | ≤10%                                                                                                                                                                              |

| 2.5.3.5        | Consejo de abandono del consumo de tabaco a fumadores con EPOC                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Pacientes mayores de 40 años diagnosticados de EPOC que refieren haber fumado en los últimos 12 meses y han recibido consejo para abandonar el consumo de tabaco x 100 / Pacientes mayores de 40 años diagnosticados de EPOC que refieren haber fumado en los últimos 12 meses |
| <b>Fuente</b>  | OMI                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Meta</b>    | ≥80%                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 2.5.3.6        | Seguimiento en Atención Primaria tras alta por EPOC                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Pacientes mayores de 40 años diagnosticados de EPOC, dados de alta, citados en consulta de Atención Primaria en los 4 días naturales posteriores al alta x100/ Pacientes mayores de 40 años dados de alta por EPOC |
| <b>Fuente</b>  | OMI, CMBD y SELENE                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Meta</b>    | ≥50%                                                                                                                                                                                                               |



## 2.5.4 Atención a pacientes con Diabetes Mellitus.

| 2.5.4.1 | Cribado factores de riesgo de Diabetes                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fórmula | Personas mayores de 45 años a las que se les ha realizado el test de Findrisk x 100/ Personas mayores de 45 años |
| Fuente  | OMI                                                                                                              |
| Meta    | ≥15%                                                                                                             |

| 2.5.4.2 | Determinación de hemoglobina glicosilada                                                                                                                                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fórmula | Pacientes mayores de 14 años con diagnóstico de Diabetes Mellitus que tienen una determinación de hemoglobina glicosilada en los últimos 12 meses x 100/ Pacientes mayores de 14 años con diagnóstico de Diabetes Mellitus |
| Fuente  | OMI                                                                                                                                                                                                                        |
| Meta    | ≥60%                                                                                                                                                                                                                       |

| 2.5.4.3 | Determinaciones de hemoglobina glicosilada con valores menores o iguales a 7%                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fórmula | Pacientes mayores de 14 y menores de 65 años diagnosticados de Diabetes Mellitus cuya última determinación de hemoglobina glicosilada, en los últimos 12 meses, muestra valores igual o inferiores al 7% x 100 / Pacientes mayores de 14 y menores de 65 años diagnosticados de Diabetes Mellitus |
| Fuente  | OMI                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Meta    | ≥50%                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## 2.5.5 Prevención de enfermedades cardiovasculares.

| 2.5.5.1 | Cribado de hábito tabáquico                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fórmula | Personas mayores de 14 años con registro en su historia clínica del hábito tabáquico en los últimos 24 meses x 100 / Personas mayores de 14 años |
| Fuente  | OMI                                                                                                                                              |
| Meta    | ≥25%                                                                                                                                             |

| 2.5.5.2 | Consejo antitabaco a personas fumadoras                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fórmula | Personas mayores de 14 años con registro en su historia clínica de tabaquismo a los que se le ha ofrecido consejo antitabaco en los últimos 24 meses x 100 / Personas fumadoras mayores de 14 años |
| Fuente  | OMI                                                                                                                                                                                                |
| Meta    | ≥65%                                                                                                                                                                                               |



| 2.5.5.3        | Control adecuado de Tensión Arterial en pacientes hipertensos                                                                                                                                                    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Pacientes mayores de 14 años diagnosticados de HTA con valores en el último control de TA diastólica <90 y TA sistólica <140, en los últimos 12 meses x 100 / Pacientes mayores de 14 años diagnosticadas de HTA |
| <b>Fuente</b>  | OMI                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Meta</b>    | ≥50%                                                                                                                                                                                                             |





### 3.1 Accesibilidad.

| <b>3.1.1</b>   | <b>Pacientes quirúrgicos con espera mayor de 365 días</b>                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Pacientes en lista de espera quirúrgica cuya espera estructural y no estructural es superior a los 365 días desde la fecha de inclusión |
| <b>Fuente</b>  | SELENE-PIN: Lista de espera quirúrgica (LEQ)                                                                                            |
| <b>Meta</b>    | 0                                                                                                                                       |

| <b>3.1.2</b>   | <b>Pacientes quirúrgicos, prioridad 1 con espera mayor de 30 días</b>                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Pacientes en lista de espera quirúrgica, P-1, cuya espera estructural es superior a los 30 días desde la fecha de inclusión |
| <b>Fuente</b>  | SELENE-PIN: Lista de espera quirúrgica (LEQ)                                                                                |
| <b>Meta</b>    | 0                                                                                                                           |

| <b>3.1.3</b>   | <b>Tiempo medio en lista de espera quirúrgica (LEQ)</b>                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Sumatorio (fecha final período de estudio – fecha entrada en registro) / Pacientes en el registro |
| <b>Fuente</b>  | PIN                                                                                               |
| <b>Meta</b>    | 65 días a final de año (acuerdo de pactos trimestrales)                                           |

| <b>3.1.4</b>   | <b>Pacientes en lista de espera quirúrgica con salida distinta a intervención quirúrgica</b>                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Pacientes en lista de espera quirúrgica cuyo motivo de salida de lista de espera quirúrgica es distinto a intervención quirúrgica x 100 / Salidas de lista de espera quirúrgica |
| <b>Fuente</b>  | SELENE-PIN: Lista de espera quirúrgica (LEQ)                                                                                                                                    |
| <b>Meta</b>    | ≤10%                                                                                                                                                                            |





## 4.1 Medicina Familiar y Comunitaria.

### 4.1.1 Eficiencia en la prestación farmacéutica.

| 4.1.1.1        | Importe por paciente ajustado por morbilidad y complejidad                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Desvío en el importe de los productos farmacéuticos prescritos mediante receta médica en médicos de Medicina Familiar y Comunitaria/ Paciente estratificado, respecto al valor del importe/paciente estratificado en el Servicio Murciano de Salud el año anterior |
| <b>Fuente</b>  | Estratificación poblacional años 2016/2017. AdN-Farmacia                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Meta</b>    | 325,29/≤ 0                                                                                                                                                                                                                                                         |

### 4.1.2 Calidad basada en la selección de medicamentos.

| 4.1.2.1        | Antibióticos de amplio espectro/espectro reducido                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Dosis Diarias Definidas (DDD) de antibióticos de amplio espectro / DDD antibióticos espectro reducido, prescritos en Atención Primaria |
| <b>Fuente</b>  | Datos disponibles por la DGAS (SGF) en el fichero Gestión de la Prestación Farmacéutica                                                |
| <b>Meta</b>    | ≤ 140                                                                                                                                  |

| 4.1.2.2        | Nuevos medicamentos sin aportación relevante (NMSAR)                                    |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | DDD de NMSAR prescritos x 100 /DDD total de medicamentos prescritos                     |
| <b>Fuente</b>  | Datos disponibles por la DGAS (SGF) en el fichero Gestión de la Prestación Farmacéutica |
| <b>Meta</b>    | ≤ 2%                                                                                    |

| 4.1.2.3        | Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA) respecto Bloqueadores del sistema renina angiotensina (BSRA) |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | DDD de IECA solos o asociados con tiazidas prescritos x 100 /DDD de IECA y ARA-II solos o asociados con tiazidas prescritos  |
| <b>Fuente</b>  | Datos disponibles por la DGAS (SGF) en el fichero Gestión de la Prestación Farmacéutica                                      |
| <b>Meta</b>    | ≥ 40%                                                                                                                        |

| 4.1.2.4        | Antihipertensivos de elección (AHT)                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | DDD de AHT recomendados x 100 / DDD total AHT<br>(*) Antihipertensivos de elección (solos y en asociación): atenolol, bisoprolol, carvedilol, metoprolol, hidroclorotiazida, amilorida, clortalidona, indapamida, captopril, enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril, trandolapril y amlodipina |
| <b>Fuente</b>  | Datos disponibles por la DGAS (SGF) en el fichero Gestión de la Prestación Farmacéutica                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Meta</b>    | ≥ 45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| 4.1.2.5        | Antiasmáticos de larga duración asociados a corticoides                                                                                            |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | DDD de B2-adrenérgicos de larga duración asociados a corticoides prescritos en Atención Primaria x 100 / DDD de antiasmáticos en Atención Primaria |
| <b>Fuente</b>  | Datos disponibles por la DGAS (SGF) en el fichero Gestión de la Prestación Farmacéutica                                                            |
| <b>Meta</b>    | ≤ 25%                                                                                                                                              |

| 4.1.2.6        | Hipolipemiantes de elección                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | DDD Simvastatina (C10AA01) + Pravastatina (C10AA03) + Atorvastatina (C10AA05) + Colestiramina (C10AC01) + Gemfibrozilo (C10AB04) + Fenofibrato (C10AB05) x 100 / DDD Agentes modificadores de lípidos (C10) |
| <b>Fuente</b>  | Datos disponibles por la DGAS (SGF) en el fichero Gestión de la Prestación Farmacéutica                                                                                                                     |
| <b>Meta</b>    | ≥ 75%                                                                                                                                                                                                       |

| 4.1.2.7        | Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) de elección                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | DDD Fluoxetina (N06AB03) + Citalopram (N06AB04) + Paroxetina (N06AB05) + Sertralina (N06AB06) x 100 / DDD Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (N06AB) |
| <b>Fuente</b>  | Datos disponibles por la DGAS (SGF) en el fichero Gestión de la Prestación Farmacéutica                                                                                  |
| <b>Meta</b>    | ≥ 70%                                                                                                                                                                    |

| 4.1.2.8        | Anticoagulantes AVK en el Área                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | DDD de acenocumarol y warfarina prescritos en el área x 100 / DDD anticoagulantes orales  |
| <b>Fuente</b>  | Datos disponibles por la DGAS (SGF) en el fichero "Gestión de la Prestación Farmacéutica" |
| <b>Meta</b>    | ≥ 65%                                                                                     |

#### 4.1.3 Calidad basada en el volumen de exposición de la población a medicamentos.

| 4.1.3.1        | Antibióticos sistémicos                                                                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Dosis Diarias Definidas x 1.000 habitantes y día (DHD), de antibióticos sistémicos (grupo J01) prescritos en atención primaria |
| <b>Fuente</b>  | Datos disponibles por la DGAS (SGF) en el fichero Gestión de la Prestación Farmacéutica                                        |
| <b>Meta</b>    | ≤ 20                                                                                                                           |



| 4.1.3.2        | Inhibidores de la bomba de protones                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Dosis Diarias Definidas por 1.000 habitantes y día (DHD) de inhibidores de la bomba de protones (A02BC) |
| <b>Fuente</b>  | Datos disponibles por la DGAS (SGF) en el fichero Gestión de la Prestación Farmacéutica                 |
| <b>Meta</b>    | ≤ 150                                                                                                   |

| 4.1.3.3        | Antiinflamatorios no esteroides (AINE)                                                  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Dosis Diarias Definidas por 1.000 habitantes y día (DHD) de AINE (M01A)                 |
| <b>Fuente</b>  | Datos disponibles por la DGAS (SGF) en el fichero Gestión de la Prestación Farmacéutica |
| <b>Meta</b>    | ≤ 60                                                                                    |

| 4.1.3.4        | Benzodiacepinas (ansiolíticos)                                                          |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Dosis Diarias Definidas por 1.000 habitantes y día (DHD) de benzodiacepinas (N05BA)     |
| <b>Fuente</b>  | Datos disponibles por la DGAS (SGF) en el fichero Gestión de la Prestación Farmacéutica |
| <b>Meta</b>    | ≤ 50                                                                                    |

| 4.1.3.5        | SYSADOA (Symptomatic Slow Action Drugs for Osteoarthritis)                                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Dosis Diarias Definidas por 1.000 habitantes y día (DHD) de SYSDOA (Glucosamina, Diacereina, Condroitin sulfato y asociaciones) |
| <b>Fuente</b>  | Datos disponibles por la DGAS (SGF) en el fichero Gestión de la Prestación Farmacéutica                                         |
| <b>Meta</b>    | ≤ 15                                                                                                                            |

| 4.1.3.6        | Fentanilo transmucoso (acción ultrarrápida)                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Dosis Diarias Definidas por 1.000 habitantes y día (DHD), de fentanilo transmucoso      |
| <b>Fuente</b>  | Datos disponibles por la DGAS (SGF) en el fichero Gestión de la Prestación Farmacéutica |
| <b>Meta</b>    | ≤ 0,5                                                                                   |



|                |                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.1.3.8</b> | <b>Pacientes con 4 envases o más de Fentanilo transmucoso/mes</b>                                  |
| <b>Fórmula</b> | Pacientes tratados con más de 4 envases de fentanilo transmucoso al mes x 100 / Pacientes tratados |
| <b>Fuente</b>  | Datos disponibles por la DGAS (SGF) en el fichero Gestión de la Prestación Farmacéutica            |
| <b>Meta</b>    | ≤ 10%                                                                                              |



## 4.2 Pediatría de Atención Primaria.

### 4.2.1 Calidad Basada en la selección de medicamentos.

| 4.2.1.1        | Amoxicilina-clavulánico                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | DDD de amoxicilina-clavulánico prescrito en Pediatría x 100 /DDD de penicilinas prescritas en Pediatría |
| <b>Fuente</b>  | Datos disponibles por la DGAS (SGF) en el fichero Gestión de la Prestación Farmacéutica                 |
| <b>Meta</b>    | ≤ 50%                                                                                                   |

| 4.2.1.2        | Macrólidos                                                                                         |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | DDD de macrólidos prescrito en Pediatría x 100 /DDD antibióticos sistémicos prescrito en Pediatría |
| <b>Fuente</b>  | Datos disponibles por la DGAS (SGF) en el fichero Gestión de la Prestación Farmacéutica            |
| <b>Meta</b>    | ≤10%                                                                                               |

| 4.2.1.3        | Antagonistas receptores leucotrienos (antiasmáticos)                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | DDD de antagonistas de receptores de leucotrienos prescritos en Pediatría x 100 / DDD de antiasmáticos prescritos en Pediatría |
| <b>Fuente</b>  | Datos disponibles por la DGAS (SGF) en el fichero Gestión de la Prestación Farmacéutica                                        |
| <b>Meta</b>    | ≤14%                                                                                                                           |

### 4.2.2 Calidad basada en el volumen de exposición de la población a medicamentos.

| 4.2.2.1        | Antibióticos sistémicos en menores de 3 años                                                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fórmula</b> | Dosis Diarias Definidas x 1.000 habitantes menores de tres años y día (DHD), de antibióticos sistémicos (grupo J01) prescritos en menores de tres años |
| <b>Fuente</b>  | Datos disponibles por la DGAS (SGF) en el fichero Gestión de la Prestación Farmacéutica                                                                |
| <b>Meta</b>    | ≤ 15                                                                                                                                                   |



### 4.3 Salud Mental.

|                |                                                                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.3.1</b>   | <b>Antipsicóticos depot en el área</b>                                                                            |
| <b>Fórmula</b> | Dosis Diarias Definidas x 1.000 habitantes y día (DHD), de antipsicóticos depot en el área de salud de referencia |
| <b>Fuente</b>  | Datos disponibles por la DGAS (SGF) en el fichero Gestión de la Prestación Farmacéutica                           |
| <b>Meta</b>    | ≤5                                                                                                                |

|                |                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.3.2</b>   | <b>Pacientes con Paliperidona depot a dosis mayores a la recomendación máxima (5 mg/paciente/día) en el Área de Salud</b> |
| <b>Fórmula</b> | Pacientes con dosis mayores a la dosis máxima x 100/Total pacientes tratados con paliperidona depot                       |
| <b>Fuente</b>  | Datos disponibles por la DGAS (SGF) en el fichero Gestión de la Prestación Farmacéutica                                   |
| <b>Meta</b>    | ≤ 20%                                                                                                                     |

### 4.4 Especialidades hospitalarias.

#### 4.4.1 Selección de medicamentos en patologías de alto impacto en el hospital.

|                |                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.4.1.1</b> | <b>Desviación en el coste/paciente en patologías de alto impacto</b>                                                                                                                                                                |
| <b>Fórmula</b> | (Coste por paciente Hospital – Coste por paciente promedio SMS) / Desviación Estándar<br>En: VIH, ARTRITIS REUMATOIDE, ESCLEROSIS MÚLTIPLE, CROHN, PSORIASIS, MIELOMA MÚLTIPLE, ASMA MEDIADA POR IgE Y URTICARIA CRÓNICA ESPONTÁNEA |
| <b>Fuente</b>  | Datos disponibles por la DGAS (SGF) en el fichero Gestión de la Prestación Farmacéutica                                                                                                                                             |
| <b>Meta</b>    | ≤ 1 Desviación Estándar                                                                                                                                                                                                             |

|                |                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4.4.1.2</b> | <b>Estudios de variabilidad en el uso de medicamentos</b>                                                                                                                            |
| <b>Fórmula</b> | Número de patologías de las incluidas en el SIAE de Farmacia Hospitalaria, sobre las que se realiza el análisis y actuaciones para evitar la variabilidad en el uso de medicamentos. |
| <b>Fuente</b>  | Documento facilitado por la Gerencia                                                                                                                                                 |
| <b>Meta</b>    | 2 estudio                                                                                                                                                                            |