



INFORME DE LA SITUACIÓN DEL CONSUMO DE TABACO EN LA REGIÓN DE MURCIA

Encuesta Europea de Salud 2014

La **Encuesta Europea de Salud en España (EES)** es una investigación periódica, realizada por Instituto Nacional de Estadística y que se corresponde con la parte española del European Health Interview Survey. Tiene como finalidad proporcionar información sobre el estado de salud de la población española de una manera comparable a nivel europeo. La encuesta incorpora información sobre el estado de salud y discapacidad, el grado de acceso y utilización de los servicios sanitarios, los factores determinantes de la salud, los hábitos de vida y las características del medio ambiente físico y social.

Principales resultados sobre tabaquismo:

- 1) La prevalencia de personas fumadoras en la Región de Murcia, se situó en 28,4% (25,6% consumo diario y 2,9% consumo ocasional), 3 puntos superior a la media en España que se sitúa en 25,4% (23% consumo diario y 2,4% consumo ocasional). Se estima que en la Región de Murcia 340.000 personas son fumadoras.
- 2) Un 50% de la población se declara como no fumadora, similar a la media española (49%), mientras que el porcentaje de personas exfumadoras se situó en el 21,6%, cifra claramente inferior a la media nacional (25,7%).
- 3) Entre los hombres de la Región, la prevalencia de tabaquismo activo (consumo diario y esporádico) fue del 30,6%, y en las mujeres fue del 26,4%. La tabla que sigue muestra estos resultados y su comparación con las medias nacionales.

Consumo de tabaco en la Región de Murcia.

Distribución por sexo. EES 2014.

	Fumador diario	Fumador ocasional	Exfumador	No fumador
España				
Hombres	27,57	2,86	32,21	37,36
Mujeres	18,6	1,9	19,51	59,99
Total	22,98	2,37	25,7	48,95
Región de Murcia				
Hombres	27,69	2,86	29,3	40,15
Mujeres	23,45	2,9	13,96	59,69
Total	25,56	2,88	21,6	49,96

Fuente: INE



Evolución entre las EES de los años 2009 y 2014:

En el quinquenio transcurrido entre las dos últimas EES se pueden observar los siguientes puntos:

- 1) Tanto en la Región de Murcia como para la media nacional, se identifica un descenso en la porcentaje de **población** que se declara **fumadora**, que incluye el consumo diario y el esporádico, con un descenso del 3,3% en Murcia y del 4,5% a nivel de España.
- 2) El descenso observado en la Región de Murcia se distribuye de forma desigual entre ambos sexos. El descenso es superior en el caso de los hombres, especialmente en nuestra Comunidad Autónoma donde ha disminuido el consumo en casi 9 puntos frente a 5 puntos de la media española. Sin embargo en las mujeres detectamos una tendencia diferente. A nivel nacional se identifica una disminución del consumo, no así en la Región de Murcia donde se observa un ligero incremento en el número de consumidoras de tabaco, que pasa del 23,9% al 26,4%.

Prevalencia de fumadores activos. EESE.			
Años	2009	2014	
	%	%	Diferencia
Total			
España	29,9	25,4	-4,5
Murcia	31,8	28,4	-3,3
Hombres			
España	35,3	30,4	-4,9
Murcia	39,3	30,6	-8,8
Mujeres			
España	24,6	20,5	-4,1
Murcia	23,9	26,4	2,5

EES: Encuesta Europea de Salud en España. INE.

- 3) En cuanto al **estatus de exfumador**, mientras que en la media española se ha observado un aumento en el número de personas que se declaran como exfumadoras, que pasa del 20,4 al 25,7%, entre ambos periodos estudiados, en la Región de Murcia se observa un ligero descenso de exfumadores que pasa del 23,9 al 21,6%. Este hecho ocurre tanto en hombres como en mujeres.



Prevalencia de exfumadores. EES.

Años	2009	2014	
	%	%	Diferencia
Total			
España	20,4	25,7	5,3
Murcia	23,9	21,6	-2,3
Hombres			
España	26,3	32,2	6,0
Murcia	30,4	29,3	-1,1
Mujeres			
España	14,7	19,5	4,8
Murcia	17,1	14,0	-3,1

EES: Encuesta Europea de Salud en España. INE.


La tabla y figura que siguen muestran la evolución desde el año 2003 hasta el año 2014 de la prevalencia de tabaquismo activo (consumo diario y esporádico u ocasional) con datos de la EES y la Encuesta Nacional de Salud (ENS).

Prevalencia de tabaquismo activo en Murcia y España. 2003 - 2014

	2003	2006	2009*	2012	2014*
	%	%	%	%	%
Murcia	32,3	33,9	31,8	31,0	28,4
España	31,0	29,5	29,9	27,0	25,4

Fuente: INE: Encuesta Nacional de Salud (ENS) y *Encuesta Europea de Salud (EES)

Tanto en España como en la Región de Murcia, parece observarse una tendencia decreciente en la **prevalencia de personas fumadoras activas** a lo largo del tiempo. No obstante, tal y como muestra la figura siguiente, para el caso de la Región de Murcia este descenso no se da por igual entre hombres y mujeres.






Por tanto, el descenso en la frecuencia de fumadores activos que se observa en la población de la Región de Murcia, parece ser explicado a una mayor **proporción de no consumidores**, sobre todo entre los hombres, como muestra la evolución de la proporción de personas no fumadoras, tanto en los resultados de la EES, como la evolución observada desde el año 2003.

Prevalencia de no fumadores. EES.			
Años	2009	2014	
	%	%	Diferencia
Total			
España	49,7	49,0	-0,8
Murcia	44,4	50,0	5,6
Hombres			
España	38,4	37,4	-1,1
Murcia	30,3	40,2	9,9
Mujeres			
España	60,7	60,0	-0,7
Murcia	59,1	59,7	0,6

EES: Encuesta Europea de Salud en España.



Fuente: INE: Encuesta Nacional de Salud (ENS) y *Encuesta Europea de Salud (EES)



Exposición al humo ambiental de tabaco:

1. Un 16,9% de la población murciana refiere estar en espacios cerrados con humo ambiental de tabaco, siendo superior este porcentaje en el caso de los hombres (19,5%) respecto a las mujeres (14,4%). Esta exposición es ligeramente superior a la identificada a nivel nacional, especialmente en el caso de los hombres y no así en el caso de las mujeres.
2. Los datos de exposición al humo de tabaco observados en la encuesta realizada en el año 2009 eran superiores en el entorno laboral, no así en el hogar. No se puede hacer una comparación directa de la exposición al humo de tabaco en este periodo al no discriminar la actual encuesta la exposición al humo de tabaco por entornos.

Prevalencia exposición al humo de tabaco. EES.			
Años	2009		2014*
	Hogar %	Laboral %	Espacio cerrados %
Ambos sexos			
Total	11,4	24,5	15,4
Murcia	16,2	27,8	16,9
Hombres			
Total	13,5	24,3	16,2
Murcia	13,8	29,0	19,5
Mujeres			
Total	8,7	24,8	14,7
Murcia	20,1	26,7	14,4

EES: Encuesta Europea de Salud en España

* No se diferenció entre exposición laboral y no laboral.