

1. **En la valoración de la función auditiva, debemos de tener en cuenta:**
 - A) Un 5% de la población infantil y juvenil presenta un déficit auditivo, del cual el 80% son congénitos y un 20% son adquiridos.
 - B) En la hipoacusia neurosensorial congénita (HNSC) la edad de diagnóstico se sitúa en torno a los 6 años.
 - C) Entre las pruebas subjetivas para la detección de la (HNSC), en la etapa preescolar frotaremos nuestros dedos con los pulgares, sin chasquear, detrás de la oreja del niño.
 - D) Todas son correctas.
2. **¿Qué tumor provoca más metástasis blásticas?:**
 - A) De mama.
 - B) De pulmón.
 - C) De próstata.
 - D) Mieloma.
3. **Ante una dispepsia funcional con predominio de dolor epigástrico recomendaremos iniciar el tratamiento con:**
 - A) IBP.
 - B) Anti-H2.
 - C) Antiácidos.
 - D) Procinéticos.
4. **¿Qué podemos apreciar comparando un genograma actual y uno de hace 10 años?:**
 - A) No sirve para ver la evolución en las pautas de relación de una generación a otra.
 - B) Puede usarse para ver la complejidad o simplicidad del patrón familiar.
 - C) Puede percibirse la situación biomédica, pero no la biopsicosocial del caso.
 - D) No es posible apreciar el ciclo vital familiar.
5. **Está contraindicado usar betabloqueantes como tratamiento en pacientes hipertensos que tengan además una de las siguientes circunstancias acompañantes, excepto:**
 - A) Bloqueo auriculoventricular de 2º grado.
 - B) Asma bronquial.
 - C) Enfermedad del nodo sinusal.
 - D) Insuficiencia cardíaca.
6. **El factor común de la EPOC es:**
 - A) Tos y expectoración persistente.
 - B) Disnea de esfuerzo.
 - C) Obstrucción crónica del flujo aéreo.
 - D) Todas las anteriores son ciertas.
7. **¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos tiene la mejor relación coste/efectividad?:**
 - A) La anticoncepción oral.
 - B) Los métodos de barrera.
 - C) El coitus interruptus.
 - D) Los de larga duración (DIU e implante).
8. **¿Cuál de las siguientes descripciones NO es sinónima de la expresión “resultado estadísticamente significativo”?:**
 - A) Se acepta la hipótesis alternativa de que existe diferencia.
 - B) El resultado observado no es compatible con la hipótesis nula.
 - C) Se acepta la hipótesis nula de que no existe diferencia.
 - D) Existe suficiente evidencia para dudar de que la hipótesis nula sea cierta.

9. **¿Cuáles de las siguientes articulaciones no suelen estar afectadas en la artritis reumatoide?:**
 A) Las interfalángicas distales.
 B) Las metatarsfalángica.
 C) Las interfalángicas proximales.
 D) Las metacarpofalángicas. 270
10. **Señale cuál no es un factor que se relaciona con la aparición de la EPOC:**
 A) Mala alimentación.
 B) Hábito tabáquico.
 C) Factores genéticos.
 D) Infecciones. 408
11. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, NO es correcta?:**
 A) El sistema atenderá de forma equitativa a todos los ciudadanos en situación de dependencia.
 B) El sistema no garantizará la participación de las entidades que representan a las personas con dependencia y sus familias en sus órganos consultivos.
 C) Los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación de las mismas según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal.
 D) La financiación vendrá determinada por el número de personas en situación de dependencia y de los servicios y prestaciones previstos en esta Ley. 112
12. **Según el Estatuto Marco, las sanciones impuestas por faltas leves prescribirán:**
 A) Al mes.
 B) A los tres meses.
 C) A los seis meses.
 D) Al año. 019
13. **En un paciente con abdomen agudo, el signo de Murphy positivo significa:**
 A) Dolor reborde hepático en la zona de la vesícula biliar.
 B) Dolor en fosa iliaca derecha en la zona del apéndice.
 C) Dolor en fosa iliaca izquierda por diverticulitis aguda.
 D) Dolor en epigastrio en la zona gástrica. 243
14. **En relación con la vigilancia sanitaria del agua de consumo, se exige a nivel nacional:**
 A) El agua de consumo humano debe estar libre de *E. coli*, Enterococos, *Clostridium perfringens* (incluidas esporas) y colifagos.
 B) Existen unos valores paramétricos para una lista de sustancias químicas que pueden afectar a la salud humana que no se han de superar.
 C) El agua de consumo humano debe tener unos índices de radiactividad por debajo de un umbral (dosis indicativa).
 D) Todo lo anterior es correcto. 161
15. **¿Cuál de los siguientes consultorios no pertenece a la Zona a Básica de Salud Lorca/San Diego?:**
 A) Consejero.
 B) Almendricos.
 C) La Hoya.
 D) Marchena. 336
16. **Debido a la alteración de la relación ventilación-perfusión que sufren los pacientes con bronquitis crónica se produce hipoxemia e hipercapnia, que conduce a:**
 A) Coloración azul abotargado.
 B) Coloración rosada y sopladores.
 C) Disminución del perímetro torácico.
 D) Destrucción de paredes alveolares. 409

17. **Respecto a las recomendaciones de Prevención del Cáncer. Actualización PAPPS 2022, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) En las mujeres asintomáticas sin factores de riesgo de cáncer de endometrio conocidos no se debe recomendar el cribado de cáncer de endometrio.
 - B) En las mujeres con riesgo medio de cáncer de ovario no se debe recomendar el cribado de cáncer de ovario.
 - C) En población con riesgo medio de cáncer de páncreas no se debe recomendar cribado de cáncer de páncreas.
 - D) La radiografía de tórax o la citología de esputo se deben recomendar como pruebas de cribado del cáncer de pulmón.
18. **Entre los criterios diagnósticos de enfermedad renal crónica propuestos por las guías K-DIGO 2022, NO figuran:**
- A) Cociente albúmina creatinina >30 ml/min.
 - B) Descenso del filtrado glomerular <60 ml/minuto mantenido al menos un mes.
 - C) Alteraciones estructurales del riñón detectadas por técnicas de imagen.
 - D) Historia de trasplante renal.
19. **¿Cuál de los siguientes antibióticos es de elección en una otitis externa aguda producida por *Pseudomona aeruginosa*?:**
- A) Amoxicilina.
 - B) Azitromicina.
 - C) Ciprofloxacino.
 - D) Cloxacilina.
20. **En un paciente con glaucoma no debemos utilizar uno de estos medicamentos en colirio:**
- A) Atropina.
 - B) Pilocarpina.
 - C) Timolol.
 - D) Latanoprost.
21. **Los siguientes puntos son indicadores de calidad en una reunión excepto uno:**
- A) Es importante ser puntuales.
 - B) Es recomendable tomar decisiones por consenso.
 - C) Es necesario realizar un acta de la reunión, con anotación ordenada de los acuerdos remitiéndola exclusivamente al coordinador del centro.
 - D) Se resumen y revisan los acuerdos tomados, las responsabilidades y las actividades asignadas.
22. **A los efectos de la prestación económica por riesgo durante el embarazo, señale la opción falsa:**
- A) La prestación correspondiente a la situación de riesgo durante el embarazo tendrá la naturaleza de prestación derivada de contingencias comunes.
 - B) La prestación económica nacerá el día en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo.
 - C) Finalizará el día anterior a aquél en que se inicie la suspensión del contrato de trabajo por maternidad o el de reincorporación de la mujer trabajadora a su puesto de trabajo anterior o a otro compatible con su estado.
 - D) La prestación económica consistirá en subsidio equivalente al 100 por 100 de la base reguladora correspondiente.
23. **El personal estatutario de los servicios de salud viene obligado a:**
- A) Cumplir las normas relativas a la seguridad y salud en el trabajo, así como las disposiciones adoptadas en el centro sanitario en relación con esta materia.
 - B) Prestar colaboración profesional cuando así sea requerido por las autoridades como consecuencia de la adopción de medidas especiales por razones de urgencia o necesidad.
 - C) Ser identificado por su nombre y categoría profesional por los usuarios del Sistema Nacional de Salud.
 - D) Todas las respuestas son correctas.

24. **Paciente joven con disfonía y formaciones pequeñas, redondas, agrupadas, de coloración clara, múltiples, en laringe, que recidivan tras su extirpación. De los siguientes, ¿cuál sería el diagnóstico más probable?:**
- A) Tuberculosis laríngea.
 - B) Papilomatosis laríngea por virus del papiloma humano.
 - C) Infección por el virus de Epstein-Barr.
 - D) Sarcoidosis.
25. **Indique qué betabloqueante adrenérgico NO ha demostrado reducir la morbilidad asociada a la insuficiencia cardíaca:**
- A) Carvedilol.
 - B) Atenolol.
 - C) Bisoprolol.
 - D) Metoprolol.
26. **En relación con el trabajo en equipo, señale la afirmación INCORRECTA:**
- A) El paciente tiene mayores probabilidades de ser mejor atendido.
 - B) Facilita y potencia el desarrollo de algunas actividades concretas difícilmente asumibles de forma efectiva desde una perspectiva individual.
 - C) La consecución de objetivos por el conjunto es menor que la simple suma de las aportaciones individuales.
 - D) Hay más oportunidades para una mejor utilización de determinadas técnicas complejas o poco habituales.
27. **Respecto a la finalidad de la evaluación inicial del paciente hipertenso, señale la afirmación correcta más relevante:**
- A) Valorar el cumplimiento terapéutico.
 - B) Diagnosticar una HTA secundaria.
 - C) Conocer la presencia de factores estresantes.
 - D) Establecer un perfil de riesgo cardiovascular.
28. **¿Cuál de los siguientes fármacos puede inducir rinitis?:**
- A) Anticonceptivos orales.
 - B) IECAS.
 - C) Aspirina.
 - D) Todos ellos pueden inducirla.
29. **No es una actividad preventiva prioritaria por la evidencia científica y la factibilidad:**
- A) Una determinación de colesterol antes de los 35 años (hombres) y de los 40 (mujeres).
 - B) Citología de Papanicolaou cada 3-5 años desde los 25 hasta los 65 años (las dos primeras con un intervalo anual).
 - C) Asegurar la primovacunación antitetánica completa con tres dosis. Dosis de recuerdo cada 10 años hasta completar cinco dosis.
 - D) Seguimiento riguroso de los pólipos colorrectales.
30. **En relación con la epidemiología de la fibromialgia, señale la afirmación incorrecta:**
- A) Predomina en el sexo femenino.
 - B) La frecuencia en la comunidad es de un 2-4%.
 - C) Es más prevalente en la etnia negra.
 - D) Se asocia con la depresión mayor.

205

448

322

450

424

156

261

31. **En el vértigo posicional paroxístico, solo una de las siguientes es cierta:**
 A) Dura 30 minutos o más.
 B) Se acompaña de hipoacusia y acúfenos.
 C) La maniobra de Epley no sirve para su tratamiento.
 D) Duración de 5-20 segundos.
32. **La longitudinalidad es una característica fundamental de Atención Primaria de Salud que la diferencia de las otras especialidades clínicas. Señale la opción FALSA:**
 A) Se establece una relación de confianza entre profesional y paciente que favorece una comunicación efectiva.
 B) Conocimiento en profundidad, por parte del profesional de la historia clínica y contexto familiar y psicosocial del paciente.
 C) Reducción de ingresos innecesarios.
 D) Aumento de consultas a servicios de urgencias.
33. **¿Qué tipo de patología es la más frecuente que podemos observar en pacientes inmigrantes?:**
 A) Patología de las vías respiratorias.
 B) Dermatitis variadas.
 C) La ocasionada por problemas psicosociales.
 D) Absentismo laboral.
34. **En un paciente diabético con insuficiencia cardiaca, ¿qué fármaco NO recomendaría?:**
 A) Pioglitazona.
 B) Gliclazida.
 C) Dapaglifozina.
 D) Sitagliptina.
35. **En un paciente con índice de masa corporal elevado y síndrome de apnea obstructiva del sueño:**
 A) La pérdida de peso debe ser la primera recomendación terapéutica.
 B) La pérdida de peso es innecesaria en la mayoría de los casos.
 C) El único tratamiento es la administración de presión positiva continua a través de una máscara nasal.
 D) A pesar de aplicarse el tratamiento, no hay ningún parámetro clínico que nos permita valorar la mejoría.
36. **¿Quién aprueba la oferta de empleo público para el personal estatutario del Servicio Murciano de Salud?:**
 A) La Asamblea Regional.
 B) El Consejo de Gobierno.
 C) La Consejería de Sanidad.
 D) El Consejo de Administración del Servicio Murciano de Salud.
37. **Paciente con insuficiencia renal avanzada, con filtrado glomerular menor de 30, que precisa tratamiento para osteoporosis. ¿Cuál de los siguientes medicamentos sería de elección?:**
 A) Ácido alendrónico.
 B) Ácido risedrónico.
 C) Ácido etidrónico.
 D) Denosumab.

208

308

140

109

434

018

254

38. En lo referente a los métodos anticonceptivos de urgencia, ¿cuál de estas afirmaciones es INCORRECTA?:
- A) El DIU de cobre puede ponerse hasta 8 días postcoito sin protección.
 - B) La píldora de levonorgestrel se da en dosis única de 1,5 mg.
 - C) El acetato de ulipristal se utiliza en dosis oral única.
 - D) La pauta clásica de etinilestradiol 0,1 mg combinada con levonorgestrel 0,5 mg, dos dosis cada 12h, se halla en desuso.
39. Respecto a las recomendaciones del PAPPS sobre hipertensión arterial (PAPPS 2022), señale la respuesta INCORRECTA:
- A) La prueba inicial de cribado de hipertensión arterial es la toma de la presión arterial en la consulta.
 - B) Los diuréticos, antagonistas del calcio, IECA, ARA II y betabloqueantes son los fármacos de elección para iniciar el tratamiento farmacológico.
 - C) La asociación IECA con ARAII (o con inhibidores de renina), y la de bloqueadores beta con antagonistas del calcio no dihidropiridínicos no está contraindicada.
 - D) Los IECA y ARAII son fármacos de elección en el diabético con o sin nefropatía.
40. Mujer de 60 años con lesiones de herpes zoster en oído externo, otalgia, hipoacusia, vértigo y parálisis facial periférica. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable?:
- A) Parálisis facial "a frigori".
 - B) Síndrome de Ménière.
 - C) Síndrome de Cogan.
 - D) Síndrome de Ramsay-Hunt.
41. Dentro de las medidas de prevención de la EPOC, encontramos:
- A) Abandono del hábito tabáquico.
 - B) Tratar las bronquitis agudas y alteraciones de vías respiratorias altas.
 - C) Administración de vacunas antigripales y antineumocócica.
 - D) Todas son correctas.
42. En un paciente con enfermedad avanzada, ¿cuál de los siguientes fármacos NO es recomendable administrarlo por vía subcutánea?:
- A) Haloperidol.
 - B) Diazepam.
 - C) Cloruro mórfico.
 - D) Midazolam.
43. Respecto al tratamiento de la EPOC, las medidas terapéuticas irán encaminadas a:
- A) Disminuir la sintomatología.
 - B) Prevenir las agudizaciones.
 - C) Aumentar la tolerancia al esfuerzo.
 - D) Todas son correctas.
44. ¿Cuál de las siguientes vitaminas no es liposoluble?:
- A) A.
 - B) C.
 - C) D.
 - D) E.
45. Siguiendo el modelo piramidal para encontrar evidencia propuesto por Alper y Haynes, ¿cuál sería el recurso menos eficiente para la práctica clínica diaria?:
- A) Revisiones sistemáticas.
 - B) Recomendaciones basadas en la evidencia.
 - C) Estudios primarios.
 - D) Resúmenes sintetizados para la práctica clínica.

46. **¿Cuál de los siguientes NO es un criterio diagnóstico de hipercolesterolemia familiar?:**
A) Existencia de arco corneal.
B) Colesterol LDL superior a 330 mg/dl.
C) Xantelasmas.
D) Antecedentes familiares de primer grado de cardiopatía isquémica precoz.
47. **¿Cuál es la tríada clásica de sintomatología que puede indicar un carcinoma de células renales?:**
A) Dolor en fosa renal, hematuria microscópica y masa renal palpable.
B) Dolor en fosa renal, hematuria macroscópica y masa abdominal palpable.
C) Dolor lumbar irradiado a genitales, hematuria macroscópica y masa renal palpable.
D) Dolor lumbar irradiado a genitales, hematuria macroscópica y vómitos.
48. **¿Qué es imprescindible para la elaboración de guías de práctica clínica?:**
A) Que tengamos la aprobación por parte de la Gerencia del Área.
B) Disponibilidad de evidencia científica.
C) Que sea una patología que consuma muchos recursos.
D) Que venga avalada por la industria farmacéutica.
49. **La principal medida preventiva en el tratamiento de la EPOC es:**
A) Eliminar secreciones.
B) Eliminar tabaco.
C) Administrar broncodilatadores.
D) Administrar corticoides.
50. **¿Cuál de las siguientes NO es una indicación de primera elección de un bloqueante de los canales del calcio en un paciente hipertenso?:**
A) Pacientes ancianos.
B) Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida descompensada.
C) Angina de pecho.
D) Arteriopatía periférica.
51. **Un paciente de 64 años tras sufrir un infarto de miocardio presenta en la ecocardiografía una fracción de eyección del 35% y clínicamente presenta una disnea con esfuerzos moderados, indique el tratamiento que estaría desaconsejado:**
A) Betabloqueantes.
B) Diltiazem.
C) Inhibidores del enzima de conversión de la angiotensina.
D) Espironolactona si persiste sintomático pese al tratamiento previo con IECAS y betabloqueantes.
52. **Según el artículo 8 de la LO 3/2007, todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad constituye:**
A) Acoso sexual.
B) Acoso por razón de sexo.
C) Discriminación directa por razón de sexo.
D) Discriminación indirecta por razón de sexo.
53. **En el tratamiento de la diabetes 2, ¿qué medicamento produce aumento de peso?:**
A) Canaglifozina.
B) Sitagliptina.
C) Metformina.
D) Glicazida.

54. **Las siguientes son habilidades en la entrevista motivacional excepto una:**
 A) Escuchar de manera empática y validar al paciente.
 B) Detectar y trabajar las resistencias.
 C) Dar apoyo al sentido de autoeficacia.
 D) Evitar la discrepancia (ambivalencia) del paciente.
55. **Indique la norma que crea la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria en España:**
 A) Real Decreto 1753/1998, de 31 de julio.
 B) Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias.
 C) La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
 D) Real Decreto 2015/1978, de 15 de julio.
56. **¿En cuál de las siguientes situaciones está indicada la gastroprotección?:**
 A) Paciente de 86 años asintomático con antecedentes de HTA y artrosis generalizada, en tratamiento con amlodipino y paracetamol, 1 gramo cada 8 horas.
 B) Paciente de 48 años, sin antecedentes de interés, que está en tratamiento con ibuprofeno (600 mg/8h durante 5 días) por un traumatismo leve en la muñeca derecha.
 C) Paciente de 72 años con antecedentes de hipertensión, diabetes, dislipemia, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular anticoagulada y artritis reumatoide tratada con naproxeno.
 D) Paciente de 35 años en tratamiento ocasional con naproxeno por cefaleas migrañosas.
57. **¿Qué factores hacen vulnerable a un adulto para que pueda desencadenar una patología psiquiátrica?:**
 A) Desempleo.
 B) Ausencia de niños en el hogar.
 C) Alto nivel de autoestima.
 D) Situación socioeconómica estable.
58. **Tener un riesgo cardiovascular moderado según la tabla calibrada del REGICOR para mujeres diabéticas supone:**
 A) Una probabilidad de sufrir un acontecimiento coronario de entre un 5% y un 9% en los próximos 5 años.
 B) Una probabilidad de sufrir muerte por enfermedad cardiovascular de entre un 5% y un 9% en los próximos 5 años.
 C) Una probabilidad de sufrir muerte por enfermedad cardiovascular de entre un 1% y un 4% en los próximos 10 años.
 D) Una probabilidad de sufrir un acontecimiento coronario de entre un 5% y un 9% en los próximos 10 años.
59. **Epistaxis de repetición unilaterales o bilaterales, en paciente de 50 años con formaciones angiomas azules pequeñas y múltiples en mucosa nasal. ¿Cuál sería la etiología más probable?:**
 A) Déficit de factor V Leyden.
 B) Enfermedad de Rendu-Osler-Weber.
 C) Granulomatosis de Wegener.
 D) Hemofilia.
60. **Según el artículo 3 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, los medios y actuaciones del sistema sanitario estarán orientados prioritariamente:**
 A) A la promoción de la salud.
 B) A y C son correctas.
 C) A la prevención de las enfermedades.
 D) A y C son incorrectas.

61. **En el objetivo general de la estrategia para el abordaje de la cronicidad en el Sistema Nacional de Salud, NO se establece:**
- A) Disminuir la prevalencia de las condiciones de salud y limitaciones en la actividad de carácter crónico.
 - B) Reducir la mortalidad prematura de las personas que ya presentan alguna condición de cronicidad.
 - C) Promover el deterioro de la capacidad funcional y las complicaciones asociadas a cada proceso.
 - D) Mejorar la calidad de vida del paciente crónico y la de las personas cuidadoras.
62. **Los médicos de familia implicados en un programa de atención familiar es conveniente que realicen las siguientes actividades (señale la respuesta INCORRECTA):**
- A) Diagnosticar el problema clínico y planificar actividades terapéuticas y de control de la medicación.
 - B) Conocer otros apoyos informales y la necesidad de utilizar los recursos formales de la comunidad.
 - C) No es preciso evaluar la carga de trabajo que sufre el cuidador principal y las repercusiones que tiene sobre su salud.
 - D) Identificar a los ancianos y a las familias de riesgo.
63. **La prueba complementaria inicial más útil para el diagnóstico en el nódulo de tiroides solitario es:**
- A) La gammagrafía.
 - B) La resonancia magnética.
 - C) La tomografía cervical.
 - D) La punción-aspiración con aguja fina.
64. **Respecto a la rotación en el medio rural por parte del residente de Medicina de Familia y Comunitaria, señale la opción más CORRECTA:**
- A) Es obligatoria, con una duración de al menos 1 mes, desde el año 1995.
 - B) Es optativa desde el año 1995.
 - C) Es optativa desde el año 2005.
 - D) Es obligatoria, con una duración de 2-3 meses, desde el año 2005.
65. **¿Cuál es el método de elección de extracción de las garrapatas?:**
- A) Manualmente sin guantes.
 - B) Quemar la garrapata o ahogarla con cualquier sustancia a nuestro alcance.
 - C) Extracción con cualquier instrumento del que dispongamos.
 - D) Extracción cuidadosa, lentamente, de forma constante y con firmeza, perpendicularmente a la piel, con pinzas de borde liso.
66. **Mujer de 54 años con fenómeno de Raynaud. ¿Cuál de las siguientes enfermedades o patologías podemos descartar como su causa?:**
- A) Enfermedad de Buerger.
 - B) Lupus eritematoso sistémico.
 - C) Sarcoidosis.
 - D) Esclerodermia.
67. **En una mujer de 71 años hipertensa, diabética e hiperlipidémica que presenta cifras de insuficiencia renal moderada, ¿cuál de los siguientes fármacos deberíamos retirar de su tratamiento?:**
- A) Ramipril.
 - B) Fenofibrato.
 - C) Insulina.
 - D) Bisoprolol.

68. **Dentro de las intervenciones grupales, señale la respuesta incorrecta respecto al art of hosting (arte del liderazgo participativo):**
- A) Utiliza los procesos conversacionales como herramienta para adentrarse en el conocimiento individual y con ello afrontar retos complejos de forma innovadora.
 - B) Propone aprovechar la sabiduría individual.
 - C) Se ha aplicado en gran variedad de comunidades y organizaciones alrededor del mundo.
 - D) Utilizan espacios comunes de ocio y agrupan alrededor de 15 personas en un ambiente respetuoso y confidencial.
69. **Respecto a las pautas para una gestión de calidad, segura y ágil de la demanda, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) Repartir la tarea asistencial entre los distintos profesionales según las máximas posibilidades de resolución de cada perfil.
 - B) Analizar los motivos de las demandas y utilizar la vía más adecuada para abordar cada consulta.
 - C) Los facultativos son los únicos implicados en la gestión de la demanda.
 - D) Reservar un tiempo para revisar la agenda del día antes de su realización.
70. **De los siguientes gestágenos, ¿cuál NO está estructuralmente relacionado con la testosterona?:**
- A) Desogestrel.
 - B) Nesterona.
 - C) Linestrenol.
 - D) Gestodeno.
71. **Los siguientes son aspectos fundamentales para el buen funcionamiento de un EAP excepto uno:**
- A) La definición de objetivos.
 - B) La delimitación clara y estructurada de las funciones de cada grupo profesional.
 - C) Liderazgo autoritario.
 - D) La participación de todos sus componentes en la toma de decisiones.
72. **¿Qué grupo terapéutico ha demostrado en pacientes con un elevado riesgo cardiovascular, mayores de 55 años y con antecedentes de episodios cardiovasculares o diabetes con otro factor de riesgo añadido, disminuir la morbilidad cardiovascular y total incluso en ausencia de HTA?:**
- A) Alfabloqueantes.
 - B) IECA.
 - C) Betabloqueantes.
 - D) Bloqueantes de los canales del calcio.
73. **Varón de 55 años con lesión en pierna, rojo oscuro, redondeada, de bordes netos, con el “signo de la pastilla” a la exploración. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable?:**
- A) Nevus melanocítico.
 - B) Dermatofibroma.
 - C) Fibroadenoma.
 - D) Granuloma piógeno.
74. **Una de las siguientes afirmaciones no se corresponde con la insuficiencia cardiaca con fracción de eyección reducida:**
- A) La fracción de eyección del ventrículo izquierdo es inferior al 40%.
 - B) La etiología más frecuente es la hipertensión arterial.
 - C) Es frecuente encontrar dilatación del ventrículo izquierdo.
 - D) También se denomina insuficiencia cardiaca sistólica.

75. **Respecto a los sistemas de salud más orientados a la Atención Primaria, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) Tienen mayores costes de los servicios sanitarios.
 - B) Tienen mejores indicadores de salud de la población.
 - C) Tienen menores desigualdades en salud.
 - D) Distribuyen los recursos de una manera más equitativa.
76. **Señale cuál de las siguientes guías de práctica clínica son de uso en EPOC:**
- A) GOLD.
 - B) GESEPOC.
 - C) GINA.
 - D) A y B son ciertas.
77. **Respecto al asma, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?:**
- A) El asma es una enfermedad crónica, no reversible, en la que la vía aérea se estrecha fácilmente por la lesión directa de diferentes estímulos a la mucosa bronquial.
 - B) Más de la mitad de los pacientes con asma no están diagnosticados.
 - C) El determinante genético explica por sí solo las diferencias geográficas de la prevalencia.
 - D) El tabaco tiene relación con la EPOC pero no con el asma.
78. **En las tablas de SCORE-OP, una de las siguientes afirmaciones es cierta:**
- A) Estiman el RCV a 5 y 10 años.
 - B) Estiman el riesgo de IAM y de ICTUS.
 - C) Se aplican a personas sanas de 70 años.
 - D) Todas son ciertas.
79. **De los siguientes métodos diagnósticos, ¿cuál es más sensible para la detección de protusiones discales?:**
- A) Radiología simple.
 - B) Tomografía computarizada.
 - C) Gammagrafía.
 - D) Resonancia magnética.
80. **¿Cuál de los siguientes tipos de estudio tiene la calidad de la evidencia más alta?:**
- A) Revisiones sistemáticas.
 - B) Estudios de cohortes.
 - C) Ensayos clínicos aleatorizados.
 - D) Estudios de casos y controles.
81. **La tos es el síntoma más molesto entre los pacientes que presentan bronquitis aguda. ¿Qué debería informar al paciente sobre la duración media de la tos en la bronquitis?:**
- A) Que es de 1 semana.
 - B) Que es de 10 días.
 - C) Que es de 3 semanas.
 - D) Que es de 2 semanas.
82. **En relación con la valoración integral de un paciente mayor, ¿qué test se utilizaría para valorar actividades básicas de la vida diaria?:**
- A) Barber.
 - B) Barthel.
 - C) Lawton-Brody.
 - D) Gijón.

83. **El tratamiento de la EPOC:**
 A) Requiere hospitalización.
 B) Cirugía en todos los casos.
 C) Es escalonado.
 D) Es efectivo. 418
84. **Se diagnóstica hipoacusia súbita o brusca si se cumple lo siguiente:**
 A) Pérdida de audición en 3 días o menos, de al menos 30 decibelios y en al menos 3 frecuencias.
 B) Pérdida de audición de al menos 30 decibelios en una frecuencia.
 C) Pérdida de audición en agudos de 50 decibelios en al menos 7 frecuencias.
 D) Pérdida de audición en 5 frecuencias independientemente de la intensidad y duración. 210
85. **La Declaración de Alma Ata incluye los siguientes principios EXCEPTO UNO. Señale cuál es:**
 A) La promoción y protección de la salud del pueblo es indispensable para un desarrollo económico y social sostenible.
 B) Es posible alcanzar un nivel aceptable de salud para toda la humanidad en el año 2000.
 C) Los gobiernos tienen la obligación de cuidar de la salud de sus pueblos.
 D) Sobre los sistemas sanitarios recae la única responsabilidad de las políticas para mejorar la salud de las poblaciones. 338
86. **En relación con las comorbilidades de las enfermedades respiratorias, ¿cuál de las siguientes asociaciones NO está descrita?:**
 A) EPOC y osteoporosis.
 B) EPOC y depresión.
 C) Asma, rinitis y poliposis nasal.
 D) SAHAS y asma. 420
87. **Paciente 30 años con bulto cervical central a nivel hioideo, de 1,5 centímetros, elástico y redondeado, que se mueve con la deglución. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:**
 A) Adenopatía.
 B) Quiste branquial.
 C) Quiste tirogloso.
 D) Quiste sebáceo. 222
88. **Mujer de 40 años diagnosticada de artritis reumatoide por reumatología. De las pruebas de laboratorio, ¿cuál es más específica de esta enfermedad?:**
 A) Anticuerpos antinucleares (ANA).
 B) Anticuerpos anticardiolipina.
 C) Anticuerpos antiestrepolisina.
 D) Anticuerpos antipéptidos citrulinados. 250
89. **El enfisema pulmonar se caracteriza por:**
 A) Aumento de los espacios aéreos pulmonares situados más allá del bronquio normal.
 B) Destrucción de paredes alveolares.
 C) Disminución de la elasticidad pulmonar que origina una obstrucción del aire, por lo que los pulmones quedan hiperinsuflados por atrapamiento de aire.
 D) Todas son correctas. 410
90. **¿Cuántos conductos semicirculares tiene el laberinto vestibular humano?:**
 A) 6.
 B) 4.
 C) 3.
 D) 2. 234

91. **Como regla general, el área de salud extenderá su acción a una población:**
 A) No inferior a 100.000 habitantes ni superior a 150.000.
 B) No inferior a 200.000 habitantes ni superior a 250.000.
 C) No inferior a 250.000 habitantes ni superior a 300.000.
 D) No inferior a 300.000 habitantes ni superior a 500.000.
92. **¿Cuál de los siguientes Centros de Salud tiene un PAC (Punto de Atención Continuada) para la atención de Urgencias?:**
 A) Cehegín.
 B) Bullas.
 C) Alhama.
 D) Jumilla.
93. **Dejar de fumar supone un cambio de conducta que responde a un proceso en el que cada fumador pasa por varias fases a lo largo de un tiempo. Si nuestro paciente se ha planteado una fecha para dejar el tabaco en el próximo mes, está en fase de:**
 A) Precontemplación.
 B) Contemplación.
 C) Preparación.
 D) Acción.
94. **En una mujer perimenopáusica con hemorragia uterina normal y en la que no se ha llegado al diagnóstico etiológico, ¿cuál de las siguientes exploraciones está indicada?:**
 A) Prueba de embarazo.
 B) Citología.
 C) Biopsia de endometrio.
 D) Exploración pelviana.
95. **No suelen observarse erosiones articulares en:**
 A) Artritis reumatoide.
 B) Lupus eritematoso sistémico.
 C) Gota.
 D) Artritis séptica.
96. **Respecto a las recomendaciones de Prevención del Cáncer de Cuello de Útero. Actualización PAPPS 2022, señale la respuesta INCORRECTA:**
 A) Los profesionales de atención primaria deben proporcionar consejo sobre protección en los contactos sexuales.
 B) En mujeres asintomáticas de 25 a 34 años se recomienda la citología de cribado cada 2 años.
 C) En mujeres asintomáticas de 35 a 65 años se recomienda la prueba de VPH cada 5 años o la citología de cribado cada 3 años.
 D) El cribado se finalizará a los 65 años siempre que exista un cribado previo adecuado y negativo (10 años) y no haya antecedentes de CIN o CCU (20 años).
97. **El Régimen Jurídico de la ordenación de las Profesiones Sanitarias está regulado por:**
 A) Real Decreto 44/2003, de 21 de noviembre.
 B) Ley 44/2003, de 21 de noviembre.
 C) La Constitución Española.
 D) Real Decreto Ley 44/2003, 21 de noviembre.
98. **Dentro de la comunicación no verbal, ¿qué no constituye parte del paralenguaje?:**
 A) Voz.
 B) Sonidos vocales.
 C) Silencios.
 D) Gestos.

99. Para detectar el carcinoma colorrectal, ¿qué tipo de cribado está indicado en población normal entre 50 y 75 años de edad?:
- A) Colonoscopia cada tres años.
 - B) No está indicado ningún tipo de cribado.
 - C) Sangre oculta en heces anual.
 - D) RNM cada cinco años a partir de los 60 años.
100. Paciente de 16 años con epiglotitis aguda, fiebre y malestar general. ¿Cuál sería el agente causal más frecuente?:
- A) Streptococcus pneumoniae.
 - B) Estreptococo beta hemolítico A.
 - C) Estafilococo.
 - D) Haemophilus influenzae.
101. Señale la definición más completa respecto a los elementos conceptuales de la Atención Primaria:
- A) Integral, integrada, continuada, permanente, activa, accesible, basada en equipos multidisciplinares, comunitaria y participativa, programada y evaluable.
 - B) Integral, integrada, continuada, permanente, activa, accesible, no basada en equipos multidisciplinares, comunitaria y participativa, programada y evaluable, docente e investigadora.
 - C) Integral, integrada, continuada, permanente, activa, inaccesible, basada en equipos multidisciplinares, comunitaria y participativa, programada y evaluable.
 - D) Integral, integrada, continuada, permanente, activa, accesible, basada en equipos multidisciplinares, comunitaria y participativa, programada y evaluable, docente e investigadora.
102. Dentro de la Violencia de Género, referida como actos violentos que se producen dentro de una relación de pareja o ex pareja, fundamentalmente del hombre contra la mujer, entenderíamos cualquier atentado contra la libertad sexual de otra persona, pero realizado sin violencia ni intimidación como:
- A) Acoso sexual.
 - B) Violencia sexual.
 - C) Violencia física.
 - D) Ninguna es correcta.
103. Según el estudio descriptivo realizado en la Región de Murcia durante el año 2018 en niños de 6 y 11 años se puede concluir que:
- A) La prevalencia de obesidad a los 6 años es del 11.4%.
 - B) La prevalencia de obesidad a los 11 años es mayor en niñas que en niños.
 - C) La prevalencia de sobrepeso a los 6 años es mayor en niños que en niñas.
 - D) La prevalencia global de obesidad es mayor que la de sobrepeso.
104. Nos consulta una familia con un niño de tres meses que ha vivido la muerte de un sobrino menor de un año de edad, a la cual no se le encontró explicación tras ardua investigación del caso. Como actividad efectiva demostrada, trasladamos el consejo anticipado siguiente:
- A) Promover la lactancia materna.
 - B) Evitar colchones muy blandos y objetos pequeños que puedan asfixiarle durante el sueño (almohadones, colgantes, cintas o cordones).
 - C) Desaconsejar el tabaquismo, muy especialmente a la madre. Si no reduce el hábito, evitar al máximo la exposición del lactante.
 - D) Todas son correctas.
105. ¿En cuál de los siguientes casos NO se recomienda solicitar urocultivo?:
- A) Cuando hay sospecha de pielonefritis aguda.
 - B) En mujeres con disuria, polaquiuria y tenesmo vesical.
 - C) En una infección urinaria en el varón.
 - D) Cuando hay síntomas de infección de orina que no se resuelven.

106. En la colitis ulcerosa es característica la presencia de:
- A) Rectorragia como síntoma fundamental.
 - B) Fisuras y fístulas perianales.
 - C) Afectación segmentaria.
 - D) Mucosa ulcerada, aspecto "en empedrado".
107. ¿Cuál de los siguientes no es un diurético tiazídico?:
- A) Clortalidona.
 - B) Hidroclorotiazida.
 - C) Furosemida.
 - D) Indapamida.
108. En cuanto a la calidad de la implementación de una intervención comunitaria, es habitual medir diferentes parámetros, señale la respuesta CORRECTA:
- A) La dosis (cantidad e intensidad de las actividades llevadas a cabo respecto a las previstas).
 - B) La fidelidad (grado en que se aplica la intervención de acuerdo con el protocolo).
 - C) La satisfacción de las personas participantes, sean receptoras, proveedoras u otros agentes.
 - D) Todas las anteriores son correctas.
109. La clasificación del bocio, según la OMS, se hace en función del tamaño, que se determina por:
- A) Ecografía.
 - B) Exploración física.
 - C) Gammagrafía.
 - D) Pruebas funcionales.
110. Respecto al síndrome del túnel carpiano:
- A) Afecta al nervio cubital.
 - B) Afecta al nervio mediano.
 - C) Afecta solo a los dedos primero y segundo.
 - D) Afecta solo a los dedos cuarto y quinto.
111. La mejor forma de valorar el exceso de grasa visceral abdominal en la práctica clínica es mediante:
- A) Bioimpedancia.
 - B) Tomografía computarizada a nivel de L4.
 - C) Perímetro de la circunferencia abdominal.
 - D) Índice de masa corporal.
112. La rodilla es una articulación del tipo:
- A) Esferoidal.
 - B) Elipsoidal.
 - C) En silla de montar.
 - D) Condílea.
113. Respecto a las revisiones sistemáticas de la evidencia científica, es cierto:
- A) Abordan una pregunta concreta.
 - B) Apenas se utilizan.
 - C) Siempre debe incluir un metaanálisis.
 - D) Se incluyen todos los estudios existentes independientemente de su calidad.
114. La estrategia NAOS del Ministerio de Sanidad propone actuaciones en los ámbitos:
- A) Escolar y sanitario.
 - B) Escolar, familiar y empresarial.
 - C) Familiar, escolar, empresarial y sanitario.
 - D) Sanitario y familiar.

115. Con respecto al delirium en los pacientes en cuidados paliativos, todas las afirmaciones son ciertas excepto:
- A) Se presenta en las últimas semanas de vida hasta en un 80% de los enfermos terminales.
 - B) Se trata siempre aumentando las dosis de opiáceos.
 - C) Hay que saber diferenciarlo de la demencia.
 - D) Se debe descartar la presencia de retención urinaria o impactación fecal.
116. Es complicación macrovascular de la diabetes:
- A) Retinopatía diabética.
 - B) Nefropatía diabética.
 - C) Neuropatía diabética.
 - D) Arteriopatía periférica.
117. Según el artículo 5 del Decreto 25/2006, de 31 de marzo, por el que se desarrolla la normativa básica estatal en materia de información sobre listas de espera y se establecen las medidas necesarias para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones del sistema sanitario público de la Región de Murcia, el plazo máximo para el acceso a primeras consultas externas es de:
- A) 20 días naturales.
 - B) 30 días naturales.
 - C) 50 días naturales.
 - D) 80 días naturales.
118. En el caso de que el paciente estuviera diagnosticado de una insuficiencia renal de larga evolución, ¿qué fármaco NO es recomendable emplear?:
- A) Vareniclina en dosis de 2 mg al día.
 - B) Parches de nicotina en dosis de 15 mg al día.
 - C) Bupropión en dosis de 150 mg al día.
 - D) Caramelos de nicotina de 2 mg.
119. ¿Cuál de los siguientes factores influyen en la demanda asistencial de un equipo de Atención Primaria?:
- A) Número de personas asignadas.
 - B) Estructura etaria de la población asignada.
 - C) Morbilidad.
 - D) Todas las anteriores son correctas.
120. Señale la respuesta CORRECTA respecto a los determinantes sociales de salud (DSS):
- A) Son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen y tienen un fuerte impacto sobre la salud.
 - B) Los servicios de salud deben reorientarse para incorporar las dimensiones colectivas de la salud y para modificar los determinantes desde su ámbito de responsabilidad.
 - C) Deben registrarse en la historia clínica los códigos Z (problemas sociales de la CIAP-2) porque ayudarán a tener una visión más global del problema.
 - D) Todas las anteriores son correctas.
121. ¿Qué parámetro no se valora en la evaluación del fenotipo de FRIED?:
- A) Pérdida de peso.
 - B) Debilidad muscular.
 - C) Velocidad de la marcha.
 - D) Actividades básicas de la vida diaria.

119

220

015

407

361

343

159

122. **Dentro de los modelos de Atención Primaria, señale cuál de las siguientes es una debilidad de aquellos basados en Centros de Salud:**
- A) Buena accesibilidad.
 - B) Escasa autonomía de gestión.
 - C) Longitudinalidad.
 - D) Universalidad de la Atención Primaria.
123. **El cribado del cáncer colorrectal no está indicado en:**
- A) Presencia de familiares de primer grado.
 - B) Presencia de familiares de segundo grado.
 - C) Individuos con historia familiar de adenoma colorrectal.
 - D) Individuos con hemorroides externas por debajo de la línea dentada.
124. **Con respecto a los sumarios de evidencia, señale la opción INCORRECTA:**
- A) Contienen recopilaciones sobre diferentes temas clínicos.
 - B) Su principal defecto es su falta de organización.
 - C) Habitualmente contienen hiperenlaces a otros sumarios o documentos de evidencia científica.
 - D) Son documentos electrónicos de fácil navegabilidad.
125. **En caso de accidente no laboral, se exigirán las siguientes condiciones para tener derecho al subsidio de incapacidad temporal:**
- A) 180 días cotizados dentro de los cinco años anteriores.
 - B) 90 días cotizados en el último año.
 - C) No se exigirá periodo previo de cotización.
 - D) 180 días cotizados dentro del año anterior al accidente.
126. **¿En qué región de la mucosa nasal está el epitelio olfatorio humano?:**
- A) Techo.
 - B) Septum nasal anterior.
 - C) Cornete medio.
 - D) Coana.
127. **Señale la respuesta falsa sobre los Programas Oficiales de la Especialidad de Medicina de Familia:**
- A) Primer programa oficial de la especialidad en marzo 1986.
 - B) Segundo programa oficial de la especialidad en abril 1996.
 - C) Tercer programa oficial de la especialidad en mayo 2005.
 - D) Cuarto programa oficial de la especialidad en febrero 2018.
128. **¿Cuál de las siguientes características o criterios diagnósticos NO se corresponde con el síndrome de ovario poliquístico?:**
- A) Presencia de amenorrea.
 - B) Incremento de estrógenos.
 - C) Presencia de obesidad central.
 - D) Incremento de LH con FSH normal o moderadamente elevada.
129. **Para medir la dependencia a la nicotina utilizamos:**
- A) Test CAT.
 - B) Test SF 36.
 - C) Test Richmond.
 - D) Test Fageström.

130. El consultorio de Benizar / PEA (Punto de Especial Aislamiento) pertenece a la siguiente Zona Básica de Salud:
- A) Abanilla.
 - B) Yecla/Este.
 - C) Moratalla.
 - D) Lorca Sutullena.
131. Paciente de 56 años, casado con tres hijos de 6, 8, 11 años, fumador de 25 cigarrillos al día desde hace 30 años. El primer cigarrillo se lo fuma en la primera media hora después de levantarse. ¿Cuál el índice paquete año de este paciente respecto al consumo de tabaco?:
- A) 60.
 - B) 30.
 - C) 40.
 - D) 37,5.
132. ¿Qué estatina es más potente para bajar el colesterol?:
- A) Atorvastatina 20 mg.
 - B) Pravastatina 20 mg.
 - C) Rosuvastatina 20 mg.
 - D) Simvastatina 20 mg.
133. Si tenemos que extirpar un quiste sebáceo, no infectado, en espalda, de 2 centímetros, ¿qué no deberíamos hacer?:
- A) Suturar con seda de 2 ceros.
 - B) Extirpar el orificio de entrada dentro de la pieza.
 - C) Extirpar la lesión en su totalidad, incluida la cápsula.
 - D) Dejar que cierre por segunda intención.
134. Respecto al tratamiento farmacológico de la hipercolesterolemia en prevención primaria, es FALSO que:
- A) Las estatinas combinadas con ezetimiba para poder dar dosis menores de las mismas son los hipolipemiantes de elección.
 - B) Para establecer la utilidad del tratamiento, es preciso esperar un período mínimo de 6 semanas.
 - C) En caso de fracaso terapéutico, es preciso valorar la cumplimentación.
 - D) Una posible opción de tratamiento sería pravastatina 40 mg/24h.
135. El haz de rayos láser de CO2 de uso en medicina:
- A) Es de color rojo.
 - B) Es de color verde.
 - C) Es de color amarillo.
 - D) Es incoloro.
136. ¿Cuál de los siguientes no es un antipsicótico atípico?:
- A) Haloperidol.
 - B) Aripiprazol.
 - C) Quetiapina.
 - D) Risperidona.
137. Respecto a la calidad asistencial, una de las siguientes definiciones de los componentes que forman la calidad es INCORRECTA:
- A) Oportunidad. Grado en que una práctica se realiza en el momento oportuno.
 - B) Eficiencia. Grado en que una determinada práctica mejora el estado de salud o satisfacción de la población.
 - C) Accesibilidad. Facilidad para obtener una determinada práctica.
 - D) Adecuación. Grado en que una determinada práctica se realiza cuando está indicada.

138. La tiroiditis de Hashimoto se puede asociar a las siguientes enfermedades, excepto a una:
- A) Lupus eritematoso sistémico.
 - B) Artritis reumatoide.
 - C) Enfermedad de Cushing.
 - D) Síndrome de Sjögren.
139. Refiriéndonos a las edades de introducción de alimentos durante el primer año de vida en el niño:
- A) No debe introducirse gluten hasta los 9 meses.
 - B) La leche de vaca entera puede introducirse a partir de los 10 meses.
 - C) El huevo completo puede ofrecerse a partir de los 12 meses.
 - D) La lactancia materna puede darse hasta que el niño y la madre quieran.
140. Paciente con placa heráldica ovalada de 2,5 centímetros, eritematosa y con descamación marginal en abdomen y, a los 5-10 días, aparición de lesiones similares pero más pequeñas, siguiendo líneas de tensión de la piel. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:
- A) Pitiriasis liquenoide crónica.
 - B) Psoriasis guttata.
 - C) Sífilis secundaria.
 - D) Pitiriasis rosada.
141. ¿Cuándo se deben utilizar los equipos de protección individual?:
- A) Siempre.
 - B) Cuando los riesgos no hayan sido evaluados.
 - C) Cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse.
 - D) Cuando el trabajador lo estime oportuno.
142. Paciente con obstrucción nasal, epistaxis, trabajador de la madera expuesto al serrín, con formación tumoral granulosa y sangrante al tacto en fondo y techo de una fosa nasal. El diagnóstico más probable sería:
- A) Papiloma invertido.
 - B) Carcinoma escamoso.
 - C) Adenocarcinoma.
 - D) Poliposis nasal.
143. En prevención primaria de la enfermedad cardiovascular, ¿cuál de estas situaciones justifica tratar farmacológicamente a los pacientes sin cuantificar el riesgo cardiovascular en tablas?:
- A) Paciente de 52 años, delgado, normotenso con colesterol total de 250 y LDL 135.
 - B) Paciente de 52 años, obeso, normotenso, con triglicéridos de 190.
 - C) Paciente de 52 años, delgado, normotenso con debut diabético hace 2 años y buenos controles.
 - D) Paciente de 52 años, delgado, normotenso con diabetes mellitus de 17 años de evolución con microalbuminuria.
144. En una analítica de una paciente con diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, ¿qué NO encontraríamos?:
- A) Relación LH/FSH = 1.
 - B) Aumento de la androstenediona.
 - C) Disminución de la proteína transportadora de esteroides (SHBG).
 - D) Aumento de la dehidroepiandrosterona sulfato.
145. ¿Cuál de las siguientes herramientas NO está diseñada específicamente para localizar sumarios de evidencia?:
- A) BMJ Best Practice.
 - B) Clinical Overviews.
 - C) UpToDate.
 - D) PubMed.

146. Referente al SCORE-2, uno de los siguientes factores no se encuentra incluido:

- A) Hipercolesterolemia familiar.
- B) Tabaquismo.
- C) LDL-Colesterol.
- D) HDL-Colesterol.

163

147. ¿Cuál es el criterio espirométrico para el diagnóstico de EPOC según la GOLD?:

- A) FEV1<80%.
- B) CVF/FEV1<80%.
- C) FEV1/CVF<70% postbroncodilatación.
- D) Ninguna es correcta.

423

148. Para el tratamiento de la diabetes 2, uno de los siguientes no es sulfonilurea:

- A) Metformina.
- B) Glicazida.
- C) Glimepirida.
- D) Glibenclamida.

215

149. Acerca del consentimiento informado, señale la opción incorrecta:

- A) Debe ser expreso y por escrito para una intervención quirúrgica.
- B) Generalmente es verbal.
- C) Se recabará a la mujer embarazada en los supuestos de riesgos o inconvenientes para la salud del feto.
- D) Siempre será verbal.

009

150. ¿Cuál de las siguientes áreas tiene un mayor número de plazas de difícil cobertura?:

- A) Área I.
- B) Área IV.
- C) Área VI.
- D) Área VII.

352