

1. **Sobre las enfermedades periodontales necrosantes, señale la afirmación falsa:**
A) Suele haber necrosis de las papilas y dolor.
B) El sangrado es raro.
C) Se asocian a alteraciones de la inmunidad del huésped.
D) Existe una forma crónica grave. 117
2. **¿Qué recomendación clínica es aceptable según un panel de expertos de la ADA (American Dental Association) para prevenir caries?:**
A) Colutorios de clorhexidina al 0,12% solos o en combinación con fluoruros para prevenir la caries de corona o de raíz.
B) Geles de clorhexidina 0,5 y al 1% solos o combinados con flúor para prevenir la caries de corona o de raíz. 444
C) Barniz de clorhexidina al 1% más timol al 1% cada tres meses para reducir la incidencia de caries de raíz.
D) Barniz de clorhexidina al 1% más timol al 1% solo o combinado con flúor para prevenir la caries de corona.
3. **En la estomatitis nicotínica es característica la afectación de la:**
A) Mucosa labial.
B) Mucosa del dorso de la lengua. 327
C) Mucosa del paladar.
D) Mucosa yugal.
4. **Puede haber transformación hacia carcinoma de células escamosas en la queilitis...:**
A) Actínica.
B) Angular. 345
C) Glandular.
D) A y C son verdaderas.
5. **¿Cuál de las siguientes circunstancias puede inducir hipodoncia?:**
A) Displasia cleidocraneal.
B) Síndrome Down. 201
C) Síndrome de Gorlin-Goltz.
D) Síndrome de Gardener.
6. **La cápsula articular de la ATM:**
A) Posee una membrana sinovial interna rica en receptores y terminaciones nerviosas.
B) Posee un estrato subsinovial rico en capilares linfáticos. 238
C) Posee una capa externa encargada de aportar nutrientes.
D) Posee tres ligamentos capsulares o intrínsecos (externo, medial e interno).
7. **Entre las manifestaciones orales de la insuficiencia hepática figuran todas excepto una de las siguientes:**
A) Mala higiene oral y descuido según la causa.
B) Enfermedad periodontal leve. 157
C) Equimosis y petequias.
D) Alteración de la cicatrización.
8. **En un error estadístico debido al azar, ¿qué afirmación no es cierta?:**
A) Ocasionan una falta de precisión.
B) Ocasionan una falta de validez de los resultados. 410
C) Disminuyen la potencia de los resultados.
D) Una de sus causas puede ser la variabilidad biológica.

9. **La transmisión de agentes microbiológicos por vía aérea a través de gotitas (partículas mayores de 5 micras μm) se caracteriza por todo lo expuesto, excepto:**
- A) Las partículas (gotitas) son expulsadas por la persona infectada a corta distancia.
 - B) Requieren un contacto cercano (menos de un metro) entre la fuente y la persona susceptible.
 - C) Las partículas quedan suspendidas en el aire mucho tiempo.
 - D) Se transmite por este mecanismo gripe, adenovirus.
10. **¿Cuál es un marcador de supresión de tumores?:**
- A) Proteína p51.
 - B) Proteína p52.
 - C) Proteína p53.
 - D) Proteína p54.
11. **En lo referente a los microorganismos que producen infecciones odontógenas, señale la opción falsa:**
- A) Existen aproximadamente 500 especies bacterianas.
 - B) Suelen ser polimicrobianas y oportunistas.
 - C) Inicialmente suelen ser anaerobias y cuando evoluciona suelen ser aerobias.
 - D) Cocos gram + anaerobios facultativos tipo *Streptococcus* suelen aparecer.
12. **Al planificar la exodoncia de un diente en una paciente embarazada, es cierto que:**
- A) No se puede realizar en el primer trimestre por riesgo teratogénico.
 - B) No se puede realizar en el último mes por riesgo de inducción al parto.
 - C) No está contraindicada si se tienen las precauciones adecuadas.
 - D) Sólo puede realizarse en el segundo trimestre.
13. **Según el artículo 43 de la Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario de la Región de Murcia, la información previa al consentimiento informado se ofrecerá al paciente:**
- A) Salvo en supuestos de urgencia, con la debida antelación y preferentemente no en la misma sala donde se deba practicar la actuación asistencial.
 - B) Salvo en supuestos de urgencia, en el momento inmediatamente anterior a la actuación asistencial y en la misma sala donde se deba practicar la actuación asistencial.
 - C) Salvo en supuestos de urgencia, con la debida antelación y siempre en la misma sala donde se deba practicar la actuación asistencial.
 - D) Incluidos los supuestos de urgencia, preferentemente con la debida antelación y no en la misma sala donde se deba practicar la actuación asistencial.
14. **Dentro de la clínica dental podemos observar diferentes tipos de síncope. El más frecuente es:**
- A) Síncope de hipotensión ortostática.
 - B) Síncope vasodepresor o vasovagal.
 - C) Síncope por hiperventilación.
 - D) Síncope del seno carotideo.
15. **Acerca de la anamnesis del paciente en odontología, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta?:**
- A) Debe realizarse preferiblemente en un despacho, no en el gabinete dental.
 - B) Debe iniciarse con el motivo de consulta.
 - C) Al planear la entrevista el profesional debe comenzarla con preguntas abiertas.
 - D) El profesional ha de adoptar una postura pasiva.

16. **Cuando un diente con presencia de placa subgingival, está además sometido a fuerzas oclusales anormales, presentará un incremento de daño periodontal, lo que se conoce como efecto:**
- A) Glickman.
 - B) Loe.
 - C) Schour-Massler.
 - D) Greene.
17. **¿Cuál de estos quistes tiene una localización extra-ósea?:**
- A) Quiste del conducto nasopalatino.
 - B) Quiste globulomaxilar.
 - C) Quiste mediopalatino.
 - D) Quiste nasolabial.
18. **Señale la opción correcta. La historia clínica la puede realizar:**
- A) El odontólogo.
 - B) La higienista dental.
 - C) El técnico de cuidados auxiliares de enfermería.
 - D) Todas las anteriores son correctas.
19. **¿Cuál de las siguientes tiene una asociación negativa con la caries dental?:**
- A) Gelatina.
 - B) Refrescos.
 - C) Pan industrial.
 - D) Bollería.
20. **Indique cuál no es una medida universal de control hemorragia en el gabinete dental:**
- A) Cirugía poco cruenta y limitación del número de piezas para exodoncia en 1 sesión (máximo 3 contiguas).
 - B) Regularización y aproximación de bordes.
 - C) Uso de esponjas hemostáticas.
 - D) Irrigación del alveolo con suero fisiológico.
21. **¿Qué tipo de patrón histológico tiene peor pronóstico en el carcinoma adenoide quístico?:**
- A) Basaloide o sólido.
 - B) Cilíndrico.
 - C) Cribiforme.
 - D) Tubular.
22. **Son medidas de prevención de la osteo-radionecrosis, todas excepto una:**
- A) Realizar las extracciones de dientes en mal estado 15 días antes de la RT.
 - B) Buena higiene oral.
 - C) Realizar fluorizaciones.
 - D) No colocar prótesis dentales ni realizar exodoncias hasta pasados 6 meses después de la radioterapia.
23. **Una caries coronal primaria, Código 3 de ICDAS II (sistema internacional de detección y valoración de caries) corresponde a:**
- A) Sombra subyacente con o sin rotura de esmalte.
 - B) Fractura de esmalte por caries sin dejar al descubierto la dentina ni mostrar sombras subyacentes.
 - C) Cambio visual inequívoco en el esmalte.
 - D) Cavidad franca en dentina visible.

267

361

166

458

143

315

116

439

24. **En la clasificación de la mucositis según la Organización Mundial de la Salud, la aparición de “Eritema, edema o úlceras. Sólo admite líquidos” se corresponde con el:**
- A) Grado 2.
 - B) Grado 3.
 - C) Grado 4.
 - D) Grado 5.
25. **Al aplicar el anestésico local a un nervio mixto, lo primero en perderse es:**
- A) Sensación de tacto.
 - B) Sensación dolorosa.
 - C) Sensación de frío.
 - D) Sensación de presión.
26. **En relación a la halitosis, ¿qué medicamento puede ser responsable directo de mal olor?:**
- A) Dimetilsulfóxido.
 - B) Dinitrato de isosorbida.
 - C) Disulfiram.
 - D) Todos los anteriores.
27. **Sobre el coma mixedematoso, señale la opción falsa:**
- A) Aparece normalmente en gente joven.
 - B) Suele desencadenarse por exposición al frío.
 - C) Cursa con hipoventilación.
 - D) Cursa con hipotermia.
28. **¿En qué situación estaría más indicada una higiene de manos con agua y jabón?:**
- A) Tras el contacto con piel intacta (tomar el pulso).
 - B) Tras quitarse los guantes.
 - C) Antes de comer o acudir a un área de descanso.
 - D) Antes y después de atender a un enfermo.
29. **Según el Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, la Asamblea Regional fijará por ley el número de sus miembros, que:**
- A) No será inferior a cuarenta ni superior a cincuenta diputados regionales.
 - B) No será inferior a cuarenta y cinco ni superior a cincuenta y cinco diputados regionales.
 - C) No será inferior a treinta y cinco ni superior a cuarenta y cinco diputados regionales.
 - D) No será inferior a cuarenta y cinco ni superior a cincuenta diputados regionales.
30. **En los protocolos de intervención breve para el abandono del hábito tabáquico es útil la estrategia de las:**
- A) “3 As”.
 - B) “4 As”.
 - C) “5 As”.
 - D) Son verdaderas A y C.
31. **Tras la exodoncia dental, se forma un coágulo, proceso en el que interviene el sistema exógeno desencadenado por factores tisulares como la tromboquinasa, junto con:**
- A) Factor VII del plasma y Ca^{++} .
 - B) Factor X del plasma y Fe^{+++} .
 - C) Factor VIII del plasma y K^{+} .
 - D) Factor X del plasma y K^{+} .

32. En caso de reimplante dentario:

- A) Se realizará la endodoncia extraoralmente para minimizar riesgo de anquilosis.
- B) Se limpiará la superficie radicular con una gasa impregnada con clorhexidina, para reducir riesgo de infecciones.
- C) Podrá revascularizarse el diente implantado, y en ocasiones incluso reinervarse.
- D) Se realizará la endodoncia a la mayor brevedad tras la inserción y ferulización del diente en su nueva ubicación.

213

33. Acerca de las arritmias, señale la opción verdadera:

- A) Se trata de cualquier ritmo cardiaco que no sea el sinusal.
- B) Pueden ser bradiarritmias o ritmos rápidos.
- C) Pueden ser taquiarritmias o ritmos lentos.
- D) Son enfermedades de muy baja incidencia.

148

34. El signo de “invasión cutánea” y el signo de “engrosamiento asimétrico” son característicos de:

- A) Labio lúpico.
- B) Queilitis actínica.
- C) Queratoacantoma labial.
- D) Síndrome de Melkersson-Rosenthal.

333

35. El blanqueamiento dental no está contraindicado en caso de:

- A) Embarazo.
- B) Dentinogénesis imperfecta.
- C) Caries incipientes.
- D) Radioterapia de cabeza y/o cuello.

206

36. Según el artículo 3 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, todo dato, cualquiera que sea su forma, clase o tipo, que permite adquirir o ampliar conocimientos sobre el estado físico y la salud de una persona, o la forma de preservarla, cuidarla, mejorarla o recuperarla, se define como:

- A) Información clínica.
- B) Historia clínica.
- C) Documentación clínica.
- D) Certificado médico.

003

37. Los suplementos de flúor:

- A) Están indicados en embarazadas.
- B) Con su administración se consigue sobre todo un efecto preeruptivo.
- C) Su uso no se asocia a aumento del riesgo de fluorosis.
- D) No se consideran una medida de salud pública.

451

38. Respecto al consentimiento informado en la práctica odontológica:

- A) El deber de información corresponde siempre al odontólogo o estomatólogo.
- B) El profesional que obtuvo el consentimiento informado es quien siempre realiza el tratamiento o intervención.
- C) Se exceptuará el requisito del consentimiento solamente en los casos que la no intervención suponga un grave riesgo para la salud pública.
- D) En caso de menores el consentimiento informado solo es válido si es emitido por ambos padres (progenitores).

404

39. **En la histología del queratoquiste odontogénico se observa con mayor frecuencia una queratinización de tipo:**
- A) Mixta.
 - B) Ortoquerátosica.
 - C) Paraqueratósica.
 - D) Se observa una ausencia de queratina.
40. **En la técnica de endodoncia rotatoria, señale la afirmación falsa:**
- A) Los instrumentos de Ni-Ti tienen gran flexibilidad.
 - B) Debemos entrar y sacar la lima nunca en movimiento, por mayor riesgo de fractura.
 - C) Los motores computarizados tienen control de revoluciones por minuto (velocidad) y de torque.
 - D) El accionamiento debe ser lento sin forzar los instrumentos y sin presiones exageradas.
41. **Tras un traumatismo dental, hablaremos de “infracción coronaria” cuando:**
- A) Hay fractura de esmalte sin pérdida de sustancia.
 - B) Hay fractura de esmalte y dentina coronaria, sin pérdida de sustancia.
 - C) Hay fractura de esmalte y dentina coronaria, con pérdida de esmalte, pero no de dentina.
 - D) Hay fractura de esmalte y dentina coronaria, con pérdida de sustancia de ambas, haya o no exposición pulpar.
42. **Las lesiones endodóntico-periodontales se caracterizan por todas las siguientes afirmaciones excepto una:**
- A) Dolor espontáneo.
 - B) Dolor a la percusión.
 - C) Supuración y movilidad dentaria.
 - D) Bolsa periodontal profunda que se extiende hasta el tercio medio radicular.
43. **Señale el enunciado erróneo:**
- A) El goma sifilitico aparece en las sífilis terciaria.
 - B) En la tuberculosis oral la clínica más común suele ser la úlcera de contorno irregular y varios meses de evolución.
 - C) Los folículos de Köster son característicos de la mononucleosis infecciosa.
 - D) Todas son incorrectas.
44. **El servicio en la “Empresa de Salud” se caracteriza por todo excepto:**
- A) Se produce a la vez que se consume.
 - B) Se presta en forma parcelada.
 - C) Nunca hay dos servicios iguales.
 - D) No se puede devolver si sale defectuoso.
45. **El modelo inferior se montará en el articulador:**
- A) Siempre en relación céntrica.
 - B) En máxima intercuspidadación si la restauración a realizar es menor.
 - C) En relación céntrica solamente cuando haya que modificar la relación intermaxilar.
 - D) En borde a borde cuando no haya referencias molares.
46. **No es característica de la placa dental madura:**
- A) La transferencia horizontal de genes entre los microorganismos de la placa.
 - B) La placa dental madura es muy inestable en su composición.
 - C) Los microorganismos pueden sufrir cambios fenotípicos.
 - D) Las variaciones en la biopelícula originan una heterogeneidad ambiental con múltiples microhábitats.

47. **En odontología comunitaria los integrantes de la comunidad intervienen en:**
- A) Planificación y gestión.
 - B) Administración y control.
 - C) Las dos anteriores.
 - D) En ninguna de las anteriores.
48. **Los postes prefabricados rígidos metálicos tienen como ventaja (indique la incorrecta):**
- A) Son radioopacos.
 - B) Son retentivos.
 - C) No se corroen.
 - D) Se colocan en una cita, sin coste de laboratorio.
49. **La historia clínica se caracteriza por las afirmaciones siguientes, excepto una:**
- A) Es un documento médico-legal.
 - B) Debe recoger la situación actual y los antecedentes personales, por lo menos de los últimos diez años.
 - C) Debe tener un registro de actividades.
 - D) Debe recoger también las pruebas diagnósticas complementarias.
50. **En primera fase quirúrgica al insertar un implante, incrementará el éxito (indique la incorrecta):**
- A) La esterilidad del campo.
 - B) La preparación del lecho con fresado energético.
 - C) La no contaminación de la superficie del implante.
 - D) La estabilidad primaria.
51. **Respecto a la tuberculosis (TBC), marque la correcta:**
- A) La localización en la mucosa oral representa el 40% de los casos de TBC extrapulmonar.
 - B) La úlcera de localización intraoral secundaria a TBC pulmonar se denomina escrófula.
 - C) En ocasiones la producen micobacterias atípicas como *Mycobacterium avium intracellulare*.
 - D) Está causada por *Mycobacterium tuberculosis*, bacilo gram negativo anaerobio estricto con un tiempo de duplicación lento.
52. **No es una característica específica de los servicios sanitarios de atención a la salud oral:**
- A) Tratan básicamente dos enfermedades muy prevalentes y altamente contagiosas: la caries y la enfermedad periodontal.
 - B) Los pacientes con patología suelen serlo de por vida.
 - C) El tratamiento quirúrgico suele ser habitual.
 - D) El tratamiento incorpora un componente artesanal importante.
53. **Con respecto a la recidiva postortodóncica es falso que:**
- A) Eliminar el factor causal de la maloclusión es un requisito fundamental.
 - B) Las correcciones realizadas en período de crecimiento tienen mayor tendencia a la recidiva.
 - C) Debemos sobre corregir como factor de seguridad.
 - D) Cuanto más se mueva una pieza, menos será su tendencia a recidiva.
54. **En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, señale la opción falsa:**
- A) El síntoma principal es la disnea.
 - B) Es una enfermedad principalmente de adultos.
 - C) No existe predisposición de infecciones respiratorias.
 - D) En su tratamiento suele haber corticoides.

55. **En lo referente a la historia clínica en odontología infantil, señale la opción falsa:**
- A) Debe ser amena y agradable.
 - B) La relación con el paciente es cuádruple: odontólogo-padres-niño-pediatra.
 - C) Recoge datos de filiación.
 - D) Recoge el motivo de consulta.
56. **De las siguientes áreas de una clínica dental, ¿cuál considera que tiene un riesgo de infección intermedio?:**
- A) Área de esterilización.
 - B) Recepción y administración.
 - C) Sala de tratamientos (gabinete dental).
 - D) Sala de espera.
57. **Respecto a la localización de los siguientes tumores, señale la respuesta incorrecta:**
- A) El cementoblastoma se presenta con mayor frecuencia en la mandíbula en la región molar o premolar.
 - B) El fibroma ameloblástico se localiza con mayor frecuencia en la región incisiva maxilar.
 - C) El tumor de Pindborg es más frecuente en mandíbula que en maxilar superior.
 - D) El tumor odontogénico adenomatoide es más frecuente en maxilar superior que en mandíbula.
58. **En caso de luxación intrusiva de un diente permanente, se debe:**
- A) Reposicionar el diente traccionando lentamente con fórceps, y ferulizar por tres meses con vigilancia radiográfica periódica.
 - B) Traccionar con ortodoncia a la mayor brevedad, antes de que cicatricen las fibras periodontales en esa posición anómala.
 - C) Esperar para ver si extruye espontáneamente a su posición anterior.
 - D) Planificar exodoncia antes de que se anquiloze el diente, o se necrose la pulpa por daños al paquete vasculonervioso apical.
59. **Sobre el tratamiento dental de los pacientes antiagregados, señale la opción verdadera:**
- A) La aplicación de calor puede resultar útil.
 - B) Se aconseja interrumpir el tratamiento con antiagregantes.
 - C) El ácido tranexámico puede ser útil.
 - D) La compresión de las heridas no suele ser útil.
60. **¿Qué afirmación es más cierta sobre el cese del crecimiento del maxilar superior y de la mandíbula?:**
- A) En niñas el maxilar superior cesa su crecimiento a los 15 años.
 - B) El maxilar superior cesa su crecimiento en varones a los 16 años.
 - C) La mandíbula cesa su crecimiento a los 15 años en chicas.
 - D) En varones el crecimiento mandibular cesa a los 16 años.
61. **Son técnicas de manejo de la conducta en odontopediatría, indique la errónea:**
- A) Distracción.
 - B) Ludoterapia.
 - C) Triple E (explique, enseñe, ejecute).
 - D) Todas son verdaderas.
62. **Ante un patrón de imagen radiolúcida, multilocular, de márgenes bien definidos, generalmente con expansión cortical, ¿qué patología le asociaría con más probabilidad?:**
- A) Lesión benigna de crecimiento lento.
 - B) Lesiones quísticas o neoplásicas de origen odontógeno.
 - C) Lesiones benignas pero agresivas, reactivas o neoplásicas.
 - D) Quistes y tumores benignos, resultado de crecimiento lento.

63. Según el artículo 12 de la Ley 5/2001, de 5 de diciembre, de personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, NO es un criterio de clasificación del personal estatutario:
- A) El nivel de titulación exigida para el ingreso.
 - B) La forma de acceso.
 - C) Las funciones que desarrolla.
 - D) El carácter fijo o temporal de su nombramiento.
64. Señale la afirmación incorrecta. Las interacciones farmacológicas se producen cuando los efectos de un fármaco son modificados por la presencia de:
- A) Otro fármaco.
 - B) Preparado fitoterapéutico.
 - C) Un alimento.
 - D) Radiaciones ionizantes.
65. Una de las siguientes afirmaciones no es cierta respecto a los fluoruros:
- A) Se ha demostrado una relación significativa entre el mayor contenido de fluoruros en el esmalte y la menor experiencia de caries en el individuo.
 - B) La administración sistémica de flúor tiene un efecto esencialmente tópico.
 - C) A menor edad, menor es la excreción renal de fluoruros.
 - D) En personas vegetarianas, con pH en la orina próximo a 7, la excreción de fluoruros es mayor.
66. ¿Cuál de estas enfermedades se considera de mayor gravedad?:
- A) Eritema Multiforme.
 - B) Rash inducido por Mycoplasma y mucositis.
 - C) Síndrome de Lyell.
 - D) Síndrome de Steven-Johnson.
67. En las fracturas no complicadas de esmalte y dentina en pacientes infantiles:
- A) Se realizará solamente la reconstrucción estética de la zona dañada.
 - B) Se aplicará hidróxido de calcio y se reconstruirá con materiales estéticos.
 - C) Se redondearán los bordes lacerantes, sin que sea necesario reconstruir la zona dañada.
 - D) Se realizará la pulpotomía con hidróxido de calcio, para fomentar la apicoformación.
68. Los objetivos de la historia clínica son todos excepto uno:
- A) Asistencial.
 - B) Docente.
 - C) Sanitario, pero no epidemiológico.
 - D) Investigador.
69. El síndrome de Melkersson- Rosenthal se asocia característicamente con:
- A) Glositis romboidal media.
 - B) Hipertrofia de papilas foliadas.
 - C) Lengua fisurada.
 - D) Lengua geográfica.
70. De las siguientes lesiones de la mucosa, ¿cuál es la menos frecuente?:
- A) Gránulos de Fordyce.
 - B) Leucoedema.
 - C) Nevus blanco esponjoso.
 - D) Queratosis friccional.

71. **Según el artículo 12 de la Ley 4/1994, de 26 de julio, de Salud de la Región de Murcia, cada Área de Salud estará vinculada a:**
- A) Un centro de salud.
 - B) Un hospital general.
 - C) Cualquier centro, servicio y establecimiento sanitario de cobertura pública.
 - D) Una instalación sanitaria.
72. **Dentro de las posibles situaciones de emergencias en el gabinete dental, podemos hacer una prevención de estas con varias medidas. Señale la respuesta falsa:**
- A) Valorando previamente el estado de salud del paciente.
 - B) Buen control del dolor mediante analgesia adecuada.
 - C) Con la sedación consciente, aunque está contraindicada, si existen antecedentes de emergencias previas.
 - D) Usar oxígeno suplementario en determinados pacientes.
73. **En caso de sospecha de alergia a anestésicos, se podría solicitar al alergólogo que realice el test (señale la incorrecta):**
- A) TPLNK.
 - B) TTL.
 - C) LHRT.
 - D) TDBH.
74. **¿En cuál de estas entidades radiográficamente podemos observar una imagen en aspecto de "rayos de sol"?:**
- A) Ameloblastoma metastatizante.
 - B) Ameloblastoma sólido.
 - C) Osteocondroma.
 - D) Osteosarcoma.
75. **Entre los principios generales de actuación odontológica en el paciente discapacitado psíquico, figuran todas excepto:**
- A) Es importante una concienciación en salud bucodental para paciente y tutores.
 - B) Evitar focos sépticos/bacteriemias y el dolor.
 - C) Control de manejo de la conducta, ansiedad y estrés.
 - D) Los programas de prevención y mantenimiento no son esenciales.
76. **En relación a los Gránulos de Fordyce, señale la verdadera:**
- A) Son de color blanco-amarillento.
 - B) Son un tipo de granulomatosis orofacial.
 - C) Su localización es exclusiva de la mucosa oral.
 - D) A y C son verdaderas.
77. **Si durante la extracción de una raíz molar superior, ésta acaba alojada en el seno maxilar por accidente, nuestra actuación deberá ser:**
- A) Suturar el alveolo sin alveoloplastia por medio de colgajo.
 - B) Abordaje quirúrgico Caldwell-Luc.
 - C) Abordaje no-quirúrgico Guillaín-Barré.
 - D) Suturar el alveolo con alveoloplastia y sin colgajo.

78. **Dentro de la clasificación de las periodontitis por estadios, según la gravedad del diagnóstico inicial, señale la opción falsa:**
- A) En el estadio I se observa una pérdida de inserción clínica interdental de 1-2 milímetros.
 - B) En el estadio II se observa una pérdida de inserción clínica interdental de 3-4 milímetros.
 - C) En el estadio III se observa una pérdida de inserción clínica interdental de $> o = 5$.
 - D) En el estadio IV se observa una pérdida de inserción clínica interdental de $> o = 7$ milímetros.
79. **Un diseño epidemiológico observacional, descriptivo, que está indicado para la evaluación de intervenciones comparando los resultados antes y después, es un estudio...:**
- A) Transversal.
 - B) Ecológico.
 - C) Casos y controles.
 - D) Cohortes.
80. **La clasificación de la displasia epitelial de Odell y cols. (2021) y de la Organización Mundial de la Salud (2017), considera los siguientes tipos:**
- A) Ausencia y presencia.
 - B) Bajo y alto grado.
 - C) Leve, moderada y severa.
 - D) Moderada y severa.
81. **Según el artículo 10 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, entre la información básica que el facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento escrito, habrá de constar (indique la CORRECTA):**
- A) Los riesgos relacionados con las circunstancias personales del paciente o profesionales del médico interviniente.
 - B) Los riesgos excepcionales e improbables, si su información produce un padecimiento innecesario al paciente, o entorpece el ejercicio de la función médica.
 - C) Los riesgos probables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención.
 - D) Las consecuencias no relevantes que la intervención origina.
82. **En materia de disyuntores, es cierto que:**
- A) El de Hyrax se debe retirar para las comidas no más de 2 horas al día en total.
 - B) El de Haas es más cómodo para el paciente, ya que distribuye la presión entre dientes y proceso alveolar gracias a su extensión acrílica de apoyo palatino.
 - C) El de McNamara está más indicado en denticiones mixtas.
 - D) Producen expansión dentoalveolar, pero si además se requiere expandir maxilar se necesitará la asociación de corticotomías en sutura palatina.
83. **¿Cuál no es un sistema de endodoncia mecánica?:**
- A) Manual.
 - B) Ultrasónica.
 - C) Mixta: rotatoria y vibratoria.
 - D) Rotatoria.
84. **Si aparece dolor torácico durante el tratamiento dental, debemos adoptar las siguientes medidas excepto una:**
- A) Interrumpir el tratamiento odontológico.
 - B) Administrar nitroglicerina sublingual.
 - C) Administrar oxígeno, tomar la presión arterial y la frecuencia cardiaca.
 - D) Si el dolor cesa, podemos acabar el tratamiento dental.

85. **Un paciente fumador acude a su consulta para realizar una profilaxis dental y le comenta que quiere dejar de fumar en los próximos 6 meses (no en el próximo mes), ¿en qué fase se encuentra?:**
- A) Precontemplación.
 - B) Contemplación.
 - C) Preparación o determinación.
 - D) Acción.
86. **En relación al fibroma, señale la incorrecta:**
- A) De tamaño variable, va de varios milímetros a varios centímetros.
 - B) Es el tumor benigno más frecuente de la cavidad oral.
 - C) Es más frecuente en mujeres que en hombres.
 - D) Su localización más frecuente es en el labio inferior.
87. **Al diseñar la oclusión en un paciente con patología previa de ATM, tendremos en cuenta que:**
- A) Si se trata de una prótesis parcial removible, es suficiente con montar los modelos en una charnela.
 - B) Si se trata de una completa se montará en máxima intercuspidadación, confiriendo oclusión de protección de grupo.
 - C) Si se trata de una prótesis parcial removible, habrá que montarla en articulador, y dar medidas standard de población ajustadas a la edad del paciente.
 - D) Si se trata de una prótesis parcial removible, habrá que montarla en articulador y registrar con arco facial la relación personal del paciente.
88. **Relativo a la mordida abierta anterior:**
- A) Si la provoca un hábito de succión digital, irá asociada a cruzada posterior simétrica.
 - B) Si persiste en dentición permanente ya no podrá tratarse solo con ortodoncia.
 - C) Será asimétrica si la provoca un hábito de succión digital.
 - D) Presentará un incremento del ángulo entre los planos mandibular y de Frankfurt.
89. **Señale el factor más importante en la eficacia de un cepillo dental:**
- A) El tamaño del cabezal.
 - B) Que el mango sea redondo y curvo.
 - C) La forma de inserción de los penachos en el cabezal.
 - D) La forma que adquieren los filamentos en su conjunto.
90. **En relación a la enfermedad de Heck, señale la verdadera:**
- A) Es una hiperplasia epitelial multifocal.
 - B) Es una forma particular de sarcoidosis.
 - C) Se manifiesta como uveítis, tumefacción parotídea y parálisis facial.
 - D) Son ciertas B y C.
91. **Las clases II de Kennedy se caracterizan por presentar un edentulismo:**
- A) Bilateral posterior.
 - B) Bilateral anterior.
 - C) Unilateral anterior y/o posterior, con dientes que por sí mismos no pueden soportar la prótesis.
 - D) Unilateral posterior.
92. **En la lesión de caries de esmalte, ¿cuál es la zona en la que se produce la principal desmineralización?:**
- A) Zona superficial.
 - B) Cuerpo de la lesión.
 - C) Zona oscura.
 - D) Zona translúcida.

460

343

264

215

440

341

266

438

93. **¿Cuál es la localización más frecuente del linfangioma?:**
 A) Dorso de la lengua.
 B) Labios.
 C) Mucosa yugal.
 D) Velo del paladar. 340
94. **Entre los objetivos específicos de la técnica de trabajo en el sillón dental a cuatro manos, tenemos:**
 A) Aumentar la eficacia del trabajo.
 B) Aprovechar las habilidades del ayudante.
 C) Confort para el paciente.
 D) Todas son correctas. 160
95. **La inervación de las papilas caliciformes corre a cargo de:**
 A) Nervio lingual, VII par (cuerda del tímpano).
 B) V lingual, IX par.
 C) IX par.
 D) VII o IX pares. 426
96. **Señale la frase falsa sobre la patología oral y el tratamiento dental en el discapacitado psíquico:**
 A) Suele existir patología oral, y suele ser específica.
 B) Puede haber mayor dificultad en el cuidado bucal.
 C) Presentan mayor dificultad en el tratamiento odontológico.
 D) Presentan una alta prevalencia de patología cariosa por tipo de dieta, falta de higiene, maloclusiones, alteraciones orales asociadas y medicaciones recibidas. 136
97. **Según el artículo 8 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, el paciente podrá revocar su consentimiento:**
 A) Verbalmente, como regla general.
 B) En cualquier forma y momento.
 C) Libremente, por escrito, y en cualquier momento.
 D) En cualquier momento, estando obligado a motivarlo justificadamente. 014
98. **Respecto a la conducta de un niño en la consulta dental, señale la verdadera:**
 A) El miedo es un estado emocional que se origina en fuentes internas no reales.
 B) El paciente infantil tímido rara vez muestra rabietas.
 C) Las visitas vespertinas son preferibles en niños de más corta edad.
 D) No existe una relación entre edad-ansiedad-conducta. 301
99. **Al usar placas activas removibles de ortodoncia, si en las zonas de apoyo necesitamos que la pieza mantenga su capacidad eruptiva, recurriremos a los ganchos:**
 A) De Adams.
 B) Triangulares.
 C) De Duysing.
 D) En ojete. 220
100. **Recurrir a la odontosección durante la exodoncia de un cordal retenido (indique la falsa):**
 A) Disminuye el campo operatorio.
 B) Supone un mayor tiempo operatorio.
 C) Reduce el riesgo de dañar a otros dientes y estructuras vecinas.
 D) Mejora la incidencia de trismo postoperatorio. 257

- 101. Son posibles complicaciones de la infección odontogena:**
- A) Cronificación de la infección.
 - B) Formas graves propagadas por continuidad.
 - C) Extensión a distancia de la infección odontogena.
 - D) Todas son correctas.
- 102. Indique la opción correcta: el tumor de Küttner es una...:**
- A) Sialodentitis aguda obstructiva.
 - B) Sialodentitis aguda supurada.
 - C) Sialodentitis crónica esclerosante.
 - D) Sialodentitis crónica supurada.
- 103. ¿Cuál de estas entidades no está relacionada con la pigmentación por melanina?:**
- A) Enfermedad de Addison.
 - B) Liquen Plano.
 - C) Sarcoma de Kaposi.
 - D) Síndrome de Peutz-Jeghers.
- 104. De los siguientes pacientes geriátricos, indique el que presentará peor pronóstico de éxito tras someterse a una cirugía de implantes:**
- A) Diabético con HbA1c < 8.
 - B) Oncológico que ha recibido radioterapia con 60 Gy.
 - C) Osteoporosis con SPRm > 13.
 - D) Anticoagulado con INR > 2,5.
- 105. Se definen como residuos sanitarios específicos:**
- A) La sangre y hemoderivados líquidos.
 - B) Los dientes y los restos tisulares.
 - C) Objetos punzantes y cortantes.
 - D) Todas las respuestas son correctas.
- 106. Indique qué afirmación no es característica del sistema de diagnóstico de caries por transiluminación por fibra óptica:**
- A) Puede detectar caries incipientes que no pueden ser observadas radiográficamente.
 - B) Puede utilizarse en embarazadas.
 - C) Es subjetivo.
 - D) Presenta alta sensibilidad.
- 107. ¿Cuál de estos quistes no tiene un origen inflamatorio?:**
- A) Quiste paradental.
 - B) Quiste periodontal lateral.
 - C) Quiste radicular.
 - D) Quiste residual.
- 108. ¿Qué premisa es falsa respecto a la historia clínica odontológica?:**
- A) Es un documento oficial con valor legal.
 - B) Ha de elaborarse siempre con carácter previo a la instauración de un tratamiento.
 - C) No se debe proporcionar a terceros sin el consentimiento expreso del paciente.
 - D) Puede realizarla el higienista o el auxiliar dental.

109. **Con respecto a los fármacos que actúan sobre la hemostasia primaria, es cierto que:**
- A) La aminaftona protege la pared capilar con su efecto vasodilatador.
 - B) El carbazocrom aumenta la fragilidad capilar.
 - C) El etamsilato dificulta la adhesión capilar.
 - D) Ninguno de los anteriores tiene utilidad en el campo bucodental.
110. **Según el artículo 15 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, la formación especializada en Ciencias de la Salud es una formación:**
- A) No reglada, y de carácter oficial.
 - B) Reglada y de carácter autonómico.
 - C) Reglada y de carácter oficial.
 - D) Reglada y de carácter oficial o privado, según los casos.
111. **Considerando la Educación para la Salud como una estrategia de intervención, entre sus objetivos no figura:**
- A) Lograr que las personas adopten la salud como un valor fundamental.
 - B) Modificar los hábitos o conductas insanas.
 - C) Identificar las necesidades de salud.
 - D) Conseguir que las personas estén bien informadas sobre los problemas de la salud y la enfermedad.
112. **Los postes flexibles intrarradiculares pueden ser de (indique la incorrecta):**
- A) Circonio.
 - B) Carbono.
 - C) Cuarzo.
 - D) Vidrio.
113. **Sobre el manejo dental del paciente con cardiopatía isquémica, señale la opción falsa:**
- A) Si dolor precordial en la consulta dental parar el tratamiento.
 - B) Si tiene ángor inestable se puede tratar.
 - C) Si infarto agudo de miocardio hace 6 meses se puede tratar.
 - D) La primera vez que aparece un ángor, se considera inestable.
114. **La eficacia de una medida de salud en poblaciones reales y en situaciones concretas se denomina:**
- A) Eficacia.
 - B) Efectividad.
 - C) Eficiencia.
 - D) Análisis de costes.
115. **Las lesiones gingivales de hiperqueratosis producidas por un cepillado crónico se consideran:**
- A) Lesiones autoinducidas por instrumento.
 - B) Lesiones autoinducidas por parafunción.
 - C) Lesiones iatrogénicas.
 - D) Lesiones por agentes físicos.
116. **Tras nuestro tratamiento de ortodoncia, podría no ser necesaria la retención en casos de (indique la correcta):**
- A) Casos en los que se han cerrado diastemas.
 - B) Mordidas cruzadas anteriores acabadas con sobremordida adecuada.
 - C) Casos de caninos altos tratados con extracción seriada.
 - D) Casos en los que se ha abierto espacio a un diente.

117. **En el Cariogram, modelo predictivo europeo de caries, el color azul claro se relaciona con:**
- A) Experiencia de caries y enfermedades relacionadas con la caries (Circunstancias).
 - B) Cantidad de placa y recuento de estreptococos mutans (Bacteria).
 - C) Contenido de la dieta y frecuencia (Dieta).
 - D) Exposición a fluoruros, secreción de saliva y capacidad buffer salival (Susceptibilidad).
118. **Señale qué aseveración no es cierta respecto a las normas de radiología dental:**
- A) Se debe utilizar la película más rápida compatible con la calidad de imagen deseada.
 - B) Se debe trabajar con tensiones lo más bajas posibles para reducir la dosis.
 - C) El localizador debe diafragmar el campo al mínimo imprescindible, poniéndolo en contacto con la piel del paciente.
 - D) Es recomendable localizar una zona protegida de la radicación ionizante fuera de la sala de trabajo, para colocar un disparador mecánico del tubo de rayos X en ese lugar.
119. **Los mucocelos de las glándulas de Blandin-Nuhn se localizan en:**
- A) Labio inferior.
 - B) Región retromolar.
 - C) Suelo de la lengua.
 - D) Superficie ventral de la lengua.
120. **En el disco articular de la ATM, por su zona de inserción anterior llegan fibras de los músculos (indique la incorrecta):**
- A) Pterigoideo lateral.
 - B) Pterigoideo medial.
 - C) Temporal.
 - D) Masetero.
121. **En lo referente a interacciones farmacológicas, es incorrecto:**
- A) Existen pacientes con mayor riesgo.
 - B) Debemos emplear dosis graduales de fármacos.
 - C) Si aparece una interacción fármaco-fármaco que no ha sido descrita, no existe.
 - D) Debemos identificar el tipo de interacción fármaco-fármaco.
122. **Una de las funciones de los Servicios de Información Sanitaria es la gestión. ¿En qué tipo de gestión encuadraría las decisiones estratégicas de cada institución?:**
- A) Macrogestión.
 - B) Gestión de procesos.
 - C) Microgestión.
 - D) Mesogestión.
123. **Entre las pulpitis degenerativas podemos encontrar:**
- A) La atrofia pulpar.
 - B) La calcificación pulpar.
 - C) La reabsorción dentinaria interna.
 - D) Todas son correctas.
124. **En el tratamiento dental del paciente hipertiroides, señale la opción falsa:**
- A) Evitar las infecciones orales agudas.
 - B) Debemos evitar la mepivacaína como anestésico.
 - C) En paciente controlado podemos aplicar procedimientos normales.
 - D) Debemos evitar la adrenalina.

125. **En cuanto a lesión, virus del papiloma (VPH) comúnmente asociado y localización más habitual, señale la relación correcta:**
- A) Papiloma escamoso – VPH 6, 16 – Mucosa yugal y labial, lengua.
 - B) Papiloma escamoso – VPH 16, 18 – Mucosa yugal y labial, lengua.
 - C) Verruga vulvar – VPH 2, 4 – Borde Bermellón, mucosa labial, parte anterior de la lengua.
 - D) Todas las opciones son incorrectas.
126. **En los casos de glosoptosis en los que queremos avanzar la lengua, además de la mandíbula, elegiremos preferentemente el siguiente aparato funcional:**
- A) Monobloc.
 - B) Frankel.
 - C) Bionator.
 - D) Herbst.
127. **Dentro de la patología pulpar, se trata de un proceso reversible:**
- A) La necrosis pulpar.
 - B) La pulpitis aguda.
 - C) La pulpitis crónica.
 - D) La hiperemia pulpar.
128. **Referente a los selladores de fisuras, es falso que:**
- A) Los selladores sin carga penetran mejor en la fisura e interfieren menos en la oclusión.
 - B) El parámetro clave para evaluar la eficacia de un sellador es la retención de éste.
 - C) La polimerización física (por luz) de los selladores es superior a la polimerización química.
 - D) Los selladores a base de resina tienen una mayor retención y mayor potencial en términos de prevención de caries.
129. **Son medicamentos capaces de producir pigmentación gris en la mucosa todos los siguientes, salvo:**
- A) Amodiaquina.
 - B) Cloroquina.
 - C) Fenazina.
 - D) Fluoxetina.
130. **Según la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, las estructuras fundamentales del sistema sanitario son:**
- A) Las zonas básicas de salud.
 - B) Los centros de salud.
 - C) Los hospitales generales, a los que se vinculan los centros de salud de su respectivo ámbito territorial.
 - D) Las Áreas de Salud.
131. **La administración de fármacos ansiolíticos prequirúrgicos:**
- A) Tiene efectos miorelajantes.
 - B) Tiene efectos anticonvulsionantes.
 - C) Atenúan las reacciones emocionales y la tensión.
 - D) Todas las anteriores son ciertas.
132. **En una crisis hipertensiva, señale la opción falsa:**
- A) Sus síntomas son entre otros, cefaleas y dolor torácico.
 - B) Debemos administrar 40 mg de furosemida IM.
 - C) Debemos poner captopril sublingual.
 - D) Una vez controlada podemos seguir con el tratamiento dental.

133. En dentición temporal no es típico:

- A) Existencia de diastemas interdentarios.
- B) Relación canina de Clase I.
- C) Plano terminal con escalón distal.
- D) Plano terminal con escalón mesial de pequeña magnitud.

468

134. En relación a la candidiasis oral señale la afirmación incorrecta:

- A) *Candida Krusei* es resistente al Fluconazol.
- B) La candidiasis hiperplásica es la forma más frecuente de candidiasis bucal.
- C) El uso tópico de Miconazol potencia el efecto de la Warfarina.
- D) Se recomienda Fluconazol oral para tratar las candidiasis orales moderadas y graves.

308

135. No podemos establecer relación directa entre las plaquetopenias y:

- A) La diabetes.
- B) El lupus eritematoso.
- C) La púrpura de Werlhof.
- D) Determinadas alergias.

245

136. Según la Constitución Española, NO es un derecho fundamental:

- A) El derecho de asociación.
- B) El derecho a la educación.
- C) El derecho a la protección de la salud.
- D) El derecho a sindicarse libremente.

001

137. No influye en el retraso patológico de la erupción:

- A) La anemia ferropénica.
- B) El síndrome de Gardner.
- C) La enfermedad de Touraine.
- D) La enfermedad de Albers-Schönberg.

259

138. De las actividades que se mencionan, ¿cuál no es propia de la odontología comunitaria?:

- A) Encuesta.
- B) Plan de tratamiento.
- C) Análisis de la situación.
- D) Financiación.

405

139. La dosis máxima de carpules de anestésico recomendada es de:

- A) 8 carpules para lidocaína 2%.
- B) 7 carpules para mepivacaína 3%.
- C) 6 carpules para prilocaína 3%.
- D) 5 carpules para articaína 4%.

231

140. Indique el nivel de evidencia y grado de recomendación de un estudio de cohortes individual con recomendación favorable:

- A) 1a/A.
- B) 2b/B.
- C) 3b/C.
- D) 4/D.

403

141. **En relación al sistema TNM del cáncer oral (2017), señale la respuesta incorrecta sobre el valor de la T:**
- A) T1: Tumor \leq 2 cm. El tumor ha invadido los tejidos circundantes hasta una profundidad de 5 mm o menos; esto se denomina profundidad de la invasión (DOI).
 - B) T3: Tumor $>$ 4 cm o bien cualquier tumor con DOI $>$ 10 mm.
 - C) T4a (cavidad oral). el tumor ha invadido las estructuras cercanas de la boca, como la mandíbula, los senos nasales o la piel de la cara.
 - D) T4c: el tumor ha invadido los músculos y los huesos que forman la boca o la base del cráneo y/o recubre a las arterias internas.
142. **Las aleaciones de titanio usadas en implantes dentales suelen incluir:**
- A) Aluminio.
 - B) Oro.
 - C) Paladio.
 - D) Plata.
143. **Paciente mujer de 80 años anticoagulada con acenocumarol (Sintrom®) por arritmia cardiaca por fibrilación auricular. Precisa exodoncia de las piezas 3.1 y 4.1 por absceso periodontal. Señale la opción falsa:**
- A) Control previo de la infección con cobertura antibiótica previa y enjuagues con clorhexidina si precisa.
 - B) Control del INR como mínimo 72 horas antes de la cita.
 - C) Que el INR esté en rango entre 2-3.
 - D) Preferible en citas cortas y matutinas.
144. **Señale la afirmación incorrecta sobre los selladores de fosas y fisuras:**
- A) Las superficies oclusales de los primeros molares permanentes son las que más se benefician de los selladores de fosas y fisuras.
 - B) Los selladores de fosas y fisuras comienzan a ser efectivos inmediatamente tras su colocación.
 - C) La efectividad de los selladores de fosas y fisuras depende fundamentalmente de su retención.
 - D) Hay una alta evidencia de que los selladores de fosas y fisuras son efectivos tanto en pacientes de alto riesgo de caries como en pacientes de bajo riesgo.
145. **Señale la causa más frecuente de pulpitis:**
- A) Infecciosa.
 - B) Traumática.
 - C) Variaciones de presión: barodontalgia.
 - D) Química.
146. **El alginato usado para impresiones dentales:**
- A) Contiene fosfato sódico como acelerador.
 - B) Es un gel hidrocoloide.
 - C) Seguirá absorbiendo agua tras la impresión si se mantiene sumergido en agua.
 - D) Perderá agua por evaporación tras la impresión y encogerá.
147. **Las hojas de balance alimentario son un método de evaluación del consumo alimentario a nivel:**
- A) Nacional.
 - B) Familiar.
 - C) Individual.
 - D) Todas las anteriores son ciertas.

148. Sobre la clínica del síndrome de boca ardiente, señale la errónea:

- A) El ardor suele manifestarse como bilateral.
- B) En ocasiones se asocia un sabor metálico.
- C) Es muy pobre en signos clínicos.
- D) La localización principal es en la mucosa yugal.

317

149. Son criterios de fracaso endodóntico clínico-radiológico todos excepto uno:

- A) Sensibilidad a la palpación y/o percusión.
- B) Movilidad dentaria.
- C) Presencia de fístula.
- D) Ligamento periodontal ensanchado 1 milímetro.

108

150. ¿Cuál de los siguientes tumores odontogénicos no presenta casos en localización extra-ósea?:

- A) Tumor dentinogénico de células fantasma.
- B) Tumor odontogénico epitelial calcificante.
- C) Tumor odontogénico escamoso.
- D) Tumor odontogénico primordial.

368