

1. **Lucía es una paciente de 31 años con historia de trastorno obsesivo compulsivo (TOC) que está siendo tratada con terapia cognitivo conductual. Actualmente está embarazada de tres meses y la gravedad de sus obsesiones y compulsiones ha ido en aumento durante el embarazo. ¿Qué farmacoterapia sería la mejor opción?:**
- A) Clonazepam.
  - B) Clomipramina.
  - C) Paroxetina.
  - D) Sertralina.
2. **De los siguientes enunciados, indique cuál describe mejor la *estereotipia motora*:**
- A) Movimientos oro-linguales involuntarios en paciente usuario durante años de neurolépticos.
  - B) Incapacidad de estar sentado mucho tiempo por necesidad sentida de permanecer en movimiento.
  - C) Repetición reiterada e innecesaria de un acto.
  - D) Persistencia de una postura forzada, anti gravitatoria, sin que la persona trate de recuperar la postura original.
3. **El diagnóstico más frecuentemente asociado a la vivencia de violencia de género es:**
- A) Trastorno por estrés postraumático.
  - B) Depresión.
  - C) Abuso de alcohol.
  - D) Ideación o intentos de suicidio.
4. **¿Cuál de los siguientes rasgos es más frecuente en hombres con trastorno bipolar que en mujeres con el mismo trastorno?:**
- A) Ciclación rápida.
  - B) Abuso de alcohol.
  - C) Trastorno de la conducta alimentaria.
  - D) Trastornos de ansiedad.
5. **Un varón de 28 años es diagnosticado de esquizofrenia. Tiene un índice de masa corporal de 30, triglicéridos en ayunas de 114 mg/dl. ¿Cuál de las siguientes opciones es menos probable que empeore su perfil metabólico?:**
- A) Olanzapina.
  - B) Quetiapina.
  - C) Risperidona.
  - D) Ziprasidona.
6. **¿Qué frecuencia media mínima de atracones de comida se requiere para establecer un diagnóstico de trastorno por atracones en el DSM V?:**
- A) Por lo menos una vez a la semana durante tres meses.
  - B) Al menos dos veces por semana durante tres meses.
  - C) Al menos una vez a la semana durante seis meses.
  - D) Por lo menos dos veces a la semana durante seis meses.
7. **El porcentaje de personas diagnosticadas con un Trastorno Mental Grave de larga duración tratados en la red de salud mental de nuestra comunidad se sitúa entre:**
- A) 22-24%.
  - B) 47-49%.
  - C) 59-61%.
  - D) 5-8%.

408

244

113

362

403

305

106

8. **Señale lo que NO es preciso suprimir de la dieta de pacientes con depresión tratados con IMAOs:**
- A) Quesos curados.
  - B) Huevos cocidos.
  - C) Paté de hígado de cerdo.
  - D) Salami y otros embutidos.
9. **La limitación intencionada de la autonomía de una persona por otra, cuando se apela exclusivamente al beneficio hacia la persona cuya autonomía resulta limitada, se denomina:**
- A) Coacción.
  - B) Imposición.
  - C) Paternalismo.
  - D) Persuasión.
10. **Con respecto a la discinesia tardía, indique la respuesta INCORRECTA:**
- A) Se manifiesta en un 20-30% de los pacientes que siguen un tratamiento a largo plazo con un antagonista del receptor dopaminérgico convencional.
  - B) Los pacientes con trastornos cognitivos o del estado de ánimo concurrente presentan una vulnerabilidad menor.
  - C) El riesgo es mayor en ancianos.
  - D) Se ha demostrado la eficacia de clozapina para reducir las discinesia tardía o la distonía tardía intensas.
11. **¿Cuál de las siguientes condiciones puede ser un factor de riesgo añadido para la aparición de un delirium en un paciente anciano ingresado para intervención quirúrgica de fractura de pelvis?:**
- A) Infección del tracto urinario.
  - B) Infección de herida quirúrgica.
  - C) Deshidratación.
  - D) Todas las anteriores.
12. **Entre las características que tiene un grupo de apoyo mutuo (GAM) se encuentran las siguientes EXCEPTO:**
- A) Están basados en la horizontalidad de las relaciones y la igualdad.
  - B) Son espacios de debate y de mejora de las relaciones sociales.
  - C) El principal punto de unión de las personas es el compartir una experiencia en común y/o una misma necesidad.
  - D) Ninguna persona está obligada ni a vincularse ni a asistir a las sesiones.
13. **Los trastornos de personalidad en la DSM-5 se agrupan en:**
- A) Dos grupos.
  - B) Tres grupos.
  - C) Cuatro grupos.
  - D) Cinco grupos.
14. **Según el artículo 22 sobre el acceso a la formación especializada regulado en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, la oferta de plazas de la convocatoria anual se fijará por:**
- A) El Consejo Interterritorial de Salud.
  - B) El Consejo Nacional de Especialidades de Ciencias.
  - C) El Ministerio de Educación y Formación Profesional.
  - D) La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud.

409

139

320

221

451

154

029

15. **¿Cuál de las siguientes patologías cerebrovasculares se asocia con más frecuencia al consumo de cocaína? Señálela:**
- A) Hemorragia subaracnoidea.
  - B) Hemorragia intraparenquimatosa.
  - C) Infartos cerebrales no hemorrágicos.
  - D) Hemorragias intraventriculares.
16. **Según el Preámbulo de la Convención sobre Derechos Humanos de las personas con discapacidad, cualquier discriminación contra las personas con discapacidad constituye:**
- A) Un delito que puede ser considerado odio.
  - B) Una falta en el cumplimiento de la convención.
  - C) Una falta leve.
  - D) Una violación de los derechos humanos.
17. **Respecto al trastorno bipolar, es CIERTO que:**
- A) Los episodios de manía son más frecuentes en mujeres.
  - B) La prevalencia del trastorno bipolar I es igual en ambos sexos.
  - C) El abuso de sustancias comórbido es más frecuente en mujeres.
  - D) El inicio del trastorno bipolar tipo I es más tardío que el del trastorno de depresión mayor.
18. **Según el Observatorio del Suicidio en España 2022 basado en datos del Instituto Nacional Estadística (INE), señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) Por primera vez en su historia, los suicidios de varones superan las 3.000 defunciones.
  - B) Han disminuido casi a la mitad los suicidios de niños menores de 15 años.
  - C) El ahorcamiento sigue siendo el método más utilizado en ambos sexos.
  - D) Por primera vez desde 2008, el suicidio deja de ser la principal causa externa de muerte en España.
19. **El núcleo supraquiasmático o “marcapasos circadiano” se ve afectado por la actividad, la luz, y ¿qué neurotransmisor?:**
- A) Acetilcolina.
  - B) Melatonina.
  - C) Norepinefrina.
  - D) Serotonina.
20. **Sobre la entrevista psiquiátrica, es incorrecto:**
- A) Es el instrumento fundamental para el diagnóstico en psiquiatría.
  - B) En el caso de que haya poca disposición de tiempo es preferible obviar los aspectos médicos y centrarse en los aspectos psicosociales.
  - C) Comparte muchos elementos con la entrevista médica estándar.
  - D) Al abordar al paciente delirante se debe evitar tanto la reafirmación como la confrontación precoz con el delirio.
21. **El síndrome amotivacional fue descrito, inicialmente, en los consumidores de una de las drogas que se enumeran a continuación, señálela:**
- A) Heroína.
  - B) Cocaína.
  - C) Cannabis.
  - D) Anfetaminas.
22. **¿Cuál de los siguientes síntomas es menos probable que se presente en una intoxicación aguda por nicotina? Señálelo:**
- A) Taquicardia.
  - B) Alucinaciones visuales.
  - C) Labilidad de estado de ánimo.
  - D) Insomnio.

23. **¿Cuál de las siguientes alteraciones cognoscitivas o perceptivas están asociadas al trastorno de la personalidad límite?:**
- A) Ideas de referencia.
  - B) Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés.
  - C) Pensamientos y discursos extraños.
  - D) Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas ilusiones corporales.
24. **Todas las siguientes son estrategias de prevención del suicidio a nivel poblacional (universal), EXCEPTO:**
- A) Facilitar el acceso a la atención de salud.
  - B) Limitar el acceso a los medios utilizables para suicidarse.
  - C) Promover una información responsable por parte de los medios de comunicación.
  - D) Atención a los familiares de personas que se han suicidado.
25. **La fatiga que no cesa con la suspensión del trabajo intelectual y tampoco con el reposo nocturno se conoce clásicamente como:**
- A) Fatiga crónica o *surmenage*.
  - B) Astenia.
  - C) Síndrome de burnout.
  - D) Holoastenia.
26. **En uno de los siguientes procesos se ha podido reconocer un factor específico transmisible como causante etiológico, señálelo:**
- A) Enfermedad de Pick.
  - B) Enfermedad de Alzheimer.
  - C) Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
  - D) Parálisis supranuclear progresiva.
27. **¿Cuál de estas patologías constituye una contraindicación absoluta para la realización de la terapia electroconvulsiva (TEC)?:**
- A) Paciente cardíopata y con edad superior a 85 años.
  - B) Infarto agudo de miocardio hace 70 días.
  - C) HTA maligna.
  - D) No hay contraindicaciones absolutas.
28. **Con respecto a la terapia electroconvulsiva de mantenimiento (TEC-M) NO es cierto que:**
- A) Una vez establecida la indicación sería recomendable volver a obtener el consentimiento informado.
  - B) Es aconsejable espaciar las sesiones de forma progresiva hasta la frecuencia mínima compatible con el mantenimiento de la remisión clínica.
  - C) La pauta fija siempre es aconsejable al inicio de las sesiones frente a la pauta flexible.
  - D) No existen estudios (hasta la fecha) que indiquen durante cuánto se debería mantener en el tiempo.
29. **Entre las intervenciones claves eficaces basadas en la evidencia para la prevención del suicidio según el documento de la OMS "LIVE LIFE" NO sería:**
- A) Desarrollar aptitudes para la vida de los jóvenes.
  - B) Financiación a los proyectos.
  - C) Limitar el acceso a los medios del suicidio.
  - D) Detectar a tiempo a todas las personas afectadas.
30. **¿Cuál de los siguientes NO figura en la actual Clasificación DSM V en el epígrafe de los trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados?:**
- A) Tricotilomanía.
  - B) Trastorno por acumulación.
  - C) Trastorno por somatización.
  - D) Trastorno dismórfico corporal.

31. El fenómeno de **despersonalización** se observa en una de las siguientes patologías con más frecuencia que en el resto de las patologías que se enumeran a continuación, señálela:
- A) Trastornos obsesivos.
  - B) Esquizofrenia.
  - C) Episodio maniaco.
  - D) Crisis de pánico.
32. ¿Cuál de los siguientes se considera “rasgos o patrones de personalidad prominentes” en la CIE 11?:
- A) Desapego en los trastornos o dificultades de la personalidad.
  - B) Afectividad negativa en los trastornos o dificultades de la personalidad.
  - C) Comportamiento disocial en los trastornos o dificultades de la personalidad.
  - D) Todos los anteriores.
33. Es característico de los terrores nocturnos:
- A) Suceden en la fase REM.
  - B) Se presentan con mayor frecuencia en la adolescencia.
  - C) Hay amnesia posterior total o parcial.
  - D) Son más frecuentes que las pesadillas.
34. El Marco de Poder Amenaza y Significado (The Power Threat Meaning framework) de la División de Psicología Clínica (DCP) de la Sociedad Británica de Psicología es:
- A) Un abordaje específico de la psicosis de inicio a nivel psicosocial.
  - B) Un sistema conceptual que incorpora factores sociales, psicológicos y biológicos como alternativa al diagnóstico psiquiátrico funcional.
  - C) Una guía de reformulación diagnóstica frente a lo establecido.
  - D) Una crítica a la corriente antipsiquiátrica.
35. ¿Cuál es la anomalía cerebral estructural más frecuentemente observada en las pruebas de imagen realizadas a pacientes con esquizofrenia? Marque la opción correcta:
- A) Ensanchamiento de los surcos cerebrales.
  - B) Atrofia cerebral generalizada.
  - C) Dilatación ventricular.
  - D) Engrosamiento meníngeo.
36. El conjunto sindrómico caracterizado por síntomas parkinsonianos, alucinaciones visuales, delirios y reacciones adversas a los antipsicóticos es típica de una de las demencias que se citan a continuación, señálela:
- A) Demencia por cuerpos de Lewy.
  - B) Demencia vascular.
  - C) Demencia frontotemporal.
  - D) Pseudodemencia depresiva.
37. Uno de los siguientes NO es un criterio diagnóstico del delirium, según la CIE-10:
- A) Presenta deterioro de la conciencia y de la atención.
  - B) Deterioro de la memoria global pero con orientación en el tiempo.
  - C) Se asocia con insomnio, miedos, irritabilidad.
  - D) Es transitorio y de intensidad fluctuante.
38. ¿Cuál de los siguientes no pertenece al grupo A de los trastornos de personalidad en la DSM-5?:
- A) Trastorno de la personalidad paranoide.
  - B) Trastorno de la personalidad esquizoide.
  - C) Trastorno de la personalidad esquizotípica.
  - D) Trastorno de la personalidad dependiente.

39. Señale la afirmación incorrecta referente a las reacciones fisiológicas que el estrés genera en el organismo sano, de entre las que se citan a continuación:
- A) Los factores estresantes activan los sistemas noradrenérgicos centrales.
  - B) Los factores estresantes disminuyen la neurotransmisión dopaminérgica en vías meso frontales.
  - C) El hipotálamo secreta factor liberador de corticotropina (CRF) generando liberación de hormona adrenocorticotropa (ACTH).
  - D) La activación del eje hipotálamo - hipofisario - suprarrenal (HHS) puede generar una respuesta tanto de inhibición como de activación del sistema inmunitario.
40. Señale la respuesta INCORRECTA sobre el desarrollo y curso del trastorno del espectro autista (TEA):
- A) Los síntomas de TEA se reconocen por lo general durante el segundo año de vida (12-24 meses).
  - B) Los síntomas de TEA no se notan hasta los 5-6 años de edad o después.
  - C) El TEA no es un trastorno degenerativo, y es normal que el aprendizaje y la compensación continúen durante toda la vida.
  - D) Los primeros síntomas implican con frecuencia un retraso en el desarrollo del lenguaje, que a menudo se acompaña de una ausencia de intereses sociales o de interacciones sociales inusuales.
41. Paciente varón de 45 años con abuso de alcohol activo que ingresa para una intervención programada de tumor mandibular. Al cuarto día del postoperatorio y tras presentar dos noches de insomnio casi global, comienza a mostrarse nervioso, agitado, refiere estar viendo insectos en las sábanas y suelo, no sabe precisar dónde se encuentra y está objetivamente sudoroso. Respecto al cuadro que este paciente sugiere, indique de las siguientes cuál es una afirmación incorrecta:
- A) Son de especial importancia en su tratamiento las medidas de soporte, el control hidroelectrolítico, el control de la diuresis y la prevención de complicaciones.
  - B) Las alucinaciones visuales suelen ser muy vívidas y generar una importante repercusión afectiva siendo imprescindibles para el diagnóstico.
  - C) Puede presentar también delirios de tipo ocupacional.
  - D) Sin tratamiento adecuado es un cuadro con una tasa de mortalidad del 50%.
42. Un deber *prima facie* es:
- A) Un deber prioritario salvo que entre en conflicto otro de igual o mayor valor ético.
  - B) Un deber personal y profesional.
  - C) Un deber institucional explícito.
  - D) Un deber social implícito.
43. Según la CIE 10, dentro de los trastornos de las emociones de comienzo específico en la infancia NO está incluido:
- A) Trastorno de hipersensibilidad social de la infancia.
  - B) Rivalidad entre hermanos.
  - C) Mutismo selectivo.
  - D) Trastorno de ansiedad de separación en la infancia.
44. El LSD (dietilamida del ácido lisérgico) es una sustancia alucinógena que provoca alteraciones en la sensopercepción, cambios psicológicos, conductuales y efectos somáticos. Dentro de las complicaciones somáticas que pueden presentarse tras su consumo, indique cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:
- A) Se ha descrito la presencia de hipertermia y rabdomiólisis.
  - B) No se han descrito malformaciones congénitas en los nacidos de madres consumidoras durante la gestación.
  - C) Se han descrito déficits cerebrales residuales por vasoespasmo.
  - D) Se han descrito estados de coma, aunque no se ha demostrado mortalidad directamente relacionada con el consumo.

45. **La escala de Yale-Brown se utiliza para medir:**  
A) Grado de ansiedad.  
B) Riesgo suicida.  
C) Gravedad de síntomas TOC.  
D) Cribado de consumo de alcohol. 311
46. **Cuando una madre informa, a sabiendas y con engaños, de signos y síntomas de la enfermedad de su niño en edad escolar que obligan a hospitalizarlo y someterlo a numerosas pruebas y procedimientos, ¿qué diagnóstico psiquiátrico se registraría para el niño según el DSM V?:**  
A) Síndrome de Munchausen por poderes.  
B) Ausencia de diagnóstico.  
C) Trastorno facticio por poderes.  
D) Síndrome de Munchausen aplicado a otro. 353
47. **La Región de Murcia lidera actualmente la coordinación nacional de dos buenas prácticas europeas sobre trastorno mental grave y prevención del suicidio en el marco de la denominada acción conjunta (JA):**  
A) CHRODIS.  
B) JADECARE.  
C) ImpleMENTAL.  
D) ACTIVAMENTE. 433
48. **¿Qué documento de orden internacional inspira de forma prioritaria la regularización de las leyes que dieron lugar al Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su inclusión social?:**  
A) El Marco Asistencial de Naciones Unidas para el Desarrollo.  
B) La Declaración Universal de Derechos Humanos.  
C) La Estrategia Europea sobre discapacidad 2010-2020.  
D) La Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. 160
49. **De entre los síntomas que se nombran a continuación, ¿cuál es el más frecuente en la abstinencia a cafeína? Señálelo:**  
A) Cefalea.  
B) Náuseas.  
C) Piloerección.  
D) Agitación. 262
50. **Respecto al trastorno ciclotímico, señale la opción CORRECTA:**  
A) Puede presentar episodios de trastorno depresivo mayor.  
B) La relación mujeres varones es de 3:2.  
C) Una prueba de estimulantes ayuda a los pacientes con trastorno ciclotímico.  
D) No suele coexistir con el trastorno límite de la personalidad. 330
51. **Según el artículo 1 del Real Decreto 137/1984, de 11 de enero, sobre estructuras básicas de salud, el marco territorial de la atención primaria de salud es:**  
A) El Área de Salud.  
B) El Centro de Salud.  
C) La Zona de Salud.  
D) La Zona Primaria de Salud. 027

52. **¿Cuál de los siguientes constituye uno de los 5 ejes de la actual Estrategia de Mejora de SM 2023-2026 en nuestra Comunidad?:**
- A) Promoción de activos en salud mental en coordinación con atención primaria.
  - B) Ciudadanía: estigma y derechos.
  - C) Prevención del suicidio.
  - D) Programa Trastorno Mental Grave.
53. **Según el DSM V, el trastorno por juego produce algunos síntomas comportamentales similares a los de ¿qué otra entidad nosológica?:**
- A) Cleptomanía.
  - B) Trastorno relacionado con sustancias.
  - C) Personalidad anancástica.
  - D) Personalidad límite.
54. **Señale la respuesta INCORRECTA respecto al trastorno de ansiedad fóbica:**
- A) La edad de inicio más frecuente es la adolescencia.
  - B) Suele haber comorbilidad con otros trastornos de ansiedad o trastornos del estado de ánimo.
  - C) Algunos investigadores han postulado que la actividad dopaminérgica se relaciona con la patogenia del trastorno.
  - D) La probabilidad de antecedentes familiares de fobia social en los pacientes con este trastorno es la misma que en individuos sin trastornos mentales.
55. **La hiperventilación con oxígeno antes de la aplicación del estímulo eléctrico de la terapia electroconvulsiva:**
- A) Incrementa el umbral convulsivo.
  - B) Acorta la duración de la crisis.
  - C) Prolonga la duración de la crisis.
  - D) Necesidad de cargas menores y prolonga la duración de la crisis.
56. **¿En cuál de los siguientes trastornos neuropsiquiátricos está notablemente disminuido el neurotransmisor inhibitor GABA (ácido gamma amino butírico)?:**
- A) Enfermedad de Pick.
  - B) Demencia vascular.
  - C) Enfermedad de Huntington.
  - D) Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
57. **¿Cuál de los siguientes tiene mayor nivel de calidad de evidencia científica?:**
- A) Serie de casos.
  - B) Comité de expertos.
  - C) Metaanálisis de ensayos clínicos aleatorios.
  - D) Estudios de cohortes.
58. **¿Qué estructura cerebral, de las que se nombran a continuación, no participa del circuito de recompensa implicado en el abuso de sustancias?:**
- A) Amígdala.
  - B) Hipocampo.
  - C) Córtex prefrontal.
  - D) Córtex occipital.
59. **Indique, de entre las siguientes estructuras cerebrales, cuál es la que contiene la mayor parte de las neuronas serotoninérgicas:**
- A) Núcleos del rafe.
  - B) Sustancia negra y área tegmental ventral.
  - C) Locus ceruleus.
  - D) Núcleo tuberomamilar.

60. **¿Cuál de las siguientes manifestaciones es característica del trastorno de la personalidad narcisista?:**
- A) Un patrón de inhibición social, sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa.
  - B) Un patrón de malestar agudo en las relaciones cercanas, distorsiones cognitivas o preceptivas y comportamiento excéntrico.
  - C) Un patrón de grandiosidad, necesidad de admiración y falta de empatía.
  - D) Un patrón de inestabilidad en las relaciones interpersonales, en la autoimagen y en las emociones y una notable impulsividad.
61. **La asociación entre determinadas edades o etapas de la vida del niño y la aparición o mayor relevancia que toman determinados síntomas o síndromes de orden psíquico, se denomina:**
- A) Psicobiografía.
  - B) Calendario evolutivo.
  - C) Trastorno del desarrollo.
  - D) Desarrollo natural.
62. **Según el Protocolo de Coordinación Sociosanitaria en la atención a personas con trastorno mental grave y/o drogodependencia (TMG-D) de la CARM, señale la opción falsa:**
- A) El TMG-D requiere un modelo de abordaje integral, incluyendo al paciente en la propuesta de objetivos del plan de actuación coordinada.
  - B) El espacio natural y operativo de la coordinación sociosanitaria es el ámbito comunitario y local.
  - C) Resuelve los procesos de modificación de la capacidad jurídica e institucionalización de las personas con TMG-D.
  - D) Se lleva a la práctica a través de comisiones de trabajo reunidas con regularidad, en las que se pactan objetivos comunes y se tratan problemas concretos.
63. **Señale la respuesta INCORRECTA sobre el trastorno de la personalidad narcisista:**
- A) Explotación de las relaciones interpersonales.
  - B) Preocupación por fantasías de éxito o de poder.
  - C) Perfeccionismo que interfiere en la terminación de las tareas.
  - D) Prevalencia entre el 1-6% de la población.
64. **Sobre el efecto Papageno en la prevención del suicidio NO es correcto que:**
- A) Este nombre proviene del personaje homónimo del cuento popular "La flauta mágica" de Mozart.
  - B) Es necesario evitar el tratamiento sensacionalista de la noticia de un suicidio.
  - C) Corresponde al efecto preventivo que puede tener sobre la conducta suicida una comunicación de los medios responsable.
  - D) Publicar notas suicidas puede ayudar a sensibilizar a la población.
65. **Con relación a las psicosis puerperales, señale cuál de los siguientes enunciados es correcto:**
- A) Los síntomas suelen comenzar entre los cuatro y los seis meses tras el parto.
  - B) Muy raramente coincide con complicaciones en el parto.
  - C) Es más probable que ocurra si hay antecedentes de una psicosis puerperal previa.
  - D) Se presenta en el 1% de los partos.
66. **¿Cuál de los siguientes no se considera un estudio descriptivo?:**
- A) Estudios ecológicos.
  - B) Serie de casos.
  - C) Estudios de prevalencia.
  - D) Estudios de casos y controles.

67. **Respecto a la piromanía, señale la afirmación FALSA:**
- A) La provocación de incendios es episódica y su frecuencia puede crecer o menguar.
  - B) Suele darse con mucha más frecuencia en hombres que en mujeres.
  - C) Es raro en los menores de edad.
  - D) El pronóstico es peor en adultos porque suelen negar sus acciones, rechazar responsabilidades y carecer de introspección.
68. **¿Qué tipo de amnesia se presenta más a menudo en la amnesia disociativa?:**
- A) Amnesia continua.
  - B) Amnesia permanente irreversible.
  - C) Amnesia localizada o selectiva para eventos específicos.
  - D) Amnesia generalizada similar a la observada en la toxicidad neurológica.
69. **El mecanismo de defensa mediante el cual se rehúyen las emociones inaceptables mediante su canalización en conductas socialmente aceptables, se denomina:**
- A) Racionalización.
  - B) Idealización.
  - C) Sublimación.
  - D) Desplazamiento.
70. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la encopresis es verdadera?:**
- A) Las infecciones de las vías urinarias pueden ser comórbidas con encopresis, y son más comunes en las niñas.
  - B) Cuando el trastorno oposicionista desafiante o trastorno de la conducta está presente, no se puede diagnosticar encopresis.
  - C) Se estima que las tasas de prevalencia de encopresis a los 5 años son de un 5%.
  - D) Cuando el estreñimiento está presente, no se puede diagnosticar de encopresis.
71. **Señale de entre las afirmaciones siguientes cuál de ellas es incorrecta respecto al Clometiazol:**
- A) Está contraindicado en mujeres gestantes.
  - B) No presenta actividad anticonvulsivante.
  - C) Presenta riesgo de abuso y dependencia.
  - D) No tiene metabolización hepática.
72. **Son características del síndrome de Asperger todas las siguientes EXCEPTO:**
- A) Repertorio restringido, estereotipado y repetitivo de actividades, intereses y conductas.
  - B) Dificultad para reconocer y responder a las expresiones y gestos de los demás.
  - C) Retraso en el desarrollo del lenguaje receptivo o expresivo y deterioro cognitivo clínicamente significativo.
  - D) Posibilidad de cierto retraso en la consecución de hitos motores y cierto grado de torpeza.
73. **Entre los factores de riesgo relacionados con el incremento de los efectos secundarios cognitivos de la terapia electroconvulsiva (TEC) atribuibles a la técnica, según el consenso nacional de la TEC (2018), NO se encuentra:**
- A) Menor duración de la crisis convulsiva.
  - B) Posición bilateral de los electrodos.
  - C) Menor tiempo transcurrido entre sesiones.
  - D) Carga total elevada.
74. **Todos los siguientes son hallazgos descritos en pacientes con trastorno del espectro autista excepto uno, señálelo:**
- A) Retraso en la maduración de los lóbulos frontales.
  - B) Activación amigdalal reducida durante el procesamiento de emociones faciales.
  - C) Aumento de los ventrículos laterales.
  - D) Atrofia cerebral generalizada.

75. **El consumo crónico de alcohol puede producir una de las patologías que se nombran a continuación, señálela:**
- A) Artrosis.
  - B) Estreñimiento.
  - C) Atrofia testicular.
  - D) Aumento de la agregación plaquetaria.
76. **¿Cuál de los siguientes síntomas de los ataques de pánico es considerado como específico de la cultura?:**
- A) Desrealización.
  - B) Dolores de cabeza.
  - C) Miedo a volverse loco.
  - D) Sensación de calor.
77. **Con respecto a la esketamina intranasal NO es cierto que:**
- A) Debe combinarse con un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS) o inhibidor de la recaptación de serotonina y noradrenalina (IRSN).
  - B) Es un antagonista no selectivo y no competitivo del receptor de N-metil-daspartato (NMDA).
  - C) La dosis recomendada en adultos < 65 años en la fase de inducción (semanas 1-4) es de una dosis inicial (día 1) de 56 mg y posteriormente 56 mg u 84 mg dos veces por semana.
  - D) Se debe administrar con precaución en pacientes con antecedentes de hemorragia intracerebral.
78. **Entre los elementos integrantes del consentimiento informado se han descrito todos los siguientes, excepto:**
- A) Voluntariedad.
  - B) Información suficiente en calidad y cantidad.
  - C) Competencia para que haya validez.
  - D) Participación de la familia y allegados en el proceso de decisión.
79. **En relación con el consumo de cannabis durante el embarazo, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:**
- A) El tetrahidrocannabinol (THC) atraviesa la barrera placentaria.
  - B) Los nacidos de madres consumidoras de cannabis durante el embarazo pueden tener bajo peso al nacer.
  - C) El THC no pasa a leche materna.
  - D) Durante la infancia, los bebés nacidos de madres consumidoras de cannabis durante el embarazo pueden tener alteradas las funciones cognitivas.
80. **Conforme al artículo 22 de la Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los Derechos y Deberes de los Usuarios del Sistema Sanitario de la Región de Murcia, los usuarios y pacientes de los servicios sanitarios de la Región de Murcia, ¿tienen derecho a estar acompañados?:**
- A) En todo caso.
  - B) Solo los pacientes.
  - C) Por, al menos, un familiar o persona de su confianza, excepto en los casos en que esta presencia, según criterios médicos, sea desaconsejable o incompatible con la prestación sanitaria.
  - D) Si la normativa interna del centro lo permite.
81. **¿En qué aspecto del trastorno de ansiedad generalizada difieren más comúnmente varones y mujeres?:**
- A) Curso.
  - B) Sintomatología.
  - C) Patrones de comorbilidad.
  - D) Edad de inicio.

255

309

436

117

237

037

348

82. **Son síntomas del trastorno por déficit de atención con hiperactividad según el DSM 5 los siguientes excepto:**
- A) Tiene dificultad para organizar tareas y actividades.
  - B) Repetición de sonidos y sílabas.
  - C) Juguetea o golpea las manos o los pies o se retuerce en el asiento.
  - D) Actúa como si le "impulsara un motor".
83. **El conjunto de expectativas, creencias y respuestas emocionales que el paciente aporta en la relación médico-paciente, se denomina:**
- A) Transferencia.
  - B) Contratransferencia.
  - C) Racionalización.
  - D) Contraevaluación.
84. **Son factores de riesgo asociados al trastorno de ideas delirantes todos EXCEPTO:**
- A) Edad temprana.
  - B) Alteración o privación sensorial.
  - C) Antecedentes familiares.
  - D) Sensibilidad interpersonal pronunciada.
85. **¿Cuál de las siguientes NO es una posible etiología médica de los síndromes delirantes?:**
- A) Enfermedad de Alzheimer.
  - B) Anfetaminas.
  - C) Hipocalcemia.
  - D) Tumores cerebrales.
86. **¿Cuál de los siguientes fenómenos se considera paramnesia?:**
- A) Falsificaciones retrospectivas.
  - B) Fabulaciones.
  - C) Fenómeno de "déjà vu".
  - D) Todas las anteriores se consideran paramnesias.
87. **¿Cuál de las siguientes características es necesaria para establecer un diagnóstico de trastorno de insomnio?:**
- A) Dificultad para espabilarse tras el despertar.
  - B) Dificultad con el inicio o mantenimiento del sueño, o despertar de madrugada con incapacidad para volver a dormir.
  - C) Ausencia de un trastorno mental coexistente.
  - D) Persistencia de dificultades para dormir a pesar del uso de agentes sedantes-hipnóticos.
88. **Respecto a la exploración de la conciencia, señale cuál de las siguientes no es un requisito:**
- A) Un nivel (despierto o consciente).
  - B) Conocimiento de nosotros mismos (del yo personal).
  - C) Establecer una relación entre pasado, presente y futuro (orientación en tiempo).
  - D) Preservar la capacidad de introspección.
89. **La afasia adquirida con epilepsia es llamada también:**
- A) Síndrome de Rett.
  - B) Síndrome de Landau-Kleffner.
  - C) Síndrome de Lesch-Nyhan.
  - D) Síndrome de Heller.

90. **Referente a los equipos de tratamiento asertivo comunitario en nuestra región, señale la opción correcta:**
- A) Son equipos interdisciplinarios que atienden a personas con diagnóstico de trastorno mental grave en programa de adultos, infanto-juvenil y drogodependencias, con dificultades para mantener la vinculación con los centros de salud mental.
  - B) Desarrollan una atención al paciente en su entorno, basada en un tratamiento farmacológico y seguimiento intensivo domiciliario, en coordinación con los recursos socio-sanitarios de su comunidad.
  - C) Tienen capacidad de intervenir aunque el paciente no otorgue su consentimiento.
  - D) Los equipos están constituidos por: psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermería especialista en salud mental y trabajadores sociales.
91. **En relación al síndrome de Wernicke-Korsakoff, señale la opción falsa:**
- A) La encefalopatía de Wernicke puede ser reversible con el tratamiento adecuado.
  - B) Su presentación está relacionada con el déficit de Tiamina (vitamina B1).
  - C) En la encefalopatía de Wernicke se producen alteraciones de la motilidad ocular.
  - D) Es típica la afectación de la corteza prefrontal dorsolateral.
92. **Respecto al trastorno de la personalidad esquizotípico, señale la respuesta INCORRECTA:**
- A) Se presenta en un 3% de la población.
  - B) Los individuos no presentan alteraciones del pensamiento y la comunicación.
  - C) Hay un patrón de deficiencias sociales e interpersonales con poca capacidad para las relaciones estrechas.
  - D) Se presentan distorsiones cognitivas o preceptivas y comportamiento excéntrico.
93. **Entre los factores protectores que disminuyen la probabilidad de un comportamiento autolítico, están todos los siguientes excepto:**
- A) Presentar flexibilidad cognitiva.
  - B) Tener hijos, más concretamente en hombres.
  - C) Apertura a nuevas experiencias.
  - D) Habilidad para las relaciones sociales e interpersonales.
94. **¿En cuál de las siguientes situaciones no plantearía inicialmente la evaluación de la capacidad mental de una persona?:**
- A) Ante una persona con manifiesta desorientación y delirios.
  - B) Cuando hay antecedentes de deterioro cognitivo en la historia personal del paciente.
  - C) Ante el rechazo de un tratamiento indicado cuando el paciente no argumenta las razones de forma lógica.
  - D) Tras un episodio de embriaguez.
95. **Una mujer de 30 años con esquizofrenia ha estado tomando una dosis terapéutica de olanzapina (20 mg/día) durante 6 meses. No ha mostrado respuesta, pero tampoco efectos secundarios. La actuación ideal en este punto sería:**
- A) Obtener un nivel de plasma de olanzapina.
  - B) Aumentar la dosis de olanzapina.
  - C) Cambiar a un antipsicótico distinto.
  - D) Bajar la dosis de olanzapina y añadir otro de otra familia.

108

225

360

437

115

402

- 230
96. **Paciente de 57 años que acude acompañado por su pareja, por presentar dificultad para empezar a caminar, con inestabilidad en la marcha, dificultades para prestar atención e incontinencia urinaria. Respecto a la patología que este cuadro sugiere, señale la afirmación falsa de entre los enunciados que siguen:**
- A) Son posibles causas del cuadro tumores del sistema nervioso central, meningitis y traumatismos craneoencefálicos.
  - B) Puede ocurrir también incontinencia fecal.
  - C) Las alteraciones psicopatológicas presentes en este cuadro pueden incluir amnesia, dificultad para prestar atención, apatía o estado de ánimo indiferente.
  - D) Su tratamiento de elección son los inhibidores de la acetilcolinesterasa.
- 324
97. **¿Cuál de los siguientes tipos de fobia específica tiene más probabilidad de estar asociado a un síndrome vaso-vagal?:**
- A) Entorno natural.
  - B) Tipo sangre-inyecciones-heridas.
  - C) Situacional.
  - D) Animal.
- 428
98. **Entre los signos y síntomas del síndrome de abstinencia a benzodiazepinas NO se encuentra:**
- A) Delirium.
  - B) Despersonalización.
  - C) Hipoacusia.
  - D) Hiperestesia.
- 258
99. **En los pacientes con esclerosis múltiple, señale, de entre los siguientes cuadros, cuál es el que se presenta de forma concomitante con más frecuencia:**
- A) Depresión.
  - B) Manía.
  - C) Trastorno de pánico.
  - D) Psicosis.
- 256
100. **¿En cuál de las patologías que se nombran a continuación es más frecuente encontrar polidipsia psicógena? Señálela:**
- A) Esquizofrenia.
  - B) Trastorno de personalidad.
  - C) Trastorno hipocondríaco.
  - D) Demencia.
- 407
101. **¿Cuál de los siguientes fármacos puede disminuir la ansiedad pero NO tiene actividad sedativa, hipnótica, anticonvulsiva o relajante musculoesquelética?:**
- A) Diazepam.
  - B) Buspirona.
  - C) Mirtazapina.
  - D) Haloperidol.
- 216
102. **La metadona es un fármaco muy frecuentemente utilizado en el tratamiento de la dependencia a opiáceos, señale la afirmación incorrecta entre los enunciados siguientes:**
- A) La vida media promedio de la metadona es cercana a 24h.
  - B) La metadona está indicada en el tratamiento de deshabituación de heroínómanas gestantes.
  - C) La interrupción brusca del tratamiento con metadona desencadena síntomas de abstinencia a partir de las 12h desde la última administración.
  - D) No se han notificado efectos teratogénicos de la metadona.

103. La escala de Plutchik se utiliza para medir:

- A) Impulsividad-suicidio.
- B) Ansiedad-depresión.
- C) Deterioro cognitivo.
- D) Razones para vivir.

443

104. Con respecto a la evolución y pronóstico de la esquizofrenia, señale la respuesta INCORRECTA:

- A) Los síntomas positivos tienden a disminuir en gravedad con el tiempo.
- B) Cada recaída en la psicosis provoca un deterioro posterior consecuente del grado de actividad basal.
- C) El inicio tardío es un signo de buen pronóstico.
- D) Los antecedentes familiares de trastorno del estado de ánimo son un signo de mal pronóstico.

318

105. Un patrón en un niño de 6 años con arrebatos en el comportamiento, que reflejan una falta de control de impulsos de la agresividad, manifestada en agresión verbal o física contra la propiedad, los animales u otros individuos en promedio de 2 veces por semana sin provocar daños ni destrucción, de magnitud suficiente, sin ser premeditados y sin una enfermedad orgánica que explique mejor el cuadro. Según el DSM 5 podríamos estar ante:

- A) Trastorno negativista desafiante.
- B) Trastorno de la conducta de inicio infantil.
- C) Trastorno explosivo intermitente.
- D) Trastorno de la personalidad antisocial.

423

106. De las siguientes intervenciones en la lucha contra el estigma en salud mental, ¿cuál ha demostrado ser más eficaz para reducir el estigma?:

- A) Protesta.
- B) Formación de tutores.
- C) Contacto social.
- D) Psicoeducación.

141

107. Indique, de entre los siguientes enunciados, cuál se corresponde mejor con la definición de alexitimia:

- A) Es un estado de ánimo exaltado y jovial.
- B) Es un estado de ánimo en el que la persona se muestra fácilmente irritada o enfadada.
- C) Es un estado en el que la persona no experimenta placer ni satisfacción con actividades que previamente sí se lo producían.
- D) Es la incapacidad para reconocer y expresar los propios sentimientos y estado de ánimo.

208

108. ¿En cuál de los siguientes trastornos de personalidad esperaría usted encontrar ausencia de remordimientos y fracaso para planificar con antelación el futuro?:

- A) Trastorno paranoide de la personalidad.
- B) Trastorno antisocial de la personalidad.
- C) Trastorno límite de la personalidad.
- D) Trastorno anancástico de la personalidad.

303

109. ¿Cuál de las siguientes escuelas de psicoterapia se centra en los determinantes actuales de la conducta y los fenómenos contrastables y observables de ésta?:

- A) Sistémica.
- B) Psicodinámica.
- C) Humanista.
- D) Cognitiva-conductual.

454

110. **¿Cuál de los siguientes NO es un factor predisponente de vulnerabilidad al trastorno por estrés postraumático (TEPT)?:**
- A) Sexo masculino.
  - B) Cambios vitales recientes estresantes.
  - C) Presencia de trauma infantil.
  - D) Reciente ingestión excesiva de alcohol.
111. **Sobre la capacidad jurídica, actualmente en nuestro país, señale la afirmación incorrecta:**
- A) Todas las personas tienen capacidad jurídica.
  - B) El Estado debe proporcionar los apoyos necesarios para el ejercicio de la capacidad jurídica de una persona con discapacidad.
  - C) Un niño de dos años no tiene capacidad jurídica.
  - D) La Ley 8/2021 de 2 de junio supuso la reforma de la Legislación Civil y Procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de la capacidad jurídica.
112. **En la intoxicación idiosincrásica por alcohol, ¿cuál de las afirmaciones que siguen es falsa? Señálela:**
- A) Se caracteriza por la presencia de comportamiento agresivo e impulsivo.
  - B) Existe un claro recuerdo del episodio una vez finalizado.
  - C) La edad es un factor predisponente.
  - D) Suele acabar con un sueño prolongado.
113. **¿Cuál de los siguientes NO representa un síntoma negativo de esquizofrenia?:**
- A) Tristeza por la pérdida de la funcionalidad.
  - B) Procesos de pensamiento empobrecido.
  - C) Aplanamiento afectivo.
  - D) Desinterés social.
114. **Una limitación de los CATs es:**
- A) Son extensos y laboriosos.
  - B) No aportan utilidad para su uso rutinario.
  - C) Tienen un escaso valor formativo.
  - D) Tienen una vida corta, quedando fácilmente obsoletos si no se realiza una revisión periódica de la literatura.
115. **Un patrón duradero de comportamiento que se expresa a lo largo del tiempo y en distintas situaciones, se denomina:**
- A) Rasgo de personalidad.
  - B) Trastorno de personalidad.
  - C) Prototipo de personalidad.
  - D) Temperamento.
116. **Señale la respuesta INCORRECTA respecto a la disforia de género:**
- A) Los niños suelen desarrollar un sentido de identidad de género hacia los 3 años.
  - B) Los menores con disforia de género muestran mayores índices de trastornos depresivos, de ansiedad y descontrol de los impulsos.
  - C) Los menores diagnosticados de disforia de género no muestran necesariamente una identidad transgénero en la edad adulta.
  - D) El diagnóstico de disforia de género incluye a los individuos transgénero o disconformes con su género cuando no están clínicamente afectados.

339

162

223

319

147

153

314

**117. En terapia sistémica, la circularidad hace referencia a:**

- A) Vuelta a la regresión infantil.
- B) El eterno retorno de lo reprimido.
- C) Las causas de la conducta no pueden diferenciarse de los efectos.
- D) La falacia en la que se utiliza la conclusión, es una premisa del argumento para demostrarla.

456

**118. Referente a la polisomnografía, señale la afirmación incorrecta:**

- A) Puede registrar varias variables durante el sueño, como electroencefalograma, electromiograma, electrooculograma o ritmo respiratorio.
- B) Se utiliza en el diagnóstico de cuadros de narcolepsia, apneas del sueño, síndrome de piernas inquietas o en insomnio refractario al tratamiento.
- C) Durante la fase NREM del sueño son típicos los movimientos oculares rápidos, la hipotonía, el aumento de la presión arterial, la erección y la poiquilotermita.
- D) El estadio NREM II se corresponde con el sueño ligero en el que son típicos los complejos K y los husos de sueño.

129

**119. Señale la respuesta CORRECTA sobre la incidencia del trastorno esquizoafectivo:**

- A) La incidencia es igual en mujeres que en hombres.
- B) La incidencia es mayor en hombres.
- C) La incidencia es mayor en mujeres.
- D) La tasa de incidencia varía en función de la estación de nacimiento.

316

**120. En los países occidentales, ¿cuál es la demencia más comúnmente diagnosticada? Señálela:**

- A) Enfermedad de Alzheimer.
- B) Demencia multiinfarto.
- C) Demencia secundaria a etilismo crónico.
- D) Neurosífilis.

250

**121. Sobre el síndrome de Rett, señale la afirmación CORRECTA:**

- A) En la mayoría de los casos su recuperación es amplia.
- B) El desarrollo psicomotor temprano es aparentemente normal hasta los 6 meses.
- C) Presenta retraso mental leve.
- D) El perímetro cefálico permanece normal.

333

**122. El modelo diátesis-estrés del suicidio fue propuesto por:**

- A) Mann.
- B) Fawcett.
- C) Turecki.
- D) Okendo.

461

**123. El papel de los profesionales en el servicio de salud mental orientado en el modelo de recuperación tendría que tener en cuenta lo siguiente, excepto:**

- A) Las personas no se recuperan solas. El proceso de recuperación está relacionado con los procesos de inclusión social en el medio comunitario.
- B) El lenguaje usado por los profesionales puede reforzar una sensación de esperanza o invitar al pesimismo y a la cronicidad.
- C) Requiere un cambio en la relación entre profesionales y pacientes que se aleje del formato Experto/Paciente.
- D) Primero se recupera la persona y a continuación se marcan objetivos de inclusión social que incluyen vivienda, el empleo, la educación y la participación plena en la sociedad y en actividades de ocio.

124

124. De entre los siguientes tipos de demencia hay una tratable y potencialmente reversible, señálela:
- A) Demencia postraumática.
  - B) Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob.
  - C) Enfermedad de Marchiafava-Bignami.
  - D) Hidrocefalia normotensiva.
125. La moria es un tipo de euforia insulsa que se produce por afectación de una de las siguientes estructuras cerebrales, señale cuál:
- A) Los ganglios basales.
  - B) El hipocampo.
  - C) El circuito frontotalámico.
  - D) Los lóbulos frontales.
126. NO forma parte de las técnicas de intervención psicosocial que se utilizan en rehabilitación psiquiátrica:
- A) Entrenamiento en habilidades sociales.
  - B) La rehabilitación de déficit cognitivos.
  - C) Ayudar a las familias a reorganizarse fomentando un clima de solidaridad y unión.
  - D) Tratamientos psicológicos grupales orientados al fortalecimiento del Yo y a mejorar la autoestima.
127. Cuando observamos en un paciente que la atención se dirige de forma anómala hacia otro foco diferente del que produce estímulo principal o bien hay un desfase temporal entre el estímulo percibido y el momento en que se presta atención, hablamos de:
- A) Paraprosexia.
  - B) Distraibilidad.
  - C) Hipoprosexia.
  - D) Hiperprosexia.
128. Respecto al neurotransmisor serotonina, indique cuál de las siguientes afirmaciones es cierta:
- A) La serotonina ayuda a regular el ritmo sueño-vigilia.
  - B) La serotonina está implicada en la fisiología del apetito y libido.
  - C) Las neuronas serotoninérgicas almacenan serotonina ante estrés transitorio y se vacían de la misma ante estrés crónico.
  - D) Todas las afirmaciones anteriores son ciertas.
129. Entre las acciones del programa Euroempleo de salud mental de la Región de Murcia se encuentran las siguientes excepto:
- A) Formación de grupos de apoyo mutuo para apoyo y supervisión a la empleabilidad.
  - B) Acciones de sensibilización a empresas, agentes sociales, entidades locales y entidades sin ánimo de lucro.
  - C) Ayuda a empresas, entidades sin ánimo de lucro y corporaciones locales.
  - D) Apoyo a proyectos empresariales/iniciativas de generación de empleo.
130. Según el artículo 33 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos), en caso de violación de la seguridad de los datos, el responsable del tratamiento lo notificará a:
- A) La autoridad de control competente.
  - B) Al encargado del tratamiento.
  - C) Al destinatario del tratamiento.
  - D) A la persona jurídica afectada.

246

220

452

120

218

431

019

131. **Cuál de los siguientes NO es factor de mal pronóstico en las parafilias:**
- A) Alta frecuencia de actos.
  - B) Abuso de sustancias.
  - C) Inicio a edad temprana.
  - D) Alta motivación para el cambio.
132. **En la Estrategia de la Mejora Salud Mental 2023-2026 de la Región de Murcia, NO está incluida una de estas acciones para la prevención del suicidio:**
- A) Elaboración de un procedimiento de detección precoz del riesgo suicida en colaboración con Atención Primaria.
  - B) Activación del Código Riesgo Suicida en todas las áreas de salud.
  - C) Campaña de sensibilización contra el suicidio dirigida a jóvenes "GRITA".
  - D) Campaña de sensibilización contra el suicidio dirigida a la población anciana.
133. **Uno de los siguientes síntomas es característico de los síndromes del lóbulo frontal, señálelo:**
- A) Mayor fluidez en la resolución de problemas.
  - B) Conservación de la conducta motivacional.
  - C) Alucinaciones cenestésicas.
  - D) Respuestas perseverativas.
134. **Señale la afirmación falsa en relación a la gestión por procesos:**
- A) La gestión por procesos es una herramienta útil para implantar las estrategias de calidad total en las organizaciones sanitarias.
  - B) Todos los modelos de calidad total llevan implícitamente el trabajo sobre los procesos para realizar la mejora de los resultados.
  - C) La introducción de la gestión por procesos se traduce en una reducción de la variabilidad asistencial.
  - D) Todas las organizaciones sanitarias en salud mental han identificado como proceso clínico más relevante el de trastorno mental común.
135. **En los pacientes con enfermedad de Parkinson, señale, de entre los siguientes cuadros, cuál es el que se presenta de forma concomitante con más frecuencia:**
- A) Depresión.
  - B) Trastorno de ansiedad generalizada.
  - C) Trastorno obsesivo compulsivo.
  - D) Demencia.
136. **¿Cuál de las siguientes NO es característica del trastorno depresivo con características melancólicas?:**
- A) Empeoramiento vespertino.
  - B) Anorexia o pérdida de peso importante.
  - C) Culpa excesiva o inapropiada.
  - D) Despertar precoz.
137. **La desviación del apetito consistente en la ingesta repetitiva de sustancias no consideradas como alimentos (yeso, pintura, papel, etc.) detectable fundamentalmente en niños se denomina:**
- A) PICA o alotriofagia.
  - B) Heterofagia.
  - C) Coprofagia.
  - D) Hiperfagia.

312

414

242

103

257

344

132

138. **Reconocer con la debida atención las facultades de una persona y su perspectiva, incluyendo su derecho a sostener ciertos puntos de vista, realizar determinadas elecciones y seguir ciertas acciones basadas en sus propios valores y creencias, supone:**
- A) Respetar la autonomía del paciente.
  - B) Actuar bajo el principio de “no dañar”.
  - C) Ejercicio de libertad de asistencia.
  - D) Identificación de necesidades.
139. **Un varón de 60 años de edad tiene cáncer de próstata con metástasis óseas que le causan dolor persistente. Se encuentra en tratamiento con medicamentos antiandrógenos, que le ocasionan sofocos y no puede trabajar a causa de sus síntomas. No obstante, se muestra firme, esperanzado y sin ansiedad. ¿Cuál es el diagnóstico psiquiátrico adecuado?:**
- A) Trastorno doloroso.
  - B) Trastorno de ansiedad por enfermedad.
  - C) Trastorno de síntomas somáticos.
  - D) Ningún diagnóstico.
140. **Según el artículo 56 de la Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad, ¿quién delimita el marco territorial que abarca cada zona de salud?:**
- A) El Estado.
  - B) Las Entidades Locales.
  - C) La Comunidad Autónoma.
  - D) El Ministerio de Sanidad.
141. **Los efectos secundarios más frecuentes de los estimulantes son:**
- A) Tics, cefalea y diarrea.
  - B) Pérdida de apetito durante el día, insomnio de conciliación.
  - C) Elevación de la presión arterial y taquicardia.
  - D) Pérdida de apetito, pérdida de peso y enlentecimiento del crecimiento en talla.
142. **La atribución de estereotipos negativos y discriminación a miembros de la familia o al personal de salud mental, se denomina:**
- A) Estigma por asociación, de cortesía o por afiliación.
  - B) Estigma público.
  - C) Autoestigma.
  - D) Discriminación estructural.
143. **El trastorno por apego reactivo, ¿en qué categoría se sitúa en el DMS-5?:**
- A) Trastornos de ansiedad.
  - B) Trastornos relacionados con trauma y factores de estrés.
  - C) Trastornos destructivos, del control de los impulsos y de la conducta.
  - D) Trastornos del neurodesarrollo.
144. **Respecto al trastorno esquizofreniforme, señale la respuesta CORRECTA:**
- A) Es probable que los pacientes presenten un declive progresivo de la función social y laboral.
  - B) Presenta una fase prodrómica larga.
  - C) Son frecuentes los síntomas negativos.
  - D) Con frecuencia se observan síntomas Schneiderianos de primer orden.
145. **Uno de los siguientes criterios sintomatológicos no fue considerado por Bleuler como “nuclear” de la esquizofrenia, señale cuál:**
- A) Ambivalencia afectiva.
  - B) Afecto inapropiado.
  - C) Autismo.
  - D) Alucinaciones.

**146. Respecto a la violencia de género, no es cierto que:**

- A) La violencia es una causa significativa de morbilidad y mortalidad para la mujer.
- B) En caso de que la mujer considerada caso de violencia de género no se asocie a psicopatología susceptible de tratamiento en salud mental, se considerará su derivación a recursos externos.
- C) Aunque no hay evidencia de que pasar al menos una noche en un recurso de acogida que ofrezca defensa legal y consejo, disminuya la tasa de reabuso y mejore la calidad de vida, puede ser una alternativa en determinadas situaciones de riesgo extremo.
- D) Las mujeres que sufren violencia machista tienen un mayor riesgo de abuso de sustancias, trastornos mentales, trastornos físicos crónicos y problemas de salud sexual.

112

**147. NO es característico del síndrome del cromosoma frágil X:**

- A) Retraso del habla y el lenguaje.
- B) Disminución de CI.
- C) Extroversión y aumento de la interacción social.
- D) Hiperactividad.

349

**148. Cuando los resultados de los estudios primarios se resumen, pero no se combinan con métodos matemáticos, estamos ante:**

- A) Una revisión de casos.
- B) Una revisión sistemática.
- C) Un metaanálisis.
- D) Un estudio analítico.

145

**149. A un paciente de 68 años con diagnóstico temprano de enfermedad de Alzheimer se les prescribe un inhibidor de la colinesterasa para su función cognitiva. Este paciente es un fumador empedernido y se niega a dejar de fumar. ¿Cuál de estas medicaciones no sería adecuada dado su tabaquismo?:**

- A) Donepezilo.
- B) Galantamina.
- C) Rivastigmina.
- D) No hay contraindicaciones en estas medicaciones por fumar.

412

**150. Con respecto a la demencia frontotemporal, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Señálela:**

- A) Es la primera causa de demencia degenerativa primaria en adultos no ancianos en población occidental.
- B) Su inicio ocurre típicamente entre los 45 y los 65 años, aunque se han descrito casos de inicio más temprano.
- C) Se encuentran antecedentes de familiares con demencia frontotemporal en un 70% de los afectados.
- D) La incidencia es significativamente mayor en hombres que en mujeres.

222