

1. **En el documento de consenso de la Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética; y la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (FESNAD-SEEDO) 2011 se incluye en todas las recomendaciones de distribución de macronutrientes en el tratamiento dietético de la obesidad, excepto:**
- A) Ácidos Grasos Monoinsaturados < 7%.
 - B) Hidratos de carbono 45-55%.
 - C) Grasas totales 25-35%.
 - D) Proteínas 15-25%.
2. **En el bloqueo auriculoventricular mobitz II, señale la respuesta correcta:**
- A) Se produce el bloqueo de una onda P ocasionalmente, pero sin variación del PR.
 - B) El PR se va alargando progresivamente, y en un momento se produce el bloqueo de una onda P.
 - C) Existe disociación auriculoventricular (con más impulsos auriculares que ventriculares).
 - D) Existe un enlentecimiento de la conducción, pero todas las ondas P son conducidas.
3. **De los siguientes procesos, hay uno que no es causa de hipercalcemia:**
- A) Hiperparatiroidismo primario.
 - B) Insuficiencia suprarrenal.
 - C) Intoxicación por vitamina D.
 - D) Hipotiroidismo.
4. **¿En cuál de las siguientes situaciones no suele observarse caída de la difusión pulmonar al monóxido de carbono?:**
- A) Asma bronquial.
 - B) Fibrosis pulmonar idiopática.
 - C) Anemia.
 - D) Enfisema pulmonar.
5. **Acude a su consulta un paciente varón, de 46 años, fumador de unos 25 cigarrillos al día desde hace 15 años. Ha hecho varios intentos para dejar de fumar, dos de ellos utilizando diversos sustitutos de la nicotina. En el momento actual nos planteamos ayudarle a dejar de fumar utilizando bupropion. En relación a la utilización de bupropion, es cierto:**
- A) El tratamiento debe continuarse al menos 4 meses.
 - B) Deben descartarse antecedentes de crisis de pánico.
 - C) Las dosis deben separarse al menos 8 horas.
 - D) Entre los efectos adversos frecuentes está el aumento de peso.
6. **En el tratamiento con L-tiroxina, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:**
- A) Está contraindicada en pacientes con cardiopatía isquémica.
 - B) Es más fisiológico combinarla con T3.
 - C) El objetivo del tratamiento es mantener los niveles de TSH dentro de la normalidad.
 - D) El objetivo del tratamiento es mantener los niveles de T3 dentro de la normalidad.
7. **Tras contacto con un paciente tuberculoso bacilífero, y presentar en la prueba de la tuberculina una induración de 16 mm con radiología negativa, ¿qué pauta antimicrobiana recomendaría?:**
- A) Rifampicina + pirazinamida durante dos meses.
 - B) Rifampicina + isoniazida durante 3 meses.
 - C) Isoniazida 6 meses.
 - D) Isoniazida + etambutol 9 meses.

8. **¿Cuál de las afirmaciones siguientes considera correcta ante la no variación del tamaño de un varicocele con la maniobra de Valsalva?:**
- A) Se debería investigar la existencia de un espermatocele asociado.
 - B) El paciente podría tener una orquiepididimitis.
 - C) Se debería investigar la existencia de posible patología retroperitoneal.
 - D) No es necesario hacer estudio más amplio.
9. **¿Qué es característico de la escabiosis?:**
- A) Prurito de intensidad progresiva.
 - B) Vesículas agrupadas.
 - C) No requiere tratamiento.
 - D) Mejora con corticoides.
10. **¿Qué tipo de estudio es el más adecuado para estimar la prevalencia de proteinuria en una población?:**
- A) Casos y controles.
 - B) Transversal.
 - C) Prospectivo de cohortes.
 - D) Retrospectivo de cohortes.
11. **Respecto a la estandarización de la recogida de muestras para el cribado, diagnóstico y control de hipercolesterolemia, ¿cuál de las siguientes recomendaciones es falsa?:**
- A) El paciente debe mantener el estilo de vida cotidiano, dieta habitual y peso estable durante dos o tres semanas previas a la extracción.
 - B) La extracción debe realizarse tras ayuno de seis horas, cuando se incluya determinación de triglicéridos y colesterol HDL.
 - C) La extracción debe realizarse con el paciente sentado y evitando la venostasis prolongada.
 - D) Es preciso retrasar la extracción tres semanas después de una enfermedad intercurrente o cambios dietéticos recientes, o tres meses si es una enfermedad grave.
12. **¿Cuál es la primera causa de muerte en España en la actualidad?:**
- A) Tumores.
 - B) Enfermedades del sistema respiratorio.
 - C) Enfermedades del sistema circulatorio.
 - D) Enfermedades del sistema digestivo.
13. **¿Cuál de las siguientes NO es una causa de las desigualdades en salud?:**
- A) El contexto económico.
 - B) Las condiciones de vida.
 - C) El trabajo.
 - D) La genética.
14. **Respecto a la profilaxis de la meningitis, ¿cuál de estas respuestas es cierta?:**
- A) La quimioprofilaxis se ha demostrado útil en la prevención de la meningitis por H. influenzae y no por meningococo.
 - B) En los casos de meningitis producidos H. influenzae debe realizarse quimioprofilaxis para eliminar el estado de portador.
 - C) Cuando se haya producido un caso de meningitis en menos de 30 días se administrará a todos los niños del centro quimioprofilaxis.
 - D) La quimioprofilaxis está especialmente indicada si el contacto se ha producido con una antelación superior a los 7 días.

15. **Respecto al síndrome de apnea del sueño, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:**
- A) La obesidad es la responsable de un elevado porcentaje del síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAOS).
 - B) El exceso de grasa en el cuello es responsable de que las almohadillas de grasa parafaríngea causen obstrucción de la vía aérea.
 - C) Su diagnóstico se realiza mediante polisomnografía.
 - D) Se suele acompañar de hipotensión.
16. **Indique cuál de las siguientes condiciones constituye una contraindicación absoluta para los anticonceptivos hormonales combinados:**
- A) Tener 25 años y ser fumadora.
 - B) Haber padecido un cáncer de mama.
 - C) Presentar un acné que requiera tratamiento con retinoides.
 - D) Tener antecedentes de dismenorrea importante.
17. **Hombre de 55 años diabético con buen control glucémico, refiere disfunción eréctil de 3 años de evolución, y de inicio lento. Tras tratar las causas etiológicas, modificar estilos de vida que favorecen la disfunción eréctil, e identificar las necesidades y expectativas del paciente y su pareja, ¿cuál debería ser el tratamiento complementario a considerar como primera opción?:**
- A) Inhibidores de la fosfodiesterasa 5.
 - B) Dispositivos de vacío.
 - C) Alprostadilo tópico.
 - D) Inyecciones intracavernosas.
18. **¿Cuándo podríamos decir que una característica de una persona puede considerarse un factor de riesgo de una enfermedad?:**
- A) Se observa frecuentemente entre los enfermos.
 - B) Está asociada a la probabilidad de desarrollar la enfermedad.
 - C) Está asociada a la prevalencia de la enfermedad.
 - D) No se manifiesta en las personas sin la enfermedad.
19. **Se entiende por trombocitopenia una cifra de plaquetas inferior a:**
- A) 80.000/microL.
 - B) 180.000/microL.
 - C) 100.000/microL.
 - D) 200.000/microL.
20. **Una de las siguientes afirmaciones sobre el consumo de tabaco es falsa:**
- A) Se asocia al consumo de alcohol y café.
 - B) Es un proceso crónico con varias recaídas.
 - C) Su consumo está relacionado con la clase social.
 - D) Los tratamientos farmacológicos actúan como placebos.
21. **Una onda T del ECG alta y picuda, puede sugerir:**
- A) Hipopotasemia.
 - B) Fase hiperaguda del infarto agudo de miocardio.
 - C) Efecto digitálico.
 - D) Todas las respuestas son correctas.

22. **¿Cuál de los siguientes criterios de la ATP III es INCORRECTO para diagnosticar a pacientes con síndrome metabólico?:**
- A) Tensión arterial \geq 130/85 o tratamiento.
 - B) Triglicéridos \geq 150 mg/dl o tratamiento.
 - C) Glucemia basal $<$ 90.
 - D) Obesidad abdominal.
23. **La estructura de edad de la población es un importante condicionante de múltiples indicadores sanitarios, pero no de todos. ¿En cuál de los siguientes indicadores NO influye la estructura de edad de la población?:**
- A) Tasa bruta de mortalidad.
 - B) Tasa específica por causa.
 - C) Tasa de años potenciales de vida perdidos.
 - D) Esperanza de vida al nacer.
24. **La parte resolutive de la entrevista semiestructurada NO incluye:**
- A) Realizar una escucha activa.
 - B) Proponer un plan de acción en un clima de diálogo.
 - C) Comprobar la comprensión y/o aquiescencia de paciente.
 - D) Informar sobre la naturaleza del problema.
25. **Acude a su consulta un paciente varón de 54 años. Refiere que desde hace un año tiene ruidos en los dos oídos, que solo oye él, y de forma intermitente. En los últimos meses han aumentado de intensidad. ¿Cuál de las proposiciones siguientes es incorrecta?:**
- A) El paciente tiene acúfenos bilaterales.
 - B) El paciente tiene acúfenos objetivos.
 - C) Sería importante conocer si existen síntomas asociados como vértigo, hipoacusia, otalgia.
 - D) Sería importante conocer si existen factores de riesgo cardiovascular, como hiperlipemia, hipertensión.
26. **Acerca de los Sistemas de Información Sanitaria, señale la opción correcta:**
- A) Un sistema de información (SI) es un conjunto de personas, procedimientos y equipos diseñados para recoger, procesar, almacenar y utilizar la información.
 - B) Su finalidad última es generar la máxima cantidad de información posible.
 - C) Su objetivo es proporcionar la información necesaria y ponerla a disposición de los profesionales sanitarios para mejorar la toma de decisiones a todos los niveles del sistema sanitario.
 - D) A y C son correctas.
27. **¿Cuál de los siguientes no se considera un principio de la bioética?:**
- A) Beneficencia.
 - B) Confidencialidad.
 - C) No maleficencia.
 - D) Autonomía.
28. **Señale la respuesta falsa en la utilización de pruebas complementarias en la crisis asmática:**
- A) Las primeras exploraciones complementarias serán la pulsioximetría y la determinación del grado de obstrucción al flujo aéreo, mediante medidor de pico de flujo aéreo (PEF) o espirometría (FEV1).
 - B) En la fase aguda, el PEF y el FEV1 se consideran un indicador más fiable de la gravedad que los síntomas que acompañan a la crisis asmática.
 - C) La radiografía de tórax se realizará de forma rutinaria por ser una prueba muy sensible en su diagnóstico.
 - D) El ECG estará indicado en pacientes mayores de 50 años o con patología cardíaca asociada.

29. **¿Cuál de los siguientes contenidos de visitas no sería una Necesidad Asistencial Previsible?:**
- A) Controles de crónicos y programas.
 - B) Recogida de resultados de pruebas.
 - C) Partes de confirmación de incapacidad transitoria.
 - D) Seguimiento de procesos.
30. **Una de las siguientes premisas no es una causa de dispareunia profunda en la mujer, señálela:**
- A) Bartholinitis.
 - B) Endometriosis.
 - C) Síndrome hemorroidal.
 - D) Tumor de ovario.
31. **En un paciente con neumotórax, señale la opción falsa:**
- A) Puede ser asintomático, sobre todo en pacientes con neumotórax espontáneo primario.
 - B) Es muy frecuente el dolor pleurítico de inicio agudo e intenso.
 - C) Aumento de vibraciones vocales en la exploración.
 - D) Timpanismo a la percusión.
32. **Dentro de las características conceptuales de la Atención Primaria de Salud están todos los siguientes excepto uno. Señale el incorrecto:**
- A) Integral.
 - B) Integrada.
 - C) Accesible.
 - D) Espontánea.
33. **Respecto al tratamiento farmacológico de la hipercolesterolemia en prevención primaria, señale la opción falsa:**
- A) Las estatinas son fármacos de primera elección.
 - B) La ezetimiba en monoterapia o combinada con estatinas no es un fármaco de primera elección.
 - C) Como con cualquier fármaco, la ausencia de efecto debe hacer sospechar una mala cumplimentación.
 - D) El efecto farmacológico se debe medir antes de las seis semanas de tratamiento.
34. **De las siguientes complicaciones en cirugía menor, indique en la que no es un factor predisponente el exceso de tensión en la sutura:**
- A) Infección de la herida.
 - B) Cicatriz queloidea.
 - C) Marcas cruzadas "en traviesa de vía de ferrocarril".
 - D) Cicatriz dehiscente.
35. **Indique lo que no es cierto con respecto a la infección por Tricomona vaginalis:**
- A) Es un parásito casi exclusivo del tracto urogenital.
 - B) La infección provoca una vaginitis con presencia de flujo vaginal amarillento o grisáceo espumoso.
 - C) Se debe tratar a las parejas sexuales del paciente que presenta tricomoniasis.
 - D) No es causa de uretritis en el hombre.
36. **¿Cuál de los siguientes síntomas neurológicos es más frecuente en la consulta de Atención Primaria?:**
- A) Cefalea.
 - B) Demencia.
 - C) Epilepsia.
 - D) Accidente cerebro vascular.

37. **Mujer de 15 años con menarquia a los 13 años, que consulta por menstruaciones irregulares, de modo que puede tener algunas semanas de retraso. En la exploración física no se detecta anomalía. ¿Qué afirmación sería correcta respecto a la actitud a tomar?:**
- A) Hay que derivar a ginecólogo para estudio preferente.
 - B) Se debe tranquilizar a la paciente por ser considerada una situación normal a esa edad.
 - C) Habría que solicitar ecografía vaginal.
 - D) Es imprescindible solicitar hormonas en sangre y orina.
38. **Los vendajes funcionales están contraindicados en:**
- A) Lesiones cápsulo-ligamentosas.
 - B) Lesiones musculares.
 - C) Lesiones cutáneas y heridas.
 - D) Lesiones tendinosas.
39. **En la pitiriasis versicolor señale la respuesta falsa:**
- A) Infección cutánea, superficial, que se caracteriza por manchas en la piel (máculas hipo o hiperpigmentadas).
 - B) Es contagiosa.
 - C) El tratamiento consiste en cremas o lociones antifúngicas.
 - D) Las recidivas son frecuentes.
40. **De las siguientes afirmaciones con respecto al carcinoma renal, ¿cuál es falsa?:**
- A) El adenocarcinoma renal es el tumor renal más frecuente del adulto.
 - B) La mayoría de los tumores de pelvis renal son carcinomas de células transicionales.
 - C) El oncocitoma renal es una variedad especialmente agresiva del carcinoma renal.
 - D) El consumo de tabaco y la obesidad aumentan el riesgo.
41. **¿Cuál de las siguientes opciones no se considera un factor de riesgo para el reflujo gastroesofágico?:**
- A) Edad avanzada.
 - B) Obesidad.
 - C) Toma de paracetamol.
 - D) Embarazo.
42. **¿Qué ventajas presentan los estudios de casos y controles?:**
- A) Son estudios eficientes, ya que su duración y coste son menores que los de cohortes.
 - B) Permiten evaluar simultáneamente varias exposiciones y la interacción entre ellas.
 - C) A y B son correctas.
 - D) A y B son incorrectas.
43. **Acude a un domicilio en el que se ha requerido su asistencia urgente. En él encuentra a una mujer de 80 años en la cama, que no puede mover el miembro inferior derecho, y este se encuentra en rotación externa y acortado respecto al contralateral. ¿Cuál sería su actitud?:**
- A) Indicaría paracetamol oral 650 mg cada 8 horas y observación por la familia.
 - B) Indicaría a la familia que la montase en un coche y la llevaran ellos al hospital.
 - C) Dispondría el traslado a urgencias de un hospital en ambulancia.
 - D) Remitir a consulta de traumatología de modo preferente.
44. **¿Cuál es la bacteria más frecuentemente asociada a endocarditis bacteriana en el usuario de drogas por vía parenteral?:**
- A) Streptococcus viridans.
 - B) Staphylococcus aureus.
 - C) Streptococcus pneumoniae.
 - D) Pseudomonas aeruginosa.

45. **¿En cuál de los siguientes pacientes NO tendría sentido calcular el riesgo cardiovascular mediante tablas?:**
- A) Paciente hipertenso.
 - B) Paciente dislipémico.
 - C) Paciente con enfermedad coronaria.
 - D) Paciente fumador.
46. **Un varón de 40 años acude a la consulta por presentar una úlcera única en el surco balano prepucial, la úlcera es indolora, de bordes bien delimitados, y sin adenopatías inguinales. Relata un contacto previo con una prostituta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:**
- A) Linfogranuloma venéreo.
 - B) Chancroide.
 - C) Sífilis primaria.
 - D) Infección por virus del herpes.
47. **En relación al tratamiento con inhaladores en el tratamiento del asma, señale la respuesta falsa:**
- A) Los inhaladores presurizados precisan una correcta coordinación entre la inhalación y la pulsación.
 - B) Los inhaladores de polvo seco disminuyen el depósito orofaríngeo con respecto a inhaladores presurizados.
 - C) Las cámaras espaciadoras, disminuyen la biodisponibilidad sistémica del fármaco inhalado y, en consecuencia, el riesgo de efectos sistémicos.
 - D) Las cámaras espaciadoras disminuyen la posibilidad de candidiasis oral.
48. **En la tendinosis del manguito de los rotadores no ha demostrado su efectividad en el tratamiento:**
- A) Antiinflamatorios en la fase aguda.
 - B) Fisioterapia precoz.
 - C) Ultrasonidos.
 - D) Infiltraciones locales con corticoides.
49. **Acerca de la gastroenteritis por salmonella, indique qué opción no es cierta:**
- A) Constituye una toxiinfección alimentaria que se manifiesta con diarrea aguda tras un periodo de incubación de 10-72 horas.
 - B) En España el alimento más implicado en la aparición de brotes es el huevo y sus derivados.
 - C) En la gastroenteritis por salmonelosis el tratamiento está siempre indicado.
 - D) En general, la gastroenteritis por Salmonella es un proceso leve, que raramente produce deshidratación grave.
50. **Señale la afirmación correcta respecto a las infiltraciones articulares:**
- A) Favorecen la recuperación funcional.
 - B) Aumentan el dolor.
 - C) No existe riesgo de yatrogenia.
 - D) No disminuyen la inflamación.
51. **Desde el punto de vista de la bioética, el documento de voluntades anticipadas atañe directamente al principio de:**
- A) Justicia.
 - B) Equidad.
 - C) Autonomía.
 - D) Beneficencia.

157

347

240

411

312

409

464

52. **En referencia a las manifestaciones clínicas de la anemia, indique lo que no es cierto:**
- A) Los signos y síntomas no dependen del grado de la velocidad a la que se ha desarrollado.
 - B) Las manifestaciones clínicas se deben a hipoxia celular y al desarrollo de mecanismos de compensación.
 - C) Los síntomas más habituales son la fatiga y la astenia.
 - D) Varían según la etiología, intensidad y rapidez de la instauración de la anemia.
53. **Una de las siguientes afirmaciones con respecto a la cefalea tensional es falsa:**
- A) Es la causa más frecuente de cefalea.
 - B) El dolor es bilateral en el 90% de los casos.
 - C) Es más frecuente en varones.
 - D) Suele iniciarse en la edad adulta.
54. **¿Cuál de estos fármacos orales, utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus, reducen especialmente las glucemias postprandiales?:**
- A) Metformina.
 - B) Glitazonas.
 - C) Meglitinidas.
 - D) Inhibidores de la DPP-4.
55. **Refiriéndonos a la seguridad de los datos en las historias clínicas informatizadas, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?:**
- A) Las historias clínicas informatizadas son más seguras que las historias en papel.
 - B) Las herramientas de seguridad de que disponen las historias clínicas informatizadas aseguran la confidencialidad de los datos.
 - C) La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal hace referencia exclusivamente a los datos sanitarios.
 - D) La informatización de los datos supone un riesgo para el acceso a datos personales de los pacientes.
56. **En la terapia antidepresiva los errores a evitar son:**
- A) La retirada precoz del fármaco antidepresivo.
 - B) Las dosis excesivas en los ancianos, si tener en cuenta que las dosis terapéuticas son la mitad de las convencionales.
 - C) El empleo de fármacos que asocian antidepresivos con ansiolíticos o neurolépticos a dosis fijas.
 - D) Todas ellas.
57. **Uno de los siguientes fármacos se puede utilizar como anticoagulante en fibrilación auricular. ¿A cuál nos referimos?:**
- A) Telmisartan.
 - B) Bisoprolol.
 - C) Dabigatran.
 - D) Ácido acetilsalicílico.
58. **Señale la respuesta correcta en relación al trastorno de ansiedad generalizada:**
- A) Durante 6 o más meses el sujeto debe estar preocupado la mayor parte del día en dos o más circunstancias vitales.
 - B) Puede existir síntomas de tensión motora (temblor, inquietud).
 - C) El curso de este trastorno es crónico y fluctuante.
 - D) Todas las respuestas son correctas.

59. **¿Cuál de estos fármacos no se debe asociar al gemfibrozilo, por el riesgo de causar hipoglucemias graves?:**
- A) Repaglinida.
 - B) Metformina.
 - C) Acarbosa.
 - D) Sitagliptina.
60. **Señale la respuesta FALSA en relación con el inicio de una sedación paliativa:**
- A) Se produce una disminución de conciencia.
 - B) Debe ser indicada por los profesionales.
 - C) No es exigible el consentimiento informado.
 - D) Se conseguirá mediante la administración de uno o más fármacos.
61. **La radiografía es un método empleado en el diagnóstico de la tuberculosis pulmonar, pero una de las siguientes afirmaciones sobre la radiología es falsa:**
- A) La radiografía de tórax es un método muy específico, pero poco sensible para la detección de la tuberculosis pulmonar.
 - B) En los casos de fibrosis intensa es mejor realizar para el diagnóstico una tomografía computarizada.
 - C) Una de las formas radiológicas de presentación de la enfermedad primaria es el infiltrado lobar o segmentario con adenopatía hilar.
 - D) La enfermedad secundaria puede dar cualquier tipo de imagen.
62. **En una situación de insuficiencia cardiaca, el corazón presenta distintos mecanismos adaptativos. ¿Cuál de los siguientes no es correcto?:**
- A) Inhibición del sistema arginina-vasopresina, que genera vasoconstricción y retención hidrosalina.
 - B) Desarrollo de hipertrofia miocárdica.
 - C) Activación del sistema nervioso simpático, que aumenta la contractilidad ventricular.
 - D) Alteraciones de la producción de energía en el miocardio y modificaciones en la matriz extracelular de los miocardiocitos.
63. **¿Cuál de estas alteraciones vitreoretinianas es la que se asocia con más frecuencia a la aparición de miodesopsias en el campo visual?:**
- A) Desprendimiento posterior de vítreo.
 - B) Desprendimiento de retina.
 - C) Retinopatía diabética.
 - D) Hemorragia vítrea.
64. **Pedro es un paciente hipertenso con antecedentes familiares de dislipemia, se le solicita una analítica que ayude a valorar su riesgo cardiovascular, ¿cuál es la mejor forma de introducir los resultados en OMI-AP?:**
- A) Como texto libre dentro del episodio "Hoja de evolución".
 - B) No es conveniente introducir los resultados, pues ya están en la base de datos del hospital de referencia.
 - C) Como texto libre en el episodio de HTA.
 - D) A través del apartado órdenes clínicas, protocolo o similar para luego poder comparar y explotar mejor los datos.
65. **La primera causa de muerte en la población diabética es:**
- A) Accidente vascular cerebral.
 - B) Insuficiencia renal por nefropatía diabética.
 - C) Enfermedad coronaria.
 - D) Coma hiperosmolar y cetoacidosis.

234

171

342

243

468

114

229

66. **El ser “integrada” es uno de los elementos principales que caracterizan a la Atención Primaria de Salud, esto significa que:**
- A) Interrelaciona los elementos de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación y reinserción social que han de formar parte de las acciones desarrolladas. 103
 - B) Considera al ser humano desde una perspectiva biopsicosocial.
 - C) Considera al ser humano desde una perspectiva holística.
 - D) Los ciudadanos no deben tener dificultades importantes para poder tomar contacto y utilizar los servicios sanitarios.
67. **Indique la respuesta cierta con respecto al trastorno somatomorfo:**
- A) El síntoma no se explica por una alteración orgánica, o hay desmesura entre la alteración y las consecuencias. 301
 - B) El paciente no busca la atención del entorno social.
 - C) No suele presentar múltiples síntomas físicos antes de los 30 años, que persisten durante años.
 - D) Son pacientes con bajo grado de sugestividad.
68. **Señale la respuesta falsa en relación con las pruebas diagnósticas no espirométricas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC):**
- A) La radiografía de tórax puede ser normal en la mayoría de los casos.
 - B) La tomografía computarizada de tórax (TC) es muy útil en el diagnóstico de los pacientes con fenotipo agudizador, ya que puede demostrar la presencia de bronquiectasias, su gravedad y extensión. 257
 - C) El hemograma suele presentar alteraciones muy frecuentes, incluso sin la presencia de complicaciones.
 - D) La pulsioximetría es útil en la valoración de la sospecha de hipoxemia.
69. **¿Cuál de estos fármacos utilizados en el tratamiento de la diabetes mellitus puede producir una pérdida significativa de peso?:**
- A) Insulinas.
 - B) Agonistas de los receptores GLP-1. 260
 - C) Sulfonilureas.
 - D) Glitazonas.
70. **¿Cuál de estos fármacos no suele estar relacionado con las caídas en los ancianos?:**
- A) Amlodipino.
 - B) Diazepan. 421
 - C) Furosemida.
 - D) Paracetamol.
71. **¿Cuál de estos no es un factor de riesgo para el desarrollo de una neumonía adquirida en la comunidad?:**
- A) Consumo de tabaco.
 - B) Ser joven. 308
 - C) Tratamiento crónico con corticoides.
 - D) Esplenectomía.
72. **Durante la menopausia, los trastornos del sueño se asocian frecuentemente a:**
- A) Nicturia.
 - B) Hipotensión arterial. 440
 - C) Sofocos por la noche.
 - D) Aumento del deseo sexual.

73. **¿En cuál de las siguientes infecciones no recomendaría una pauta de antibiótica corta (5 días o menos)?:**
- A) Faringitis estreptocócica.
 - B) Rinosinusitis bacteriana aguda.
 - C) Infección urinaria no complicada en la mujer joven no embarazada.
 - D) Neumonía adquirida en la comunidad.
74. **¿Cuál es el ámbito principal en el que debe desarrollarse la formación continuada del profesional?:**
- A) La universidad.
 - B) Los cursos reglados.
 - C) Las rotaciones en otros centros y servicios.
 - D) El propio centro de trabajo.
75. **Acude a su consulta una paciente, mujer de 35 años, que desde hace dos meses siente un bulto duro, palpable, en la mama derecha. ¿Cuál de estas actitudes le parece correcta?:**
- A) Observación.
 - B) Solicitar mamografía urgente.
 - C) Solicitar analítica con Prolactina.
 - D) Iniciar tratamiento antibiótico.
76. **¿Cuál de las infecciones de transmisión sexual no requiere búsqueda de contactos?:**
- A) Hepatitis A.
 - B) Hepatitis B.
 - C) Sarna.
 - D) Virus del herpes simple.
77. **Un estudio compara las lecturas de una serie de radiografías realizadas por dos médicos de familia del Centro de Salud de Calasparra. El objetivo es conocer:**
- A) La validez de las lecturas.
 - B) La repetibilidad de las lecturas.
 - C) La concordancia intraobservador de la lectura.
 - D) La concordancia interobservador de la lectura.
78. **¿Cuál de estos corticoides tópicos se considera de potencia baja?:**
- A) Clobetasol propionato al 0.05%.
 - B) Dipropionato de betametasona al 0.05%.
 - C) Hidrocortisona acetato al 1%.
 - D) Prednicarbato al 0.25%.
79. **Indique, de entre las siguientes, la mejor definición del concepto de Enfermedad Profesional:**
- A) Es una lesión que aparece de forma aguda.
 - B) Su distribución solo se da entre la población activa (mayores de 16 años y menores de 65 años).
 - C) Los agentes causales son específicos.
 - D) Las enfermedades profesionales son las que recoge el Cuadro de Enfermedades Profesionales.
80. **En la fascitis plantar, ¿cuál de estas opciones es falsa?:**
- A) Hay dolor a la presión en la parte de apoyo del talón.
 - B) Duele más al inicio del día y al empezar a caminar.
 - C) El dolor se acentúa con la marcha en talones.
 - D) Aumenta con la posición prolongada de pie.

81. **Sobre el tratamiento de la EPOC, ¿cuál de las siguientes respuestas no es correcta?:**
- A) Los corticoides inhalados se usan siempre asociados a los broncodilatadores de larga duración, sobre todo en los pacientes con fenotipo EPOC-asma.
 - B) Los broncodilatadores de acción corta se usan siempre pautados en la EPOC leve con síntomas.
 - C) La elección de tratamiento, y la combinación de fármacos, se basa en las características clínicas de cada paciente.
 - D) Los broncodilatadores β 2-agonistas de larga duración son de elección en los pacientes con síntomas permanentes.
82. **Realizaremos un cribado oportunista de diabetes mellitus:**
- A) En personas con sobrepeso y antecedentes de diabetes mellitus en familiares de primer grado.
 - B) En embarazadas, antes de las 12 semanas.
 - C) En niños recién nacidos con sobrepeso.
 - D) En cualquier persona fumadora y con antecedentes de hiperlipemia.
83. **¿Cuál de estos es un indicador para la medida cuantitativa de la demanda asistencial en Atención Primaria?:**
- A) La presión asistencial.
 - B) Número de recetas crónicas.
 - C) Frecuentación.
 - D) A y C son correctas.
84. **¿Cuál de estas afirmaciones respecto a la enfermedad de Graves-Basedow es INCORRECTA?:**
- A) La tríada clásica consta de hipertiroidismo, bocio multinodular y oftalmopatía infiltrativa.
 - B) El tabaquismo puede aumentar el riesgo de padecer la enfermedad de Graves-Basedow.
 - C) Afecta predominantemente a mujeres entre 30 y 40 años.
 - D) Las manifestaciones clínicas pueden aparecer y evolucionar de manera independiente entre sí.
85. **¿Cuál es la etiología más frecuente de la estenosis aórtica en el adulto?:**
- A) Reumática.
 - B) Postendocarditis.
 - C) Isquémica.
 - D) Degenerativa o calcificada.
86. **¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la migraña?:**
- A) Es más frecuente en varones.
 - B) Suele iniciarse antes de los 15 años.
 - C) Puede desencadenarse por factores alimentarios.
 - D) La crisis suele durar menos de dos horas.
87. **El modelo de atención personal del adolescente es diferente al de la relación con los niños. ¿Cuál de estas características sobre la atención al adolescente es incorrecta?:**
- A) El profesional sanitario ayuda al adolescente, no se alía con los padres “contra él”.
 - B) El consejo de salud será básicamente a demanda; la información sin motivación previa del interlocutor es poco útil.
 - C) La información debe ser extensa y utilizar todos los tecnicismos precisos para demostrar al adolescente nuestro conocimiento y dominio del tema abordado.
 - D) Cualquier alteración que afecte a su autoimagen (acné, obesidad, crecimiento...) requerirá gran sensibilidad en el trato.

88. Dentro de las vacunaciones que se recomiendan de forma rutinaria al personal sanitario están las siguientes EXCEPTO:
- A) Gripe.
 - B) Hepatitis A.
 - C) Hepatitis B.
 - D) Tétanos-difteria.
89. En monoterapia, ¿cuál es el fármaco más eficaz para el tratamiento del tabaquismo?:
- A) Bupropión.
 - B) Terapia sustitutiva con nicotina (TSN).
 - C) Vareniclina.
 - D) Clonidina.
90. ¿Cuáles son los trastornos musculoesqueléticos más frecuentes debidos a la postura y manipulación de cargas?:
- A) El síndrome del manguito de los rotadores.
 - B) Las lumbalgias.
 - C) Las cervicoartrosis.
 - D) Las necrosis de los huesos del carpo.
91. Paciente de 54 años, que cumple criterios de síndrome de dependencia alcohólica (SDA) y acepta ser incluido en una pauta de desintoxicación, ante la posibilidad de que presente un síndrome de abstinencia, ¿cuál de los fármacos siguientes está más indicado?:
- A) Diazepam.
 - B) Amitriptilina.
 - C) Fluoxetina.
 - D) Bupropion.
92. ¿Cuál de estas situaciones clínicas aumentan las vibraciones vocales en la exploración torácica?:
- A) Condensación pulmonar.
 - B) Derrame pleural.
 - C) Neumotórax.
 - D) Lesiones de faringe.
93. De las siguientes ventajas que aportan los estudios de casos y controles, ¿cuál NO es cierta?:
- A) Son un buen diseño para estudiar enfermedades con largos periodos de latencia.
 - B) Son muy útiles en el estudio de enfermedades raras.
 - C) Son un buen diseño para estudiar varias enfermedades simultáneamente.
 - D) Permiten evaluar simultáneamente varias exposiciones y la interacción entre ellas.
94. ¿Cuál de estos criterios de buen control del asma no es correcto?:
- A) Sin síntomas nocturnos.
 - B) Sin crisis y sin ingresos en servicios de urgencias.
 - C) Necesidad mínima de broncodilatadores de acción rápida, cuatro días a la semana, pero no diario.
 - D) FEV1 o FEM > 80%.

158

241

162

458

264

122

204

95. **Un paciente consulta a las 24 horas después de haber sufrido un accidente de tráfico de choque por alcance. Refiere dolor en región cervical que le produce limitación de la movilidad del cuello por contractura muscular. La exploración radiológica no evidencia lesiones anatómicas y presenta una corrección de la lordosis cervical fisiológica. Respecto al tratamiento que se indica a continuación, ¿cuál es la PEOR opción?:**
- A) Collarín cervical durante 5 días.
 - B) Relajantes musculares vía oral durante 7 días.
 - C) Fisioterapia precoz.
 - D) Antiinflamatorios no esteroideos vía oral durante 7 días.
96. **¿Qué rasgo definiría a un profesional de la salud que logra que la entrevista se desarrolle en términos comprensibles para ambos, de forma bidireccional y con disposición para compartir la información?:**
- A) Concreción.
 - B) Confianza.
 - C) Calidez.
 - D) Asertividad.
97. **Paciente de 45 años, que desde hace 24 horas aqueja enrojecimiento ocular unilateral, junto con disminución de la agudeza visual, dolor ocular y miosis. Probablemente su diagnóstico es:**
- A) Neuritis óptica.
 - B) Ataque agudo de glaucoma.
 - C) Glaucoma primario de ángulo abierto.
 - D) Uveítis anterior.
98. **En relación con el cáncer de próstata, señale la opción más correcta:**
- A) Produce polaquiuria.
 - B) Produce urgencia miccional.
 - C) Produce nicturia.
 - D) No existe ningún síntoma específico que nos haga sospecharlo.
99. **De las siguientes características, una es propia del ictus isquémico:**
- A) La edad es el principal factor de riesgo no modificable para el ictus.
 - B) El papel de médico de familia no es fundamental en la cadena del ictus.
 - C) Si la evolución es de menos de tres horas no se debe derivar al hospital.
 - D) Debemos descender enérgicamente la tensión arterial en un paciente con ictus agudo.
100. **Con respecto al cribado de la infección por el VIH, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?:**
- A) En España se recomienda cribado universal en todos los centros asistenciales.
 - B) Es conveniente ofrecer la prueba del VIH a todos los jóvenes entre 18-25 años.
 - C) La estrategia más efectiva es ofrecer la prueba del VIH a partir de criterios de riesgo y enfermedades indicadoras de VIH.
 - D) El objetivo del cribado del VIH es su diagnóstico diferencial.
101. **Acude a su consulta un varón de 22 años aquejado de una faringoamigdalitis aguda. En la anamnesis detectamos un consumo de tabaco de 10 cigarrillos al día desde hace un año. En la exploración no hay otros hallazgos más que los producidos por la faringoamigdalitis. Después de solucionar su motivo de consulta, ¿cuál sería la actitud más adecuada?:**
- A) Recomendarle que fume menos estos días.
 - B) Recomendarle que mientras esté enfermo no fume, y cuando se le pase fume menos.
 - C) Recomendarle que deje de fumar totalmente, preguntarle si quiere hacerlo y si necesita ayuda para ello.
 - D) Remitirlo a neumología del hospital para desintoxicación.

102. Los integrantes del EAP del Centro de Salud de Abarán quieren realizar un mapeo de los activos de salud de esa bonita villa; según la metodología de mapeo de activos de salud, ¿cuáles de los siguientes serían recursos existentes?:
- A) Las asociaciones de vecinos.
 - B) Las comunidades religiosas.
 - C) Las asociaciones juveniles.
 - D) Todos son recursos.
103. ¿Cuál de los siguientes no es un error común en el abordaje de la conducta suicida?:
- A) Tener una actitud moralizadora.
 - B) Mantener actitud comprensiva.
 - C) No preguntar por la ideación suicida.
 - D) Deslegitimar la conducta del paciente.
104. Un varón con Índice de Masa Corporal igual a 35,9 correspondería en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud a:
- A) Normopeso.
 - B) Obesidad clase I.
 - C) Obesidad clase II.
 - D) Obesidad clase III.
105. Las siguientes afirmaciones indican necesidades técnicas antes de usar un bisturí eléctrico sobre un paciente, salvo una de ellas. Señálela:
- A) Retirar todos los objetos metálicos que estén en contacto con el paciente.
 - B) Colocar la placa del bisturí eléctrico íntimamente en contacto con la piel del enfermo.
 - C) Utilizar un antiséptico en solución alcohólica y anestésiar la zona por infiltración.
 - D) Comprobar el tipo de corriente y la intensidad antes de empezar a utilizarlo.
106. Los siguientes se consideran factores predisponentes intrínsecos de la inmovilidad, excepto uno. Indique cuál no es uno de esos factores intrínsecos:
- A) Enfermedades neurológicas.
 - B) Déficit sensorial.
 - C) Enfermedades musculoesqueléticas.
 - D) Fármacos.
107. Todos los siguientes son indicadores de salud, ¿cuál de todos ellos NO es útil para valorar la gravedad de un problema de salud de la comunidad?:
- A) Años de vida perdidos.
 - B) Incidencia.
 - C) Mortalidad.
 - D) Incapacidad generada por el problema.
108. Imagínese un problema ético respecto a una situación en su consulta, en el cual dos principios de la bioética entran en conflicto. ¿Cuál sería la propuesta correcta?:
- A) Siempre tiene prioridad el principio de autonomía.
 - B) Todos los principios tienen la misma prioridad y se resuelve según convenga.
 - C) El principio de justicia tiene prioridad sobre el de autonomía del paciente.
 - D) El principio de beneficencia prima sobre el de no maleficencia.

137

370

319

435

166

139

465

109. En cuanto a las características del trastorno depresivo mayor, indique cuál de las siguientes opciones no es cierta:

- A) La prevalencia estimada del trastorno depresivo mayor en 1 año es del 5% en la población general.
- B) El trastorno depresivo mayor no es más frecuente en los familiares biológicos de primer grado de las personas con este trastorno que en la población general.
- C) En el anciano es difícil determinar si los síntomas cognoscitivos son atribuibles a una demencia o a un episodio depresivo mayor.
- D) Los pacientes con depresión se presentan en la consulta de atención primaria manifestando múltiples síntomas somáticos y no explican de forma espontánea los síntomas emocionales.

306

110. ¿Cuál es la causa más frecuente de hirsutismo?:

- A) Idiopática.
- B) Síndrome del ovario poliquístico.
- C) Hiperprolactinemia.
- D) Enfermedades tiroideas.

153

111. Al valorar la talla de un niño de 8 años se considera que existe una alteración en su patrón de crecimiento cuando:

- A) La talla está entre los percentiles 10 y 3.
- B) La talla evoluciona en el percentil 3.
- C) Se produzca un cambio en el percentil o «carril».
- D) La talla es menor que la de hermanos a la misma edad.

146

112. Entre los efectos adversos más relevantes de las tiazidas se encuentran:

- A) Intolerancia hidrocarbonada.
- B) Ototoxicidad.
- C) Ginecomastia.
- D) Enrojecimiento de la cara.

212

113. En el vértigo posicional benigno, una de estas afirmaciones es falsa:

- A) Es la causa más frecuente de vértigo.
- B) Presenta un nistagmo multidireccional.
- C) Se presenta a partir de los 50-60 años.
- D) Son crónicos y recurrentes.

366

114. ¿Cuál de los siguientes factores influye en la composición del Equipo de Atención Primaria (EAP)?:

- A) La situación política, económica y de la infraestructura sanitaria.
- B) Las necesidades de salud.
- C) La estructura poblacional.
- D) Todos son factores influyentes en la composición del EAP.

104

115. La doxazosina es un fármaco perteneciente al grupo de los:

- A) Bloqueadores Alfa adrenérgicos.
- B) Bloqueadores Beta adrenérgicos.
- C) Agonistas Alfa adrenérgicos.
- D) Agonistas Beta adrenérgicos.

238

116. Señale la respuesta falsa en la pericarditis aguda:

- A) El uso de corticoides está contraindicado en la pericarditis aguda, en países desarrollados.
- B) En los países desarrollados, los virus son la etiología más frecuente.
- C) En el ECG se observa un ascenso generalizado del ST.
- D) Uno de los factores de mal pronóstico es la falta de respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) en la primera semana de tratamiento.

225

117. **Para controlar los efectos anticoagulantes del tratamiento con heparina se utiliza:**
- A) Tiempo de tromboplastina parcial (TTP).
 - B) Tiempo de sangría.
 - C) Recuento de plaquetas.
 - D) Determinación del fibrinógeno.
118. **Señale la respuesta falsa en la isquemia arterial periférica aguda:**
- A) La embolia arterial representa el 60% de la isquemia aguda en extremidades.
 - B) Pasadas 4-8 horas del inicio de la isquemia, la necrosis muscular es irreversible.
 - C) El ECO-Doppler permitirá valorar la permeabilidad vascular y el flujo arterial.
 - D) Los pacientes pueden ser tratados de forma ambulatoria y controlados muy de cerca por su médico de familia.
119. **¿Cuál de estas características no es típica del carcinoma basocelular?:**
- A) Tiene agresividad local.
 - B) Metastatiza muy frecuentemente.
 - C) Aparece en piel fotoexpuesta.
 - D) Se ulcera con frecuencia.
120. **¿Cuál de estas situaciones puede provocar hipotensión con más frecuencia?:**
- A) Toma de anticonceptivos hormonales.
 - B) Toma de corticoides.
 - C) Toma de fármacos para la disfunción eréctil (Cialis, Viagra).
 - D) Toma de antiinflamatorios no esteroideos.
121. **Una de las afirmaciones es cierta con respecto al hipotiroidismo subclínico:**
- A) Por definición el hipotiroidismo subclínico es sintomático.
 - B) La mejor evidencia actual sugiere que el hipotiroidismo subclínico con TSH > 10 mU/l es el umbral para iniciar la terapia con T 4.
 - C) El hipotiroidismo subclínico no es factor de riesgo para el desarrollo de un hipotiroidismo clínico.
 - D) El hipotiroidismo subclínico es causa siempre de alteraciones del perfil lipídico.
122. **Las etiologías más prevalentes de la insuficiencia cardíaca son:**
- A) Cardiopatía isquémica e hipertensión arterial.
 - B) La hipertensión arterial es responsable, por sí sola, del 95% de los casos de insuficiencia cardíaca.
 - C) La cardiopatía isquémica es responsable del 95% de los casos de insuficiencia cardíaca.
 - D) En la actualidad, la cardiopatía reumática es la etiología más frecuente.
123. **El síndrome postcaída en el anciano se caracteriza por:**
- A) Disminución de las actividades físicas.
 - B) Mareo rotatorio.
 - C) Dolor de raquis lumbar.
 - D) Demencia.
124. **Paciente de 60 años que presenta cefalea desde hace 48 horas, en la exploración destaca edema de papila bilateral, motilidad pupilar normal, y agudeza visual conservada. ¿Cuál es su diagnóstico?:**
- A) Esclerosis múltiple.
 - B) Neuropatía óptica isquémica arterítica.
 - C) Papiledema por hipertensión intracraneal.
 - D) Neuropatía óptica isquémica no arterítica.

125. Señale la causa más frecuente de exacerbación asmática:
- A) Infecciones bacterianas.
 - B) Infecciones víricas.
 - C) Factores ocupacionales relacionados con el puesto de trabajo.
 - D) Falta de adherencia al tratamiento.
126. ¿Cuál de las siguientes medidas se considera una medida de prevención secundaria de SIDA?:
- A) Detección precoz de la infección por VIH.
 - B) Diagnóstico y tratamiento precoz de las infecciones de transmisión sexual.
 - C) Promoción del uso sistemático del preservativo.
 - D) Promoción de los programas de intercambio de agujas y jeringuillas en UDVP.
127. El tratamiento inicial de elección inicial de una tiroiditis de De Quervain es:
- A) Antitiroideos de síntesis.
 - B) Corticoides.
 - C) Propanolol.
 - D) Ácido acetilsalicílico.
128. Acerca de los criterios de gravedad y/o derivación de las neumonías adquiridas en la comunidad. Señale la respuesta falsa (escala CURB-65):
- A) Confusión.
 - B) Frecuencia respiratoria ≥ 20 .
 - C) Presión arterial sistólica < 90 mmHg o tensión arterial diastólica ≤ 60 mmHg.
 - D) Edad > 65 años.
129. ¿En qué fase de la historia natural de las enfermedades situaría usted a las actividades de prevención secundaria?:
- A) Prepatogénica.
 - B) Asintomática.
 - C) Sintomática precoz.
 - D) De cronicidad.
130. Mujer de 48 años, aporta el resultado de una endoscopia digestiva alta que presenta una úlcera gástrica, y un test rápido de la ureasa positivo para Helicobacter pylori. ¿Qué tratamiento de primera línea indicaría?:
- A) Omeprazol 20 mg/12 horas durante dos semanas.
 - B) Pauta cuádruple Omeprazol + amoxicilina + claritromicina + metronidazol durante 14 días.
 - C) Omeprazol + amoxicilina + metronidazol durante 10-14 días.
 - D) Omeprazol + levofloxacino + metronidazol durante 10 días.
131. Señale la respuesta correcta en relación al paciente con esquizofrenia:
- A) Aparece característicamente entre la adolescencia tardía y antes de los 30 años.
 - B) El médico de familia debe descartar el uso de drogas u otros fármacos que pueden precipitar un cuadro psicótico similar sin tratarse de una verdadera esquizofrenia.
 - C) Los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia no presentan significativamente mayor riesgo de incidencia de demencia que la población general.
 - D) Son ciertas la respuesta A y la respuesta B.
132. De las siguientes recomendaciones sobre alimentación, ¿cuál indicaría como NO adecuada?:
- A) Incluir a diario cinco o más raciones de la combinación de frutas y verduras.
 - B) Evitar en lo posible los dulces y azúcares refinados.
 - C) Administrar suplementos de vitamina D a la población de 50 a 75 años.
 - D) Las proteínas deben aportar el 12% del total de calorías de la dieta.

133. **El contaminante y determinante más poderoso de morbimortalidad del planeta es:**
- A) El tabaco.
 - B) La combustión de biomasa intradomiciliaria.
 - C) El VIH.
 - D) La pobreza.
134. **Ante una pérdida brusca de olfato, ¿cuál es la primera causa que tendría en cuenta?:**
- A) Pólipo nasal.
 - B) Infección vírica.
 - C) Trastorno congénito.
 - D) Tumoral.
135. **Indique la opción falsa en relación con la tensión arterial:**
- A) Las deficiencias de potasio y magnesio se asocian a cifras elevadas de tensión arterial.
 - B) La prevalencia del síndrome de apnea del sueño es mayor en la población de hipertensos, en comparación con la general.
 - C) El alcohol provoca una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
 - D) Los manguitos de medida de la tensión arterial demasiado pequeños producen lecturas anormalmente bajas.
136. **¿Cuál de las siguientes NO es una fase de un proyecto de mejora?:**
- A) Prevenir los errores.
 - B) Escoger el grupo de mejora.
 - C) Monitorizar.
 - D) Analizar las causas.
137. **Señale la respuesta falsa en el derrame pleural:**
- A) Los trasudados suelen ser secundarios a proceso infeccioso o inflamatorio subyacente.
 - B) Los exudados suelen ser unilaterales.
 - C) En general, los trasudados suelen ser bilaterales.
 - D) Los exudados tienen un recuento de proteínas > 30 g/l y en los trasudados < 30g/l.
138. **¿Cuál de estos grupos de fármacos no es un factor predisponente de faringitis crónica?:**
- A) Betabloqueantes.
 - B) Diuréticos.
 - C) Psicofármacos.
 - D) Inhibidores de bomba de protones.
139. **Conforme al Programa Oficial de la Especialidad de Medicina de Familia y Comunitaria de 2005, señale la respuesta correcta:**
- A) Durante el primer año la rotación por Atención Primaria es de un año.
 - B) Las rotaciones del segundo año son básicamente extrahospitalarios.
 - C) Los residentes de 4º año están en el centro de salud unos 11 meses.
 - D) Durante el tercer año se realizan de 5 a 8 meses de aprendizaje de campo en Medicina Interna y Especialidades.
140. **Se quiere diseñar una investigación de tipo cualitativo. En este tipo de estudios, la revisión bibliográfica...:**
- A) No tiene por qué llevarse a cabo, ya que ha de predominar el componente espontáneo y natural.
 - B) Solo ha de limitarse a las investigaciones cualitativas previamente publicadas.
 - C) Es tan importante como en los estudios cuantitativos en cuanto a conocimiento y justificación previa de la relevancia de la investigación.
 - D) Es contraproducente, porque puede condicionar al investigador.

141. **Las actividades de la vida diaria avanzadas (AVDA) evalúan las capacidades de:**
- A) Mantener un estado físico saludable.
 - B) Interaccionar con el medio ambiente.
 - C) Utilizar el inodoro.
 - D) Control de la medicación usada.
142. **¿Cuál de estas afirmaciones en relación a la resistencia insulínica es cierta?:**
- A) Afecta al 25% y puede estar presente incluso en personas con normopeso.
 - B) El grado de resistencia insulínica aumenta con la edad.
 - C) En la resistencia insulínica, mientras la célula beta pueda mantener la respuesta a las demandas de insulina, el paciente se mantendrá normoglucémico.
 - D) Todas son ciertas.
143. **Acude a su consulta un paciente de 15 años que presenta dolor intenso en pabellón auditivo, con el lóbulo de la oreja normal. Se da la circunstancia de que se puso en la oreja un piercing ayer. ¿Cuál sería su diagnóstico?:**
- A) Otitis externa difusa.
 - B) Otitis externa circunscrita.
 - C) Otomicosis.
 - D) Pericondritis del pabellón auditivo.
144. **En una reacción de anafilaxia, ¿qué no esperaría encontrar en los primeros 30 minutos desde que se inició?:**
- A) Taquicardia.
 - B) Disnea.
 - C) Hipotensión.
 - D) Hiperreflexia.
145. **Ante un caso de intoxicación por un producto con acción simpaticomimética, ¿cuál de estos signos clínicos no esperaría encontrar?:**
- A) Hiperreflexia.
 - B) Taquicardia.
 - C) Miosis.
 - D) Alucinaciones.
146. **Con respecto a la tos, señale la respuesta falsa:**
- A) No está indicada de entrada ninguna prueba complementaria para su estudio.
 - B) Si persiste más de 4 semanas, debemos solicitar una radiografía de tórax y senos paranasales, así como una espirometría con prueba broncodilatadora asociada.
 - C) En la tos aguda, suele resolverse espontáneamente en la segunda semana desde su inicio.
 - D) La PHmetría de 24 horas, no forma parte de las pruebas complementarias para su estudio.
147. **En la intoxicación por paraquat, en la primera semana puede ocurrir:**
- A) Isquemia miocárdica.
 - B) Parálisis facial.
 - C) Fallo renal.
 - D) Parkinsonismo.
148. **¿Cuál de estas afirmaciones es falsa en la aplicación de crioterapia?:**
- A) No está indicado en procesos crónicos.
 - B) Está contraindicada en heridas abiertas.
 - C) Tiene propiedades analgésicas.
 - D) Tiene propiedades anestésicas.

149. Respecto a la dieta del hipertenso, señale la respuesta falsa:

- A) La reducción de la ingesta de potasio puede asociarse a una elevación de la tensión arterial.
- B) Se debe recomendar un aumento de la ingesta de potasio a todos los pacientes hipertensos.
- C) El aumento de la ingesta de potasio no debe recomendarse a pacientes en tratamiento con inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA).
- D) El jamón serrano y pescados ahumados tienen alto contenido en sodio.

215

150. Indique cuál de los siguientes fármacos es de elección para el tratamiento de la hipertensión en caso de ser necesario en una embarazada:

- A) Olmesartán.
- B) Enalapril.
- C) Losartán.
- D) Labetalol.

152