



## ENCUESTA SOBRE LA UTILIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS / INTERVENCIONES EN ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD

Subdirección General de Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación

### Información sobre la encuesta y cláusula de Protección de Datos de la persona encuestada.

La Subdirección General de Calidad Asistencial, Seguridad y Evaluación del Servicio Murciano de Salud está llevando a cabo un estudio para **conocer con qué frecuencia se están realizando determinados procedimientos/intervenciones en Atención Primaria**, con el **objetivo de mejorar la calidad de la asistencia a los pacientes**.

Su opinión es muy importante para nosotros, por ello le estaríamos muy agradecidos si dedicase unos minutos a cumplimentar este cuestionario.

*Sus respuestas serán tratadas de manera anónima y confidencial. Toda la información será tratada en base al cumplimiento de obligaciones del art. 6.1.a), 6.1 c) y 6.1 e) de conformidad con el Reglamento General Europeo de Protección de Datos y con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, ante el Responsable del tratamiento que es la Dirección General de Recursos Humanos o en la dirección de correo electrónico del dpd: [dpd-sms@carm.es](mailto:dpd-sms@carm.es).*

*Asimismo, le comunicamos que tiene a su disposición información adicional en nuestra página web: <http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=425743>*

Estoy informado/a y acepto participar en esta encuesta.\*

He leído y acepto la política de protección de datos.

Seleccione su categoría profesional en función del puesto de trabajo que desempeña en la actualidad\*.

- Enfermería de Atención Primaria
- Medicina de Familia de Atención Primaria
- Pediatría de Atención Primaria

## CUESTIONARIO PARA MÉDICO DE FAMILIA (todas obligatorias salvo indicación en contra)

1. Indique, por favor, con qué frecuencia realiza, en mujeres postmenopáusicas, una valoración de factores de riesgo de fractura osteoporótica antes de solicitar una densitometría.

- 1. Siempre
- 2. Casi siempre
- 3. A veces
- 4. Casi nunca
- 5. Nunca

2. Y también en mujeres postmenopáusicas asintomáticas ¿con qué frecuencia utiliza la terapia hormonal para la prevención de la enfermedad vascular?

- 1. Siempre
- 2. Casi siempre
- 3. A veces
- 4. Casi nunca
- 5. Nunca

3. A los pacientes diabéticos tipo 2 en tratamiento exclusivo con metformina, ¿con que frecuencia les prescribe o indica el uso de tiras reactivas y/o glucómetros?

- 1. Siempre
- 2. Casi siempre
- 3. A veces
- 4. Casi nunca
- 5. Nunca

4. ¿Con que periodicidad solicita la realización de HbA1C a los pacientes diabéticos que mantienen un buen control clínico y metabólico?

- 1. Una vez al año
- 2. Cada seis meses
- 3. Cada tres meses
- 4. Cada mes
- 5. Otra periodicidad (especificar, por favor): \_\_\_\_\_

5. ¿Con que frecuencia solicita la determinación de PSA en hombres de 70 años o más, como cribado para la detección del cáncer de próstata?
- 1. Siempre
  - 2. Casi siempre
  - 3. A veces
  - 4. Casi nunca
  - 5. Nunca
6. ¿Les valora, antes de pedir la PSA, la existencia de antecedentes familiares de primer grado de cáncer de próstata?
- 1. Siempre
  - 2. Casi siempre
  - 3. A veces
  - 4. Casi nunca
  - 5. Nunca
7. ¿Con qué frecuencia prescribe antibióticos en las faringoamigdalitis?
- 1. Siempre
  - 2. Casi siempre
  - 3. A veces
  - 4. Casi nunca
  - 5. Nunca
8. ¿Con que frecuencia prescribe broncodilatadores de vida media o larga con corticoide asociado, en el asma bronquial?
- 1. Siempre
  - 2. Casi siempre
  - 3. A veces
  - 4. Casi nunca
  - 5. Nunca
9. Ante un cuadro agudo de lumbalgia inespecífica, de menos de 6 semanas de evolución, sin signos de alarma ¿con qué frecuencia indica la realización de pruebas de imagen (radiografía, RMN, TAC)?
- 1. Siempre
  - 2. Casi siempre
  - 3. A veces
  - 4. Casi nunca
  - 5. Nunca

10. En un paciente con sospecha de enfermedad tiroidea ¿solicita únicamente TSH para la valoración inicial?

- 1. Siempre
- 2. Casi siempre
- 3. A veces
- 4. Casi nunca
- 5. Nunca

11. ¿Con que frecuencia prescribe paracetamol de 1 gramo en lugar del de 650 miligramos?

- 1. Siempre
- 2. Casi siempre
- 3. A veces
- 4. Casi nunca
- 5. Nunca

12. ¿Dispone del test del estreptococo A en su centro de salud o consultorio?

- 1. SI
- 2. NO

13. En caso de disponer del test del estreptococo A ¿Con que frecuencia realiza o indica la realización del mismo en las faringoamigdalitis agudas?

- 1. Siempre
- 2. Casi siempre
- 3. A veces
- 4. Casi nunca
- 5. Nunca

14. Y finalmente, si quiere realizar alguna observación o sugerencia utilice este espacio: (opcional)

## CUESTIONARIO PARA ENFERMERÍA (todas obligatorias salvo indicación en contra)

1. A los pacientes diabéticos tipo 2 en tratamiento exclusivo con metformina, ¿con que frecuencia les prescribe o indica el uso de tiras reactivas y/o glucómetros?

- 1. Siempre
- 2. Casi siempre
- 3. A veces
- 4. Casi nunca
- 5. Nunca

2. ¿Con que frecuencia utiliza o indica la utilización de la povidona yodada para limpiar las heridas crónicas?

- 1. Siempre
- 2. Casi siempre
- 3. A veces
- 4. Casi nunca
- 5. Nunca

3. Y en niños menores de dos años ¿con que frecuencia utiliza o recomienda el uso de povidona yodada para la cura de heridas?

- 1. Siempre
- 2. Casi siempre
- 3. A veces
- 4. Casi nunca
- 5. Nunca

4. ¿Con que frecuencia utiliza los apósitos de plata para la prevención de la infección en heridas?

- 1. Siempre
- 2. Casi siempre
- 3. A veces
- 4. Casi nunca
- 5. Nunca

5. ¿Cuándo considera apropiada la recomendación de uso de flotadores para la prevención de las úlceras por presión?

- 1. Siempre
- 2. Casi siempre
- 3. A veces
- 4. Casi nunca
- 5. Nunca

6. ¿Realiza o indica la realización de masajes sobre prominencias óseas para la prevención de las úlceras por presión?

- 1. Siempre
- 2. Casi siempre
- 3. A veces
- 4. Casi nunca
- 5. Nunca

7. Y finalmente, si quiere realizar alguna observación o sugerencia utilice este espacio: (opcional)

## CUESTIONARIO PARA PEDIATRÍA (todas obligatorias salvo indicación en contra)

1. ¿Con qué frecuencia prescribe antibióticos en las faringoamigdalitis?
  1. Siempre
  2. Casi siempre
  3. A veces
  4. Casi nunca
  5. Nunca
  
2. En un paciente con sospecha de enfermedad tiroidea ¿solicita únicamente TSH para la valoración inicial?
  1. Siempre
  2. Casi siempre
  3. A veces
  4. Casi nunca
  5. Nunca
  
3. ¿Dispone del test del estreptococo A en su centro de salud o consultorio?
  1. SI
  2. NO
  
4. En caso de disponer del test del estreptococo A ¿Con que frecuencia realiza o indica la realización del mismo en las faringoamigdalitis agudas?
  1. Siempre
  2. Casi siempre
  3. A veces
  4. Casi nunca
  5. Nunca
  
5. Y finalmente, si quiere realizar alguna observación o sugerencia utilice este espacio: (opcional)



**Para todos los cuestionarios:**

---

Para poder clasificar los resultados de la encuesta realizada le pedimos que, por favor, nos facilite los siguientes datos:

---

Edad en años (indicar número): \_\_

Sexo: (opcional)

1. Hombre

2. Mujer

Seleccione su Área de Salud (desplegable)\*

Seleccione su Equipo de Atención Primaria (desplegable)\*

Seleccione su centro de trabajo (Punto Asistencial) (desplegable)\*

Muchas gracias por su colaboración. La información que nos has facilitado será de mucha utilidad para la mejora de la calidad de la atención en el Servicio Murciano de Salud.