

NOMBRE Y APELLIDOSFECHA DE NACIMIENTO	ÁREA DE SALUD
CIP AUTONÓMICO	Servicio de Anestesia
Nº Ht² CLÍNICA NÚMERO DE DNI, NIE O PASAPORTE	y Reanimación

## CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ANALGESIA OBSTÉTRICA

### EN QUÉ CONSISTE EL PROCEDIMIENTO Y PARA QUÉ SIRVE

La técnica consiste en inyectar unos medicamentos que se llaman anestésicos locales en la zona baja de la columna vertebral, lo que permite dormir desde el abdomen hacia abajo (piernas incluidas), mientras que usted está consciente (despierta).

El anestésico se puede administrar de forma continua a través de un tubo muy fino (catéter) que se coloca cerca de la médula espinal y de las raíces nerviosas, por fuera de una cubierta llamada duramadre (técnica epidural), o introduciendo el anestésico de una sola vez a través de una aguja muy fina más profundamente y más cerca aún de la médula espinal y de las raíces nerviosas (dentro de lo que se llama el espacio subaracnoideo).

En ocasiones la analgesia obstétrica por la debilidad que produce en las piernas dificulta o impide que camine libremente, por lo que puede que deba permanecer en la cama.

La finalidad de esta técnica es el alivio parcial o total del dolor asociado al parto. No hay evidencia de que el dolor de parto sea beneficioso para la madre o el feto. Por el contrario, el dolor, el miedo y la ansiedad desencadenan una serie de respuestas reflejas que pueden producir efectos nocivos sobre la madre, el feto y el propio trabajo de parto.

A veces, durante el parto pueden surgir complicaciones que necesitan la realización de una cesárea, y por tanto, es necesario cambiar la analgesia obstétrica por una anestesia más profunda que permita realizar la intervención.

### **CONSECUENCIAS RELEVANTES O DE IMPORTANCIA**

Es posible que no sienta la sensación de necesidad de empujar cuando sale el bebé por lo que debe atender a las indicaciones de matronas y obstetras para empujar voluntariamente.

#### **RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO**

### Riesgos frecuentes:

- Descenso de la presión arterial: Se aplicará, si lo necesita, el tratamiento necesario.
- Temblores
- Punción difícil o imposible de realizar.
- Fallo de la analgesia: en ese caso, hay alternativas como son recolocar el catéter, inyectar más anestésico, etc.
- Dolor de cabeza o de espalda. Suelen desaparecer en unos días, aunque a veces necesitan tratamiento.
- Picor en la cara o abdomen, es pasajero y se debe a la medicación.
- Dificultad para orinar.
- Náuseas y vómitos.

### Riesgos menos frecuentes y más graves:

- Infecciones o sangrado en la columna.
- De forma excepcional, el anestésico local puede pasar a su sangre y provocar complicaciones graves en su corazón y en su sistema nervioso (parada cardiaca, convulsiones e incluso la muerte).



NOMBRE Y APELLIDOSFECHA DE NACIMIENTO	ÁREA DE SALUD
CIP AUTONÓMICO	Servicio de Anestesia
Nº Htª CLÍNICA	
NÚMERO DE DNI, NIE O PASAPORTE	y Reanimación

- Lesión de un nervio de las piernas. Produce hormigueos, dolor o pérdida de fuerza. Por lo general son pasajeros, aunque pueden ser permanentes.
- Sangrado intracraneal y/o meningitis.
- Reacciones alérgicas.
- Rotura de la aguja o del catéter.
- Contraer una infección durante su estancia en el hospital.

### **RIESGOS QUE SE AÑADEN EN SU CASO**

Por mi situación actual: (señalar lo que proceda)					
No tiene Diabetes	Obesidad	Hipertensión			
Anemia Edad Avanzada	Tabaquismo	Tratamiento anticoagulante			
		puede			
aumentar la frecuencia o la gravedad del riesgo o complicaciones					

# aumentar la frecuencia o la gravedad del riesgo o complicaciones.

#### **CONTRAINDICACIONES**

- Alergia conocida a fármacos a utilizar.
- Infección general o local (en el lugar de la punción).
- Enfermedades neurológicas (por ejemplo, esclerosis múltiple).
- Alteraciones de la coagulación de la sangre.
- Tratamiento anticoagulante o antiagregante plaquetario no adecuadamente suspendido.
- Falta de colaboración de la paciente.

#### **ALTERNATIVAS AL PROCEDIMIENTO**

La alternativa a la técnica es:

- Administración de analgésicos vía intravenosa o inhalatoria.

#### **AUTORIZACIÓN PARA** "ANALGESIA OBSTÉTRICA"

DECLARO QUE HE COMPRENDIDO ADECUADAMENTE la información que me ha sido facilitada, y en consecuencia, AUTORIZO para que se me realice este procedimiento. He aclarado todas mis dudas en entrevista personal con D./D.ª ,así como los riesgos y consecuencias en la evolución de la enfermedad que padezco, de no realizarlo.

Estoy satisfecho con la información que se me ha proporcionado y entiendo que este documento puede ser REVOCADO por mí en cualquier momento antes de la realización del procedimiento. Se me entrega COPIA del mismo.



Fdo. Paciente:

NOMBRE Y APELLIDOS.
FECHA DE NACIMIENTO
CIP AUTONÓMICO
№ Htª CLÍNICA
NIÍMERO DE DNI, NIE O PASAPORTE

ÁREA DE SALUD Servicio de Anestesia y Reanimación

Para que así conste, firmo el presente documento después de leído.

En	, a	
Fdo. Paciente:		Fdo.: Dr./Dra.
DNI/NIE o pasaporte:		Col. Nº:
Sólo en caso de REVOCA	CIÓN DEL CONSENTIMIE	NTO:
· ·	evoco el consentimiento	, no doy la autorización para la realización previo si lo hubiere otorgado. Tomo esta decisión riesgos que asumo por este motivo.
En , ;	а	