

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA UTILIZACIÓN DE FENTANILO SUBLINGUAL EN DERMATOLOGÍA EN CONDICIONES DIFERENTES A LAS AUTORIZADAS

EN QUÉ CONSISTE EL PROCEDIMIENTO Y PARA QUÉ SIRVE

El fentanilo sublingual de liberación rápida es un fármaco opioide, al que se recurre como analgesia por su fácil administración (pastilla bajo la lengua), buena tolerancia y rápido efecto, para la realización de curas de úlceras dolorosas, terapias para el cáncer cutáneo (de la piel) y crioterapia profunda en verrugas periungueales múltiples (alrededor o debajo de las uñas). Aunque su enfermedad no está dentro de las indicaciones autorizadas en la ficha técnica de estos fármacos, si se ajusta al protocolo que tiene aprobado el hospital en estos casos.

La pauta de tratamiento será personalizada y dependerá de la intensidad del dolor del paciente, del tratamiento que haya recibido con anterioridad y de la capacidad que tenga para realizar el seguimiento. La dosis podrá cambiar en función de la evolución de su estado clínico y de los controles médicos de seguimiento que se realicen. Su médico le informará con detalle, la pauta que debe seguir en su caso.

Usted debe saber que estos fármacos pueden dar positivo en un control antidoping o de drogas.

Este tratamiento no va a curar su enfermedad de base. Su finalidad es disminuir el dolor para que pueda mejorar su calidad de vida.

CONSECUENCIAS RELEVANTES O DE IMPORTANCIA

- Disminución de la capacidad de conducir.
- Resultado positivo en las pruebas de control de drogas.

RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO

Pueden darse efectos no deseados tales como:

- Sensación de somnolencia excesiva, con respiración lenta o poco profunda y posible pérdida del conocimiento.
- Confusión, agitación o cansancio.
- Estreñimiento.
- Picor en la piel.
- Náuseas y vómitos.
- Sensación de lentitud y torpeza en los movimientos.
- Efectos sobre el estado de ánimo (depresión, ansiedad, apatía).
- Depresión de la inmunidad.
- Pérdida de la función sexual.
- Pérdida temporal de la menstruación en mujeres fértiles.
- Caídas, que pueden suponer fracturas.
- Osteoporosis.
- Hiperalgesia (sentir más dolor).
- Boca seca y caries en los dientes.

Riesgos menos frecuentes y más graves:

- Sobredosis: si se toman dosis más altas que las prescritas por el médico puede producirse depresión respiratoria extrema y coma, que pueden tener un desenlace fatal si no se tratan con urgencia.
- Dependencia física del fármaco: es la necesidad de tomarlos para encontrarse "normal".
- Síndrome de abstinencia: se produce cuando se reduce o interrumpe de forma súbita la medicación. Los síntomas son: aumento del dolor, insomnio, nerviosismo, diarrea, dolor de cuerpo, corazón acelerado, temblor, etc.
- Adicción al fármaco: alta dependencia física y psicológica de consumir el medicamento.

Existe el riesgo de tener accidentes mientras dure el tratamiento, en el caso de conducir vehículos, manejar maquinarias o realizar actividades de precisión.

Durante el tratamiento con opioides no debe tomar otros medicamentos similares como: alcohol, somníferos, sedantes, estimulantes, drogas ilegales, etc. El riesgo de sufrir los efectos adversos descritos anteriormente aumenta e incluso puede llegar a comprometer la vida.

RIESGOS QUE SE AÑADEN EN SU CASO

Por mi situación actual: (*señalar lo que proceda*)

<input type="checkbox"/> No tiene	<input type="checkbox"/> Diabetes	<input type="checkbox"/> Obesidad	<input type="checkbox"/> Hipertensión
<input type="checkbox"/> Anemia	<input type="checkbox"/> Edad Avanzada	<input type="checkbox"/> Tabaquismo	<input type="checkbox"/> Tratamiento anticoagulante
<input type="checkbox"/>puede			

aumentar la frecuencia o la gravedad del riesgo o complicaciones.

CONTRAINDICACIONES

- Historia previa de adicción, alergia o intolerancia a estos fármacos.

ALTERNATIVAS AL PROCEDIMIENTO

En su caso se considera que este tratamiento es el más adecuado. Otras alternativas a la técnica son:

- Analgésicos intravenosos (en vena).

AUTORIZACIÓN PARA "UTILIZACIÓN DE FENTANIL SUBLINGUAL EN DERMATOLOGÍA EN CONDICIONES DIFERENTES A LAS AUTORIZADAS"

DECLARO QUE HE COMPRENDIDO ADECUADAMENTE la información que me ha sido facilitada, y en consecuencia, AUTORIZO para que se me realice este procedimiento. He aclarado todas mis dudas en entrevista personal con D./D.^a , así como los riesgos y consecuencias en la evolución de la enfermedad que padezco, de no realizarlo.

Estoy satisfecho con la información que se me ha proporcionado y entiendo que este documento puede ser REVOCADO por mí en cualquier momento antes de la realización del procedimiento. Se me entrega COPIA del mismo.

Para que así conste, firmo el presente documento después de leído.

En _____, a _____

Fdo. Paciente:	Fdo.: Dr./Dra.
DNI/NIE o pasaporte:	Col. Nº:

Sólo en caso de REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO:

Yo, el paciente con DNI/NIE o Pasaporte: _____, no doy la autorización para la realización de esta intervención, o revoco el consentimiento previo si lo hubiere otorgado. Tomo esta decisión habiendo sido informado suficientemente de los riesgos que asumo por este motivo.

En _____, a _____

Fdo. Paciente: