

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA URETROLISIS

EN QUÉ CONSISTE EL PROCEDIMIENTO Y PARA QUÉ SIRVE

La cirugía para resolver el problema de la incontinencia urinaria puede producir dificultades al orinar, con síntomas de irritación y/o de obstrucción. La uretrolisis consiste en la liberación de la uretra después de este tipo de cirugía, incluyendo la posible sección y resección de las mallas previamente implantadas. En algún caso, además puede hacer falta colocar nuevas mallas para evitar la incontinencia.

La finalidad de la técnica es corregir la obstrucción que se ha producido tras las cirugías para evitar la incontinencia y mejorar el vaciado de la vejiga así como disminuir y solucionar los síntomas que produce.

CONSECUENCIAS RELEVANTES O DE IMPORTANCIA

El uso de esta técnica no tiene secuelas de importancia que se den con seguridad.

RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO

Pueden darse efectos no deseados, algunos son comunes a toda cirugía y afectan a todos los órganos y sistemas. Otros riesgos de la intervención son:

Riesgos frecuentes:

- Incontinencia urinaria de esfuerzo o de urgencia.
- Riesgo de que aparezca fibrosis que haga inefectiva la cirugía.

Riesgos menos frecuentes y más graves:

- No conseguir mejorar el problema.
- No poder orinar de forma espontánea.
- Incontinencia al orinar y/o descenso de la vejiga.
- Formación de cálculos en la vejiga.
- Dolor en el coito.
- Dolor en el pubis, en la pelvis o en las piernas.
- Fístula uretral o vesical (comunicación de la uretra o la vejiga al exterior, perdiendo orina de forma continua).
- Sangrado durante la intervención o tras ella, que en ocasiones puede precisar una transfusión de sangre o sus derivados.
- Lesiones de vísceras (intestino) o de grandes vasos.
- Salida del paquete intestinal.
- Salida al exterior de las mallas que se colocaron durante la cirugía.
- Contraer una infección durante su estancia en el hospital.

Complicaciones de la herida quirúrgica:

- Infección con diferente gravedad.
- Dehiscencia (apertura) de la herida.
- Fístulas permanentes o temporales.

- Cicatrización anómala.
- Intolerancia a los materiales de sutura.
- Neuralgias (dolores) y las hiper o hipoestesis (aumento o descenso de la sensibilidad).

La mayoría de estos problemas, se resuelven con tratamiento médico. Aunque a veces hay que recurrir a la cirugía para resolverlos.

RIESGOS QUE SE AÑADEN EN SU CASO

Por mi situación actual: *(señalar lo que proceda)*

No tiene Diabetes Obesidad Hipertensión

Anemia Edad Avanzada Tabaquismo Tratamiento anticoagulante

.....puede aumentar la frecuencia o la gravedad del riesgo o complicaciones.

CONTRAINDICACIONES

No tiene.

ALTERNATIVAS AL PROCEDIMIENTO

En su caso se considera que este tratamiento es el más adecuado. Otra alternativa a la técnica es:

- Tratamiento médico.

AUTORIZACIÓN PARA "URETROLISIS"

DECLARO QUE HE COMPRENDIDO ADECUADAMENTE la información que me ha sido facilitada, y en consecuencia, AUTORIZO para que se me realice este procedimiento. He aclarado todas mis dudas en entrevista personal con D./D.ª , así como los riesgos y consecuencias en la evolución de la enfermedad que padezco, de no realizarlo.

Estoy satisfecho con la información que se me ha proporcionado y entiendo que este documento puede ser REVOCADO por mí en cualquier momento antes de la realización del procedimiento. Se me entrega COPIA del mismo.

Para que así conste, firmo el presente documento después de leído.

En , a

Fdo. Paciente:	Fdo.: Dr./Dra.
DNI/NIE o pasaporte:	Col. Nº:



NOMBRE Y APELLIDOS.....
FECHA DE NACIMIENTO.....
CIP AUTONÓMICO.....
Nº Htª CLÍNICA.....
NÚMERO DE DNI, NIE O PASAPORTE.....

ÁREA DE SALUD

Servicio de Urología

Sólo en caso de REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO:

Yo, el paciente con DNI/NIE o Pasaporte: _____, no doy la autorización para la realización de esta intervención, o revoco el consentimiento previo si lo hubiere otorgado. Tomo esta decisión habiendo sido informado suficientemente de los riesgos que asumo por este motivo.

En _____, a _____,

Fdo. Paciente: