

## POBLACIÓN DIANA Y PAUTA DE LA VACUNACIÓN FRENTE AL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)

Población		Límite de edad superior	Número de dosis y pauta	Cambios respecto a 2023
Personas no vacunadas en determinadas situaciones de riesgo	Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)	Hasta los 26 años (incluidos)	2 dosis (0 y 6 meses)*	Se abandona el esquema de 3 dosis
	Personas en situación de prostitución			
Personas con inmunosupresión	Trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH)	Hasta los 45 años (incluidos)	3 dosis (0, 2 y 6 meses)**	Se amplía el rango de edad hasta los 45 años (incluidos)
	Infección por VIH			
	Trasplante de órgano sólido (TOS)			
	Síndrome WHIM (IDP)			
Mujeres, que hayan recibido tratamiento escisional por lesión intraepitelial de alto grado en cuello de útero/cérvix (CIN2+)		Independientemente de la edad		Sin cambios
Niñas y niños a los 11-12 años (6º de Educación Primaria)			2 dosis (0 y 6 meses)*	Sin cambios
Recaptación de personas no vacunadas en vacunación escolar (punto anterior)		Hasta los 18 años (incluidos) en caso de mujeres no vacunadas. En caso de varones no vacunados, nacidos en 2011 y años posteriores	2 dosis (0 y 6 meses)*	Se abandona el esquema de 3 dosis a partir de 15 años de edad

\* Intervalo mínimo entre dosis de 5 meses.

\*\* Independientemente de la edad de comienzo de la vacunación. El intervalo mínimo entre la 1ª y 2ª dosis debe ser de 1 mes y, al menos, de 4 meses entre la 2ª y la 3ª dosis.