


# ¿Quién debe vacunarse frente a neumococo?



Personas de 65 a 69 años no vacunados nunca frente a neumococo.

Personas de 65 a 69 años vacunados con una única dosis de vacuna frente a neumococo por debajo de los 65 años siempre que hayan pasado 5 años o más desde la dosis anterior.



Personas con alguna de estas condiciones de riesgo:

1. Enfermedad cardiovascular crónica.
2. Enfermedad respiratoria crónica, incluida asma y fibrosis quística.
3. Diabetes mellitus.
4. Enfermedad celiaca.
5. Hepatopatía crónica no cirrótica (incluyendo esteatosis hepática), cirrosis y alcoholismo crónico.
6. Enfermedad neurológica y neuromuscular u otros trastornos que dificulten la movilización de secreciones respiratorias o aumenten el riesgo de aspiración.
7. Fístula de LCR e implante coclear (o en espera de realizarlo).
8. Antecedente de enfermedad neumocócica invasiva confirmada por PCR o cultivo para cualquier serotipo.
9. Patología pulmonar confirmada tras padecimiento de COVID-19.
10. Institucionalizados de manera prolongada.
11. Leucemia, linfoma y otros cánceres en tratamiento con quimio-radioterapia o inmunosupresión.
12. Asplenia anatómica o funcional, disfunción esplénica (drepanocitosis homocigótica) y tratamiento con inhibidores del complemento.
13. Inmunodeficiencia celular, deficiencias de complemento y trastornos de la fagocitosis.
14. Infección por VIH.
15. Insuficiencia renal crónica avanzada, síndrome nefrótico y diálisis.
16. Enfermedad inflamatoria crónica.
17. Trasplante de órgano sólido y progenitores hematopoyéticos.
18. Síndrome de Down.

**Hay diferentes vacunas frente a neumococo, infórmate con tu profesional sanitario la recomendada para ti.**

Programa de vacunaciones



Región de Murcia  
Consejería de Salud

Dirección General de Salud  
Pública y Adicciones

