

VACUNACIÓN ESCOLAR

(vacuna frente a VPH y Meningococo ACWY) La mejor solución

Durante el presente curso escolar, se van a administrar **en el centro escolar la vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH) y la vacuna frente a Meningococo ACWY a los niños y niñas nacidos en 2012**. La vacuna VPH se administra en dos dosis, entre septiembre de 2023 y junio de 2024, aproximadamente. Coincidiendo con la 1ª dosis, se administrará una dosis de la vacuna frente al Meningococo ACWY. Si a la hora de la vacunación su hijo o hija padeciera alergia, fiebre o enfermedad consulte a su pediatra o al Programa de Vacunaciones. **Recuerde que a los 11 años debe acudir a su centro de salud para la revisión del Programa de Atención al Niño y al Adolescente**

Anote los siguientes datos sobre su hijo/a:

NOMBRE Y APELLIDOS _____ D.N.I. _____
FECHA DE NACIMIENTO (Importante) _____ TELÉFONO _____
DOMICILIO _____
POBLACIÓN _____
CÓDIGO POSTAL _____ CORREO ELECTRÓNICO _____
CENTRO DE SALUD AL QUE PERTENECE / MUTUALIDAD _____
CENTRO ESCOLAR (Importante) _____

MUY IMPORTANTE. Para proceder a la vacunación es necesaria su autorización **mediante su firma**. Marque en la casilla correspondiente si está de acuerdo con la vacunación de su hijo/a.

D./D.ª _____
con DNI n.º _____ actuando en nombre propio y como padre/madre/tutor (señale lo que proceda)

- Deseo que vacunen a mi hijo/a frente al VPH
 Deseo que vacunen a mi hijo/a frente al Meningococo ACWY

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR.

Si ya ha sido **vacunado este año 2023** de Meningococo ACWY, por favor anote aquí la fecha _____

ESPACIO RESERVADO AL PERSONAL SANITARIO

<p>Pegar código de barras 1ª DOSIS VPH</p> <p>Fecha: _____</p>	<p>Pegar código de barras Meningococo ACWY</p> <p>Fecha: _____</p>	<p>Pegar código de barras 2ª DOSIS VPH</p> <p>Fecha: _____</p>
--	--	--

No ha sido vacunado/a de _____

- Por contraindicaciones Por negativa Por ausencia

A su hijo/a _____

- Se le ha administrado la **2ª dosis** de la vacuna frente al **VPH**
 No ha sido vacunado/a de VPH
 Debe ponerse en contacto con su Centro de Salud

Fecha de administración: _____ de _____ de 2024

Guarde esta pestaña junto al carnet de vacunaciones

A su hijo/a _____

- Se le ha administrado la **1ª dosis** de la vacuna frente al **VPH** (Se le administrará la 2ª en el plazo de 6 meses aprox.) Se le ha administrado la vacuna frente al **Meningococo ACWY**
 Debe ponerse en contacto con su Centro de Salud

Fecha de administración: _____ de _____ de 2023

Guarde esta pestaña junto al carnet de vacunaciones

Información sobre las vacunas del Virus del Papiloma humano (VPH) y Meningococo ACWY

¿Qué es el VPH?

Es el virus de transmisión sexual más común en España, y puede causar problemas graves de salud como cánceres en ambos sexos y la aparición de verrugas genitales.

La mayoría de personas no presentan síntomas, sin embargo, algunos tipos concretos de este virus, cuando persisten durante muchos años (20-30) en el organismo, pueden provocar un tumor maligno.

¿Por qué es necesario vacunarse frente al VPH?

La prevención es fundamental. La vacuna es segura y eficaz en la prevención de la infección por VPH así como frente a las complicaciones que éste puede ocasionar, tanto en mujeres como en varones, como son la aparición de cánceres de área genital así como otras localizaciones (orofaringe, laringe, etc.) y el desarrollo de lesiones precancerosas y de verrugas genitales, con un nivel de protección superior al 90%.

¿Quién debería vacunarse frente a VPH?

La vacunación es eficaz especialmente si no se ha producido la infección y esto solo puede asegurarse cuando aún no se han iniciado las relaciones sexuales. Por esta razón, son los preadolescentes y adolescentes, tanto niños como niñas, los más beneficiados de los efectos preventivos de la vacuna.

¿Por qué es necesario vacunarse frente a Meningococo ACWY?

Las enfermedades causadas por el Meningococo ACWY (meningitis, sepsis, etc.) son muy graves e incluso pueden causar la muerte. Estas enfermedades se contagian de una persona a otra. Los períodos de máxima incidencia son las edades extremas de la vida, incluyendo a los menores de 5 años. Sin embargo, en la adolescencia existe la mayor tasa de personas que pueden portar el germen y transmitirlo sin necesidad de padecer la enfermedad.

¿Quién debería vacunarse frente a Meningococo ACWY?

Deben recibir la vacuna los escolares de ambos sexos nacidos en el año 2012. Aquellos que no hayan recibido una dosis de esta vacuna por encima de los 10 años de edad.

¿Cuáles son los riesgos de estas vacunas?

La vacuna frente al VPH se viene aplicando en todo el mundo más de 15 años y se han administrado más de 280 millones de dosis. Desde entonces se ha comprobado que es muy segura.

Cualquiera de las dos vacunas (VPH y Meningococo ACWY) pueden causar reacciones adversas pero que suelen ser leves y que desaparecen en pocas horas. Estas reacciones son:

- Reacciones en el brazo donde se administró la vacuna, como dolor, enrojecimiento e hinchazón.
- Décimas de fiebre en una de cada diez niñas.
- Dolor de cabeza en una de cada tres personas.
- Mareos debidos a la inyección pero no al contenido de la vacuna.

¿Qué hacer en caso de una reacción?

- Para la hinchazón del brazo se recomienda frío local y antiinflamatorios (ibuprofeno).
 - Para las décimas de fiebre: paracetamol o ibuprofeno.
 - Para evitar los mareos: permanecer sentado/a unos 15 minutos después de recibir la vacuna.
- Consulte con el médico si estas reacciones aumentan de intensidad o duran más de lo habitual.

¿Dónde puedo tener más información?

En su Centro de Salud o en los teléfonos del Programa de Vacunaciones: 968 362249, 968 366881, en el e-mail: vacunas@carm.es y en www.murciasalud.es/web/vacunacion/-/vacunacionescolar