

Informații privind vaccinurile împotriva Virusului Papiloma uman (HPV) și Meningococului ACWY

Ce este HPV?

Este virusul cu transmitere sexuală cel mai comun în Spania și poate cauza probleme grave de sănătate, precum tipuri de cancer la ambele sexe și apariția verucilor genitale.

De ce este necesară vaccinarea împotriva HPV?

Prevenția este fundamentală. Vaccinul este sigur și eficient în prevenirea infecției cu HPV, precum și a complicațiilor la care aceasta poate duce, atât la femei cât și la bărbați, cum sunt apariția unor tipuri de cancer în zona genitală dar și cu alte localizări (orofaringe, laringe etc.) și a dezvoltării leziunilor precanceroase și a verucilor genitale, oferind un nivel de protecție de peste 90%.

Cine ar trebui să se vaccineze împotriva HPV?

Vaccinul este eficient în special dacă nu s-a produs infectarea, iar acest lucru poate fi garantat numai înainte de începerea vieții sexuale. De aceea, preadolescenții și adolescenții, atât băieții cât și fetele, sunt cei mai avantajați de efectele preventive ale vaccinului.

De ce s-a schimbat vaccinarea împotriva HPV la doză unică?

S-a demonstrat că o singură doză de vaccin împotriva HPV protejează corect persoanele sănătoase cu vârsta de până la 25 ani inclusiv, strategie care se urmează deja în țările învecinate. Totuși, persoanele cu probleme imunitare (congenitale sau din cauza unui tratament), indiferent de vârsta la care încep vaccinarea, întotdeauna vor trebui să primească 3 doze. Puteți afla mai multe informații accesând: <https://www.murciasalud.es/web/vacunacion/-/vacunaci%C3%B3n-frente-al-virus-del-papiloma-humano-vph-en-grupos-de-riesgo>

De ce este necesară vaccinarea împotriva meningococului ACWY?

Bolile cauzate de Meningococul ACWY (meningită, septicemie etc.) sunt foarte grave și pot duce chiar la deces. Aceste boli se transmit de la o persoană la alta. Perioadele cu incidența cea mai mare sunt vârstele extreme ale vieții. Cu toate acestea, în adolescență există un risc ridicat de meningită, precum și o rată mai mare a persoanelor care pot purta și transmite germele, fără a manifesta neapărat boala.

Cine ar trebui să se vaccineze împotriva Meningococului ACWY?

Trebuie să primească vaccinul școlarii de ambele sexe născuți în anul 2014. Cei care au peste 10 ani și care nu au primit o doză din acest vaccin.

Care sunt riscurile acestor vaccinuri?

Vaccinul împotriva HPV se aplică în toată lumea de peste 15 ani și au fost administrate mai mult de 280 de milioane de doze. De atunci s-a putut observa că este foarte sigur.

Oricare dintre cele două vaccinuri (HPV și Meningococul ACWY) poate cauza reacții adverse, însă acestea sunt ușoare și dispar în câteva ore. Aceste reacții sunt:

- Reacții la brațul în care s-a administrat vaccinul, cum ar fi durere, roșeață sau umflătură.
- Febră ușoară la unul din zece copii.
- Durere de cap la una din trei persoane.
- Amețeli cauzate de injecție, nu de conținutul vaccinului.

Ce trebuie făcut în cazul unei reacții?

- Pentru umflarea brațului se recomandă aplicarea locală de comprese reci și antiinflamatoare (ibuprofen).
- Pentru febră ușoară: paracetamol sau ibuprofen.
- Pentru evitarea amețelii: rămâneți așezat timp de 15 minute după primirea vaccinului. Consultați medicul dacă aceste reacții cresc în intensitate sau durează mai mult decât de obicei.

De unde pot obține mai multe informații?

De la Unitatea dumneavoastră medicală sau la numerele de telefon ale Programului de Vaccinare: 968 362249, 968 366881, pe e-mail: vacunas@carm.es și pe <https://www.murciasalud.es/web/vacunacion/-/vacunacion-escolar-meningococo-vph>