

Informations sur les vaccins contre le papillomavirus humain (HPV)

Qu'est-ce que le papillomavirus?

Le papillomavirus est le virus sexuellement transmissible le plus répandu en Espagne. Il peut causer de graves problèmes de santé tels que des cancers chez les deux sexes et des verrues génitales.

Pourquoi est-il nécessaire de se faire vacciner contre le papillomavirus?

La prévention est essentielle. Le vaccin est sûr et efficace pour prévenir l'infection par le VPH ainsi que les complications qu'il peut provoquer, non seulement chez les femmes mais aussi chez les hommes, telles que l'apparition de cancers de la zone génitale ou d'autres localisations (oropharynx, larynx, etc.), ainsi que le développement de lésions précancéreuses et de verrues génitales, avec un niveau de protection supérieur à 90 %

Qui doit être vacciné contre le HPV?

La vaccination est efficace surtout si l'infection n'a pas encore eu lieu, ce qui ne peut être assuré que si les rapports sexuels n'ont pas encore commencé. C'est pourquoi ce sont les adolescents qui bénéficient le plus des effets préventifs du vaccin.

Pourquoi la vaccination contre le papillomavirus a-t-elle été remplacée par une dose unique?

Il a été démontré qu'une dose unique de vaccin anti-HPV protège les personnes en bonne santé jusqu'à l'âge de 25 ans inclus, une stratégie déjà suivie dans d'autres pays. Toutefois, chez les personnes présentant des problèmes de défense (congénitaux ou dus à un traitement), quel que soit l'âge auquel elles commencent à recevoir le vaccin, elles devront toujours recevoir 3 doses. Pour plus d'informations : <https://www.murciasalud.es/web/vacunacion/-/vacunaci%C3%B3n-frente-al-virus-del-papiloma-humano-vph-en-grupos-de-riesgo>.

Quels sont les risques de ces vaccins?

Le vaccin contre le VPH est administré dans le monde entier depuis 20 ans, et des centaines de millions de doses ont été administrées. Depuis lors, malgré une surveillance continue, aucun signal d'alerte ou de sécurité n'a été détecté qui puisse faire douter de son innocuité.

Ce vaccin peut provoquer des effets indésirables, mais elles sont généralement légères et disparaissent en quelques heures. Ces réactions sont les suivantes:

- Réactions au niveau du bras où le vaccin a été administré, telles qu'une douleur, une rougeur et un gonflement.
- Une légère fièvre chez un enfant sur dix.
- Maux de tête chez une personne sur trois.
- Étourdissements dus à l'injection, mais non au contenu du vaccin.

Que faire en cas de réaction?

- En cas de gonflement du bras, un refroidissement local et des anti-inflammatoires (ibuprofène) sont recommandés.
- Pour la fièvre: paracétamol ou ibuprofène.
- Pour éviter les vertiges: rester assis pendant environ 15 minutes après avoir reçu le vaccin.

Consultez votre médecin si ces réactions augmentent en intensité ou durent plus longtemps que d'habitude.

Consultez votre médecin si ces réactions augmentent en intensité ou durent plus longtemps que d'habitude.

Où puis-je obtenir plus d'informations?

Auprès de votre centre de santé ou aux numéros de téléphone du programme de vaccination: 968 362249, 968 366881, par courrier électronique: vacunas@carm.es et <https://www.murciasalud.es/web/vacunacion/-/vacunacion-escolar-meningococo-vph>.

Vous pouvez consulter la politique de protection des données à l'adresse suivante: <https://www.murciasalud.es/web/vacunacion/proteccion-de-datos>