

Informații privind vaccinurile împotriva Virusului Papiloma uman (HPV)

Ce este HPV?

Este virusul cu transmitere sexuală cel mai comun în Spania și poate cauza probleme grave de sănătate, precum tipuri de cancer la ambele sexe și apariția verucilor genitale.

De ce este necesară vaccinarea împotriva HPV?

Prevenția este esențială. Vaccinul este sigur și eficient în prevenirea infecției cu HPV, precum și a complicațiilor pe care aceasta le poate provoca — nu doar la femei, ci și la bărbați — cum ar fi apariția cancerelor în zona genitală sau în alte localizări (orofaringe, laringe etc.), precum și dezvoltarea leziunilor precanceroase și a verucilor genitale, cu un nivel de protecție de peste 90%.

Cine ar trebui să se vaccineze împotriva HPV?

Vaccinul este eficient în special dacă nu s-a produs infectarea, iar acest lucru poate fi garantat numai înainte de începerea vieții sexuale. De aceea, preadolescenții și adolescenții, atât băieții cât și fetele, sunt cei mai avantajați de efectele preventive ale vaccinului.

De ce s-a schimbat vaccinarea împotriva HPV la doză unică?

S-a demonstrat că o singură doză de vaccin împotriva HPV protejează corect persoanele sănătoase cu vârsta de până la 25 ani inclusiv, strategie care se urmează deja în țările învecinate. Totuși, persoanele cu probleme imunitare (congenitale sau din cauza unui tratament), indiferent de vârsta la care încep vaccinarea, întotdeauna vor trebui să primească 3 doze. Puteți afla mai multe informații accesând: <https://www.murciasalud.es/web/vacunacion/-/vacunaci%C3%B3n-frente-al-virus-del-papiloma-humano-vph-en-grupos-de-riesgo>

Care sunt riscurile acestor vaccinuri?

Vaccinul împotriva HPV este administrat în întreaga lume de aproximativ 20 de ani și au fost administrate sute de milioane de doze. De atunci, în ciuda monitorizării continue, nu a apărut niciun semnal de alertă sau de îngrijorare care să pună la îndoială siguranța sa. Acest vaccin poate provoca reacții adverse, dar acestea sunt de obicei ușoare și dispar în câteva ore. Aceste reacții sunt:

- Reacții la brațul în care s-a administrat vaccinul, cum ar fi durere, roșeață sau umflătură.
- Febră ușoară la unul din zece copii.
- Durere de cap la una din trei persoane.
- Amețeli cauzate de injecție, nu de conținutul vaccinului.

Ce trebuie făcut în cazul unei reacții?

- Pentru umflarea brațului se recomandă aplicarea locală de comprese reci și antiinflamatoare (ibuprofen).
- Pentru febră ușoară: paracetamol sau ibuprofen.
- Pentru evitarea amețelii: rămâneți așezat timp de 15 minute după primirea vaccinului.

Consultați medicul dacă aceste reacții cresc în intensitate sau durează mai mult decât de obicei.

De unde pot obține mai multe informații?

De la Unitatea dumneavoastră medicală sau la numerele de telefon ale Programului de



Vaccinare: 968 362249, 968 366881, pe e-mail: vacunas@carm.es și pe <https://www.murciasalud.es/web/vacunacion/-/vacunacion-escolar-meningococo-vph>

Puteți consulta politica de protecție a datelor la următoarea adresă: <https://www.murciasalud.es/web/vacunacion/proteccion-de-datos>