

Інформація про вакцини проти вірусу папіломи людини (ВРН, за аббревіатурою на іспанській мові)

Що таке ВРН?

В Іспанії ВРН є найпоширенішим вірусом, що передається статевим шляхом, і може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, такі як рак у жінок та чоловіків, а також утворення бородавок на статевих органах.

Чому необхідно робити щеплення проти ВРН?

Профілактика є надзвичайно важливою. Вакцина є безпечною та ефективною для запобігання інфекції та ускладнень, спричинених ВРН, як у жінок, так і у чоловіків, наприклад, виникнення раку в області статевих органів, а також інших ділянок (ротоглотки, гортані тощо) та розвитку передракових захворювань і бородавок на статевих органах, з рівнем захисту понад 90 %.

Кому слід робити щеплення проти ВРН?

Щеплення є особливо ефективним, коли зараження ще не відбулося, а це можна забезпечити лише до початку статевих стосунків. З цієї причини саме діти та підлітки, як хлопчики, так і дівчатка, отримують найбільшу користь від профілактичного ефекту вакцини.

Чому щеплення проти ВРН перейшло на одноразову дозу?

Доведено, що одноразова доза вакцини проти ВРН забезпечує ефективний захист у здорових осіб віком до 25 років включно. Мова йде про стратегію, якої вже дотримуються в сусідніх країнах. Однак людям, які мають проблеми з імунітетом (вроджені або внаслідок лікування), незалежно від віку, в якому вони починають вакцинуватися, завжди потрібно отримати 3 дози. Додаткову інформацію можна знайти за посиланням: <https://www.murciasalud.es/web/vacunacion/-/vacunaci%C3%B3n-frente-al-virus-del-papiloma-humano-vph-en-grupos-de-riesgo>

Які ризики пов'язані з цими вакцинами?

Вакцину проти ВПЛ застосовують у всьому світі протягом останніх 20 років, і було введено сотні мільйонів доз. За цей час, попри постійний моніторинг, не з'явилося жодних сигналів тривоги чи занепокоєння, які могли б поставити під сумнів її безпеку.

Ця вакцина може спричинити побічні реакції, але вони зазвичай легкі та зникають протягом кількох годин. Ці реакції є:

- Реакції на передпліччі у місці введення вакцини, такі як болючість, почервоніння та набряк.
- Підвищення температури у однієї з десяти осіб.
- Головний біль у однієї з трьох осіб.
- Запаморочення через ін'єкцію, але не через вміст вакцини.

Що робити у випадку прояву реакції?

- При набряку передпліччя рекомендується накладання холодних компресів місцево та прийом протизапальних препаратів (ібупрофен).
- При підвищеній температурі: парацетамол або ібупрофен.
- Щоб уникнути запаморочення: після введення вакцини необхідно залишатися в сидячому положенні протягом 15 хвилин.

Якщо реакції посилюються або тривають довше, ніж зазвичай, слід проконсультуватися з лікарем.

Де можна отримати додаткову інформацію?

У вашому медичному центрі або за телефонами Програми щеплень: 968 362249, 968 366881, електронною поштою: vacunas@car.m.es та на сайті

<https://www.murciasalud.es/web/vacunacion/-/vacunacion-escolar-meningococo-vph>

Ви можете ознайомитися з політикою захисту даних за посиланням:

<https://www.murciasalud.es/web/vacunacion/proteccion-de-datos>