

Інформація про вакцину проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) та менингококової вакцини ACWY

Що таке ВПЛ?

Це найпоширеніший вірус в Іспанії, що передається статевим шляхом і може викликати серйозні проблеми зі здоров'ям, такі як рак у чоловіків та жінок і появу генітальних бородавок.

Більшість людей не мають симптомів, проте деякі специфічні види цього вірусу, коли вони зберігаються протягом багатьох років (20-30) в організмі, можуть викликати злоякісну пухлину.

Чому необхідно робити щеплення від ВПЛ?

Профілактика має важливе значення. Вакцина безпечна та ефективна для профілактики інфекції ВПЛ, а також проти ускладнень, які вона може викликати, як у жінок, так і у чоловіків, таких як поява раку в області статевих органів, а також інших місць (ротоглотки, гортані тощо) та розвиток передракових уражень та генітальних бородавок, з рівнем захисту більше 90%.

Хто повинен робити щеплення від ВПЛ?

Вакцинація ефективна, особливо коли зараження ще не відбулося і забезпечити це можна тільки до початку статевих стосунків. Тому, саме підлітки, як хлопчики, так і дівчатка, отримують найбільшу користь від профілактичного впливу вакцини.

Чому необхідно робити щеплення від менингіту (вакцина ACWY)?

Захворювання, викликані менингоковим збудником ACWY (менингіт, сепсис і т.д.), дуже серйозні і навіть можуть викликати смерть. Ці захворювання передаються від однієї людини до іншої. Періоди максимальної захворюваності - це екстремальні періоди життя, в тому числі до у віці до 5 років. Однак, у підлітковому віці існує найвищий показник людей, які можуть переносити збудник і передавати його, при цьому не хворіючи.

Кому слід робити щеплення проти менингококу ACWY?

Школярі обох статей, народжені в 2012 році, повинні отримати вакцину. Ті, хто не отримав дозу цієї вакцини, віком від 10 років і старше.

Які ризики має вакцинація?

Вакцина проти ВПЛ вводиться у всьому світі понад 15 років і було введено понад 280 мільйонів доз. Тому, було доведено, що вона дуже безпечна.

Будь-яка вакцина (ВПЛ і менингококова ACWY) може викликати побічні реакції, але вони, як правило, легкі і зникають протягом декількох годин. Такими реакціями можуть бути:

- Реакції в руці, де була введена вакцина, такі як біль, почервоніння і набряк.
- Підвищення температури у кожної десятої дівчини.
- Головний біль у кожної третьої людини.
- Запаморочення внаслідок ін'єкції, не пов'язане з самою вакциною.

Що робити в разі реакції?

- При набряку руки рекомендується місцевий холод і протизапальні засоби (ібупрофен).
- Якщо підвищується температура: парацетамол або ібупрофен.
- Щоб уникнути запаморочення: залишайтеся сидіти приблизно протягом 15 хвилин після отримання вакцини.
- Зателефонуйте своєму лікарю, якщо ці реакції збільшуються або тривають довше, ніж зазвичай.

Де я можу отримати більше інформації?

У Вашому Центрі здоров'я або за телефонами Програми вакцинації: 968 362249, 968 366881, на e-mail: vacunas@carm.es та у www.murciasalud.es/web/vacunacion/-/vacunacionescolar