

VACUNACIÓN ESCOLAR

(vacuna frente a VPH en varones)

La mejor solución

Durante el presente curso escolar se va a administrar en el centro docente la vacuna frente al virus del papiloma humano (VPH) a los chicos nacidos en 2008 y en 2010 no vacunados previamente frente a este virus. La vacuna, Gardasil 9®, se administrará en dosis única durante los últimos días del mes de marzo de 2026. Si a la hora de la vacunación su hijo padeciera alergia, fiebre o enfermedad, consulte a su Médico de Familia o al profesional sanitario de referencia o contacte directamente con el Programa de Vacunaciones.

Anote los siguientes datos sobre su hijo:

NOMBRE Y APELLIDOS		D.N.I.	
FECHA DE NACIMIENTO (Importante)		TELÉFONO	
DOMICILIO			
POBLACIÓN		CÓDIGO POSTAL	
CORREO ELECTRÓNICO			
CENTRO DE SALUD AL QUE PERTENECE / MUTUALIDAD			
CENTRO DOCENTE (Importante)			

MUY IMPORTANTE: Para proceder a la vacunación es necesaria su autorización **mediante su firma y entréguela en el centro docente cuando se la soliciten**. Marque en la casilla correspondiente si está de acuerdo con la vacunación de su hijo.

D./D.ª
con DNI n.º actuando en nombre propio y como padre/madre/tutor (señale lo que proceda)

☐ DESEO que vacunen a mi hijo frente al VPH

☐ NO DESEO que vacunen a mi hijo frente al VPH

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR

Si ya ha sido **vacunado frente a VPH**, por favor anote aquí la fecha

ESPACIO RESERVADO AL PERSONAL SANITARIO

Fecha:

Pegar código de barras
VPH

No ha sido vacunado:

☐ Por contraindicaciones

☐ Por negativa

☐ Por inasistencia

A su hijo

☐ Se le ha administrado la vacuna frente al VPH.

Fecha de administración: de marzo de 2026

☐ Debe ponerse en contacto con su centro de salud.

Guarde esta pestaña junto al carnet de vacunaciones

Información sobre la vacuna del Virus del Papiloma humano (VPH)

¿Qué es el VPH?

Es el virus de transmisión sexual más común en España, y puede causar problemas graves de salud como cánceres en ambos sexos como, entre otros, el cáncer de pene en varones, y la aparición de verrugas genitales.

¿Por qué es necesario vacunarse frente al VPH?

La prevención es fundamental. La vacuna es segura y eficaz en la prevención de la infección por VPH así como frente a las complicaciones que éste puede ocasionar, no solo en mujeres sino también en varones, como son la aparición de cánceres de área genital o en otras localizaciones (orofaringe, laringe, etc.) y el desarrollo de lesiones precancerosas y de verrugas genitales, con un nivel de protección superior al 90 %.

¿Quién debería vacunarse frente a VPH?

La vacunación es eficaz especialmente si no se ha producido la infección y esto solo puede asegurarse cuando aún no se han iniciado las relaciones sexuales o éstas no han sido muy frecuentes o con múltiples parejas. Por esta razón, son los adolescentes, los más beneficiados de los efectos preventivos de la vacuna.

¿Por qué se ha cambiado la vacunación frente a VPH a una única dosis?

Se ha demostrado que una única dosis de vacuna frente a VPH protege correctamente en personas sanas hasta los 25 años de edad, inclusive, estrategia que ya se sigue en países de nuestro entorno. Sin embargo, en aquellas personas con problemas de defensas (congénitos y/o debidos a algún tratamiento), independientemente de la edad de inicio de la vacuna, siempre tendrán que recibir 3 dosis. Puede ampliar información en: <https://www.murciasalud.es/web/vacunacion/-/vacunaci%C3%B3n-frente-al-virus-del-papiloma-humano-vph-en-grupos-de-riesgo>

¿Cuáles son los riesgos de esta vacuna?

La vacuna frente al VPH se viene aplicando en todo el mundo durante los últimos 20 años y se han administrado cientos de millones de dosis. Desde entonces, no ha habido ninguna señal de alerta o alarma, a pesar del seguimiento continuado, que haga dudar de su seguridad.

Esta vacuna puede causar reacciones adversas, pero suelen ser leves y desaparecen en pocas horas. Estas reacciones son:

- Reacciones en el brazo donde se administró la vacuna, como dolor, enrojecimiento e hinchazón.
- Décimas de fiebre en uno/a de cada diez chicos/as.
- Dolor de cabeza en una de cada tres personas.
- Mareos debidos a la inyección, pero no al contenido de la vacuna.

¿Qué hacer en caso de una reacción?

- Para la hinchazón del brazo se recomienda frío local y antiinflamatorios (ibuprofeno).
- Para las décimas de fiebre: paracetamol o ibuprofeno.
- Para evitar los mareos: permanecer sentado unos 15 minutos después de recibir la vacuna.

Consulte con el médico si estas reacciones aumentan de intensidad o duran más de lo habitual.

¿Dónde puedo tener más información?

En su Centro de Salud o en los teléfonos del Programa de Vacunaciones: 968 362249, 968 357409, en el e-mail: vacunas@carm.es y en <https://www.murciasalud.es/web/vacunacion/-/vacunacion-escolar-meningococo-vph>

Puede consultar la política de protección de datos en: <https://www.murciasalud.es/web/vacunacion/proteccion-de-datos>