

## VACUNACIÓN ANTIGRI PAL EN PERSONAS CON ALERGIA AL HUEVO<sup>1</sup>

Tradicionalmente, la vacunación antigripal estaba contraindicada en personas alérgicas al huevo. Sin embargo, la evidencia científica actual permite recomendar la vacunación incluso en personas con antecedentes de reacciones alérgicas graves, incluida la anafilaxia. A continuación, se detallan las recomendaciones específicas y las consideraciones técnicas para la administración de las vacunas disponibles en la Región de Murcia.

### RECOMENDACIONES GENERALES

#### Vacuna inactivada cultivada en huevos embrionados (Influvac Tetra®):

- Indicada para personas a partir de 6 meses.
- Apta para personas con alergia al huevo, incluyendo aquellas con anafilaxia.
- En caso de anafilaxia, se recomienda su administración en un entorno clínico, como es el centro de salud o el puesto de vacunación habitual, con personal capacitado para manejar reacciones alérgicas y una observación posterior de 30 minutos.

#### Vacuna cultivada en líneas celulares (Flucelvax Tetra®):

- Indicada para personas a partir de 2 años.
- Libre de proteínas del huevo, por lo que puede administrarse en personas con alergia al huevo de cualquier gravedad

---

<sup>1</sup> UK Health Security Agency. Influenza: the green book, chapter 19. Actualizado noviembre 2023. [Internet]. Disponible en : <https://assets.publishing.service.gov.uk/media/654cf306014cc90010677371/Green-book-chapter-19-influenza-3November2023.pdf>

### Vacuna atenuada intranasal (Fluenz®):

- Indicada para personas de entre 2 y 17 años, ambos inclusive.
- Contiene trazas mínimas de ovoalbúmina (<0,024 µg/dosis). Son seguras para niños con alergias no graves al huevo.
- Contraindicada en personas con anafilaxia al huevo. En aquellas personas con recomendación de vacunación antigripal y esta condición se administrará cualquiera de las vacunas inactivadas. Consultar el resto de contraindicaciones en el protocolo de la campaña de vacunación estacional.

## **ADMINISTRACIÓN DE VACUNA ANTIGRI PAL EN ALÉRGICOS AL HUEVO POR FRANJAS DE EDAD**

**Niños y niñas de 6 a 23 meses.** Deben recibir vacunas inactivadas (Influvac Tetra®), que cumplan con los límites seguros de ovoalbúmina.

**Personas de 2 a 17 años.** Vacuna intranasal atenuada (Fluenz®) como opción preferente para alergias no graves en niños y niñas de hasta 5 años de edad y mayores de hasta 17 años con condiciones de riesgo sin contraindicación de vacunas atenuadas. En casos de anafilaxia, se recomienda cualquiera de las vacunas inactivadas, Flucelvax Tetra® o Influvac Tetra®, según disponibilidad en el centro.

**Adultos con alergia al huevo.** Vacunas inactivadas, Influvac Tetra® o Flucelvax Tetra®, dependiendo de la disponibilidad de vacuna en el centro.

## **ASPECTOS TÉCNICOS ADICIONALES**

- Introducción del huevo en la alimentación. No es necesario la introducción previa del huevo dentro de la alimentación complementaria del lactante para recibir vacunas antigripales inactivadas.

- Observación post-vacunación. En personas con anafilaxia al huevo, debe realizarse la vacunación en un entorno clínico, como puede ser el centro de salud o puesto de vacunación habitual, con supervisión durante 30 minutos.