

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA CIRUGÍA DEL COLESTEATOMA

EN QUÉ CONSISTE EL PROCEDIMIENTO Y PARA QUÉ SIRVE

El colesteatoma es un quiste o saco de piel que se forma en el oído medio. Es un crecimiento anormal de piel en el oído medio, generalmente detrás del tímpano, que puede causar pérdida auditiva y otras complicaciones si no se trata. Es como una especie de "bolsa" formada por células similares a la piel que no deberían estar allí. Esta bolsa puede crecer y dañar partes importantes del oído, como los huesecillos que nos ayudan a escuchar. Comúnmente ocurre como complicación de una infección crónica del oído.

La cirugía para tratarlo consiste en limpiar el oído, eliminar el colesteatoma y las partes dañadas. Si es posible, también se intenta reconstruir el oído, reparando los huesecillos y el tímpano para mejorar la audición.

En casos más graves, puede ser necesario quitar parte del hueso que rodea el oído medio, dejando una cavidad más grande que se puede revisar fácilmente en el futuro. Incluso en estos casos, existe la opción de intentar reconstruir la membrana timpánica y la cadena de huesecillos.

La operación se realiza con anestesia general. Para acceder al oído, generalmente se hace a través del canal auditivo o, más comúnmente, por detrás de la oreja.

Durante la cirugía, se pueden usar materiales especiales como pegamentos biológicos, esponjas sintéticas y reabsorbibles, prótesis que reemplazan los huesecillos del oído hechas con diferentes materiales, además de sustancias como meninges artificiales, hueso liofilizado u otros materiales sintéticos.

Cabe la posibilidad de que durante la cirugía haya que realizar modificaciones del procedimiento por los hallazgos intraoperatorios, para proporcionarle el tratamiento más adecuado.

Después de la operación, generalmente se coloca un tapón en el oído para protegerlo, y es importante usar sistemas de impermeabilización, como tapones u otros, para evitar que entre agua o suciedad. Además, si la cirugía fue por detrás de la oreja, se coloca un vendaje en la cabeza para mantener todo en su lugar y facilitar la recuperación.

La finalidad consiste en controlar el colesteatoma, prevenir complicaciones infecciosas y, en la medida de lo posible, mejorar la audición.

CONSECUENCIAS RELEVANTES O DE IMPORTANCIA

Este procedimiento no tiene consecuencias graves o de importancia que se den en todos los casos.

RIESGOS DEL PROCEDIMIENTO

Pueden darse efectos no deseados, algunos son comunes a toda cirugía y afectan a todos los órganos y sistemas. Otros riesgos de la intervención son:

Riesgos frecuentes:

- Molestias en el oído o mareos después de la operación.
- Sangrado durante o después de la cirugía.

- Adormecimiento en la zona cercana a la oreja, que puede durar un tiempo o quedarse de forma permanente.
- Dificultad e incluso imposibilidad de mojarse el oído si no se pudo reconstruir bien por dentro.

Riesgos poco frecuentes y/o graves:

- Pérdida de audición, que puede empeorar o, en casos muy raros, ser total y permanente.
- Ruidos en el oído (acúfenos) que podrían quedarse como secuela.
- Vértigos (sensación de que todo da vueltas) o inestabilidad, que pueden ser variables en el tiempo.
- Cambios en el gusto o sabor metálico en la lengua, por afectación del nervio cuerda del tímpano, que puede ser temporal o permanente.
- Parálisis facial, si se daña el nervio que mueve los músculos de la cara (muy poco frecuente).
- Salida de líquido del cerebro por el oído, si se forma o se descubre que exista previamente, una pequeña abertura (fístula).
- Infecciones, tanto en el oído como en el cerebro (como meningitis o abscesos).
- Supuración continua (salida de líquido o pus del oído).
- Lesión de una vena importante cerca del oído (seno venoso lateral) o, en casos muy raros, de una arteria (carótida).
- Hernia de las meninges, que son las membranas que protegen el cerebro.
- Reparación del colesteatoma.
- Contraer una infección durante su estancia en el hospital.

La mayoría de estos problemas se resuelven con tratamiento médico, aunque a veces haya que recurrir a la cirugía para resolverlos.

RIESGOS QUE SE AÑADEN EN SU CASO

Por mi situación actual: (señalar lo que proceda)

No tiene Diabetes Obesidad Hipertensión

Anemia Edad Avanzada Tabaquismo Tratamiento anticoagulante

.....puede aumentar la frecuencia o la gravedad del riesgo o complicaciones.

CONTRAINDICACIONES

Este procedimiento no tiene contraindicaciones absolutas.

ALTERNATIVAS AL PROCEDIMIENTO

No hay alternativas para este procedimiento que puedan mejorar su situación.



NOMBRE Y APELLIDOS.....
FECHA DE NACIMIENTO.....
CIP AUTONÓMICO.....
Nº Htª CLÍNICA.....
NÚMERO DE DNI, NIE O PASAPORTE.....

ÁREA DE SALUD
Servicio de
Otorrinolaringología

AUTORIZACIÓN PARA "CIRUGÍA DEL COLESTEATOMA"

DECLARO QUE HE COMPRENDIDO ADECUADAMENTE la información que me ha sido facilitada, y en consecuencia, AUTORIZO para que se me realice este procedimiento. He aclarado todas mis dudas en entrevista personal con D./Dª. , así como los riesgos y consecuencias en la evolución de la enfermedad que padezco, de no realizarlo.

Estoy satisfecho con la información que se me ha proporcionado y entiendo que este documento puede ser REVOCADO por mí en cualquier momento antes de la realización del procedimiento. Se me entrega COPIA del mismo.

Para que así conste, firmo el presente documento después de leído.

En , a

Fdo. Paciente:	Fdo.: Dr./Dra.
DNI/NIE o pasaporte:	Col. Nº: Servicio de

Sólo en caso de REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO:

Yo, el paciente con DNI/NIE o Pasaporte: , no doy la autorización para la realización de esta intervención, o revoco el consentimiento previo si lo hubiere otorgado. Tomo esta decisión habiendo sido informado suficientemente de los riesgos que asumo por este motivo.

En , a

Fdo. Paciente: