

Evolución de los calendarios de vacunaciones en la Región de Murcia

Programa de Vacunaciones de la Región de Murcia



Región de Murcia
Consejería de Salud

Dirección General de Salud
Pública y Adicciones





En este documento se recogen los cambios en el Calendario de Vacunaciones de la Región de Murcia desde el año 1977, año en el que se instaura el primer Calendario Oficial en esta Comunidad Autónoma (el primer calendario a nivel nacional data de 1975).

Antes de disponer de un calendario de vacunación sistemático, se realizaron en los años indicados se realizaron las siguientes vacunaciones:

- 1921: viruela.
- 1944: vacunación frente a viruela y difteria obligatorias.
- 1963: poliomielitis oral (niños/as de 2 meses a 7 años).
- 1965: DTP 2 dosis entre los 3 meses y 2 años.
- 1967: DTP 3^a dosis de recuerdo.

Los símbolos o anotaciones que aparecen en rojo se corresponden con las novedades instauradas cada año y en verde a la vacunación solo de los susceptibles.



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.



1977

EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina (célula entera)	Polio oral	Viruela	Sarampión monovalente	Rubéola
M E S E S	3	●	●	●	●			
	5	●	●	●	●			
	7	●	●	●	●			
	15					●		
	18	●	●		●			
	20					●		
	6		●		●			
AÑOS	11							● (solo en niñas)
	14		●		●			



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.



1981

EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina (célula entera)	Polio oral	Triple vírica	Rubéola
M E S E S	3	●	●	●	●		
	5	●	●	●	●		
	7	●	●	●	●		
	15					●	
	18	●	●		●		
AÑOS	6		●		●		
	11						● (solo en niñas)
	14		●		●		

Eliminación de la vacuna de la viruela: 1980



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.



1991

EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina (célula entera)	Polio oral	Triple vírica
M E S E S	3	●	●	●	●	
	5	●	●	●	●	
	7	●	●	●	●	
	15					●
	18	●	●		●	
AÑOS	6		●		●	
	11					● Vacunación escolar
	14		●		●	

Gripe estacional en población diana de manera protocolizada.



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA. 1994



EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina (célula entera)	Polio oral	Triple vírica	Hepatitis B
MESSES	3	●	●	●	●		
	5	●	●	●	●		
	7	●	●	●	●		
	15					●	
	18	●	●		●		
	6		●		●		
AÑOS	11					● Vacunación escolar	● Vacunación escolar
	14		●		●		



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.



1997

EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina (célula entera)	Polio oral	Triple vírica	Meningococo A+C	Hepatitis B
MESSES	3	●	●	●	●			
	5	●	●	●	●			
	7	●	●	●	●			
	15					●		
	18	●	●	●	●		●*	
AÑOS	6	●	●		●		●*	
	11					●	●*	● Vacunación escolar
	14	● (ad)	●		●		●*	

*Campaña de vacunación frente a meningococo A+C (18 meses a 19 años).

(ad) adulto



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA. 1998



EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina (célula entera)	Polio oral	Triple vírica	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B
MESSES	3	●	●	●	●		●*	
	5	●	●	●	●		●*	
	7	●	●	●	●		●*	
	15					●		
	18	●	●	●	●			
	6	●	●		●			
AÑOS	11					● Vacunación escolar		● Vacunación escolar
	14	● (ad)	●		✗			

*Nacidos a partir de enero de 1998.

(ad) adulto



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA. 1999



EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina	Polio oral	Triple vírica	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B
MESSES	3	●	●	●	●		● *	● **
	5	●	●	●	●		● *	● **
	7	●	●	●	●		● *	● **
	15					●		
	18	●	●	● (a)	●		● *	
	6	●	●		●	●		
AÑOS	11					● Vacunación escolar		● Vacunación escolar
	14	● (ad)	●					

*Nacidos a partir de enero de 1998.

**Nacidos en 1999.

(ad) adulto

(a) acelular



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA. 2000



EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina	Polio oral	Triple vírica	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B	Meningococo C
MESSES	2	●	●	●	●		●	●	●*
	4	●	●	●	●		●	●	●*
	6	●	●	●	●		●	●	●*
	15					●			
	18	●	●	●(a)	●		●		
	6	●	●		●	●			
ANOS	11					●		●	
	14	●(ad)	●						

* Para nacidos a partir del 1 de septiembre de 2000. Campaña de *catch-up* frente a meningococo C (2 meses a 5 años, nacidos a partir de diciembre de 1994).

(ad) adulto
(a) acelular



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.



2001

EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina	Polio oral	Triple vírica	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B	Meningococo C
MESSES	2	💧	💧	💧	💧		💧	💧	💧
	4	💧	💧	💧	💧		💧	💧	💧
	6	💧	💧	💧	💧		💧	💧	💧
	15					💧	💧		
	18	💧	💧	💧(a)	💧				
	6	💧	💧	🔴(a)	💧	💧			
AÑOS	11					🟢		🟢	
	14	💧(ad)	💧						

(ad) adulto
(a) acelular



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.



2002

EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina	Polio oral	Triple vírica	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B	Meningococo C
MESSES	2	●	●	●	●		●	●	●
	4	●	●	●	●		●	●	●
	6	●	●	●	●		●	●	●
	15					●	●		
	18	●	●	●(a)	●				
AÑOS	6	●	●	●(a)	●	●			
	11					●		●	
	14	●(ad)	●						

Neumococo polisacárido 23-valente en ≥ 65 años.

(ad) adulto
(a) acelular



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.

2003



EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina	Polio oral	Triple vírica	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B	Meningococo C
MESSES	2	●	●	●	●		●	●	●
	4	●	●	●	●		●	●	●
	6	●	●	●	●		●	●	●
	15					●	●		
	18	●	●	●(a)	●				
AÑOS	6	●	●	●(a)	●	●			
	11					●		●	
	14	●(ad)	●						

Gripe adyuvada en >64 años institucionalizados.

Neumococo polisacárido 23-valente en ≥65 años.

Neumococo conjugado 7-valente en 2-59 meses de riesgo.

(ad) adulto
(a) acelular



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.



2004

EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina	Polio inactivada	Triple vírica	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B	Meningococo C
MESSES	2	💧*	💧*	💧*	🔴*		💧*	💧	💧
	4	💧*	💧*	💧*	🔴*		💧*	💧	💧
	6	💧*	💧*	💧*	🔴*		💧*	💧	✗
	15					💧	💧		
	18	💧	💧	💧(a)	💧				
	6	💧	💧	💧(a)	✗	💧			
AÑOS	11							💧	
	14	💧(ad)	💧						

Neumococo polisacárido 23-valente en ≥ 65 años.

Neumococo conjugado 7-valente en 2-59 meses de riesgo.

Gripe adyuvada en >64 años institucionalizados o que padeczan una condición de riesgo.

*Catch-up meningococo C 10-20 años
(nacidos 1984-1994).*

*Introducción vacuna pentavalente
(ad) adulto
(a) acelular



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.



2005

EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina	Polio inactivada	Triple vírica	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B	Meningococo C
MESSES	2	●	●	●	●		●	●	●
	4	●	●	●	●		●	●	●
	6	●	●	●	●		●	●	
	15					●	●		
	18	●	●	●(a)	●				
	6	●	●	●(a)		●			
AÑOS	11							●	
	14	●(ad)	●						

Neumococo polisacárido 23-valente en ≥65 años.

Neumococo conjugado 7-valente en 2-59 meses de riesgo.

Gripe adyuvada en >64 años institucionalizados.

(ad) adulto

(a) acelular



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.



2006

EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina	Polio inactivada	Triple vírica	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B	Meningococo C	Varicela
MESSES	2	*	*	*	*		*	*		
	4	*	*	*	*		*	*		
	6	*	*	*	*		*	*		
	15					*			*	
	18			(a)			*			
	6			(a)						
AÑOS	11							*		(s)
	14	(ad)								

Neumococo polisacárido 23-valente en ≥ 60 años.

Neumococo conjugado 7-valente en 2-59 meses de riesgo.

Gripe adyuvada en ≥ 60 años institucionalizados.

(s) Varicela en susceptibles (1 dosis) <13 años.

*Introducción vacuna hexavalente

(ad) adulto

(a) acelular



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.



2008

EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B	Polio inactivada	Meningococo C	Triple vírica	Varicela	VPH
MESSES	2	●	●	●	●	●	●	●			
	4	●	●	●	●	●	●	●			
	6	●	●	●	●	●	●				
	15							●	●		
	18	●	●	●	●		●				
AÑOS	6	●	●	●					●		
	11					●				(1) 2 dosis	
	13-14	● (ad)	● Vacunación escolar							(2) Vacunación escolar 3 dosis	

Neumococo polisacárido 23-valente en ≥ 60 años.

Neumococo conjugado 7-valente en 2-59 meses de riesgo.

Gripe adyuvada en ≥ 60 años institucionalizados.

⁽¹⁾Solo para susceptibles (2 dosis a cualquier edad ≥ 12 meses).

⁽²⁾Solo en niñas nacidas en el año 1995.

(ad) adulto



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.



2009

EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B	Polio inactivada	Meningococo C	Triple vírica	Varicela	VPH
MESSES	2	●	●	●	●	●	●	●			
	4	●	●	●	●	●	●	●			
	6	●	●	●	●	●	●				
	15							●	●		
	18	●	●	●	●		●				
AÑOS	6	●	●	●				● ⁽¹⁾	●		
	11					✗			● ⁽²⁾	2 dosis	
A	13-14	● ^(ad)	● ⁽³⁾	Vacunación escolar							Vacunación escolar 3 dosis

Neumococo polisacárido 23-valente en ≥60 años.

Neumococo conjugado 7-valente en 2-59 meses de riesgo.

Gripe adyuvada en ≥60 años institucionalizados.

Eliminación de recuerdo de Td cada 10 años.

⁽¹⁾Para aquellos niños nacidos en el año 2003 que no hayan recibido ninguna dosis después de los 12 meses de edad.

⁽²⁾Solo para susceptibles.

⁽³⁾Solo en niñas nacidas en los años 1994 y 1996.

(ad) adulto



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.



2010

EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B	Polio inactivada	Meningococo C	Triple vírica	Varicela	VPH
MESSES	2	●	●	●	●	●	●	●			
	4	●	●	●	●	●	●	●			
	6	●	●	●	●	●	●				
	15							●	●		
	18	●	●	●	●		●				
AÑOS	6	●	●	●				● (1)	●		
	11									● (2) 2 dosis	
AÑOS	13-14	● (ad)	● Vacunación escolar							● (3) Vacunación escolar 3 dosis	

Neumococo polisacárido 23-valente en ≥ 60 años.

Cambio a neumococo conjugado 13-valente en 2-71 meses de riesgo inmunodeprimidos (ID).

Gripe adyuvada en ≥ 60 años institucionalizados.

(1)Para aquellos niños nacidos en el año 2004 que no hayan recibido ninguna dosis después de los 12 meses de edad.

(2)Solo para susceptibles.

(3)Solo en niñas nacidas en el año 1997. Recaptación de no vacunadas nacidas entre 1994 y 1996.

(ad) adulto



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.



2011

EDAD	Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B	Polio inactivada	Meningococo C	Triple vírica	Varicela	VPH
MESSES	2	●	●	●	●	●	●			
	4	●	●	●	●	●	●			
	6	●	●	●	●	●				
	12						●	●		
	18	●	●	●	●	●				
AÑOS	6	● (carga reducida)	●	● (carga reducida)				●		
	11						● (1)		● (2) 2 dosis	
	13-14	● (ad)	●	Vacunación escolar					● (3) Vacunación escolar 3 dosis	

Neumococo polisacárido 23-valente en ≥ 60 años.

Neumococo conjugado 13-valente en 2-71 meses de riesgo ID.

Gripe adyuvada en ≥ 60 años institucionalizados.

(1) Para aquellos niños nacidos en el año 2000 que no hayan recibido ninguna dosis después de los 12 meses de edad.

(2) Solo para susceptibles.

(3) Solo en niñas nacidas en el año 1998. Recaptación de no vacunadas nacidas entre 1994 y 1997.

(ad) adulto



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.



2012

EDAD	Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B	Polio inactivada	Meningococo C	Triple vírica	Varicela	VPH
MESSES	2	●	●	●	●	●	●			
	4	●	●	●	●	●	●			
	6	●	●	●	●	●				
	12						●	●		
	18	●	●	●		●				
AÑOS	6	● (carga reducida)	●	● (carga reducida)				●		
	11						● (1)		● (2)	
	13-14	● (ad)	●	Vacunación escolar					● (3)	Vacunación escolar 3 dosis

Neumococo polisacárido 23-valente en ≥ 60 años.

Neumococo conjugado 13-valente en ≥ 2 meses de riesgo.

Gripe adyuvada en ≥ 60 años institucionalizados.

(1) Para aquellos niños nacidos en el año 2001 que no hayan recibido ninguna dosis después de los 12 meses de edad.

(2) Solo para susceptibles.

(3) Solo en niñas nacidas en el año 1999 y 2000. Recaptación de no vacunadas nacidas entre 1995 y 1998.

(ad) adulto



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.

2013



EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B	Polio inactivada	Meningococo C	Triple vírica	Varicela	VPH
MESSES	2	●	●	●	●	●	●	●			
	4	●	●	●	●	●	●	●			
	6	●	●	●	●	●	●				
	12							●	●		
	18	●	●	●	●		●				
	4								● (2)		
AÑOS	6	●	●	●					● (3)		
	11							● (1)		● (4)	● (5) Vacunación escolar 3 dosis
	13-14	●	●	Vacunación escolar							● (5)

Neumococo polisacárido 23-valente en ≥ 60 años.

Neumococo conjugado 13-valente en ≥ 2 meses de riesgo.

Gripe adyuvada en ≥ 60 años institucionalizados.

(1)Para aquellos niños nacidos en el año 2002 que no hayan recibido ninguna dosis después de los 12 meses de edad.

(2)Para los nacidos en los años 2009.

(3)Para los nacidos en el año 2007.

(4)Solo para susceptibles.

(5)Solo en niñas nacidas en el año 2001 y 2002. Recaptación de no vacunadas nacidas entre 1995 y 2000.



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.

2014



EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B	Polio inactivada	Meningococo C	Triple vírica	Varicela	VPH
MESSES	2	●	●	●	●	●	●	✗			
	4	●	●	●	●	●	●	●			
	6	●	●	●	●	●	●				
	12							●	●		
	18	●	●	●	●		●				
	4								● (2)		
AÑOS	6	●	●	●					● (3)		
	11							● (1)		● (4) 2 dosis	● (5) Vacunación escolar 2 dosis
	13-14	●	●					Vacunación escolar			● (5)
				Pasa a vacunación en el centro de salud							

Neumococo polisacárido 23-valente en ≥ 60 años.

Neumococo conjugado 13-valente en ≥ 2 meses de riesgo.

Gripe adyuvada en ≥ 60 años institucionalizados.

VPH mujeres conizadas.

(1) Dosis de recuerdo coincidiendo con la primera dosis de VPH en los colegios.

(2) Para los nacidos en los años 2010.

(3) Para los nacidos en el año 2008,

(4) Solo para susceptibles.

(5) Solo en niñas nacidas en el año 2003. Recaptación de no vacunadas nacidas entre 1996 y 2002.



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.

2015



EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B ⁽¹⁾	Polio inactivada	Neumococo (Conjugada 13v)	Meningococo C	Triple Vírica	Varicela	VPH
MESSES	2	●	●	●	●	●	●	●				
	4	●	●	●	●	●	●	●	●			
	6	●	●	●	●	●	●					
	12							●	●	●		
	18	●	●	●	●		●					
AÑOS	4								●			
	6 ⁽⁵⁾	●	●	●								
	11-12							● (2)		● (3)	● (4)	2 dosis Vacunación escolar
	14	●	●					Vacunación escolar			● (4)	

Neumococo polisacárido 23-valente en ≥60 años.

(1) En recién nacidos de madre portadora de AgsHB: 1^a dosis de vacuna e inmunoglobulina al nacer, la 2^a dosis de vacuna a los 2 meses y la 3^a a los 6 meses.

Meningococo B grupos de riesgo.

(2) Para los niños nacidos en el año 2004.

VPH en conizadas.

(3) Para aquellos niños que no la hayan padecido y no hayan sido vacunados con anterioridad.

Gripe adyuvada en ≥60 años institucionalizados.

(4) Vacunación sistemática en niñas nacidas en 2004. Recaptación de no vacunadas nacidas entre 1997 y 2003. Esquema de vacunación 2 dosis (0 y 6 meses) con 14 años o menos y 3 dosis (0, 1-2 y 6 meses) para las de 15 a 18 años, ambos inclusive.

(5) Vacunación temporalmente aplazada desde noviembre de 2015.



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.

2016 (nacidos hasta 30 de junio)



EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B ⁽¹⁾	Polio inactivada	Neumococo (Conjugada 13v)	Meningococo C	Triple Vírica	Varicela	VPH
MESSES	2	●	●	●	●	●	●	●				
	4	●	●	●	●	●	●	●	●			
	6	●	●	●	●	●	●					
	12							●	●	●		
	15										● (2)	
	18	●	●	●	●		●					
AÑOS	4									●	● (2)	
	6 ⁽³⁾	●	●	●								
	11-12							● (4)		● (5)	● (6) 2 dosis	Vacunación escolar
	14	●	●							● (6)		

Neumococo polisacárido 23-valente en ≥60 años.

Neumococo conjugado 13-valente en ≥6 años de riesgo.

VPH mujeres conizadas.

dTpa en gestantes (semanas 27-36).

Meningococo B grupos de riesgo.

Gripe adyuvada en ≥60 años institucionalizados.

(1) En recién nacidos de madre portadora de AgsHB: 1ª dosis de vacuna e inmunoglobulina al nacer, la 2ª dosis de vacuna a los 2 meses y la 3ª a los 6 meses.

(2) Para los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2015.

(3) Vacunación temporalmente aplazada.

(4) Para los niños nacidos en el año 2005.

(5) Para aquellos niños que no la hayan padecido y no hayan sido vacunados con anterioridad.

(6) Vacunación sistemática en niñas nacidas en 2005. Recaptación de no vacunadas nacidas entre 1998 y 2004. Esquema de vacunación 2 dosis (0 y 6 meses) con 14 años o menos y 3 dosis (0, 1-2 y 6 meses) para las de 15 a 18 años, ambos inclusive.



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.

2016 (nacidos a partir del 1 de julio)



EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B ⁽¹⁾	Polio inactivada	Neumococo (Conjugada 13v)	Meningococo C	Triple Vírica	Varicela	VPH
MESSES	2	●	●	●	●	●	●	●				
	4	●	●	●	●	●	●	●	●			
	11	●	●	●	●	●	●	●				
	12								●	●		
	15										●	
AÑOS	4										●	●
	6	●	●	●								
	11-12								● (2)		● (3)	● (4) 2 dosis Vacunación escolar
	14	●	●									● (4)

Neumococo polisacárido 23-valente en ≥60 años.

Neumococo conjugado 13-valente en ≥6 años de riesgo.

VPH mujeres conizadas.

dTpa en gestantes (semanas 27-36).

Meningococo B grupos de riesgo.

Gripe adyuvada en ≥60 años institucionalizados.

(1) En recién nacidos de madre portadora de AgsHB: 1ª dosis de vacuna e inmunoglobulina al nacer, la 2ª dosis de vacuna a los 2 meses y la 3ª a los 6 meses.

(2) Para los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2015.

(3) Para los niños en el año 2005.

(4) Para aquellos niños que no la hayan padecido y no hayan sido vacunados con anterioridad.

(5) Vacunación sistemática en niñas nacidas en 2005. Recaptación de no vacunadas nacidas entre 1998 y 2004. Esquema de vacunación 2 dosis (0 y 6 meses) con 14 años o menos y 3 dosis (0, 1-2 y 6 meses) para las de 15 a 18 años, ambos inclusive.



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.

2017



EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B ⁽¹⁾	Polio inactivada	Neumococo (Conjugada 13v)	Meningococo C	Triple Vírica	Varicela	VPH
MESSES	2	●	●	●	●	●	●	●				
	4	●	●	●	●	●	●	●	●			
	11	●	●	●	●	●	●	●				
	12								●	●		
	15										●	
AÑOS	4										●	●
	6	●	●	●								
	11-12								● (2)		● (3)	● (4) 2 dosis Vacunación escolar
	14	●	●							Vacunación escolar	2 dosis	● (4)

Neumococo polisacárido 23-valente en ≥60 años.

Neumococo conjugado 13-valente en ≥6 años de riesgo.

VPH mujeres conizadas.

dTpa en gestantes (semanas 27-36).

Meningococo B grupos de riesgo.

Gripe adyuvada en ≥60 años institucionalizados.

(1) En recién nacidos de madre portadora de AgsHB: 1ª dosis de vacuna e inmunoglobulina al nacer, la 2ª dosis de vacuna a los 2 meses y la 3ª a los 6 meses.

(2) Para los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2015.

(3) Para los niños en el año 2006.

(4) Para aquellos niños que no la hayan padecido y no hayan sido vacunados con anterioridad.

(5) Vacunación sistemática en niñas nacidas en 2005. Recaptación de no vacunadas nacidas entre 1999 y 2005. Esquema de vacunación 2 dosis (0 y 6 meses) con 14 años o menos y 3 dosis (0, 1-2 y 6 meses) para las de 15 a 18 años, ambos inclusive.



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.

2018



EDAD	Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B ⁽¹⁾	Polio inactivada	Neumococo (Conjugada 13v)	Meningococo C	Triple Vírica	Varicela	VPH
MESSES	2	●	●	●	●	●	●				
	4	●	●	●	●	●	●	●			
	11	●	●	●	●	●	●				
	12							●	●		
	15									●(2)	
AÑOS	4								●	●(2)	
	6	●	●	●							
	11-12							●(3)		●(4) 2 dosis	●(5) 2 dosis Vacunación escolar
	14	●	●					Vacunación escolar		●(5)	

Calendario adulto:

Neumococo polisacárido 23-valente en ≥60 años.

dTpa en gestantes (semanas 27-36).

Gripe en ≥60 años.

(1) En recién nacidos de madre portadora de AgsHB: 1ª dosis de vacuna e inmunoglobulina al nacer, la 2ª dosis de vacuna a los 2 meses, la 3ª a los 4 meses y la 4ª a los 11 meses.

(2) Para los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2015 en régimen de dos dosis a los 15 meses y a los 4 años.

(3) Para los niños nacidos en el año 2007.

(4) Para aquellos niños que lo no la hayan padecido y no hayan sido vacunados con anterioridad.

(5) Vacunación sistemática en niñas nacidas en 2007. Recaptación de no vacunadas nacidas entre 2000 y 2006. Esquema de vacunación 2 dosis (0 y 6 meses) con 14 años o menos y 3 dosis (0, 1-2 y 6 meses) para las de 15 a 18 años, ambos inclusive.



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.

2019



EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B ⁽¹⁾	Polio inactivada	Neumococo (Conjugada 13v)	Meningococo C/ACWY	Triple Vírica	Varicela	VPH
MESSES	2	●	●	●	●	●	●	●				
	4	●	●	●	●	●	●	●	● (C)			
	11	●	●	●	●	●	●	●				
	12								● (C)	●		
	15										● (2)	
AÑOS	4									●	● (2)	
	6	●	●	●								
	11-12								● ACWY (3)		● (4) 2 dosis	● (5) 2 dosis Vacunación escolar
	14	●	●						Vacunación escolar		● (5)	

Calendario Adulto:

Neumococo polisacárido 23-valente en ≥60 años.

dTpa en gestantes (semanas 27-36).

Gripe en ≥60 años.

(1) En recién nacidos de madre portadora de AgsHB: 1^a dosis de vacuna e inmunoglobulina al nacer, la 2^a dosis de vacuna a los 2 meses, la 3^a a los 4 meses y la 4^a a los 11 meses.

(2) Para los niños nacidos a partir del 1 de enero de 2015 en régimen de dos dosis a los 15 meses y a los 4 años. La dosis de los 4 años se administrará utilizando la vacuna Tetravírica (sarampión, rubeola, parotiditis y varicela).

(3) Para los niños nacidos en el año 2008.

(4) Para aquellos niños que lo no la hayan padecido y no hayan sido vacunados con anterioridad.

(5) Vacunación sistemática en niñas nacidas en 2008. Recaptación de no vacunadas nacidas entre 2001 y 2007. Esquema de vacunación 2 dosis (0 y 6 meses) con 14 años o menos y 3 dosis (0, 1-2 y 6 meses) para las de 15 a 18 años, ambos inclusive.



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.

2020



EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B ⁽¹⁾	Polio inactivada	Neumococo (Conjugada 13v)	Meningococo C/ACWY	Triple Vírica	Varicela	VPH
MESSES	2											
	4								(C)			
	11											
	12								(C)			
	15											
AÑOS	4									(2)	(2)	
	6											
	11-12								(ACWY)		(3)	(4) (2 dosis) Vacunación escolar
	14								Vacunación escolar		(4)	

Rotavirus en prematuros de 27 a 32 semanas de gestación (SG).

Calendario Adulto:

Neumococo polisacárido 23-valente en ≥60 años.

dTpa en gestantes (semanas 27-36).

Gripe en ≥60 años.

Gripe adyuvada en ≥65 años no institucionalizados.

(1) En recién nacidos de madre portadora de AgsHB: 1ª dosis de vacuna e inmunoglobulina al nacer, la 2ª dosis de vacuna a los 2 meses, la 3ª a los 4 meses y la 4ª a los 11 meses.

(2) La dosis de los 4 años (2ª dosis de sarampión, rubeola, parotiditis y varicela) se administrará utilizando la vacuna Tetravírica .

(3) Para aquellos niños que lo no la hayan padecido y no hayan sido vacunados con anterioridad.

(4) Vacunación sistemática en niñas nacidas en 2009. Recaptación de no vacunadas nacidas entre 2002 y 2008. Esquema de vacunación 2 dosis (0 y 6 meses) con 14 años o menos y 3 dosis (0, 1-2 y 6 meses) para las de 15 a 18 años, ambos inclusive.



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.

2021



EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B ⁽¹⁾	Polio inactivada	Neumococo (Conjugada 13v)	Meningococo C/ACWY	Triple Vírica	Varicela	VPH
MESSES	2	●	●	●	●	●	●	●				
	4	●	●	●	●	●	●	●	●(C)			
	11	●	●	●	●	●	●	●				
	12								●(C)	●		
	15										●	
AÑOS	4									●(2)	●(2)	
	6	●	●	●								
	11-12								●(ACWY)		●(3)	●(4)
	13-14	●	●								2 dosis	Vacunación escolar 2 dosis ●(4)

Ampliación vacunación rotavirus a prematuros a partir de 25 SG.

Calendario Adulto:

Neumococo polisacárido 23-valente en ≥60 años.

dTpa en gestantes (semanas 27-36).

Gripe en ≥60 años.

Catch-up meningococo ACWY nacidos 2001-2007.

- (1) En recién nacidos de madre portadora de AgsHB: 1^a dosis de vacuna e inmunoglobulina al nacer, la 2^a dosis de vacuna a los 2 meses, la 3^a a los 4 meses y la 4^a a los 11 meses.
- (2) La dosis de los 4 años (2^a dosis de sarampión, rubeola, parotiditis y varicela) se administrará utilizando la vacuna Tetravírica .
- (3) Para aquellos niños que lo no la hayan padecido y no hayan sido vacunados con anterioridad.
- (4) Vacunación sistemática en niñas nacidas en 2010. Recaptación de no vacunadas nacidas entre 2003 y 2009. Esquema de vacunación 2 dosis (0 y 6 meses) con 14 años o menos y 3 dosis (0, 1-2 y 6 meses) para las de 15 a 18 años, ambos inclusive.



CALENDARIO DE VACUNACIONES. REGIÓN DE MURCIA.

2022



EDAD		Difteria	Tétanos	Tosferina	<i>Haemophilus influenzae b</i>	Hepatitis B ⁽¹⁾	Polio inactivada	Neumococo (Conjugada 13v)	Men C/ACWY	Triple Vírica	Varicela	Gripe	VPH
MESSES	2	●	●	●	●	●	●	●					
	4	●	●	●	●	●	●	●	●				
	11	●	●	●	●	●	●	●	(C)			● (3)	
	12								● ACWY (2)	●		● (3)	
	15									●		● (3)	
	4									● (4)	● (4)	● (3)	
AÑOS	6	●	●	●			● (5)						
	11-12								● (6) (ACWY) Vacunación escolar	● (7) (2 dosis)		● (8) (2 dosis) Vacunación escolar	
	13-14	●	●								● (8)		

Calendario Adulto:

Neumococo conjugada 20-valente en 65 años.
 Gripe en ≥60 años. Vacuna tetravalente recombinante en institucionalizados.
 dTpa en gestantes (semanas 27-36).
 Catch-up meningococo ACWY nacidos 2001-2007.

(1) En recién nacidos de madre portadora de AgsHB: 1^a dosis de vacuna e inmunoglobulina al nacer, la 2^a dosis de vacuna a los 2 meses, la 3^a a los 4 meses y la 4^a a los 11 meses.

(2) Nacidos a partir del 1 de marzo de 2021.

(3) Gripe en temporadas 6-59 meses de edad. 24-59 meses con vacuna intranasal si no hay contraindicación.

(4) La dosis de los 4 años (2^a dosis de sarampión, rubeola, parotiditis y varicela) se administrará utilizando la vacuna Tetravírica.

(5) En los niños nacidos a partir del 1 de julio de 2016 o con pauta 2+1. Se utilizará una vacuna combinada en forma de tetravalente.

(6) Vacunación sistemática a niñas y niños nacidos en el 2011. Recaptación de no vacunados previamente nacidos entre 2001 y 2010.

(7) Para aquellos niños que lo no la hayan padecido y no hayan sido vacunados con anterioridad.

(8) Vacunación sistemática en niños/as nacidos en 2011 y cambio a VPH-9. Recaptación de niñas no vacunadas nacidas entre 2004 y 2010. Esquema de vacunación 2 dosis (0 y 6 meses) con 14 años o menos y 3 dosis (0, 1-2 y 6 meses) para las de 15 a 18 años, ambos inclusive.



CALENDARIO DE VACUNACIONES A LO LARGO DE TODA LA VIDA.

REGIÓN DE MURCIA. 2023



EDAD	VRS	Difteria	Tétanos	Tosferina	Hib	Hepatitis B ⁽³⁾	Polio inactivada	Neumococo (Conjugada 13v)	Men C/ACWY	MenB	Triple Vírica	Varicela	Gripe	VPH	Neumococo (Conjugada 20v)	Herpes zóster
PRENATAL		● (2)	● (2)	● (2)												
MESSES	0	● (1)														
	2	● (1)	●	●	●	●	●	●			● (4)					
	4	● (1)	●	●	●	●	●	●	●	C	● (4)					
	11		●	●	●	●	●	●					● (5)			
	12								● ACWY	● (4)	●		● (5)			
	15											●	● (5)			
ANOS	4										●	● (6)	● (5)			
	6		●	●	●		●					(2 dosis)				(2 dosis) Vacunación escolar
	11-12								● (7) ACWY			● (8)		● (9)		
	13-14		●	●					● (7)			● (8)		● (9)		
	15-18		● (10)	● (10)					● (7)			● (8)		● (9)		
	19-64		● (10)	● (10)							●	● (8)	● (12)			
	≥65		● (11)	● (11)									● (12)		● (13)	● (14)

Leyenda en siguiente diapositiva.



CALENDARIO DE VACUNACIONES A LO LARGO DE TODA LA VIDA. REGIÓN DE MURCIA. 2023



1. Ac monoclonal en nacidos abril 2023 a marzo 2024. Nacidos en temporada previo al alta de la maternidad. Nacidos antes de temporada como *catch-up* al inicio de la misma. Grupos de riesgo hasta mayor edad, consultar protocolo estacional.
2. dTpa en gestantes (semanas 27-36).
3. En recién nacidos de madre portadora de AgsHB: 1^a dosis de vacuna e inmunoglobulina al nacer, la 2^a dosis de vacuna a los 2 meses, la 3^a a los 4 meses y la 4^a a los 11 meses.
4. **Nacidos a partir del 1 de enero de 2023.**
5. Gripe en temporada 6-59 meses de edad. 24-59 meses con vacuna intranasal si no hay contraindicación.
6. La dosis de los 4 años (2^a dosis de sarampión, rubeola, parotiditis y varicela) se administrará utilizando la vacuna Tetravírica.
7. Vacunación sistemática a niñas y niños nacidos en el 2012. Recaptación de no vacunados previamente nacidos entre 2001 y 2011.
8. Para aquellas personas que lo no la hayan padecido y no hayan sido vacunados con anterioridad.
9. Vacunación sistemática en nacidos en 2012, niños y niñas. Recaptación de niñas no vacunadas nacidas entre 2004 y 2011 y niños no vacunados nacidos desde 2011. Esquema de vacunación 2 dosis (0 y 6 meses) con ≤14 años y 3 dosis (0, 1 y 6 meses) para las de ≥15 años.
10. Completar vacunación hasta 5 dosis desde 15 a 64 años. No administrar recuerdo cada 10 años.
11. Recuerdo de Td a los 65 años en personas que hayan recibido 5 dosis a lo largo de la infancia y adolescencia.
12. Gripe ≥60 años.
13. VNC20 en personas de 65 a 80 años no vacunadas con anterioridad o vacunadas previamente con una única dosis de VPN23 antes de los 65 años (intervalo de 5 años mínimo desde la última dosis de vacuna antineumocócica recibida).
14. Personas nacidas en 1958.



CALENDARIO DE VACUNACIONES A LO LARGO DE TODA LA VIDA.

REGIÓN DE MURCIA. 2024

Leyenda en siguiente diapositiva.



EDAD	VRS	Difteria	Tétanos	Tosferina	Hib	Hepatitis B ⁽³⁾	Polio inactivada	Neumococo (Conjugada 20v)	Men ACWY	MenB	Triple Vírica	Varicela	Gripe	VPH	Rotavirus	Herpes zóster	
PRENATAL			“(2)”	“(2)”													
MESES	0		“(1)”														
	2	“(1)”		“(1)”	“(1)”	“(1)”	“(1)”	“(13)”		“(1)”					“(4)”		
	4	“(1)”		“(1)”	“(1)”	“(1)”	“(1)”	“(13)”		“(1)”	“(1)”				“(4)”		
	6	“(1)”						“(13)”							“(4)”		
	11		“(1)”	“(1)”	“(1)”	“(1)”	“(1)”	“(13)”					“(5)”				
	12							“(13)”		“(1)”	“(1)”	“(1)”		“(5)”			
	15							“(13)”				“(1)”	“(5)”				
AÑOS	4							“(13)”			“(1)”	“(6)”	“(5)”				
	6		“(1)”	“(1)”	“(1)”		“(1)”						“(2 dosis)”		Vacunación escolar nacidos 2020 y 2021		
	11-12								“(7)”	Vacunación escolar		“(8)”			“(9) (1 dosis)”	Vacunación escolar	
	13-14		“(1)”	“(1)”					“(7)”			“(8)”			“(9)”		
	15-18		“(10)”	“(10)”					“(7)”			“(8)”			“(9)”		
	19-64		“(10)”	“(10)”							“(8)”		“(12)”	“(9)”			
	≥65		“(11)”	“(11)”				“(13)”					“(12)”			“(14)”	



CALENDARIO DE VACUNACIONES A LO LARGO DE TODA LA VIDA. REGIÓN DE MURCIA. 2024



1. Ac monoclonal en nacidos abril 2024 a marzo 2025. Nacidos en temporada previo al alta de la maternidad. Nacidos antes de temporada como *catch-up* al inicio de la misma. Grupos de riesgo hasta mayor edad, consultar protocolo estacional.
2. dTpa en gestantes (semanas 27-36).
3. En recién nacidos de madre portadora de AgsHB: 1^a dosis de vacuna e inmunoglobulina al nacer, la 2^a dosis de vacuna a los 2 meses, la 3^a a los 4 meses y la 4^a a los 11 meses.
4. **Nacidos a partir de enero de 2024. No se podrá iniciar la vacunación más allá de las 12 semanas de vida.**
5. Gripe en temporada de 6 meses a 5 años de edad. 2-5 años con vacuna intranasal si no hay contraindicación.
6. La dosis de los 4 años (2^a dosis de sarampión, rubeola, parotiditis y varicela) se administrará utilizando la vacuna Tetravírica.
7. Vacunación sistemática a niñas y niños nacidos en el 2012. Recaptación de no vacunados previamente nacidos entre 2001 y 2011.
8. Para aquellas personas que lo no la hayan padecido y no hayan sido vacunados con anterioridad.
9. Vacunación sistemática en niños/as nacidos/as en 2013, niños y niñas. Recaptación de niñas no vacunadas nacidas entre 2004 y 2012 y niños no vacunados nacidos desde 2011. Esquema de vacunación 1 dosis en no inmunodeprimidos. *Catch-up* de nacidos en 1999 y 2000 no vacunados.
10. Completar vacunación hasta 5 dosis desde 15 a 64 años. No administrar recuerdo cada 10 años.
11. Recuerdo de Td a los 65 años en personas que hayan recibido 5 dosis a lo largo de la infancia y adolescencia.
12. Gripe ≥60 años.
13. VNC20 en nacidos a partir del 1 de marzo de 2024. *Catch-up* con una única dosis de VNC20 en niños/as nacidos/as en junio de 2021 y posteriores correctamente vacunados/as con VNC13 para protección adicional de los 7 serotipos. VNC20 en personas de 65 años o más no vacunadas con anterioridad o vacunadas previamente con una única dosis de VPN23 antes de los 65 años (intervalo de 5 años mínimo desde la última dosis de vacuna antineumocócica recibida).
14. Personas nacidas en 1959 y 1944. Recaptación de las personas nacidas en 1958 no vacunadas con anterioridad.



CALENDARIO DE VACUNACIONES E INMUNIZACIONES A LO LARGO DE TODA LA VIDA. REGIÓN DE MURCIA. 2025



Leyenda en siguiente diapositiva.

EDAD	VRS	Difteria	Tétanos	Tosferina	Hib	Hepatitis B ⁽³⁾	Polio inactivada	Neumococo (Conjugada 20v)	Men ACWY	MenB	Triple Vírica	Varicela	Gripe	VPH	Rotavirus	Herpes zóster
PRENATAL		● (2)	● (2)	● (2)												
MESSES	0	● (1)														
	2	● (1)	●	●	●	●	●	● (13)		●					● (4)	
	4	● (1)	●	●	●	●	●	● (13)	●	●					● (4)	
	6	● (1)						● (13)							● (4)	
	11		●	●	●	●	●	● (13)					● (5)			
	12							● (13)	●	●	●		● (5)			
	15							● (13)				● (5)				
AÑOS	4							● (13)			●	● (6)	● (5)			
	6		●	●	●		●					(2 dosis)	● (5)		Vacunación escolar nacidos 2016-2023	
	11-12								● (7)	Vacunación escolar		● (8)	● (5)		● (9) (1 dosis) Vacunación escolar	
	13-14		●	●					● (7)			● (8)		● (9)		
	15-18		● (10)	● (10)					● (7)			● (8)		● (9)		
	19-64	● (1)	● (10)	● (10)								● (8)	● (12)	● (9)		
	≥65	● (1)	● (11)	● (11)				● (13)					● (12)			● (14)



CALENDARIO DE VACUNACIONES E INMUNIZACIONES A LO LARGO DE TODA LA VIDA. REGIÓN DE MURCIA. 2025



1. Ac monoclonal en nacidos abril 2025 a marzo 2026. Nacidos en temporada previo al alta de la maternidad. Nacidos antes de temporada como *catch-up* al inicio de la misma. Grupos de riesgo hasta mayor edad, consultar protocolo estacional. **Vacunación frente a VRS en personas de 50 años o más, siempre que estén institucionalizadas en centros de personas mayores o de personas con discapacidad, así como grandes inmunodeprimidos, según protocolo estacional.**
2. dTpa en gestantes (semanas 27-36).
3. En recién nacidos de madre portadora de AgsHB: 1^a dosis de vacuna e inmunoglobulina al nacer, la 2^a dosis de vacuna a los 2 meses, la 3^a a los 4 meses y la 4^a a los 11 meses.
4. No se podrá iniciar la vacunación más allá de las 12 semanas de vida.
5. Gripe en temporada de 6 meses a 9 años de edad. 2-9 años con vacuna intranasal si no hay contraindicación en el entorno escolar.
6. La dosis de los 4 años (2^a dosis de sarampión, rubeola, parotiditis y varicela) se administrará utilizando la vacuna Tetravírica.
7. Vacunación sistemática a niñas y niños nacidos en el 2012. Recaptación de no vacunados previamente nacidos entre 2001 y 2011.
8. Para aquellas personas que lo no la hayan padecido y no hayan sido vacunados con anterioridad.
9. Vacunación sistemática en niños/as nacidos/as en 2014, niños y niñas. Recaptación de niñas no vacunadas nacidas entre 2004 y 2012 y niños no vacunados nacidos desde 2011. Esquema de vacunación 1 dosis en no inmunodeprimidos. **Catch-up de nacidos en 1999 a 2003 no vacunados.**
10. Completar vacunación hasta 5 dosis desde 15 a 64 años. No administrar recuerdo cada 10 años.
11. Recuerdo de Td a los 65 años en personas que hayan recibido 5 dosis a lo largo de la infancia y adolescencia.
12. Gripe ≥60 años.
13. VNC20 en nacidos a partir del 1 de marzo de 2024. *Catch-up* con una única dosis de VNC20 en niños/as nacidos/as en junio de 2021 y posteriores correctamente vacunados/as con VNC13 para protección adicional de los 7 serotipos. VNC20 en personas de 65 años o más no vacunadas con anterioridad o **vacunadas previamente con una o dos dosis de VPN23 (intervalo de 5 años mínimo desde la última dosis de vacuna antineumocócica recibida).**
14. Personas nacidas en 1960 y 1945. Recaptación de las personas nacidas en 1958, 1959 y 1944 no vacunadas con anterioridad.