

MOTIVOS DE NO VACUNACIÓN O INMUNIZACIÓN EN VACUSAN

Microorganismo	Vacuna
Bordetella pertussis	Tosferina
Clostridium tetani	Tétanos
Corynebacterium diphtheriae	Difteria
Haemophilus influenzae tipo b	Haemophilus influenzae tipo b
Poliovirus	Polio
Virus de la Hepatitis B	Hepatitis B
Rotavirus	Rotavirus
Streptococcus pneumoniae conjugado	Neumococo conjugado
Neisseria meningitidis serogrupo B	Meningococo B
Neisseria meningitidis ACWY	Meningococo ACWY
Virus de la Rubéola (Rubivirus)	Rubéola
Virus del Sarampión (Morbillivirus)	Sarampión
Virus de la Parotiditis (Paramyxovirus)	Parotiditis
Virus Varicela	Varicela
Papilomavirus	Papiloma
Virus Zoster	Zóster
Virus Influenza	Gripe
SARS-CoV-2	COVID-19
Virus respiratorio sincitial (VRS)	Vacuna VRS
Ag virus Vaccinia Ankara vivo modificado	Mpox
Virus de la Hepatitis A	Hepatitis A
Virus de la Rabia	Vacuna de la Rabia
Vibrio cholerae	Cólera
Virus Chikungunya	Chikungunya
Virus de la Encefalitis Japonesa	Encefalitis Japonesa
Virus de la Fiebre Amarilla	Fiebre Amarilla
Salmonella typhi	Fiebre Tifoidea
Virus Dengue	Dengue
Virus Encefalitis por garrapata	Encefalitis Centroeuropea

Inmunización pasiva	Producto
VRS pasivo	Ac monoclonal VRS
Hepatitis A pasiva	Ig Hepatitis A
Hepatitis B pasiva	Ig Hepatitis B
Inmunoglobulina humana	Ig inespecífica
Rabia pasiva	Ig antirrábica
Tétanos pasiva	Ig antitetánica

Motivos de no vacunación más frecuentes	Explicación
Negativa a vacunarse	Negativa a vacunarse (temporal o permanente)
Contraindicación	Contraindicación por motivo médico justificado
No susceptible	Infección pasada o serología IgG positiva

No usar

- Neisseria Meningitiditis serogrupo A
 - Neisseria Meningitiditis serogrupo C
 - Neisseria Meningitiditis serogrupo W
 - Neisseria Meningitiditis serogrupo Y
- Virus Influenza Pandémico
 - Streptococcus Pnneumoniar
 - SARS-CoV-2-pre