




CALIDAD DE VIDA Y SALUD EN POBLACIÓN GENERAL DE LA REGIÓN DE MURCIA

AUTORES

Olga Monteagudo Piqueras
Lauro Hernando Arizaleta
Joaquín Alfonso Palomar Rodríguez

TRABAJO DE CAMPO

Rosa Guillamón Álvarez S.L.U.

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

M^a José Sánchez Robles
Antonio Hernández Osete
Mónica Garay Pelegrín

CITA RECOMENDADA

Monteagudo-Piqueras O, Hernado-Arizdeta L, Palomar-Rodríguez J A. Calidad de vida y salud en población general de la Región de Murcia. Murcia: Consejería de Sanidad y Consumo 2007.

Disponible en: www.murciasalud.es

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo no se hubiera podido realizar sin la ayuda y colaboración de los ciudadanos de la Región de Murcia. De igual manera, agradecemos la colaboración del Servicio de Informática de la Consejería de Sanidad y Consumo, especialmente a Juan José Pujante Moreno, Juan Francisco Molina Muñoz e Ignacio López Almagro, que actualizaron la información administrativa de las personas incluidas en el estudio. También colaboraron desinteresadamente en labores administrativas Soledad Muñoz Sandoval, Isabel López Tórtola y Antonio Javier Martínez González.

Jordi Alonso, Montserrat Ferrer y Gemma Vilagut, del Instituto Municipal de Investigaciones Médicas de Barcelona (IMIM) han resuelto amablemente cuestiones metodológicas en la aplicación del cuestionario SF12v2.

Edita

Consejería de Sanidad y Consumo.
Dirección General de Planificación, Ordenación
Sanitaria y Farmacéutica e Investigación.
Ronda de Levante - 30008 Murcia.
Tel.: 968 36 22 54 – Fax: 968 20 19 50

Imprime: Libecrom, S.A.

ISBN: 978-84-96994-17-1

Depósito legal: MU-3049-2008

ÍNDICES

ÍNDICE GENERAL

PRESENTACIÓN	12
ABREVIATURAS	14
RESUMEN.	16
SUMMARY	20
INTRODUCCIÓN	24
MATERIAL Y MÉTODOS	28
RESULTADOS REGIONALES	32
Características generales	33
Calidad de vida relacionada con la salud y determinantes de salud: análisis bivariante	37
Calidad de vida relacionada con la salud y determinantes de salud: análisis multivariante	45
RESULTADOS POR ÁREAS DE SALUD	49
Área de Salud de Murcia	52
Área de Salud de Cartagena	59
Área de Salud de Lorca	66
Área de Salud del Noroeste	73
Área de Salud del Altiplano	80
Área de Salud de la Vega del Segura	87
DISCUSIÓN	94
CONCLUSIONES	98
BIBLIOGRAFÍA	100
ANEXO A: TABLAS DE RESULTADO DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD	105
1. Tabla de frecuencias de respuestas del cuestionario SF-12V2	106
2. Tablas de calidad de vida índices resumen y dimensiones regionales	109
2.1. Tablas de características sociodemográficas	110
2.2. Tablas de hábitos de vida	122
2.3. Tablas según presencia de condición médica crónica	126
2.4. Tablas de utilización de servicios sanitarios	134
3. Calidad de vida relacionada con la salud por áreas de salud: índices resumen y dimensiones	137
3.1. Área de Salud de Murcia	138
3.2. Área de Salud de Cartagena	149
3.3. Área de Salud de Lorca	160
3.4. Área de Salud del Noroeste	171
3.5. Área de Salud del Altiplano	182
3.6. Área de Salud de la Vega del Segura	193
ANEXO B: TABLAS COMPLEMENTARIAS	205
ANEXO C: CUESTIONARIO	211

ÍNDICE DE TABLAS

TABLAS INTEGRADAS EN EL TEXTO

Tabla 1.	Principales diferencias entre instrumentos de CVRS genéricos y específicos	26
Tabla 2.	Descripción de los principales cuestionarios genéricos de salud disponibles en España para población general en España	26
Tabla 3.	Calidad de vida relacionada con la salud en población general. Índice de Salud Físico. Resultados del análisis de regresión logística. Región de Murcia 2007	47
Tabla 4.	Calidad de vida relacionada con la salud en población general. Índice de Salud Mental. Resultados del análisis de regresión logística. Región de Murcia 2007	48
Tabla 5.	Encuesta de salud en población general. Características sociodemográficas. Área de Salud de Murcia 2007	53
Tabla 6.	Encuesta de salud en población general. Hábitos de vida. Área de Salud de Murcia 2007	54
Tabla 7.	Encuesta de salud en población general. Presencia de condiciones médicas crónicas. Área de Salud de Murcia 2007	54
Tabla 8.	Encuesta de salud en población general. Tipo de condición médica crónica declarada. Área de Salud de Murcia 2007	55
Tabla 9.	Encuesta de salud en población general. Tiempo desde la última visita médica y utilización de servicios sanitarios en las cuatro últimas semanas. Área de Salud de Murcia 2007	56
Tabla 10.	Encuesta de salud en población general. Utilización de servicios sanitarios hospitalarios en el último año. Área de Salud de Murcia 2007	57
Tabla 11.	Encuesta de salud en población general. Características sociodemográficas. Área de Salud de Cartagena 2007	60
Tabla 12.	Encuesta de salud en población general. Hábitos de vida. Área de Salud de Cartagena 2007	61
Tabla 13.	Encuesta de salud en población general. Presencia de condiciones médicas crónicas. Área de Salud de Cartagena 2007	61
Tabla 14.	Encuesta de salud en población general. Tipo de condición médica crónica declarada. Área de Salud de Cartagena 2007	62
Tabla 15.	Encuesta de salud en población general. Tiempo desde la última visita médica y utilización de servicios sanitarios en las cuatro últimas semanas. Área de Salud de Cartagena 2007	63
Tabla 16.	Encuesta de salud en población general. Utilización de servicios sanitarios hospitalarios en el último año. Área de Salud de Cartagena 2007	64
Tabla 17.	Encuesta de salud en población general. Características sociodemográficas. Área de Salud de Lorca 2007	67
Tabla 18.	Encuesta de salud en población general. Hábitos de vida. Área de Salud de Lorca 2007	68
Tabla 19.	Encuesta de salud en población general. Presencia de condiciones médicas crónicas. Área de Salud de Lorca 2007	68
Tabla 20.	Encuesta de salud en población general. Tipo de condición médica crónica declarada. Área de Salud de Lorca 2007	69
Tabla 21.	Encuesta de salud en población general. Tiempo desde la última visita médica y utilización de servicios sanitarios en las cuatro últimas semanas. Área de Salud de Lorca 2007	70
Tabla 22.	Encuesta de salud en población general. Utilización de servicios sanitarios hospitalarios en el último año. Área de Salud de Lorca 2007	71
Tabla 23.	Encuesta de salud en población general. Características sociodemográficas. Área de Salud del Noroeste 2007	74
Tabla 24.	Encuesta de salud en población general. Hábitos de vida. Área de Salud del Noroeste 2007	75
Tabla 25.	Encuesta de salud en población general. Presencia de condiciones médicas crónicas. Área de Salud del Noroeste 2007	75
Tabla 26.	Encuesta de salud en población general. Tipo de condición médica crónica declarada. Área de Salud del Noroeste 2007	76
Tabla 27.	Encuesta de salud en población general. Tiempo desde la última visita médica y utilización de servicios sanitarios en las cuatro últimas semanas. Área de Salud del Noroeste 2007	77
Tabla 28.	Encuesta de salud en población general. Utilización de servicios sanitarios hospitalarios en el último año. Área de Salud del Noroeste 2007	78
Tabla 29.	Encuesta de salud en población general. Características sociodemográficas. Área de Salud del Altiplano 2007	81
Tabla 30.	Encuesta de salud en población general. Hábitos de vida. Área de Salud del Altiplano 2007	82

Tabla 31. Encuesta de salud en población general. Presencia de condiciones médicas crónicas. Área de Salud del Altiplano 2007	82
Tabla 32. Encuesta de salud en población general. Tipo de condición médica crónica declarada. Área de Salud del Altiplano 2007	83
Tabla 33. Encuesta de salud en población general. Tiempo desde la última visita médica y utilización de servicios sanitarios en las cuatro últimas semanas. Área de Salud del Altiplano 2007	84
Tabla 34. Encuesta de salud en población general. Utilización de servicios sanitarios hospitalarios en el último año. Área de Salud del Altiplano 2007	85
Tabla 35. Encuesta de salud en población general. Características sociodemográficas. Área de Salud de la Vega del Segura 2007	88
Tabla 36. Encuesta de salud en población general. Hábitos de vida. Área de Salud de la Vega del Segura 2007	89
Tabla 37. Encuesta de salud en población general. Presencia de condiciones médicas crónicas. Área de Salud de la Vega del Segura 2007	89
Tabla 38. Encuesta de salud en población general. Tipo de condición médica crónica declarada. Área de Salud de la Vega del Segura 2007	90
Tabla 39. Encuesta de salud en población general. Tiempo desde la última visita médica y utilización de servicios sanitarios en las cuatro últimas semanas. Área de Salud de la Vega del Segura 2007	91
Tabla 40. Encuesta de salud en población general. Utilización de servicios sanitarios hospitalarios en el último año. Área de Salud de la Vega del Segura 2007	92

TABLAS DE RESULTADOS DE CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD (ANEXO A)

Tabla A.1. Encuesta de salud en población general. Frecuencias de las repuestas al cuestionario SF-12. Región de Murcia y áreas de salud 2007	107
Tabla A.2. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general por sexo. Región de Murcia 2007	110
Tabla A.3. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general por grupos edad en ambos sexos. Región de Murcia 2007	111
Tabla A.4. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres por grupo de edad. Región de Murcia 2007	113
Tabla A.5. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres por grupo edad. Región de Murcia 2007	115
Tabla A.6. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según área de salud de pertenencia (aplicación de pesos regionales). Región de Murcia 2007	117
Tabla A.7. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según actividad económica. Región de Murcia 2007	117
Tabla A.8. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según estado civil. Región de Murcia 2007	119
Tabla A.9. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según convivencia. Región de Murcia, 2007	120
Tabla A.10. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según país de nacimiento. Región de Murcia, 2007	120
Tabla A.11. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según nivel de estudios. Región de Murcia, 2007	121
Tabla A.12. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general por consumo de tabaco. Región de Murcia 2007	122
Tabla A.13. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general por consumo de alcohol. Región de Murcia 2007	123
Tabla A.14. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según actividad física laboral. Región de Murcia 2007	124
Tabla A.15. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según actividad física de ocio. Región de Murcia 2007	125
Tabla A.16. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condiciones médicas crónicas, ambos sexos. Región de Murcia 2007	126
Tabla A.17. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condiciones médicas crónicas, hombres. Región de Murcia 2007	127
Tabla A.18. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condiciones médicas crónicas, mujeres. Región de Murcia 2007	128

Tabla A.19.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según el tipo de condición médica crónica. Región de Murcia 2007	129
Tabla A.20.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general especificando la respuesta abierta “otras situaciones” médicas crónicas declaradas. Región de Murcia 2007	131
Tabla A.21.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según tiempo pasado desde la última consulta médica realizada. Región de Murcia 2007	134
Tabla A.22.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según hospitalización en el último año. Región de Murcia 2007	135
Tabla A.23.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según número de hospitalizaciones. Región de Murcia 2007	136
Tabla A.24.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos. Área de Salud de Murcia 2007	138
Tabla A.25.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres. Área de Salud de Murcia 2007	138
Tabla A.26.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres. Área de Salud de Murcia 2007	138
Tabla A.27.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos por grupo de edad. Área de Salud de Murcia 2007	139
Tabla A.28.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres por grupo de edad. Área de Salud de Murcia 2007	141
Tabla A.29.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres por grupo de edad. Área de Salud de Murcia 2007	143
Tabla A.30.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica en ambos sexos. Área de Salud de Murcia 2007	145
Tabla A.31.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, hombres. Área de Salud de Murcia 2007	145
Tabla A.32.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, mujeres. Área de Salud de Murcia 2007	146
Tabla A.33.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según el tipo de condición médica crónica. Área de Salud de Murcia 2007	147
Tabla A.34.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos. Área de Salud de Cartagena 2007	149
Tabla A.35.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres. Área de Salud de Cartagena 2007	149
Tabla A.36.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres. Área de Salud de Cartagena 2007	149
Tabla A.37.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos por edad. Área de Salud de Cartagena 2007	150
Tabla A.38.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres por grupo de edad. Área de Salud de Cartagena 2007	152
Tabla A.39.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres por grupo de edad. Área de Salud de Cartagena 2007	154
Tabla A.40.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica en ambos sexos. Área de Salud de Cartagena 2007	156
Tabla A.41.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, hombres. Área de Salud de Cartagena 2007	156
Tabla A.42.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, mujeres. Área de Salud de Cartagena 2007	157
Tabla A.43.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según el tipo de condición médica crónica. Área de Salud de Cartagena 2007	158
Tabla A.44.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos. Área de Salud de Lorca 2007	160
Tabla A.45.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres. Área de Salud de Lorca 2007	160
Tabla A.46.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres. Área de Salud de Lorca 2007	160
Tabla A.47.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos por edad por grupos de edad. Área de Salud de Lorca 2007	161

Tabla A.48.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres por grupo de edad. Área de Salud de Lorca 2007	163
Tabla A.49.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres por grupo de edad. Área de Salud de Lorca 2007	165
Tabla A.50.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica en ambos sexos. Área de Salud de Lorca 2007	167
Tabla A.51.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, hombres. Área de Salud de Lorca 2007	167
Tabla A.52.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, mujeres. Área de Salud de Lorca 2007	168
Tabla A.53.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según el tipo de condición médica crónica. Área de Salud de Lorca 2007	169
Tabla A.54.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos. Área de Salud del Noroeste 2007	171
Tabla A.55.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres. Área de Salud del Noroeste 2007	171
Tabla A.56.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres. Área de Salud del Noroeste 2007	171
Tabla A.57.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos por grupo de edad. Área de Salud del Noroeste 2007	172
Tabla A.58.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres por grupo de edad. Área de Salud del Noroeste 2007	174
Tabla A.59.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres por grupo de edad. Área de Salud del Noroeste 2007	176
Tabla A.60.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica en ambos sexos. Área de Salud del Noroeste 2007	178
Tabla A.61.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, hombres. Área de Salud del Noroeste 2007	178
Tabla A.62.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, mujeres. Área de Salud del Noroeste 2007	179
Tabla A.63.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según el tipo de condición médica crónica. Área de Salud del Noroeste 2007	180
Tabla A.64.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos. Área de Salud del Altiplano 2007	182
Tabla A.65.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres. Área de Salud del Altiplano 2007	182
Tabla A.66.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en mujeres generales. Área de Salud del Altiplano 2007	182
Tabla A.67.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos por grupo de edad. Área de Salud del Altiplano 2007	183
Tabla A.68.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres por grupo de edad. Área de Salud del Altiplano 2007	185
Tabla A.69.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres por grupo de edad. Área de Salud del Altiplano 2007	187
Tabla A.70.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica en ambos sexos. Área de Salud del Altiplano 2007	189
Tabla A.71.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, hombres. Área de Salud del Altiplano 2007	189
Tabla A.72.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, mujeres. Área de Salud del Altiplano 2007	190
Tabla A.73.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según el tipo de condición médica crónica. Área de Salud del Altiplano 2007	191
Tabla A.74.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos. Área de Salud de la Vega del Segura 2007	193
Tabla A.75.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres. Área de Salud de la Vega del Segura 2007	193
Tabla A.76.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres. Área de Salud de la Vega del Segura 2007	193

Tabla A.77.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos por grupo de edad. Área de Salud de la Vega del Segura 2007	194
Tabla A.78.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres por grupo de edad. Área de Salud de la Vega del Segura 2007	196
Tabla A.79.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres por grupo de edad. Área de Salud de la Vega del Segura 2007	198
Tabla A.80.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica en ambos sexos. Área de Salud de la Vega del Segura 2007	200
Tabla A.81.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, hombres. Área de Salud de la Vega del Segura 2007	201
Tabla A.82.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, mujeres. Área de Salud de la Vega del Segura 2007	201
Tabla A.83.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según el tipo de condición médica crónica. Área de Salud de la Vega del Segura 2007	202

TABLAS COMPLEMENTARIAS (ANEXO B)

Tabla B.1.	Pesos (p) asignados a las áreas de salud, por edad y sexo, para la reconstrucción de la muestra	206
Tabla B.2.	Encuesta de salud en población general. Características sociodemográficas. Región de Murcia 2007	206
Tabla B.3.	Encuesta de salud en población general. Hábitos de vida. Región de Murcia 2007	207
Tabla B.4.	Encuesta de salud en población general. Presencia de condiciones médicas crónicas. Región de Murcia 2007	207
Tabla B.5.	Encuesta de salud en población general. Tipo de condición médica crónica declarada. Región de Murcia 2007	208
Tabla B.6.	Encuesta de salud en población general. Tiempo desde la última visita médica y utilización de servicios sanitarios en las <i>cuatro últimas semanas</i> . Región de Murcia 2007	209
Tabla B.7.	Encuesta de salud en población general. Utilización de servicios sanitarios hospitalarios en el <i>último año</i> . Región de Murcia 2007	210
Tabla B.8.	Estandarización por el método directo, con la población muestral total, de los Índices de Salud Físico (ISF) y Mental (ISM) de las distintas Áreas de Salud. Región de Murcia 2007	210

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1.	Pirámide de la población de la Región de Murcia reconstruida con pesos. Región de Murcia 2007	33
Gráfico 2.	Encuesta de salud en población general. Características sociodemográficas. Región de Murcia 2007	34
Gráfico 3.	Encuesta de salud en población general. Hábitos de vida. Región de Murcia 2007	35
Gráfico 4.	Encuesta de salud en población general. Condiciones médicas crónicas y utilización de servicios sanitarios. Región de Murcia 2007	36
Gráfico 5.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Dimensiones e índices de salud en ambos sexos. Región de Murcia 2007	38
Gráfico 6.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Dimensiones e índices de salud por sexo. Región de Murcia 2007	38
Gráfico 7.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Dimensiones en ambos sexos por edad (años). Región de Murcia 2007	39
Gráfico 8.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Dimensiones por edad (años) y sexo. Región de Murcia 2007	40
Gráfico 9.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Índices de salud por edad (años) y sexo. Región de Murcia 2007	41
Gráfico 10.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general por área de salud. Región de Murcia 2007	41
Gráfico 11.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Características sociodemográficas en ambos sexos. Región de Murcia 2007	42
Gráfico 12.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Hábitos de vida en ambos sexos. Región de Murcia 2007	43
Gráfico 13.	Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Condiciones médicas crónicas y utilización de servicios sanitarios en ambos sexos. Región de Murcia 2007	44

Gráfico 14. Pirámides de la población de estudio por regional y por área de salud. Región de Murcia 2007	51
Gráfico 15. Pirámides de población general y del Área de Salud de Murcia 2007	53
Gráfico 16. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica. Dimensiones e índices de salud en ambos sexos. Área de Salud de Murcia 2007	57
Gráfico 17. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica Dimensiones e índices de salud por sexo. Área de Salud de Murcia 2007	58
Gráfico 18. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Índices de salud por edad (años) y sexo. Área de Salud de Murcia 2007	58
Gráfico 19. Pirámides de población general y del Área de Salud de Cartagena 2007	60
Gráfico 20. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica. Área de Salud de Cartagena 2007	64
Gráfico 21. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica. Dimensiones e índices de salud por sexo. Área de Salud de Cartagena 2007 ..	65
Gráfico 22. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Índices de salud por edad (años) y sexo. Área de Salud de Cartagena 2007	65
Gráfico 23. Pirámides de población general y del Área de Salud de Lorca 2007	67
Gráfico 24. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica. Dimensiones e índices de salud en ambos sexos. Área de Salud de Lorca 2007	71
Gráfico 25. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica. Área de Salud de Lorca 2007	72
Gráfico 26. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Índices de salud por edad y sexo. Área de Salud de Lorca 2007	72
Gráfico 27. Pirámides de población general y del área de salud del Noroeste 2007	74
Gráfico 28. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica. Dimensiones e índices de salud en ambos sexos. Área de Salud del Noroeste 2007	78
Gráfico 29. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica. Dimensiones e índices de salud por sexo. Área de Salud del Noroeste 2007	79
Gráfico 30. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Índices de salud por edad (años) y sexo. Área de Salud del Noroeste 2007	79
Gráfico 31. Pirámides de población general y del Área de Salud del Altiplano 2007	81
Gráfico 32. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica. Dimensiones e índices de salud en ambos sexos. Área de Salud del Altiplano 2007	85
Gráfico 33. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica. Dimensiones e índices de salud por sexo. Área de Salud del Altiplano 2007	86
Gráfico 34. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Índices de salud por edad (años) y sexo. Área de Salud del Altiplano, 2007	86
Gráfico 35. Pirámides de población general y del Área de Salud de la Vega del Segura 2007	88
Gráfico 36. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica. Área de Salud de la Vega del Segura 2007	92
Gráfico 37. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica. Dimensiones e índices de salud por sexo. Área de Salud de la Vega del Segura 2007	93
Gráfico 38. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Índices de salud por edad (años) y sexo. Área de Salud de la Vega del Segura 2007	93

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Aparición cronológica de los principales cuestionarios específicos y genéricos de calidad de vida relacionada con la salud	27
Figura 2. Modelo conceptual de obtención de las dimensiones y de los índices de salud de CVRS a través de las preguntas del cuestionario	30
Figura 3. Proporción de hombres y mujeres con un Índice de Salud Físico inferior al de la media de la población general en función de la edad. Región de Murcia 2007	46

PRESENTACIÓN

La mejora de las condiciones de vida ha traído consigo una mayor longevidad de la población, o lo que es lo mismo, un aumento de la esperanza de vida. Tan importante como dar años a la vida, es dar calidad de vida a los años. La “calidad de vida” es un concepto amplio ya que contempla todos los aspectos que influyen en la vida del hombre. De todos estos aspectos, desde la Consejería de Sanidad y Consumo, hemos contraído el compromiso de estudiar aquellos relacionados con la salud. Es decir, valorar la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) en la población de la Región de Murcia y los principales factores que la determinan.

El año 2007 supuso el horizonte temporal del Plan de Salud iniciado en el 2003. A lo largo de ese año se realizó el estudio de CVRS, que ha servido como colofón del plan mencionado y como punto de partida para el nuevo Plan de Salud 2009-2015, actualmente en fase de elaboración. Conocer la CVRS de los ciudadanos, antes y después de la implantación de un plan de salud, nos ayudará a conocer parte del impacto de las políticas sanitarias en la salud de la población. Es decir, el resultado en salud que percibe el ciudadano como receptor de la protección que le ofrece el Sistema de Salud de la Región.

Este estudio es también de gran utilidad para los profesionales sanitarios, ya que ahora disponen de datos de referencia para conocer los resultados en salud de sus intervenciones terapéuticas, para detectar grupos de población vulnerables de actuación.

El protagonismo indiscutible de este estudio ha sido la población general de la Región, sin cuya participación hubiera sido imposible su realización. Por ello, quiero aprovechar esta oportunidad para dedicar la publicación a toda ella, mostrarles mi agradecimiento y el compromiso de esta Consejería para seguir trabajando en este sentido.

María Ángeles Palacios Sánchez
Consejera de Sanidad y Consumo

ABREVIATURAS

AP: Atención Primaria.

AE: Atención Especializada.

CVRS: Calidad de vida relacionada con la salud.

DM: Diabetes Mellitus.

ENS: Encuesta Nacional de Salud.

ESaRM: Encuesta de Salud de la Región de Murcia

ESCAV: Encuesta de Salud de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

DC: Dolor Corporal

FF: Función Física.

FS: Función Social.

ISF: Índice de Salud Físico.

ISM: Índice de Salud Mental.

INE: Instituto Nacional de Estadística.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

p: nivel de significación estadística (probabilidad de que las diferencias o asociaciones encontradas se deban al azar).

PG_{ISF}: Índice de Salud Físico en población general de la Región de Murcia.

PG_{ISM}: Índice de Salud Mental en población general de la Región de Murcia.

RE: Rol Emocional.

RF: Rol Físico.

RM: Región de Murcia.

SF 36: Short Form health survey questionnaire (instrumento de medición de salud percibida).

SF 12: Short Form health survey questionnaire (instrumento de medición de salud percibida, versión reducida del SF-36).

SG: Salud General.

SM: Salud Mental.

VT: Vitalidad.

RESUMEN

Las encuestas de salud son cuestionarios dirigidos a población general que valoran de forma integral aquellos aspectos relacionados con la salud. Con el paso de los años, han incorporado instrumentos sofisticados y validados para la medición de diferentes aspectos como son la salud mental, apoyo familiar o la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS). Entre éstos destaca la versión española del SF12v2, que contiene 12 variables con las que se construyen 8 dimensiones y 2 componentes resumen o índices de salud, el Índice de Salud Físico (ISF) y el Índice de Salud Mental (ISM).

El objetivo de este trabajo es conocer la CVRS de la población general de la Región de Murcia, sin dejar de lado la detección de posibles desigualdades de salud y de factores asociados a éstas (características sociodemográficas y económicas, hábitos de vida, problemas de salud y utilización de servicios sanitarios).

Se trata de un estudio transversal analítico mediante encuesta de salud administrada vía telefónica, durante el año 2007. La población de estudio fueron personas, mayores de 17 años, no institucionalizados, residentes en la Región de Murcia. El cuestionario, estructurado y cerrado, constaba de 30 preguntas agrupadas en 5 ámbitos, "Problemas de Salud", "Utilización de Servicios Sanitarios", "Salud y Bienestar", "Hábitos de vida", y "Datos Demográficos". Para la evaluación del "Salud y Bienestar", se utilizó el formato estándar del "Cuestionario de Salud SF-12v2". La información (dirección postal y teléfono) de la población, se obtuvo de la base de datos poblacional del programa de vacunas de la Consejería de Sanidad y Consumo.

El tamaño muestral se calculó para una desviación estándar estimada de 10 y un error que no superara el 0,9 con una confianza del 95%. El número de ciudadanos por área de salud fue de 498, lo que supuso un total regional de 3.486. La selección se realizó mediante muestreo aleatorio, estratificado por edad, sexo y área de salud (83 personas por estrato). Cada seleccionado contaba con 5 potenciales suplentes de su misma edad, sexo y área de salud. Los criterios de exclusión establecidos fueron: número de teléfono erróneo; no obtener contestación telefónica después de un mínimo de 4 llamadas y un máximo de 10 (realiza-

das en distintas franjas horarias, durante varios días); fallecimiento y personas que en el momento de la realización del estudio presentaran cualquier problema físico y/o psíquico grave que impidiera la respuesta. Para reconstruir los estratos se ponderó la muestra por el peso real que cada área de salud tenía en el total poblacional de la Región.

En el análisis bivalente de las dimensiones, se aplicaron test estadísticos no paramétricos (U de Mann-Whitney y Kruskal-Wallis); y para los índices de salud (ISF e ISM), test paramétricos (prueba T para muestras independientes y Anova de un factor). El análisis multivariante, se realizó para los Índices de Salud Físico y Mental. Para ello se dicotomizaron ambas variables, según la interpretación de las puntuaciones del SF12v2, tomando los valores medios para cada índice de la población general, como punto de corte; puntuaciones por encima y por debajo se definen como mejor o peor CVRS. Se estableció como criterio de inclusión en la regresión logística una $p < 0,2$ en el bivalente. Se valoraron interacciones entre las variables independientes.

Accedieron a participar en el estudio 3.381 (97,0%) personas, de los que 3.326 (98,4%) contestaron a la totalidad de las preguntas del SF12v2. El 50,5% eran hombres, con una media de edad de 43,6 años ($DE=17,2$; mediana=40; mínimo=18; máximo=97); la de las mujeres fue de 46,0 años. Se observó una alta proporción de personas de edades entre los 25 y los 44 años, con algún tipo de estudios, casados y laboralmente activos. El 91,6% había nacido en España.

Más de la mitad de las mujeres encuestadas afirmó no haber fumado nunca (57,5%), cifra inferior en los hombres (34,0%). Algo menos de la mitad de la población manifestó consumir alcohol, aunque no diariamente, (45,5%). Sólo un 6,8% realizaba actividad física moderada-alta en su ámbito laboral (caminar o realizar grandes esfuerzos). El 55,6% de las mujeres declaró no realizar actividad física en su tiempo de ocio, entre los hombres, fue de un 46,2%.

El 61,0% de la población declaró padecer al menos una patología crónica. En un 10,4%, el número de patologías concomitantes eran 4 ó más. De forma ge-

neral, la más declarada, con un 26,3% fue la “artrosis y problemas reumáticos”, la segunda, con una frecuencia del 21,0% fue la “alergia”, la tercera, con un 19,8%, fue la “hipertensión arterial”, y la cuarta, con un 12,7%, la depresión. Estas cuatro patologías son, en todos los casos, más frecuentes en la mujer que en el hombre. Las mayores diferencias se observaron en la “artrosis y problemas reumáticos” (mujer=32,6%; hombre=20,0%), y en la “depresión” (mujer=17,4%; hombre= 8,1%).

Un 54,5% de la población había realizado su última visita médica (a atención primaria o especializada) más allá de un mes, pero sin pasar del año. Teniendo en cuenta ambos sexos, la especialidad más frecuentada fue Medicina de Familia (26,3%); la segunda más frecuentada por mujeres fue Ginecología y Obstetricia (3,2%) y por los hombres, traumatología (0,9%). En consonancia con los resultados previos, el lugar de consulta más frecuente fue el centro de salud/consultorio (25,0%); el segundo las consultas externas del hospital (5,6%). Los motivos principales de consulta fueron para determinar un diagnóstico (14,3%) o bien una revisión (13,2%).

Un 8,3% de las personas fueron hospitalizadas en el transcurso del último año, y de éstas, un 7,5% sólo lo hicieron una vez. Los motivos de hospitalización más frecuentes fueron ingresar para una intervención quirúrgica (4,2%).

Los valores medios de CVRS de la población general de la Región, fueron de 48,6 ($\pm$ 10,6) para el ISF y de 53,6 ($\pm$ 10,7) para el ISM. Según estos valores, un 68,7% de los ciudadanos tenían buena calidad de vida en relación al Índice de Salud Físico y un 66,0% en relación al Índice de Salud Mental. El análisis multivariante de la CVRS se realizó para estos índices, tomando para ello, las variables que en el análisis bivalente obtuvieron una asociación estadística $< 0,2$. Estas variables fueron: sexo, edad, actividad física laboral y de ocio, consumo de tabaco y alcohol nivel de estudios, actividad económica, estado civil, número de condiciones médicas crónicas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, “asma, bronquitis crónica y enfisema”, enfermedad del corazón, depresión, “artrosis y problemas reumáticos”, tumor maligno (en

los 5 últimos años), tiempo desde la última vista médica y hospitalización. El país de nacimiento sólo cumplió el criterio para el ISF y el área de salud sólo para el ISM. Se detectaron interacciones entre el sexo y la edad para el ISF y entre el área de salud y la depresión para el ISM.

En relación al Índice de Salud Físico, el de los hombres fue 1,3 veces mejor que el de las mujeres. Tomando como referencia el estrato de edad de más de 74 años, el ISF del estrato de 18-24 años fue 2,6 veces mejor, el de 25-34 años 2,2 veces mejor, el de 35-44 años 2,0 veces mejor, el de 45-64 años 2,0 veces mejor y el de 65-74 años 1,8 veces mejor. A menor número de condiciones médicas crónicas mejor ISF, éste fue 5,9 veces mejor en los que no tenían ninguna que los que tenían 4 ó más. Los ciudadanos que no tenían “artrosis y problemas reumáticos” presentaron 2,5 veces mejor ISF que los que la tenían; aquellos que no tuvieron un tumor maligno (en los 5 últimos años) presentaron 1,9 veces mejor ISF que los que lo sufrían. Los ciudadanos que habían ido al médico hacía más de 1 año tenían 3,4 veces mejor ISF que los que fueron en el último mes. Aquellos que no fueron hospitalizados en el último año presentaron 2,4 veces mejor ISF que los hospitalizados. El nivel de estudios medio-alto también resultó estar asociado a un mejor ISF. Aquellos con estudios secundarios la odds ratio fue 2,6 veces mejor que los que no sabían leer ni escribir. Aquellos que afirmaron practicar actividad física en tiempo de ocio, obtuvieron un ISF 1,8 veces mejor que los que dijeron no practicarla. Comparando con la actividad económica “estar trabajando”, presentaron peor ISF, los que estaban jubilados/pensionistas (0,5 veces) y los que estaban de baja laboral (0,2 veces). Las variables independientes incluidas en el modelo explicaron el 46,3% de la variabilidad existente.

Al igual que ocurre con el Índice de Salud Físico, en el análisis multivariante del Índice de Salud Mental, los hombres obtuvieron mejor ISM que las mujeres (1,4 veces). A menor número de condiciones médicas crónicas, mejor ISM, éste era 2,0 veces mejor en los que no tenían ninguna que los que tenían 4 ó más. Los ciudadanos que no tenían “artrosis y problemas reumáticos”, ni enfermedades del corazón, ni “asma,

bronquitis crónica, enfisema”, ni depresión, presentaron respectivamente una Odds Ratio de 1,7;1,5; 1,5 y 4,5 veces mejor ISM que los que no sufrían alguna de éstas. Los ciudadanos que habían ido al médico hacía más de 1 mes pero menos de 1 año tenían 1,4 veces mejor ISM que los que fueron en el último mes. Aquellos que practicaban actividad física en su tiempo de ocio presentaron 1,8 veces mejor ISM que los que no la practicaban. Comparando con el valor de la variable actividad económica estar “trabajando”, los estudiantes presentaron peor ISM (0,5 veces). Por último, comparado con los ciudadanos que estaban solteros, los casados presentaron 1,7 veces mejor ISM. Las variables independientes incluidas en el modelo explicaron el 25,3 % de la variabilidad existente.

La evaluación de la CVRS de la población general parece un método idóneo para la monitorización del es-

tado de salud percibido. También permite la identificación de desigualdades en salud, lo que es de utilidad en la elaboración de programas sanitarios y estrategias de salud, ya que facilita la identificación de poblaciones vulnerables. En relación a estas últimas, este estudio no ha detectado desigualdades de salud en función del área de salud de residencia de la población; aunque sí se han detectado desigualdades difícilmente evitables como son las provocadas por la edad, el sexo, la carga de enfermedad, o el padecimiento de determinados condiciones médicas crónicas. Otras detectadas son las relacionadas con la realización de ejercicio físico y determinantes socioeconómicos. Por último, mencionar que los resultados de este trabajo sirven de referencia a los profesionales sanitarios de la Región a la hora de comparar la CVRS de determinadas patologías crónicas con la de la población general y establecer así objetivos terapéuticos.

Palabras clave: Calidad de vida relacionada con la salud o CVRS. Calidad de vida. SF-12. Población general. Valores de referencia. Bases de datos utilizadas: MEDLINE, EMBASE, CINAHL e IME

SUMMARY

Health surveys are questionnaires that providing health related information about general population. With the passage of the years, sophisticated and validated instruments, like Health Related Quality of Life (HRQoL), had been incorporated. Between these, stand out the Spanish version of the SF12v2 that has 12 variables. With these we can get 8 scales and 2 health rates, Physical Component Summarize (PCS) and Mental Component Summarize (MCS).

The aim of this study was to asses the HRQoL on general population in the Region of Murcia, and to detect possible health inequalities associated with some factors (socioeconomic determinants, lifestyle, use of health-care services and chronic health problems).

This is an analytical, cross-sectional study based on a health survey carried out by phone calls throughout 2007. The study was realized on non institutionalised general population of the Region of Murcia, over 17 years old. The questionnaire consisted of 30 variables comprising 5 groups: "Health Problems", "Health and well being", "Lifestyle", "Use of health-care services" and "Demographic data". The standard format of the Spanish version of SF-12v2 Health Survey questionnaire was used for evaluation of "Health and well being". Information related to those polled (mailing address and telephone), was obtained from the Regional vaccine program database of the Council of Health.

The sample size was calculated for an appraisal standard deviation of 10, a margin of error of 0,9 and a 95% confidence level. The result was 498 citizens for each health area, and 3.486 for all country. Sample selection was made through a random method stratified by sex, age, and health area (83 citizens in everyone). Each citizen had 5 potential substitutes, with the same age, sex and health area. The exclusion criteria in selecting subjects were: wrong telephone

number; no telephone answer after a minimum of 4 calls and a maximum of 10 (made at different time of the day, during several days); death and citizens who, at the moment of the study, displayed any serious physic and/or psychic problem which did not allow them to take part in the poll. Layers were reconstructed by weighting the sample in accordance to the real weight that each health area had in the total population of the Region.

The bivariate analysis was made with nonparametric statistical test (Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis) for the scales and with parametric test (T-test and One-Factor Anova) for the component summarize. The multivariate analysis was made only for the PCS and MCS. These were dichotomized according with every mean value for general population as cut-off point. Values above and below of every one were defined as a better or worse HRQoL. A p-value < 0.2 was an inclusion criterion into the logistic regression. Interactions between the independent variables were taken into account.

The whole of citizens that agree to take part in the study were 3.381 (97,0%). The full questionnaire (SF12v2) was answered by 3.326 (98,4%). Men were 50,5%, with a mean age of 43,6 years (SD=17,2; medium=40; minimum=18; maximum=97). Mean age of women was 46,0 years (SD=18,6; median=42; minimum=18; maximum=100). There were a high proportion of people aged between 25 and 44 years, with studies, married and working. Most of them (91,6%) were born in Spain.

More than half of women interviewed had never smoked (57,5%), and less than half of men (34,0%). Less than half of people had consumed alcohol (45,5%), but not every day. Only 6,8% declared to had to do moderate-high physical effort at work. Free-time physical was made by 55,6% of women and 46,2% of men.

The 61,0% had one or more chronic health problems and 10,4% four or more. In general, “arthrosis and rheumatic problems” was the first and most declare, with a 26,3%. The second one was allergy (21,0%) followed by blood pressure (19,8%) and depression (12,7%). These diseases are more frequent en women too, especially in “arthrosis and rheumatic problems” (women=32,6%; men=20,0%) and depression (women=17,4%; men=8,1%).

The citizens who had visited a doctor (primary or specialist health care) for some health problem in more than a month and less than a year were the 54,5%. Family physician was the physician more frequented (26,3%) among men and women. The second one was gynecology and obstetric (3,2%), only in women and traumatology (0,9%), only in men. In Keeping with these results, the place more frequented was the primary care center (25,0%). The second place was hospital consulting room (5,6%). In most cases, the reason for the visit was for diagnostic (14,3%) or revision (13,2%).

The 8,3% of citizens had to be hospitalized in the last year, and 7,5% more than once. The principal reason for that was for surgery (4,2%).

The mean value of HRQoL for general population in the country was 48,6 ($\pm$ 10,6) for PCS and 53,6 ($\pm$ 10,7) for MSC. Therefore, 68,7% citizens had good quality of life related for the PCS and 66,0% for the MCS. The multivariant analysis of the HRQoL was made only for the components summarize, for variables with a p-value <0,2 on the bivariate analysis . These variables were: sex, age, occupational physical activity, free-time physical activity, tobacco and alcohol use, economic activity, education level, marital status, burden of chronic disease, blood pressure, diabetes mellitus, “asthma, EPOC”, “heart diseases”, depression, “arthrosis and rheumatic problems”, cancer in the last 5 years, time past since the last

medical visit and hospitalitation. The country bird only was used for PCS and health area for MSC. Interaction between sex and age were detected for PCS and between health area and depression with MCS.

In relation with PCS, men had an adds ratio 1,3 times more likely to report better PCS than women. Taking as reference people over 74 years old, those age 18-24 the odds ratio was 2,6 times greater, those age 25-34 was 2,2 times greater, those age 35-44 was 2,2 times greater, those age 45-54 was 2,0 times greater, those age 55-64 years was 2,0 times greater and those age 65-74 was 1,8 times greater. For smaller burden of chronic diseases better was the PCS. People without any chronic diseases had 5,9 times more likely to report better PCS than people with four or more chronic diseases. People without “arthrosis and rheumatic problems” had 2,5 times greater PCS than those with the disease. People without cancer in the last 5 years had 1,9 times greater PCS than those with the disease. The citizens that visited to a doctor more than a year had 3,4 times greater PCS than those that did in the last month. People who was not hospitalized in the last year obtained 2,4 times greater PCS than those who had to be hospitalized. The citizens that had secondary studies had 2,6 times greater PCS than those who could not read or write. People that practiced physical activity in their free time, obtained a PCS 1,8 times greater than those who did not practice it. Using employed people as reference level, those who were retired (0,5 times) or disablement (0,2 times) had worse PCS. The independent variables explained the 46,3% of the variability.

Like it happens with PCS, men had greater MCS than women (1,4 times more) in the multivariate analysis. For smaller burden of chronic diseases greater was the MCS. People without any chronic diseases had 2,0 times more likely to report greater MCS than people with four or more chronic diseases. People without “arthrosis and rheumatic problems”, “heart

diseases”, “asthma, EPOC” or depression had 1,7; 1,5; 1,5 and 4,5 times greater MCS than those without every disease. The citizens that visited to a doctor more than a month but less than a year had 1,4 times greater MCS than those that did in the last month. People that practiced physical activity in their free time had 1,8 times greater MCS than those who did not practice it. Using employed people as reference level, students (0,5 times) had worse MCS. Finally, married people had 1,7 times greater MCS than those who were single people. The independent variables explained the 25,3% of the variability.

The HRQoL evaluation in general people likes a suitable method for monitoring self-perceived

health status and allow identify inequalities in health. All that is useful for the elaboration of sanitary programs and health strategies because facilitates the identification of vulnerable population. The results of the study show the nonexistence of inequalities in health territorial organization of the Region. However, avoidable inequalities in health have been detected, related with, age, sex or burden of chronic diseases. Another inequalities related with health had been socioeconomic determinants and physical activity practice. Lastly is important comment that these results are reference values for other studies, as reference status for medical chronic conditions and for establish therapeutics objects.

Key words: Health-related quality of life. HRQoL or QOL. SF-12. General population. Reference values. Electronic database searched: MEDLINE, EMBASE, CINAHL e IME

INTRODUCCIÓN

Las encuestas de salud son extensos cuestionarios dirigidos a población general que valoran de forma integral aquellos aspectos relacionados con la salud. Con el paso de los años, éstas han incorporado instrumentos sofisticados y validados para la medición de diferentes aspectos como son la salud mental, apoyo familiar o la Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS). En el caso concreto de la CVRS, algunas encuestas de salud^{1,2}, han pasado de valorarla sólo con una pregunta (¿Cuál es estado de salud percibido: muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo?) a introducir cuestionarios específicos para ello.

El **concepto de CVRS**, aunque cada vez más utilizado, no se emplea de forma universal y son muchos los sinónimos³ existentes: “salud percibida”, “estado de salud”, “calidad de vida relacionada con la salud”, “resultados percibidos por los pacientes” y “calidad de vida” entre otras. Estos términos pueden utilizarse de forma indistinta, excepto el de “calidad de vida”, que contempla todos los aspectos que influyen en la calidad de la vida del hombre⁴, como la satisfacción con el entorno y el sistema político. Aunque, de una forma u otra, todo influye en la salud de una población, el concepto de CVRS, como indicador de resultado de salud, quedaría restringido a aquellos aspectos íntimamente relacionados con la salud, con el fin de obtener “el valor asignado por individuos, grupos de individuos y la sociedad a la duración de vida modificada por las deficiencias, los estados funcionales, las percepciones y las oportunidades sociales, que están influidas por las enfermedades, las lesiones, el tratamiento (médico) o la política (salud)”⁵.

En la misma línea, también son numerosos los modelos conceptuales⁶ de CVRS existentes, y aunque ninguno es utilizado de forma universal, todos incluyen la definición de salud de la OMS: “Estado de completo bienestar físico, mental y social, que no sólo comporta la ausencia de enfermedad”.

La CVRS es una medida de salud, que al igual que otras, como la mortalidad, la morbilidad y los parámetros clínicos, tiene identidad propia. El valor que añade en este conjunto, es que mide la percepción (del sujeto) de la enfermedad y la salud, así como sus consecuencias.

Por tanto, como su propio nombre indica, medir la CVRS requiere de un acto de medición, y para ello, se

precisa de **instrumentos** diseñados para tal fin. Se trata de cuestionarios contruidos siguiendo un modelo psicométrico, y que, antes de su uso, han sido probadas su fiabilidad, validez y sensibilidad al cambio⁶. Aunque el enfoque de medición de estos instrumentos es multidimensional, las dimensiones más importantes son:

- Funcionamiento social, físico y cognitivo
- Movilidad y cuidado personal
- Bienestar emocional

Estos cuestionarios utilizan como fuente de información al propio ciudadano. Tradicionalmente se clasifican según su aplicación a un abanico amplio de situaciones sanitarias <cuestionarios genéricos> o de manera restringida a un problema de salud <cuestionarios específicos> (figura 1). En esta última situación, es frecuente el uso conjunto de ambos, así quedan complementadas sus diferencias principales (tabla 1). Independientemente del carácter específico o genérico de un cuestionario, es de suma importancia conocer el sexo y la edad de la población a la que va dirigido. Así, por ejemplo, entre los cuestionarios genéricos (tabla 2), los hay dirigidos a niños y adolescentes (KIDSCREEN, VSP-A), a adolescentes y adultos (EQ-5D, SF-36, SF-12), a ancianos (WHOQOL-Old, SQPGC), etc.

Algunos cuestionarios disponen además de diferentes modelos en función del marco temporal que evocan las preguntas, así por ejemplo, la familia de instrumentos “SF” dispone de dos formatos, uno que evoca percepción en la última semana (aguda), y otro la de las cuatro últimas (estándar). De manera concreta, con el SF-36 y el SF-12v2, puede obtenerse tanto un perfil de salud de la población (a partir de sus múltiples dimensiones) como índices de salud (valores resumen). De hecho, esta familia de instrumentos se considera actualmente el patrón de referencia para el desarrollo o la validación de otros instrumentos de CVRS^{7,8}.

La CVRS tiene diversos **ámbitos de aplicación**, entre los que destacan la investigación y la práctica clínica, utilizándose en gran medida la familia del “SF”²⁴. En cuanto a la investigación clínica, hace más de una década que experimentó su repunte; es cada vez más utilizado sobre todo en estudios de eficacia clínica (ensayos clínicos)²⁵. De forma adicional, supone un aporte información a la hora de conocer el estado de salud

Tabla 1. Principales diferencias entre instrumentos de CVRS genéricos y específicos.

Genéricos	Específicos
Contenido multidimensional	<i>Menos dimensiones, pero clínicamente más relevantes</i>
Muchas poblaciones o pacientes	<i>Poblaciones o pacientes seleccionados</i>
Comparación transectorial	<i>Comparación sectorial</i>
Poca sensibilidad en intervenciones concretas	<i>Muy sensibles a los tratamientos</i>


FUENTE: adaptado de Guyatt GH. CMAJ. 1989; 140: 1441-8.

Tabla 2. Descripción de los principales cuestionarios genéricos de salud disponibles para población general en España.

Siglas	Nombre	Nº preguntas	Dimensiones	Referencia
KIDSCREEN	Calidad de Vida Relacionada con la Salud en Niños y Adolescentes	52	<i>Bienestar físico, Bienestar psicológico, Estado de ánimo y emociones, Autopercepción, Autonomía, Relación con amigos y vida social, Relación con padres y vida familiar, Ambiente escolar, Aceptación social, y Recursos económicos.</i>	VT ⁹
VSP-A	Calidad de Vida adolescentes	39	<i>Vitalidad, Bienestar físico, Bienestar psicológico, Autoestima, Relac. amigos, Relac. padres, Relac. profesores, Act. escolares, Act. Ocio.</i>	VT ¹⁰
WHOQOL OLD	Calidad de vida en las personas mayores	24 + 100 (WHOQOL) 24 + 26 (Bref)	<i>Modulo adicional al WHOQOL o WHOQOL-Bref que mide: capacidad sensorial; autonomía; actividades pasadas, presentes, futuras; participación / aislamiento; muerte e intimidad.</i>	VT ¹¹
SQPGC	Encuesta para la Detección de Ancianos con Riesgo de Dependencia	9	Física y social	VT ¹²
COOP-C	Láminas COOP-WONCA	6 láminas	<i>Forma física; Sentimientos; Actividades cotidianas y sociales; Cambio de Salud; Estado de Salud; Dolor; Apoyo social; Calidad de vida.</i>	VT ¹³
CSG	Cuestionario de Satisfacción de Guadalajara	21	<i>Calidad de la atención médica, aspectos organizativos, relación equipo de AT-paciente, accesibilidad física y disponibilidad.</i>	VO ¹⁴
EQ-5D	EUROQOL	5	Mobilidad, autocuidado, actividades habituales, dolor o malestar y ansiedad o depresión.	VT ¹⁵
Health Utilities Index Mark 3	Versión española del HUI-3	15 ó 40	<i>Visión; Audición; Habla, Deambulación; Destreza; Emoción, Cognición y Dolor.</i>	VT ¹⁶
PECVEC	Perfil de Calidad de Vida para Enfermos Crónicos	40	<i>Capacidad física; Función psicológica, Estado de ánimo positivo y negativo; Función social y Bienestar social.</i>	VT ¹⁷
PSN	Perfil de Salud de Nottingham	38+7	<i>Energía, dolor, reacciones emocionales, sueño, aislamiento social y movilidad física.</i>	VT ¹⁸
SF 12	Cuestionario de Salud SF-12	12	<i>Función Física; Rol físico; Dolor corporal; Salud General; Vitalidad; Función Social; Rol Emocional; Salud mental (Sólo la versión 2 permite valorar las 8 dimensiones).</i>	VT ^{19,20}
SF 36	Cuestionario de Salud SF-36	36	<i>Función Física; Rol físico; Dolor corporal; Salud General; Vitalidad; Función Social; Rol Emocional; Salud mental.</i>	VT ²¹
SIP	Perfil de las Consecuencias de la Enfermedad	136	<i>Función Física, emocional y social.</i>	VT ²²
CCV	Cuestionario de Calidad de Vida	39	<i>Apoyo social; Satisfacción o bienestar general; Bienestar físico/psicológico y Ausencia de sobrecarga laboral/tiempo libre.</i>	VO ²³

FUENTE: adaptado de BiblioPro, biblioteca virtual de cuestionarios de Calidad de Vida y otros resultados percibidos por los pacientes (Patient Reported Outcomes, PRO). Disponible en: <http://iryss.imim.es/iryss/BiblioPRO.asp>. VO: Versión originalmente desarrollado en castellano; VT: Versión traducida y validada al castellano.

Figura 1. Aparición cronológica de los principales cuestionarios específicos y genéricos de calidad de vida relacionada con la salud.



de un paciente en un momento determinado. También, permite predecir el riesgo de muerte^{26,27}, hospitalización y/o utilización de servicios sanitarios²⁸⁻³⁰, detectar desigualdades de salud, evaluar el impacto de diversas patologías y establecer objetivos terapéuticos. Aunque se ha comprobado la baja asociación entre este tipo de indicadores, y otros clínicos tradicionales³¹, esto no implica una utilización de unos en detrimento de otros, sino la importancia de su utilización conjunta. Otras aplicaciones, no menos importantes, son la gestión y evaluación de servicios sanitarios, en la elaboración e implantación de políticas de salud, así como la monitorización de la salud de una población³².

De las potenciales aplicaciones mencionadas, el presente estudio tiene como **objetivo** un poco de todas

ellas. De manera principal plantea la monitorización de la salud de la población general (con y sin condiciones médicas crónicas) en la RM y de sus determinantes, así como un punto de partida para el seguimiento sistemático de la salud. Pero este estudio va más allá de la monitorización, ya que pretende también detectar posibles desigualdades de salud entre los ciudadanos, que sirvan a su vez en el enfoque de las políticas de salud. Para llevar a cabo este objetivo, la RM ha elaborado una encuesta de salud dirigida a población general (ESaRM) que cuenta con un instrumento (SF-12v2) de medición de la CVRS como resultado de salud. De manera adicional, los valores de CVRS resultantes constituyen un referente para investigación clínica y epidemiológica en la RM, como patrón de comparación a la hora de comunicar resultados de CVRS.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se trata es un estudio transversal mediante encuesta de salud administrada vía telefónica, a una muestra representativa de la población general de la RM no institucionalizada, de 18 años y más, durante el 2007.

FUENTE DE INFORMACIÓN

La selección de los casos se realizó a partir de la base de datos poblacional del programa de vacunas de la Consejería de Sanidad y Consumo, que incluye información demográfica y administrativa de la población asistida. El 14% de esta población no tenía registrado el nº de teléfono, por lo que se realizó su búsqueda activa en diferentes guías telefónicas. Si tras la búsqueda no se encontraba, el ciudadano era sustituido por otro de la misma edad, sexo y área de salud con nº de teléfono disponible.

CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL, TÉCNICA DE MUESTREO Y PONDERACIÓN

El número personas necesarias para estimar el valor medio de la CVRS en la población general de la RM se hizo para cada una de las seis áreas de salud. Para su cálculo se aplicó una desviación estándar estimada de 10 (obtenida a partir de las normas poblacionales de referencia de la versión española del SF-12v1-población española 1998³³) y un error que no superara el 0,9 con una confianza del 95%. El tamaño muestral obtenido fue de 498 ciudadanos por área de salud, lo que supuso un total regional de 3.486.

El muestreo fue aleatorio no proporcional, estratificado por sexo, edad, y área de salud, obteniendo así estratos de 83 ciudadanos. Posteriormente, la reconstrucción de la muestra (tabla B.1) se hizo en función de la población (padrón Región de Murcia 2007) de hombres y mujeres por estrato de edad y sexo definido. Se establecieron 5 potenciales suplentes mediante muestreo aleatorio, para cada ciudadano excluido, de la misma edad, sexo y área de salud.

Los criterios de exclusión establecidos fueron: 1) Ilocalizable (Nº teléfono erróneo o no obtener contestación telefónica después de un mínimo de 4 llamadas

y un máximo de 10); 2) Fallecimiento; 3) Ciudadanos que en el momento de la realización del estudio presentaban cualquier problema físico y/o psíquico grave que impidiera la respuesta; 4) Institucionalizado; 5) No comprender el castellano; 6) No reside actualmente en Murcia. Aquellos que cumplían los criterios de exclusión, fueron sustituidos por otros de la misma edad, sexo y área de salud.

ESTRUCTURA DE LA ENCUESTA DE SALUD

El cuestionario, estructurado y cerrado, constaba de 30 preguntas (Anexo C) agrupadas en 5 ámbitos, “Problemas de Salud”, “Utilización de Servicios Sanitarios”, “Salud y Bienestar”, “Hábitos de vida”, y “Datos Demográficos”. Para todos estos apartados, exceptuando el de “Salud y Bienestar” se tomó como referente la Encuesta Nacional de Salud (ENS 2003 y 2006), seleccionando aquellas variables que otros autores habían identificado previamente como determinantes de calidad de vida en población general³⁴.

El apartado “Salud y Bienestar”, lo compone de manera íntegra el formato estándar del “Cuestionario de Salud y Bienestar SF-12”. Se eligió este cuestionario de tipo genérico para medir la CVRS de la población general de la RM, por haber sido aplicado con éxito en otras localizaciones geográficas^{35,36}. En este estudio se utilizó la versión española 2.0 (SF-12v2).

El **Cuestionario de Salud y Bienestar SF 12v2**, contiene 12 variables con las que se construyen 8 dimensiones, que proporcionan un perfil de salud y 2 índices de salud, que son dos medidas resumen de salud (figura 2). Las dimensiones son:

- 1) **Función Física (FF)**: Grado en que la salud limita las actividades físicas subir escaleras y andar más de una hora.
- 2) **Rol Físico (RF)**: Grado en que la salud física interfiere en el trabajo y otras actividades diarias, incluyendo el rendimiento menor que el deseado, limitación en el tipo de actividades realizadas o la dificultad en la realización de actividades.
- 3) **Dolor Corporal (DC)**: Intensidad del dolor y su efecto en el trabajo habitual, tanto fuera de casa como en el hogar.


- 4) *Salud General (SG)*: Valoración personal de la salud.
- 5) *Vitalidad (VT)*: Sentimiento de vitalidad frente al sentimiento de cansancio y agotamiento.
- 6) *Función Social (FS)*: Grado en que los problemas de salud física o emocional interfieren en la vida habitual.
- 7) *Rol Emocional (RE)*: Grado en que los problemas emocionales interfieren en el trabajo o actividades cotidianas.
- 8) *Salud Mental (SM)*: Sentimiento de tranquilidad, desánimo o tristeza.

Con estas dimensiones, y a través de la aplicación pesos específicos predeterminados³⁷, se crean dos puntuaciones resumen finales: *el Índice de Salud Físico (ISF)* y *el Índice de Salud Mental (ISM)*.

La construcción del perfil de salud (dimensiones) y de los índices de salud (físico y mental) a partir de las variables del cuestionario SF12v2, se realiza con un algoritmo que, para calcular las dimensiones, transforma las puntuaciones de los sujetos y las normaliza, con medias y desviaciones estándar de una población de referencia, haciendo que oscilen alrededor de una media de 50 y desviación estándar de 10. Para el cálculo de los Índices de Salud Físico y Mental (ISF e ISM), se agregan las dimensiones y se aplican una serie de pesos en función de su contribución en cada índice. Para realizar todo esto existen dos métodos, con sus respectivas ventajas e inconvenientes, el método estándar²⁰ (referido a datos obtenidos en EE.UU) y el específico (para el que se emplean datos de cada país). En este estudio se optó por el método estándar.

Las normas poblacionales de referencia de la Región de Murcia y de sus respectivas áreas de salud son la media, la DE, y los percentiles 5, 25, 50 (mediana), 75 y 95. Estos cálculos se realizaron para el total de la muestra, así como estratificado por el resto de variables que se recogieron en la encuesta (determinantes de salud). En el caso concreto de las áreas de salud, los cálculos sólo se estratificaron por edad, sexo y condiciones médicas crónicas. El Anexo A es el apartado donde quedan recogidas las normas poblacionales de referencia que permiten posicionar la puntuación individual de una persona (con o sin con-

Figura 2. Modelo conceptual de obtención de las dimensiones y de los índices de salud de CVRS a través de las preguntas del cuestionario.



FUENTE: Vilagut G, Valderas JM, Ferrer M, Garin O, López-García E, Alonso J. Interpretation of SF-36 and SF-12 questionnaires in Spain: physical and mental components. Med Clin (Barc). 2008 May 24;130(19):726-35.

diciones médicas) o grupos de personas, con respecto a la población general de la Región. Esto es de gran utilidad para los clínicos, ya que ante determinados tratamientos, puede observarse la mejoría o empeoramiento del paciente con respecto así mismo o la población general. Además y para facilitar la interpretación de la CVRS, en todos los gráficos de barras se marcaron, a modo de referencia, los valores medios de los índices de salud físico y mental de la población general de la RM.

ANÁLISIS DE DATOS

El *análisis de los datos* se realizó con el programa estadístico SPSS v 12.0®. Se reagruparon las variables ejercicio físico en el ámbito laboral (sedentaria-baja/moderada-alta) y de ocio (sí/no), estado civil (soltero, viudo, casado, separado/divorciado), actividad económica (trabajando, de baja laboral, desempleado, pensionista/jubilado, estudiante y labores del hogar), edad (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, ≥ 75 años), país de nacimiento (foráneo/España), tiempo desde la última consulta médica (≤4 semanas, >4 semanas y <1 año, ≥1 año).

Se crearon varias variables secundarias a partir de la pregunta con respuesta múltiple “¿Le ha dicho su médico que padece alguna de las siguientes enfermedades?”. Se predeterminaron 8 condiciones crónicas cerradas: hipertensión arterial, diabetes mellitus, “asma, bronquitis crónica y enfisema”, enfermedad del corazón, alergia, depresión, “artrosis y problemas reumáticos”, tumor maligno (en los 5 últimos años), que constituyan por sí solas una variable dicotómica (sí/no), según el padecimiento, o no, de éstas. Dado que este espectro de opciones resultaba insuficiente para establecer la condición de sufrir una patología crónica, se ofreció una última opción de respuesta abierta, llamada “Otras situaciones especificadas”, con la que también se construyeron variables dicotómicas. Para ello fue necesario el tratamiento previo de esta opción, que se hizo de la siguiente manera. Una vez revisada la totalidad de las respuestas, se crearon grandes grupos de enfermedades según el descriptivo que hace la CIE 9MC de sus códigos. Con lo que se definieron 15 grupos más de condiciones crónicas: Enfermedades del aparato digestivo, “enfermedades del aparato urinario y genital (masculino y femenino)”, “osteopatías, condropatías y deformidades adquiridas músculoesqueléticas”, “otras enfermedades mentales”, “otras enfermedades pulmonares”, “enfermedades de otorrinolaringología y otras del aparato respiratorio”, enfermedades endocrino-metabólicas (excepto DM), vasculares, neurológicas, renales, hematológicas, oculares, dermatológicas, colesterol y dorsopatías. Por último, y en función de la información total aportada a partir de esta pregunta, se crearon dos variables más, una que recogía el estado de tener alguna condición crónica (sí/no) y otra politómica, con el número de condiciones crónicas (0, 1, 2, 3 y ≥ 4).

En primer lugar, se analizaron los datos a nivel regional y, posteriormente, por área de salud. De esta forma se obtienen valores de referencia a estos dos niveles.

Para el **análisis estadístico bivariante** se establecieron dos estrategias, una dirigida a establecer el perfil de salud de la población general y otra a los índices de salud (ISF e ISM). La estrategia del análisis se basó en test no paramétricos (U de Mann-Whitney y Kruskal Wallis), para el perfil de salud, y en test paramétricos (prueba T para muestras independientes y Anova de

un factor), para los índices de salud. Esta decisión se fundamentó sobre las conclusiones de un estudio de aspectos estadísticos del cuestionario SF-36 realizado en España³⁸. El **análisis multivariante** se realizó sólo para los índices de salud, seleccionando como técnica la regresión logística (método condicional hacia delante). Para ello cada índice de salud se dicotomizó en función de la media de la población general murciana obtenida en el estudio. De esta forma, puntuaciones por encima y por debajo de este punto de corte, se definieron como mejor o peor CVRS. El criterio de inclusión establecido en el modelo multivariante fue la obtención de una $p < 0,2$ en el bivalente. Se valoraron interacciones entre las variables independientes.

La **confidencialidad de los datos** se garantizó con la aplicación de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, se establecieron las siguientes medidas de seguridad:

- Los datos de carácter personal procedentes de la base de datos poblacional del programa de vacunas³⁹ se mantuvieron disociados de la información fruto de la investigación.
- Se elaboró un manual de seguridad de la base de datos donde se establecía las personas autorizadas al acceso y responsabilidades.
- Todas las personas que participaron en el trabajo de campo y/o tuvieron acceso a la base de datos, firmaron un compromiso de confidencialidad.
- Los ciudadanos seleccionados recibieron una carta donde además de informarles sobre el objeto del proyecto, se pedía su participación y se les aseguraba la confidencialidad de la información recabada. Además de cómo ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de datos.

Para el diseño del estudio se consultó la guía de recomendaciones para la incorporación de la **perspectiva de género** en la investigación, elaborada por el Observatorio de Salud de la Mujer⁴⁰.

La **financiación** de este proyecto procede de los fondos asignados en el presupuesto de la CARM a la Consejería de Sanidad. Los autores no realizan otra actividad profesional remunerada relacionada con el tema de estudio.

RESULTADOS REGIONALES

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La búsqueda activa de teléfono supuso el paso de un 86% de cobertura telefónica a un 93%. La encuesta telefónica iba dirigida a un total de 3.486 ciudadanos de los que accedieron a colaborar 3.381 (tasa de respuesta=97,0%). Por contar con criterios de exclusión y por disponer, sólo para este caso, de ciudadanos suplentes fue necesario realizar 8.461 contactos, con una proporción de excluidos del 58,7% (4.975). Los motivos, sobre el total de excluidos, fueron:

- Ilocalizable por teléfono erróneo o no lograr contacto (91,6%)
- Incapacidad física (2,0%)
- Fallecimiento (1,8%)
- Incapacidad psíquica (0,9%)
- Institucionalizado (0,6%)
- No comprender el castellano (0,7%)
- No reside actualmente en Murcia (1,9%)
- Entrevista realizada por error (0,5%)


El 49,6% de las personas respondieron dentro del margen de llamadas establecido sin recurrir a un suplente; el 18,0 % eran suplentes de primer orden, el 13,0% de segundo orden, el 9% de tercer orden, el 5,8% de cuarto orden y, por último, en un 4,6% de los casos se a los de quinto orden. De tal forma, nin-

gún ciudadano excluido quedó sin ser sustituido y en ningún momento se agotaron los suplentes.

La reconstrucción de la muestra se hizo mediante la asignación de pesos para el análisis a nivel Regional (tabla B.1, gráfico 1). De los 3.381 encuestados, el 50,5% eran hombres, con una media de edad de 43,6 años (DE=17,2; mediana=40; mínimo=18; máximo=97). La media de edad de las mujeres fue de 46,0 años (DE=18,6; mediana=42; mínimo=18; máximo=100) Las edades más frecuentes fueron la comprendidas entre los 25 y los 44 años. Se observó una alta proporción de ciudadanos con algún tipo de estudios, casados y con actividad económica en situación de trabajo (gráfico 2; tabla B.2). El país de nacimiento del 91,6% de los encuestados había sido España y en un 8,3% un país foráneo.

Las frecuencias de los distintos hábitos relacionados con la salud, como el consumo de tabaco y alcohol, la actividad física en el ámbito laboral y en el tiempo de ocio, quedan representadas en el gráfico 3 y detalladas en la tabla B.3. Entre estos resultados, cabe destacar que más de la mitad de las mujeres encuestadas afirmó no haber fumado nunca (57,5%), cifra bastante inferior en los hombres (34,0%). Por otro lado, algo menos de la mitad de la población manifestó consumir alcohol, aunque no diariamente, (45,5%). En cuan-

Gráfico 1. Pirámide de la población de la Región de Murcia reconstruida con pesos. Región de Murcia 2007.



Resultados expresados en porcentaje sobre el total de población. FUENTE: Encuesta de salud en población general. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Región de Murcia 2007.

Gráfico 2. Encuesta de salud en población general. Características sociodemográficas. Región de Murcia 2007.




Gráfico 3. Encuesta de salud en población general. Hábitos de vida. Región de Murcia 2007.





Gráfico 4. Encuesta de salud en población general. Condiciones médicas crónicas y utilización de servicios sanitarios. Región de Murcia 2007.



to a la actividad física, sólo un 6,8% realizaba actividad física moderada-alta en su ámbito laboral (caminar o realizar grandes esfuerzos). El 55,6% de las mujeres declaró no realizar actividad física en su tiempo de ocio, entre los hombres, esta cifra fue de un 46,2%.

En relación con la presencia de condiciones médicas crónicas (gráfico 4 y tabla B.4.) el 61,0% de la población declaró padecer al menos 1 patología crónica. Con una frecuencia de un 10,4%, el número de patologías concomitantes eran 4 ó más. En relación al tipo específico de condición crónica declarada (tabla B.5.), de forma general, la más declarada, con un 26,3% fue la “artrosis y problemas reumáticos”, la segunda, con una frecuencia del 21,0% fue la “alergia”, la tercera, con un 19,8%, fue la “hipertensión arterial”, y la cuarta, con un 12,7%, la depresión. Estas cuatro patologías son, en todos los casos, más frecuentes en la mujer que en el hombre. Las mayores diferencias se observan en la “artrosis y problemas reumáticos” (mujer=32,6%; hombre=20,0%), y en la “depresión” (mujer=17,4%; hombre= 8,1%).

En relación con la utilización de servicios sanitarios (gráfico 4 y tabla B.6), un 54,5% de la población había realizado su última visita médica (de AP o AE) más allá de un mes, pero sin pasar del año. Teniendo en cuenta ambos sexos, la especialidad más frecuentada fue Medicina de Familia; la segunda más frecuentada por las mujeres fue Ginecología y Obstetricia y por los hombres, traumatología. En consonancia con los resultados previos, el lugar de consulta más frecuente fue el centro de salud/consultorio. El segundo en frecuencia fueron las consultas externas del hospital. Los motivos principales de estas consultas fueron con el fin de determinar un diagnóstico o bien para realizar una revisión.

Un 8,3% de los ciudadanos fueron hospitalizados (gráfico 4; tabla B.7.) en el transcurso del último año, y de éstos, un 7,5% sólo lo hicieron una vez. Los motivos de hospitalización más frecuentes fueron ingresar para una intervención quirúrgica.

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD Y DETERMINANTES DE SALUD: ANÁLISIS BIVARIANTE

De las 3.381 personas que accedieron a participar en el estudio, 3.326 (98,4%) respondieron a la totalidad de las preguntas del Cuestionario de Salud SF12v2. De las 12 preguntas que lo componen, la número 10, “¿Con qué frecuencia tuvo mucha energía?”, fue la menos contestada, con un 99,2%. La pregunta número 4, “¿A causa de su salud física hizo menos de lo que hubiera querido hacer?”, tuvo una respuesta del 99,7%. Por último, los encuestados pertenecientes al área de salud de Lorca, contestaron al 100% de las preguntas del cuestionario SF-12v2 (tabla A.1).

Dado el carácter multidimensional de la calidad de vida, la dimensión mejor valorada por los ciudadanos de la Región (gráfico 5 y tabla A.2) fue la Vitalidad (media= 56,9; DE= 11,0; mediana= 57,8); seguida de la Salud Mental (media= 53,3; DE= 10,9; mediana= 58,5). Por el contrario, la dimensión peor valorada fue la Salud General (media= 42,3; DE= 9,6; mediana= 44,7).

Los resultados en función del sexo (tabla A.2) siguen mostrando la Vitalidad como la dimensión mejor percibida, tanto en hombres (media=58,7; DE= 10,3; mediana= 57,8) como en mujeres (media= 55,1; DE= 11,4; mediana= 57,8), y la Salud General, como la peor percibida, también en hombres (media= 43,4; DE= 9,2; mediana= 44,7) y en mujeres (media= 41,1; DE= 9,8; mediana= 44,7). La valoración conjunta de todas las dimensiones en función del sexo muestra, de forma general, la mejor percepción del estado de salud por los hombres (gráfico 6 y tabla A.2).

En cuanto a los índices de calidad de vida relacionada con la salud, el Índice Salud Mental “ISM” (media= 53,6; DE= 10,7; mediana= 57,3) es superior al Índice Salud Físico “ISF” (media= 48,6; DE= 10,6; mediana= 52,4). Al calcular estos índices en función del sexo, los hombres obtuvieron un ISM (media= 55,3; DE= 9,7; mediana= 57,3) mejor que el de las mujeres (media= 52,0; DE= 11,4; mediana= 56,7). Para el ISF, ocurre exactamente lo mismo, el de los hombres (media= 49,8; DE= 9,7; mediana= 53,2)

fue mejor que el de las mujeres (media= 47,5; DE= 11,4; mediana= 52,4). Las diferencias observadas en función del sexo para la calidad de vida relacionada con la salud en la Región (dimensiones e índices), resultaron ser estadísticamente significativas (gráfico 6 y tabla A.2).

Al estratificar los valores de CVRS por edad se observa cómo la Vitalidad y la Salud General, respectivamente, siguen siendo las dimensiones mejor y peor

valoradas (gráfico 7; tabla A.3). Todas las dimensiones, excepto Salud Mental, sufren un declive acusado en los estratos avanzados de edad. Este declive es especialmente pronunciado para la Función Física que, a partir de los 45-54 años, pasa de valores de CVRS superiores a 50, a valores por debajo de 40, para el estrato de 75 años y más.

Si al estrato edad se le añade el estrato sexo (gráfico 8; tablas A.4 y A.5), de forma casi generalizada y

Gráfico 5. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Dimensiones e índices de salud en ambos sexos. Región de Murcia 2007.




Gráfico 6. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Dimensiones e índices de salud por sexo. Región de Murcia 2007.





Gráfico 7. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Dimensiones en ambos sexos por edad (años). Región de Murcia 2007.



hasta el estrato de 45-54 años, los valores de las dimensiones son similares para hombres y mujeres, aunque superiores en los primeros. Pasado este estrato de edad, los valores de CVRS según sexo la diferencia aumenta a favor de los hombres.

En la representación gráfica Índices de Salud Físico “ISF” y Mental “ISM”, estratificados por edad y sexo (gráfico 9, tablas A.4 y A.5), se observa también cómo el estrato de 45-54 años es el punto crítico a partir del cual empiezan a diferir mayormente los valores de CVRS a favor de los hombres.

Teniendo en cuenta la ordenación territorial de los servicios de salud⁴¹, para valorar la accesibilidad a la atención sanitaria, se procedió al estudio de posibles diferencias en la calidad de vida entre las distintas áreas de salud de la Región (tabla A.6). Se detectaron diferencias estadísticamente significativas entre los valores medios de CVRS del Dolor Corporal, de la Vitalidad, de la Función Social, del Rol Emocional y entre las medias del ISM. Además, según se observa en el gráfico 10, el área del Noroeste, difiere considerablemente en puntuaciones medias de CVRS para las dimensiones Dolor Corporal y Función social, y para el ISM.

En el gráfico 11, se muestran los resultados de calidad de vida en función del resto de variables sociodemográficas recogidas en la encuesta de salud destinada a población general. En relación a la actividad económica, entre sus diferentes categorías se detectaron diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,000$) para todas las dimensiones de CVRS e índices resumen de éstas (tabla A.7). Se observó que quienes se encuentran en activo (trabajando) presentaban mejores puntuaciones medias de CVRS que el resto de actividades económicas. Las personas jubiladas/pensionistas en situación de baja laboral (> 3 meses) y las dedicadas a sus labores, presentaron un ISF medio inferior al de población general; esta misma situación, pero en relación con el ISM, sólo se dio para los que estaban de baja laboral.

Siguiendo con la descripción del gráfico 11, pero en relación con el estado civil, entre sus diferentes categorías, se detectaron diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,000$) para todas las dimensiones de CVRS e índices resumen de éstas (tabla A.8). Las personas solteras y los viudos, presentaron respectivamente, las mejores y peores puntuaciones medias de CVRS. Las medias de los ISF e ISM, para el estado de viudez, fueron inferiores que los medios de población ge-

Gráfico 8. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Dimensiones por edad (años) y sexo. Región de Murcia 2007.











Gráfico 9. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Índices de salud por edad (años) y sexo. Región de Murcia 2007.




Gráfico 10. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general por área de salud. Región de Murcia 2007.





Gráfico 11. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Características sociodemográficas en ambos sexos. Región de Murcia 2007.



neral. Independientemente del estado civil, al valorar la CVRS de los ciudadanos que manifestaron vivir en pareja (convivencia) se detectaron diferencias estadísticamente significativas ($p<0,000$) entre ambos estados para todas las dimensiones de CVRS e índices resumen pero como muestra el gráfico 11, no siempre en el mismo sentido (tabla A.9). Las medias de los ISF e ISM, son similares a las de la población general.

En relación al país de nacimiento (tabla A.10; gráfico 11), la media del ISF de los foráneos fue superior a la de los nacidos en España ($p<0,000$). Mientras la media del ISF es superior a la de población general, el ISM es ligeramente inferior a su correspondiente en dicha población.

El último histograma del gráfico 11, corresponde al nivel de estudios realizados, en el que se observa un gradiente ascendente de calidad de vida en función de la

complejidad de éstos. Entre las diferentes categorías, se detectaron diferencias estadísticamente significativas ($p<0,000$) para todas las dimensiones de CVRS e índices resumen de éstas (tabla A.11). Las medias de los ISF e ISM, para los que no sabían leer ni escribir, fueron inferiores a las obtenidas en población general.

Los resultados según hábitos de vida se representan en el gráfico 12. Así, entre las diferentes categorías del consumo de tabaco y alcohol, se detectaron diferencias estadísticamente significativas ($p<0,000$) para todas las dimensiones de CVRS e índices resumen (tablas A.12 y A.13). Las medias de los ISF e ISM, para los nunca fumadores y para los que dejaron de consumir alcohol, fueron inferiores que los medios de población general.

En relación con la actividad física laboral y de ocio (gráfico 12), el gradiente en la calidad de vida, es

Gráfico 12. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Hábitos de vida en ambos sexos. Región de Murcia 2007.





Gráfico 13. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Condiciones médicas crónicas y utilización de servicios sanitarios en ambos sexos. Región de Murcia 2007.



mayor en quienes realizan actividad física en cualquiera de las dos situaciones, y según su intensidad. Se detectaron diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,000$) para todas las dimensiones de CVRS e índices resumen de éstas (tablas A.14 y A.15). Las medias de los ISF e ISM, para quienes no practicaban ejercicio físico en ambos casos, fueron inferiores a los valores medios de población general.

La calidad de vida en función de la presencia de condiciones médicas crónicas y de la utilización de servicios sanitarios se muestra en el gráfico 13. La calidad de vida es mejor en ausencia de problemas de salud crónicos, además cuando estos aparecen de forma concomitante (carga de enfermedad) peores son los valores de CVRS. Se detectaron diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,000$) para todas las dimensiones de CVRS e índices resumen de éstas (tablas A.16 y A.18). Las medias de los ISF e ISM, para las personas sin presencia de patología crónica, fueron superiores a los valores medios presentados en población general (incluye a todo tipo de personas independientemente de su condición médica). Estratificando por sexo, los valores de las personas sin condición médica crónica presente, se observan gráficamente pequeñas diferencias en las puntuaciones medias. Sin embargo, estas diferencias aumentan en presencia de condición médica crónica. Para las principales patologías crónicas declaradas, se detectaron diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,000$) en todas las dimensiones de CVRS e índices resumen, excepto para la alergia (tabla A.19). Las medias de los ISF e ISM, para todas las patologías, fueron inferiores a los valores medios de población general.

En el gráfico 13 (tabla A.21) también se observa que cuanto mayor fue el tiempo pasado desde la última consulta médica, mejores fueron los resultados en calidad de vida obtenidos. Además, las personas que no fueron hospitalizadas en el último año, presentaron mejor calidad de vida que las sí lo fueron (tabla A.22 y A.23). Se detectaron diferencias estadísticamente significativas ($p < 0,000$) para todas las dimensiones de CVRS e índices resumen de estas variables (tablas A.21, A.22 y A.23). Las medias de los ISF e ISM de quienes acudieron al médico en el último mes y fueron hospitalizados en el último año, resultaron inferiores a las medias de población general.

CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD Y DETERMINANTES DE SALUD: ANÁLISIS MULTIVARIANTE

El análisis multivariante se realizó sólo para los índices resumen de salud. Los puntos de corte utilizados para dicotomizar cada uno de los índices como variables respuesta fueron las respectivas medias de la población general de la RM (ISF media= 48,6; ISM media= 53,6). Según estos puntos de corte el 68,7% de las personas mostraron una CVRS por encima de la media regional en relación al ISF y un 66,0% en relación al ISM. Las variables que en el análisis bivariante obtuvieron una asociación estadística con una probabilidad menor de 0,2 (criterio de inclusión en el análisis multivariante) para los Índices de Salud Físico y Mental fueron: sexo, edad, actividad física laboral y de ocio, nivel de estudios, actividad económica, número de condiciones médicas crónicas, hipertensión arterial, diabetes mellitus, “asma, bronquitis crónica y enfisema”, enfermedad del corazón, depresión, “artrosis y problemas reumáticos”, tumor maligno (en los 5 últimos años), estado civil, consumo de tabaco y alcohol, tiempo desde la última visita médica y hospitalización. El país de nacimiento sólo cumplió el criterio para el ISF y el área de salud sólo para el ISM. Se estudiaron posibles interacciones entre las variables independientes, detectándose una entre el sexo y la edad para el ISF y otra entre el área de salud y la depresión para el ISM.

Las variables de ajuste introducidas en el modelo final de regresión logística para el ISF fueron: sexo, edad, actividad física de ocio, actividad económica, nivel de estudios, número de condiciones crónicas médicas, “artrosis y problemas reumáticos”, tumor maligno (en los 5 últimos años), consumo de alcohol, tiempo desde la última visita médica y hospitalización. Para el ISM fueron: sexo, edad, actividad física de ocio, actividad económica, número de condiciones crónicas médicas, depresión, “asma, bronquitis crónica y enfisema”, enfermedad del corazón, depresión, “artrosis y problemas reumáticos”, área de salud, consumo de alcohol y tabaco y tiempo desde la última vista médica.

Según los resultados del análisis multivariante para el Índice de Salud Físico (tabla 3), los hombres presentaron mejor ISF que las mujeres. Tomando como referencia el estrato de edad de “75 años o más”, la CVRS es mejor para todos los estratos, no obstante, la magnitud de este efecto va disminuyendo al aproximarse al de mayor edad. Entre estas dos variables se detectó una interacción que muestra cómo el porcentaje de

hombres con peor CVRS aumenta de manera gradual en función de la edad; mientras que en las mujeres, el porcentaje con peor CVRS, se mantiene estable hasta el estrato de 45-54 años en el que aumenta de manera brusca. La interacción entre las variables edad y sexo se observa en los estratos que van de 25 a 54 años (figura 3). En relación con el número de condiciones médicas crónicas cuanto menor es el número, mejor es la CVRS. Las personas sin “artrosis y problemas reumáticos” o sin tumor maligno (en los 5 últimos años) presentaron mejor ISF que los que sufrían esta dolencia. El nivel de estudios medio-alto también resultó estar asociado a un mejor ISF, así como aquellos que practicaban actividad física en el tiempo de ocio. En función de la utilización de servicios sanitarios, cuanto mayor fue el tiempo transcurrido desde la última visita médica realizada mejor fue la CVRS presentado. Quienes no fueron hospitalizados en el último año presentaron mejor CVRS que los hospitalizados. Comparando con la actividad económica “estar trabajando”, presentaron peor ISF, quienes eran jubilados/pensionistas y quienes estaban de baja laboral. Las variables independientes incluidas en el modelo explicaron el 46,3% de la variabilidad existente.

Al igual que ocurre con el Índice de Salud Físico, en el análisis multivariante para el Índice de Salud Mental

(tabla 4), fueron los hombres los que obtuvieron mejor ISM que las mujeres. En relación con el número de condiciones médicas crónicas cuanto menor es el número, mejor es la CVRS. Las personas sin “artrosis y problemas reumáticos”, sin enfermedad del corazón sin “asma, bronquitis crónica y enfisema”, sin depresión, presentaron mejor ISM que las que sufrían esta dolencia. Entre las variables depresión y área de salud se detectó una interacción. Entre los ciudadanos que declaran tener depresión, la proporción de peor ISM es similar en todas las áreas. Sin embargo, para los que declaran no tenerla esta proporción es superior sólo en el Noroeste. Las personas que practicaban actividad física en el tiempo de ocio presentaban mejor ISM. Quienes habían dejado de consumir alcohol, presentaban peor ISM que quienes nunca lo habían consumido. Las personas que estaban casadas tenían mejor ISM que las solteras. En función de la utilización de servicios sanitarios, cuando el tiempo transcurrido desde la última visita médica fue mayor de 1 mes y menor de 1 año, la CVRS presentada fue mejor que cuando éste fue menor de 1 mes. Comparando con la actividad económica “estar trabajando”, presentaron peor ISM quienes estaban jubilados/pensionistas, o quienes declararon ser estudiantes. Las variables independientes incluidas en el modelo explicaron el 25,3% de la variabilidad existente.

Figura 3. Proporción de hombres y mujeres con un Índice de Salud Físico inferior al de la media de la población general en función de la edad. Región de Murcia 2007.




Tabla 3. Calidad de vida relacionada con la salud en población general. Índice de Salud Físico. Resultados del análisis de regresión logística. Región de Murcia 2007.

ÍNDICE DE SALUD FÍSICO					
		p	*OR	**IC 95%	
Edad (años)	≥75 (nivel de referencia)	0,04			
	18-24	0,00	2,6	1,3	5,1
	25-34	0,01	2,2	1,2	3,8
	35-44	0,00	2,5	1,5	4,4
	45-54	0,01	2,0	1,2	3,4
	55-64	0,00	2,0	1,2	3,2
	65-74	0,01	1,8	1,1	2,7
Sexo	Hombre/Mujer (H/M)	0,03	1,3	1,0	1,7
Edad ≥75 * Sexo (H/M)	(Interacción Edad * Sexo)	0,00			
	18-24 * Sexo (H/M)	0,87	0,9	0,3	2,5
	25-34 * Sexo (H/M)	0,01	0,3	0,2	0,8
	35-44 * Sexo (H/M)	0,00	0,2	0,1	0,4
	45-54 * Sexo (H/M)	0,00	0,2	0,1	0,5
	55-64 * Sexo (H/M)	0,23	0,6	0,3	1,4
	65-74 * Sexo (H/M)	0,29	0,6	0,3	1,5
Actividad económica	Trabajando (nivel de referencia)	0,00			
	Baja laboral	0,00	0,2	0,1	0,3
	Desempleo	0,65	0,9	0,6	1,4
	Jubilado/Pensionista	0,00	0,5	0,4	0,8
	Estudiante	0,31	0,7	0,4	1,3
	Labores del hogar	0,17	1,3	0,9	1,8
Nivel de estudios	No sabe leer ni escribir				
	(nivel de referencia)	0,00			
	Sin estudios	0,36	1,3	0,7	2,4
	Estudios primarios	0,05	1,8	1,0	3,1
	Estudios secundarios	0,00	2,6	1,4	4,7
	Estudios superiores	0,01	2,3	1,2	4,2
Consumo de alcohol	No nunca (nivel de referencia)	0,02			
	Diariamente	0,02	1,4	1,0	1,8
	Si pero no diario	0,01	1,4	1,1	1,7
	No pero ha bebido	0,51	0,8	0,4	1,6
Actividad física	No/Si	0,00	1,8	1,5	2,3
Última visita médica	≤4 semanas (nivel de referencia)	0,00			
	>4 semanas y <1 año	0,00	2,2	1,8	2,7
	≥1 año	0,00	3,4	2,2	5,2
Hospitalización	No/Si	0,00	2,4	1,7	3,3
Nº condiciones crónicas					
(Carga de enfermedad)	≥ 4 (nivel de referencia)	0,00			
	0	0,00	5,9	4,0	8,7
	1	0,00	5,2	3,6	7,5
	2	0,00	3,1	2,2	4,5
	3	0,00	2,0	1,4	3,0
Artrosis y problemas reumáticos	No/Si	0,00	2,5	1,9	3,2
Tumor maligno (5 últimos años)	No/Si	0,05	1,9	1,0	3,5
***R²	0,463				

(*) OR: Odds Ratio; (**) IC 95%: Intervalo de Confianza del 95%; (***) R²: Coeficiente de determinación.

Tabla 4. Calidad de vida relacionada con la salud en población general. Índice de Salud Mental. Resultados del análisis de regresión logística. Región de Murcia 2007.

ÍNDICE DE SALUD MENTAL		p	*OR	**IC 95%	
Edad (años)	≥75 (nivel de referencia)				
	18-24	0,01	2,1	1,2	3,9
	25-34	0,91	1,0	0,6	1,7
	35-44	0,35	0,8	0,5	1,3
	45-54	0,93	1,0	0,6	1,7
	55-64	0,18	1,3	0,9	2,1
	65-74	0,41	1,2	0,8	1,8
Sexo	Hombre /Mujer	0,00	1,4	1,2	1,7
Actividad económica	Trabajando (nivel de referencia)				
	Baja laboral	0,00	0,4	0,2	0,7
	Desempleo	0,24	0,8	0,5	1,2
	Jubilado/Pensionista	0,79	1,0	0,7	1,4
	Estudiante	0,00	0,5	0,3	0,8
	Labores del hogar	0,90	1,0	0,8	1,4
Área de salud de pertenencia	Vega Segura (nivel de referencia)				
	Murcia	0,83	1,0	0,6	1,5
	Cartagena	0,99	1,0	0,6	1,6
	Lorca	0,55	1,2	0,7	2,0
	Noroeste	0,15	0,6	0,3	1,2
	Altiplano	0,94	1,0	0,4	2,3
Estado civil	Soltero	0,00			
	Casado	0,00	1,7	1,4	2,2
	Viudo	0,64	1,1	0,7	1,8
	Separado/Divorciado	0,39	1,2	0,8	2,0
Consumo de tabaco	No nunca (nivel de referencia)				
	Diariamente	0,08	0,8	0,7	1,0
	Si pero no diario	0,66	1,1	0,7	1,8
	No pero ha fumado	0,06	1,2	1,0	1,6
Consumo de alcohol	No nunca (nivel de referencia)				
	Diariamente	0,16	1,2	0,9	1,5
	Si pero no diario	0,20	0,9	0,7	1,1
	No pero ha bebido	0,01	0,5	0,3	0,8
Actividad física	No/Si	0,00	1,8	1,5	2,2
Última visita médica	≤4 semanas (nivel de referencia)	0,00			
	>4 semanas y <1 año	0,00	1,4	1,2	1,7
	≥1 año	0,96	1,0	0,7	1,3
Nº condiciones crónicas (Carga de enfermedad)	≥ 4 (nivel de referencia)				
	0	0,00	2,0	1,4	3,0
	1	0,00	2,0	1,4	2,9
	2	0,01	1,6	1,1	2,3
	3	0,19	1,3	0,9	1,8
Artrosis y probl. reumáticos	No/Si	0,00	1,7	1,4	2,3
Enfermedad del corazón	No/Si	0,03	1,5	1,1	2,2
Asma, bronq. crónica, enfisema	No/Si	0,01	1,5	1,1	2,1
Depresión	No/Si	0,00	4,5	3,0	6,7
Depresión * Vega del Segura	(Interacción depresión * Área de Salud)	0,30			
	Depresión * Murcia	0,15	0,5	0,2	1,2
	Depresión * Cartagena	0,65	0,8	0,3	2,0
	Depresión * Lorca	0,49	0,7	0,2	2,0
	Depresión * Noroeste	0,06	0,3	0,1	1,1
	Depresión * Altiplano	0,75	1,3	0,2	7,7
R²	0,253				

(*) OR: Odds Ratio; (**) IC 95%: Intervalo de Confianza del 95%; (***) R²: Coeficiente de determinación.

RESULTADOS POR ÁREA DE SALUD


RESULTADOS POR ÁREAS DE SALUD

Los resultados del análisis multivariante no mostraron diferencias entre la calidad de vida relacionada con la salud de la población general por el hecho de residir en una determinada área de salud. Sin embargo, para facilitar el acceso a la información por parte de usuarios de un área de salud determinada, a continuación se expone el perfil de cada una de ellas.

En el gráfico 14, se muestra junto a la pirámide de la poblacional regional, las de las áreas de salud reconstruidas según pesos correspondientes (tabla B.1).

Dado que la estructura por edad y sexo de la población general difiere entre las áreas de salud de la Región (gráfico 14), se valoró la posible influencia de estas diferencias sobre los Índices resumen de calidad de vida por área de salud. Para ello se calculó el porcentaje de variación relativa entre los valores estandarizados (por el método directo) y brutos de los índices de salud de las seis áreas (tabla B.8). Las variaciones máximas observadas de los valores brutos con los estandarizados fueron de un 1,4%, para el Índice de Salud Físico, y de un 3,6%, para el Mental. A pesar de que se evidencian ligeras diferencias entre los valores estandarizados y brutos, los resultados sólo se muestran en función de éstos últimos.

Gráfico 14. Pirámides de la población de estudio por regional y por área de salud. Región de Murcia 2007.



Resultados expresados en porcentaje sobre el total de población. Fuente: encuesta de salud en población general. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Región de Murcia 2007.

Las pirámides de población adulta de la Región y del Área de Salud de Murcia se representan en el gráfico 15. La media de edad de los encuestados fue de 44,4 años (DE= 17,8; mediana= 41,0). El 49,6% eran hombres; el 29,9% tenían estudios superiores, la mayoría estaban casados (60,7%) y en actividad económica trabajando el 56,5% (tabla 5).

Algo menos de la mitad de los encuestados afirmó no haber fumado nunca (44,9% en ambos sexos y el 51,6% de las mujeres). El 49,6% consumían alcohol, pero no diariamente. Más de la mitad realizaban una actividad laboral que no requería esfuerzo físico. Un 42,1% practicaba actividad física en el tiempo de ocio varias veces a la semana (tabla 6).

El 62,0% de los encuestados declaró tener alguna condición médica crónica, de éstos un 10,1% padecía 4 ó más (tabla 7). La condición crónica más prevalente fue la artrosis y los problemas reumáticos (24,2%), sobre todo en mujeres (tabla 8).


Un 29,9% de los ciudadanos dijo haber consultado con un médico (de AP o AE) por algún problema de salud en el último mes. Las especialidades más consultadas después de Medicina Familiar y Comunitaria, fueron Ginecología y Medicina Interna, ambas realizadas por mujeres (tabla 9). El motivo principal de consulta fue para establecer un diagnóstico. Un 7,6 % de los ciudadanos declaró haber estado hospitalizado en el último año, destacando la hospitalización para intervención quirúrgica (tabla 10).

Las percepciones de calidad de vida relacionada con la salud, para ambos sexos, según la presencia o no de alguna condición médica crónica, se muestran en el gráfico 16. La “Vitalidad” fue la dimensión mejor valorada en todos los casos, independientemente de la presencia o no de alguna condición médica crónica. Para los que no presentaron ninguna condición médica crónica, esta dimensión se encuentra por encima de los valores medios poblaciones regionales del ISF y del ISM. La “Salud General”, sin embargo, fue

la peor valorada estando muy por debajo de los valores medios poblacionales de ambos índices. El ISF y el ISM, son similares a los valores medios de población general (tabla A.24). Las dimensiones e índices de salud en función del sexo se representan en el gráfico 17 y se detallan en las tablas A.25, A.26, A.30, A.31 y A.32. Para el total del área y de forma general, se observan diferencias estadísticamente significativas ($p<0,05$) entre las medias de hombres y mujeres para los dos índices de salud y todas las dimensiones. Los índices de salud por edad y sexo están representados en el gráfico 18 y detallados en las tablas A.27, A.28 y A.29, mostrando una tendencia descendente con la edad para el Índice Físico y mantenido para el Mental.

Las condiciones médicas crónicas con valoración de CVRS (tabla A.33) más frecuentes en el área de Murcia fueron la “Artrosis y problemas reumáticos”, la “Alergia”, la “Hipertensión arterial”, la “Depresión” y la “Diabetes mellitus”. El peor ISF medio fue para las “Enfermedades del corazón”, seguido del hecho de haber padecido un “Tumor maligno en los últimos 5 años” y de la “Diabetes mellitus”. El peor ISM fue para la “Depresión”, seguido de las “Enfermedades del corazón” y de haber padecido un “Tumor maligno en los últimos 5 años”.

Gráfico 15. Pirámides de población general y del Área de Salud de Murcia 2007.



Resultados expresados en porcentaje sobre el total de población. Fuente: encuesta de salud en población general. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Región de Murcia 2007.

Tabla 5. Encuesta de salud en población general. Características sociodemográficas. Área de Salud de Murcia 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Grupos de edad						
18-24	66	11,7	34	12,2	32	11,3
25-34	134	23,8	71	25,5	63	22,3
35-44	121	21,5	62	22,3	59	20,8
45-54	85	15,2	42	15,1	43	15,2
55-64	61	10,9	29	10,5	32	11,3
65-74	50	9,0	23	8,2	27	9,5
≥ 75	44	7,9	17	6,1	27	9,5
Educación						
No saber leer ni escribir	13	2,3	3	0,9	10	3,5
Sabe leer y escribir	49	8,7	18	6,3	31	11,0
Estudios primarios	179	31,8	89	32,1	90	31,8
Estudios secundarios	150	26,6	74	26,4	76	26,9
Estudios superiores	168	29,9	93	33,4	75	26,5
NS/NC	4	0,7	2	0,9	2	0,7
Estado civil						
Soltero	168	29,9	90	32,4	78	27,6
Casado	341	60,7	174	62,4	167	59,0
Viudo	28	5,0	2	0,9	26	9,2
Separado/Divorciado	23	4,1	12	4,4	11	3,9
NS/NC	1	0,3			1	0,4
Vivir en pareja						
NO	185	32,9	82	29,2	103	36,4
SI	375	66,7	197	70,8	178	62,9
NS/NC	2	0,4	0	0	2	0,7
Actividad económica						
Trabajando	317	56,5	188	67,3	129	45,6
Baja de ≥ 3 meses	7	1,3	4	1,6	3	1,1
En desempleo	32	5,7	15	5,3	17	6,0
Jubilado/Pensionista	89	15,9	48	17,2	41	14,5
Estudiante	40	7,1	20	7,1	20	7,1
Labores del hogar	70	12,5	188	67,3	70	24,7
NS/NC	6	1,1	4	1,4	2	0,7

Tabla 6. Encuesta de salud en población general. Hábitos de vida. Área de Salud de Murcia 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	562	–	279	49,6	283	50,4
Consumo tabaco						
Diariamente	161	28,6	83	29,8	78	27,6
No diariamente	14	2,5	9	3,2	5	1,8
No actualmente, pero sí antes	135	24,0	81	29,0	54	19,1
No fuma, ni ha fumado nunca	252	44,9	106	37,9	146	51,6
NS/NC	0	0	0	0	0	0,0
Consumo alcohol						
Diariamente	125	22,3	87	31,3	38	13,4
No diariamente	279	49,6	132	47,2	147	51,9
No actualmente, pero sí antes	6	1,1	4	1,3	2	0,7
No nunca	149	26,5	54	19,5	95	33,6
NS/NC	3	0,5	2	0,7	1	0,4
Actividad física laboral						
Sentado	216	38,5	116	41,5	100	35,3
De pie	328	58,4	148	53,1	180	63,6
Caminando	6	1,1	5	1,8	1	0,4
Gran esfuerzo	9	1,5	9	3,1	0	0,0
NS/NC	2	0,4	2	0,5	0	0,0
Actividad física tiempo ocio						
No realiza	251	44,6	106	38,1	145	51,2
≥ 1 vez al mes	70	12,5	38	13,7	32	11,3
Varias veces a la semana	236	42,1	132	47,5	104	36,7
NS/NC	4	0,8	2	0,7	2	0,7

Tabla 7. Encuesta de salud en población general. Presencia de condiciones médicas crónicas. Área de Salud de Murcia 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	562	-	279	49,6	283	50,4
Sin condición médica crónica	214	38,0	113	40,5	101	35,7
Con alguna condición méd. crónica	348	62,0	166	59,5	182	64,3
1 condición médica crónica	133	23,6	67	24,0	66	23,3
2 condiciones médicas crónicas	104	18,6	49	17,7	55	19,4
3 condiciones médicas crónicas	55	9,7	26	9,4	29	10,2
≥ 4 condiciones médicas crónicas	57	10,1	23	8,4	34	12,0

Tabla 8. Encuesta de salud en población general. Tipo de condición médica crónica declarada. Área de Salud de Murcia 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	562	-	279	49,6	283	50,4
Hipertensión arterial	107	19,0	52	18,6	55	19,4
Diabetes mellitus	47	8,4	23	8,2	24	8,5
Asma, bronquitis crónica, enfisema	38	6,7	20	7,2	18	6,4
Enfermedad del corazón	32	5,7	14	5,0	18	6,4
Alergia	133	23,6	68	24,4	65	23,0
Depresión	75	13,4	27	9,7	48	17,0
Artrosis y problemas reumáticos	136	24,2	50	17,9	86	30,4
Tumor maligno (5 últimos años)	17	3,0	8	2,9	9	3,2
Enfermedades del aparato digestivo	7	1,3	5	1,8	2	0,7
Enfermedades del aparato urinario y genital (masculino y femenino)	9	1,6	3	1,1	6	2,1
Osteopatías, condropatías y deformidades adquiridas músculoesqueléticas	10	1,8	3	1,1	7	2,5
Otras enfermedades mentales	4	0,8	0	0,0	4	1,4
Otras enfermedades pulmonares	3	0,5	3	1,1	0	0,0
Enfermedades de otorrinolaringología y otras del aparato respiratorio	3	0,5	3	1,1	0	0,0
Enfermedades endocrino-metabólicas (excepto DM)	6	1,0	2	0,7	4	1,4
Enfermedades vasculares	7	1,2	1	0,4	6	2,1
Enfermedades neurológicas	8	1,4	2	0,7	6	2,1
Enfermedades renales	5	0,8	4	1,4	1	0,4
Enfermedades hematológicas	6	1,0	1	0,4	5	1,8
Enfermedades oculares	1	0,1	1	0,4	0	0,0
Enfermedades dermatológicas	2	0,4	2	0,7	0	0,0
Dorsopatías	9	1,7	3	1,1	6	2,1
Colesterol alto	14	2,5	10	3,6	4	1,4

Tabla 9. Encuesta de salud en población general. Tiempo desde la última visita médica y utilización de servicios sanitarios en las cuatro últimas semanas. Área de Salud de Murcia 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	562	–	279	49,6	283	50,4
Tiempo desde la última visita a (AP o AE)						
≤ 4 semanas	168	29,9	66	23,7	102	36,0
> 4 semanas y < 1 año	345	61,3	180	64,5	165	58,3
≥ 1 año	47	8,4	32	11,6	15	5,3
NS/NC	2	0,3	0	0,2	2	0,7
Especialidad médica últimas 4 semanas						0,0
Medicina de Familia	121	21,6	49	17,5	72	25,4
Ginecología	8	1,4	0	0,0	8	2,8
Medicina Interna	4	0,6	0	0,0	4	1,4
Otras especialidades	35	6,3	17	6,2	18	6,4
NS/NC	0	0	0	0	0	0,0
Total	168	29,9	66	23,7	102	36,0
Lugar de consulta						0,0
Centro salud/consultorio	117	20,8	44	15,9	73	25,8
Ambulatorio/CEP	6	1,1	2	0,7	4	1,4
Consulta externas de hospital	28	4,9	10	3,5	18	6,4
Urgencias de ambulatorio	1	0,2	1	0,5	0	0,0
Urgencias de hospital	6	1,0	3	1,1	3	1,1
Consulta médico particular	3	0,5	1	0,2	2	0,7
Consulta médico de una sociedad	7	1,2	4	1,6	3	1,1
Empresa o lugar de trabajo	1	0,1	1	0,3	0	0,0
Domicilio del sujeto de entrevista	1	0,1	0	0	1	0,4
Otro lugar	0	0	0	0	0	0,0
NS/NC	0	0	0	0	0	0,0
Total	168	29,9	66	23,7	102	36,0
Motivo consulta						0,0
Diagnóstico	71	12,6	35	12,5	36	12,7
Accidentes o agresión	1	0,1	1	0,2	0	0,0
Revisión	64	11,4	20	7,0	44	15,5
Sólo dispensación de recetas	22	4,0	9	3,3	13	4,6
Parte de baja, confirmación o alta	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Otros motivos	10	1,8	2	0,7	8	2,8
NS/NC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	168	29,9	66	23,7	102	36,0

Tabla 10. Encuesta de salud en población general. Utilización de servicios sanitarios hospitalarios en el último año. Área de Salud de Murcia 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	562	-	279	49,6	283	50,4
Hospitalización en el último año						
NO	520	92,4	259	92,5	261	92,2
SI	42	7,6	20	7,3	22	7,8
NS/NC	0	0	0	0	0	0,0
Nº Hospitalizaciones*						
Una vez	41	7,3	19	6,9	22	7,8
Más de una vez	1	0,2	1	0,2	0	0,0
NS/NC	0	0	0	0	0	0,0
Total	42	-	20	7,3	22	7,8
Motivo hospitalización*						
Intervención Quirúrgica	22	3,9	9	3,2	13	4,6
Estudio médico diagnóstico	5	1,0	2	0,8	3	1,1
Tratamiento médico sin IQ	13	2,3	9	3,1	4	1,4
Parto (incluye cesárea)	2	0,3	0	0,0	2	0,7
Otros motivos	0	0,0	0	0,0	0	0,0
NS/NC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	42	-	20	7,3	22	7,8

(*) Nº y Motivo de hospitalización calculado sobre el total de hospitalizaciones en el en el último año (n=42).

Gráfico 16. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica. Dimensiones e índices de salud en ambos sexos. Área de Salud de Murcia 2007.




Gráfico 17. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica Dimensiones e índices de salud por sexo. Área de Salud de Murcia 2007.








Gráfico 18. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Índices de salud por edad (años) y sexo. Área de Salud de Murcia 2007.



Las pirámides de población adulta de la Región y del Área de Salud de Cartagena se representan en el gráfico 19. La media de edad de los encuestados fue de 45,0 años (DE=17,9; mediana=43,0). El 51,2 % eran hombres; el 37,7% tenían estudios primarios, la gran mayoría estaban casados (60,2%) y con actividad económica trabajando el 57,8% (tabla 11).

Menos de la mitad de los encuestados afirmó no haber fumado nunca (42,7% en ambos sexos y el 56,8% de las mujeres). El 47,9% consumía alcohol, pero no diariamente. Más de la mitad realizaban una actividad laboral que no requería esfuerzo físico. Un 57,3% declaró no practicar actividad física en su tiempo de ocio (tabla 12).

El 61,2% de los encuestados declaró tener alguna condición médica crónica, de éstos un 9,8% padecía 4 ó más (tabla 13). La condición crónica más prevalente fue la artrosis y los problemas reumáticos (25,6%), sobre todo en mujeres (tabla 14).


Un 40,9% de los ciudadanos dijo haber consultado con un médico (de AP o AE) por algún problema de salud en el último mes. Las especialidades más consultadas después de Medicina Familiar y Comunitaria, fueron Ginecología, Traumatología, Cirugía General y Oftalmología (tabla 15). El motivo de consulta principal realizar una revisión. Un 9,4 % de los ciudadanos declaró haber estado hospitalizado en el último año, destacando la hospitalización para intervención quirúrgica (tabla 16).

Las percepciones de calidad de vida relacionada con la salud, para ambos sexos, según la presencia o no de alguna condición médica crónica, se muestran en el gráfico 20. La “Vitalidad” fue la dimensión mejor valorada en todos los casos, independientemente de la presencia o no de alguna condición médica crónica. Para los que no presentaron ninguna condición médica crónica, esta dimensión se encuentra por encima de los valores medios poblacionales regionales del ISF y del ISM. La “Salud General”, sin embargo, es la peor valorada estando por

debajo de los valores medios poblacionales de ambos índices. Los valores medios de los ISF e ISM, son similares a los valores medios de población general (tabla A.34). Las dimensiones e índices de salud en función del sexo se representan en el gráfico 21 y se detallan en las tablas A.35, A.36, A.40, A.41 y A.42. De forma general, se observan diferencias estadísticamente significativas ($p<0,05$) entre las medias de hombres y mujeres para el ISF y en todas las dimensiones, excepto para la “Función Social” y el “Rol Emocional”. Los índices de salud por edad y sexo están representados en el gráfico 22 y detallados en las tablas A.37, A.38 y A.39, mostrando una tendencia descendente con la edad para el Índice Físico y mantenido para el Mental.

Las condiciones médicas crónicas con valoración de CVRS (tabla A.43) más frecuentes en el área de Cartagena fueron la “Artrosis y problemas reumáticos”, la “Hipertensión arterial”, la “Alergia”, la “Depresión” y la “Diabetes mellitus”. El peor ISF medio fue para los ciudadanos que habían padecido “Tumor maligno en los últimos 5 años”, seguido de los que habían sufrido “Enfermedades del corazón” y “Diabetes mellitus”. El peor ISM fue en los que habían padecido un “Tumor maligno en los últimos 5 años”, seguido de los que tenían “Depresión” y “Enfermedades del corazón”.

Gráfico 19. Pirámides de población general y del Área de Salud de Cartagena 2007.



Resultados expresados en porcentaje sobre el total de población. Fuente: encuesta de salud en población general. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Región de Murcia 2007.

Tabla 11. Encuesta de salud en población general. Características sociodemográficas. Área de Salud de Cartagena 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	559	–	286	51,2	273	48,8
Grupos de edad						
18-24	66	11,8	34	12,0	32	11,7
25-34	129	23,1	71	24,9	58	21,2
35-44	115	20,6	61	21,5	54	19,8
45-54	86	15,3	44	15,3	42	15,4
55-64	67	11,9	33	11,4	34	12,5
65-74	55	9,8	26	9,1	29	10,6
≥ 75	42	7,5	17	5,8	25	9,2
Educación						
No saber leer ni escribir	13	2,4	4	1,5	9	3,3
Sabe leer y escribir	47	8,5	21	7,2	26	9,5
Estudios primarios	211	37,7	104	36,4	107	39,2
Estudios secundarios	160	28,6	87	30,3	73	26,7
Estudios superiores	125	22,3	67	23,5	58	21,2
NS/NC	13	2,4	3	1,1	10	3,7
Estado civil						
Soltero	161	28,8	99	34,5	62	22,7
Casado	336	60,2	168	58,9	168	61,5
Viudo	38	6,7	5	1,7	33	12,1
Separado/Divorciado	23	4,1	12	4,3	11	4,0
NS/NC	1	0,3	1	0,5	0	0,0
Vivir en pareja						
NO	179	32,0	90	31,5	89	32,6
SI	378	67,6	194	67,7	184	67,4
NS/NC	2	0,4	2	0,8	0	0,0
Actividad económica						
Trabajando	323	57,8	198	69,0	125	45,8
Baja de ≥ 3 meses	22	3,9	7	2,4	15	5,5
En desempleo	19	3,4	8	2,7	11	4,0
Jubilado/Pensionista	79	14,2	61	21,2	18	6,6
Estudiante	23	4,1	11	4,0	12	4,4
Labores del hogar	90	16,2	0	0	90	33,0
NS/NC	3	0,5	2	0,7	1	0,4

Tabla 12. Encuesta de salud en población general. Hábitos de vida. Área de Salud d de Cartagena 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	559	–	286	51,2	273	48,8
Consumo tabaco						
Diariamente	173	30,9	110	38,3	63	23,1
No diariamente	18	3,2	7	2,4	11	4,0
No actualmente, pero sí antes	126	22,6	83	29,1	43	15,8
No fuma, ni ha fumado nunca	239	42,7	84	29,2	155	56,8
NS/NC	3	0,6	3	1,0	0	0,0
Consumo alcohol						
Diariamente	123	22,0	94	32,8	29	10,6
No diariamente	268	47,9	134	46,9	134	49,1
No actualmente, pero sí antes	3	0,6	2	0,6	1	0,4
No nunca	162	28,9	53	18,7	109	39,9
NS/NC	3	0,6	3	1,0	0	0,0
Actividad física laboral						
Sentado	179	32,0	107	37,5	72	26,4
De pie	352	63,0	156	54,6	196	71,8
Caminando	15	2,7	12	4,0	3	1,1
Gran esfuerzo	5	0,8	5	1,6	0	0,0
NS/NC	8	1,5	6	2,2	2	0,7
Actividad física tiempo ocio						
No realiza	321	57,3	156	54,7	165	60,4
≥ 1 vez al mes	56	10,0	32	11,0	24	8,8
Varias veces a la semana	180	32,2	96	33,6	84	30,8
NS/NC	3	0,5	2	0,7	1	0,4

Tabla 13. Encuesta de salud en población general. Presencia de condiciones médicas crónicas. Área de Salud de Cartagena 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	559	–	286	51,2	273	48,8
Sin condición médica crónica	217	38,8	117	41,0	100	36,6
Con alguna condición médica crónica	342	61,2	169	59,0	173	63,4
1 condición médica crónica	137	24,4	72	25,3	65	23,8
2 condiciones médicas crónicas	80	14,4	39	13,7	41	15,0
3 condiciones médicas crónicas	70	12,6	30	10,5	40	14,7
≥ 4 condiciones médicas crónicas	55	9,8	27	9,5	28	10,3

Tabla 14. Encuesta de salud en población general. Tipo de condición médica crónica declarada. Área de Salud de Cartagena 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	559	-	286	51,2	273	48,8
Hipertensión arterial	106	18,9	57	19,9	49	17,9
Diabetes mellitus	53	9,5	29	10,2	24	8,8
Asma, bronquitis crónica, enfisema	34	6,1	20	7,1	14	5,1
Enfermedad del corazón	34	6,1	19	6,7	15	5,5
Alergia	106	18,9	50	17,4	56	20,5
Depresión	76	13,7	26	8,9	50	18,3
Artrosis y problemas reumáticos	143	25,6	56	19,7	87	31,9
Tumor maligno (5 últimos años)	16	2,9	1	8	15	5,5
Enfermedades del aparato digestivo	13	2,4	10	3,5	3	1,1
Enfermedades del aparato urinario y genital (masculino y femenino)	5	0,9	5	1,8	0	0,0
Osteopatías, condropatías y deformidades adquiridas músculo-esqueléticas	8	1,4	3	0,9	5	1,8
Otras enfermedades mentales	0	0	0	0	0	0,0
Otras enfermedades pulmonares	4	0,6	4	1,3	0	0,0
Enfermedades de otorrinolaringología y otras del aparato respiratorio	4	0,7	3	1,2	1	0,4
Enfermedades endocrino-metabólicas (excepto DM)	11	2,1	5	1,7	6	2,2
Enfermedades vasculares	10	1,9	2	0,7	8	2,9
Enfermedades neurológicas	5	0,9	1	0,4	4	1,5
Enfermedades renales	3	0,4	0	0,2	3	1,1
Enfermedades hematológicas	5	0,8	2	0,6	3	1,1
Enfermedades oculares	5	1,0	2	0,8	3	1,1
Enfermedades dermatológicas	3	0,6	1	0,5	2	0,7
Dorsopatías	9	1,6	6	2,2	3	1,1
Colesterol alto	21	3,7	13	4,4	8	2,9

Tabla 15. Encuesta de salud en población general. Tiempo desde la última visita médica y utilización de servicios sanitarios en las cuatro últimas semanas. Área de Salud de Cartagena 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	559	–	286	51,2	273	48,8
Tiempo desde la última visita a (AP o AE)						
≤ 4 semanas	228	40,9	98	34,4	130	47,6
> 4 semanas y < 1 año	264	47,2	138	48,4	126	46,2
≥ 1 año	65	11,7	48	16,7	17	6,2
NS/NC	2	0,3	2	0,6	0	0,0
Especialidad médica últimas 4 semanas					0	0,0
Medicina de Familia	169	30,3	79	27,7	90	33,0
Ginecología	13	2,4			13	4,8
Traumatología	5	0,9	3	1,1	2	0,7
Cirugía General	5	0,9	2	0,8	3	1,1
Oftalmología	5	0,9	2	0,7	3	1,1
Otras especialidades	30	5,4	12	4,2	18	6,6
NS/NC	0	0			0	0,0
Total	228	40,9			228	83,5
Lugar de consulta					0	0,0
Centro salud/consultorio	157	28,0	67	23,5	90	33,0
Ambulatorio/CEP	8	1,4	4	1,4	4	1,5
Consulta externas de hospital	38	6,9	15	5,1	23	8,4
Urgencias de ambulatorio	6	1,0	2	0,7	4	1,5
Urgencias de hospital	4	0,7	3	1,1	1	0,4
Consulta médico particular	7	1,2	1	0,3	6	2,2
Consulta médico de una sociedad	8	1,4	5	1,9	3	1,1
Empresa o lugar de trabajo	1	0,2	1	0,3	0	0,0
Domicilio del sujeto de entrevista	0	0	0	0	0	0,0
Otro lugar	0	0	0	0	0	0,0
NS/NC	0	0	0	0	0	0,0
Total	228	40,9			228	83,5
Motivo consulta					0	0,0
Diagnóstico	87	15,5	38	13,4	49	17,9
Accidentes o agresión	3	0,5	1	0,3	2	0,7
Revisión	103	18,4	44	15,4	59	21,6
Sólo dispensación de recetas	30	5,4	11	3,8	19	7,0
Parte de baja, confirmación o alta	3	0,6	2	0,8	1	0,4
Otros motivos	3	0,5	2	0,7	1	0,4
NS/NC	0	0	0	0	130	47,6
Total	228	40,9	98	34,4	126	46,2

Tabla 16. Encuesta de salud en población general. Utilización de servicios sanitarios hospitalarios en el último año. Área de Salud de Cartagena 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	559	–	286	51,2	273	48,8
Hospitalización en el último año						
NO	506	90,3	258	90,2	248	90,2
SI	53	9,4	26	9,2	27	9,2
NS/NC	2	0,3	2	0,6	0	0,6
Nº Hospitalizaciones*						
Una vez	46	8,2	26	9,2	20	7,3
Más de una vez	5	0,9	0	0	5	1,8
NS/NC	2	0,3	0	0	2	0,7
Total	53	9,4	26	9,2	27	9,9
Motivo hospitalización*						
Intervención Quirúrgica	31	5,5	18	6,3	13	4,8
Estudio médico diagnóstico	7	1,2	2	0,7	5	1,8
Tratamiento médico sin IQ	9	1,6	6	2,2	3	1,1
Parto (incluye cesárea)	6	1,0	0	0	6	2,2
Otros motivos	0	0	0	0	0	0,0
NS/NC	0	0	0	0	0	0,0
Total	53	9,4	26	9,2	27	9,9

(*) N° y Motivo de hospitalización calculado sobre el total de hospitalizaciones en el en el último año (n=53).

Gráfico 20. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica. Área de Salud de Cartagena 2007.




Gráfico 21. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica. Dimensiones e índices de salud por sexo. Área de Salud de Cartagena 2007.





Gráfico 22. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Índices de salud por edad (años) y sexo. Área de Salud de Cartagena 2007.



Las pirámides de población adulta de la Región y del Área de Salud de Lorca se representan en el gráfico 23. La media de edad de los encuestados fue de 44,6 años (DE= 18,3; mediana=41,1). El 48,4 % eran hombres, el 40,1% tenían estudios primarios, la mayoría estaban casados (58,9%) y con actividad económica trabajando el 59,7% (tabla 17).

Algo menos de la mitad de los encuestados afirmó no haber fumado nunca (47,7% en ambos sexos y el 61,8% de las mujeres). El 40,4% consumía alcohol, pero no diariamente. Más de la mitad realizaban una actividad laboral que no requería esfuerzo físico. Un 57,3% declaró no practicar actividad física en su tiempo de ocio (tabla 18).

El 59,2% de los encuestados declaró tener alguna condición médica crónica, de éstos un 8,7% padecía 4 ó más (tabla 19). La condición crónica más prevalente fue la artrosis y los problemas reumáticos (27,7%), sobre todo en mujeres (tabla 20).


Un 34,5 % de los ciudadanos dijo haber consultado con un médico (de AP o AE) por algún problema de salud en el último mes. Las especialidades más consultadas después de Medicina Familiar y Comunitaria, fueron Endocrinología y Nutrición, Traumatología y Ginecología (tabla 21). El motivo de consulta más frecuente fue para la realización de un diagnóstico. Un 9,0 % de los ciudadanos declaró haber estado hospitalizado en el último año, destacando la hospitalización para tratamiento médico sin intervención quirúrgica (tabla 22).

Las puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud, para ambos sexos y según la presencia o no de alguna condición médica crónica, se muestran en el gráfico 24. La “Vitalidad” fue la dimensión mejor valorada en todos los casos, independientemente de la presencia o no de alguna condición médica crónica. Para los que no presentaron ninguna condición médica crónica, esta dimensión se encuentra por encima de los valores medios poblacionales regionales del ISF y del ISM. La “Salud General”, sin embargo, es la peor valorada estando por

debajo de los valores medios poblacionales de ambos índices. Los valores medios de los ISF e ISM, son superiores a los valores medios de población general (tabla A.44). Las dimensiones e índices de salud en función del sexo se representan en el gráfico 25 y se detallan en las tablas A.45, A.46, A.50, A.51 y A.52. De forma general, se observan diferencias estadísticamente significativas ($p<0,05$) entre las medias en hombres y mujeres de los Índices de Salud y todas las dimensiones. Los índices de salud por edad y sexo están representados en el gráfico 26 y detallados en las tablas A.47, A.48 y A.49, mostrando una tendencia descendente con la edad para el Índice Físico y mantenido para el Mental hasta el grupo de mayores de 75 años donde cae bruscamente.

Las condiciones médicas crónicas con valoración de CVRS (tabla A.53) más frecuentes en el área de Lorca fueron la “Artrosis y problemas reumáticos”, la “Hipertensión arterial”, la “Alergia”, la “Depresión” y el “Asma, bronquitis o enfisema”. El peor ISF medio fue para los ciudadanos que habían sufrido “Enfermedades del corazón”, seguido de los que tenían “Artrosis y problemas reumáticos” y “Diabetes mellitus”. El peor ISM se dio en los que tenían “Depresión”, seguido de los que habían padecido “Enfermedades del corazón” y “Asma, bronquitis o enfisema”.

Gráfico 23. Pirámides de población general y del Área de Salud de Lorca 2007.



Resultados expresados en porcentaje sobre el total de población. Fuente: encuesta de salud en población general. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Región de Murcia 2007.

Tabla 17. Encuesta de salud en población general. Características sociodemográficas. Área de Salud de Lorca 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	568	-	275	48,4	293	51,6
Grupos de edad						
18-24	68	12,0	37	12,5	31	10,6
25-34	141	24,9	79	26,8	62	21,2
35-44	114	20,1	61	20,8	53	18,1
45-54	81	14,3	42	14,3	39	13,3
55-64	63	11,2	32	10,8	31	10,6
65-74	51	9,1	24	8,2	27	9,2
≥ 75	48	8,4	19	6,6	29	9,9
Educación						
No saber leer ni escribir	26	4,6	10	3,6	16	5,5
Sabe leer y escribir	79	13,9	40	13,7	39	13,3
Estudios primarios	228	40,1	125	42,7	103	35,2
Estudios secundarios	130	22,8	70	23,9	60	20,5
Estudios superiores	105	18,5	47	15,9	58	19,8
NS/NC	1	0,1	1	0,2	0	0,0
Estado civil						
Soltero	170	30,0	100	34,1	70	23,9
Casado	335	58,9	176	59,9	159	54,3
Viudo	38	6,7	7	2,5	31	10,6
Separado/Divorciado	21	3,7	9	3,0	12	4,1
NS/NC	4	0,7	1	0,5	3	1,0
Vivir en pareja						
NO	196	34,4	91	31,1	105	35,8
SI	369	64,9	201	68,5	168	57,3
NS/NC	4	0,7	1	0,5	3	1,0
Actividad económica						
Trabajando	339	59,7	209	71,1	130	44,4
Baja de ≥ 3 meses	7	1,3	4	1,3	3	1,0
En desempleo	28	4,9	10	3,2	18	6,1
Jubilado/Pensionista	82	14,4	52	17,7	30	10,2
Estudiante	28	4,9	17	5,9	11	3,8
Labores del hogar	83	14,6	1	0,5	82	28,0
NS/NC	1	0,1	1	0,2	0	0,0

Tabla 18. Encuesta de salud en población general. Hábitos de vida. Área de Salud de Lorca 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	568	–	275	48,4	293	51,6
Consumo tabaco						
Diariamente	159	28,1	104	35,3	55	18,8
No diariamente	28	4,9	22	7,5	6	2,0
No actualmente, pero sí antes	109	19,3	78	26,6	31	10,6
No fuma, ni ha fumado nunca	271	47,7	90	30,6	181	61,8
NS/NC	0	0			0	0,0
Consumo alcohol						
Diariamente	143	25,2	101	34,4	42	14,3
No diariamente	230	40,4	131	44,5	99	33,8
No actualmente, pero sí antes	24	4,2	8	2,9	16	5,5
No nunca	172	30,2	54	18,3	118	40,3
NS/NC	0	0			0	0,0
Actividad física laboral						
Sentado	160	28,1	91	30,9	69	23,5
De pie	305	53,6	149	50,9	156	53,2
Caminando	93	16,4	44	14,9	49	16,7
Gran esfuerzo	9	1,5	9	3,0	0	0,0
NS/NC	2	0,4	1	0,4	1	0,3
Actividad física tiempo ocio						
No realiza	325	57,3	153	52,3	172	58,7
≥ 1 vez al mes	57	1,0	44	15,0	13	4,4
Varias veces a la semana	186	32,7	95	32,5	91	31,1
NS/NC	0	0	0	0	0	0,0

Tabla 19. Encuesta de salud en población general. Presencia de condiciones médicas crónicas. Área de Salud de Lorca 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	568	–	275	48,4	293	51,6
Sin condición médica crónica	232	40,8	135	46,0	97	33,1
Con alguna condición médica crónica	336	59,2	158	54,0	178	60,8
1 condición médica crónica	141	24,8	73	24,8	68	23,2
2 condiciones médicas crónicas	92	16,3	40	13,7	52	17,7
3 condiciones médicas crónicas	53	9,3	24	8,3	29	9,9
≥ 4 condiciones médicas crónicas	50	8,7	21	7,2	29	9,9

Tabla 20. Encuesta de salud en población general. Tipo de condición médica crónica declarada. Área de Salud de Lorca 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	568	–	275	48,4	293	51,6
Hipertensión arterial	118	20,7	53	18,1	65	22,2
Diabetes mellitus	41	7,3	26	9,0	15	5,1
Asma, bronquitis crónica, enfisema	49	8,6	27	9,0	22	7,5
Enfermedad del corazón	39	6,8	19	6,5	20	6,8
Alergia	113	19,9	51	17,6	62	21,2
Depresión	64	11,2	16	5,4	48	16,4
Artrosis y problemas reumáticos	158	27,7	63	21,6	95	32,4
Tumor maligno (5 últimos años)	16	2,9	8	2,9	8	2,7
Enfermedades del aparato digestivo	4	0,7	3	1,0	1	0,3
Enfermedades del aparato urinario y genital (masculino y femenino)	2	0,4	1	0,3	1	0,3
Osteopatías, condropatías y deformidades adquiridas músculoesqueléticas	4	0,6	0	0	4	1,4
Otras enfermedades mentales	1	0,2	1	0,4	0	0,0
Otras enfermedades pulmonares	1	0,1	1	0,2	0	0,0
Enfermedades de otorrinolaringología y otras del aparato respiratorio	3	0,5	3	1,0	0	0,0
Enfermedades endocrino-metabólicas (excepto DM)	4	0,7	1	0,2	3	1,0
Enfermedades vasculares	7	1,2	1	0,2	6	2,0
Enfermedades neurológicas	8	1,4	4	1,4	4	1,4
Enfermedades renales	3	0,6	3	0,9	0	0,0
Enfermedades hematológicas	1	0,2	0	0	1	0,3
Enfermedades oculares	6	1,0	2	0,6	4	1,4
Enfermedades dermatológicas	2	0,3	2	0,5	0	0,0
Dorsopatías	8	1,4	5	1,7	3	1,0
Colesterol alto	10	1,7	6	2,2	4	1,4

Tabla 21. Encuesta de salud en población general. Tiempo desde la última visita médica y utilización de servicios sanitarios en las cuatro últimas semanas. Área de Salud de Lorca 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	568	-	275	48,4	293	51,6
Tiempo desde la última visita a (AP o AE)						
≤ 4 semanas	196	34,5	83	28,3	113	38,6
> 4 semanas y < 1 año	309	54,5	171	58,1	138	47,1
≥ 1 año	63	11,0	40	13,6	23	7,8
NS/NC	0	0	0	0	0	0,0
Especialidad médica últimas 4 semanas					0	0,0
Medicina de Familia	150	26,4	57	19,4	93	31,7
Endocrinología	9	1,6	5	1,8	4	1,4
Traumatología	7	1,2	5	1,8	2	0,7
Ginecología	4	0,7	0	0	4	1,4
Otras especialidades	26	4,5	15	5,3	11	3,8
NS/NC	0	0	0	0	0	0,0
Total	196	34,5	83	28,3	113	38,6
Lugar de consulta					0	0,0
Centro salud/consultorio	143	25,2	56	19,1	87	29,7
Ambulatorio/CEP	4	0,8	4	1,5	0	0,0
Consulta externas de hospital	35	6,1	20	7,0	15	5,1
Urgencias de ambulatorio	6	1,1	0	0	6	2,0
Urgencias de hospital	3	0,6	0	0	3	1,0
Consulta médico particular	3	0,5	0	0	1	0,3
Consulta médico de una sociedad	1	0,2	2	0,7	1	0,3
Empresa o lugar de trabajo	0	0	0	0	0	0,0
Domicilio del sujeto de entrevista	0	0	0	0	0	0,0
Otro lugar	0	0	0	0	0	0,0
NS/NC	0	0	0	0	0	0,0
Total	196	34,5	83	28,3	113	38,6
Motivo consulta					0	0,0
Diagnóstico	87	15,3	36	12,2	51	17,4
Accidentes o agresión	4	0,6	1	0,4	3	1,0
Revisión	53	9,4	24	8,1	29	9,9
Sólo dispensación de recetas	45	7,9	20	6,8	25	8,5
Parte de baja, confirmación o alta	4	0,7	0	0	4	1,4
Otros motivos	3	0,5	2	0,8	1	0,3
NS/NC	0	0	0	0	0	0
Total	196	34,5	83	28,3	51	17,4

Tabla 22. Encuesta de salud en población general. Utilización de servicios sanitarios hospitalarios en el último año. Área de Salud de Lorca 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	568	–	275	48,4	293	51,6
Hospitalización en el último año						
NO	517	91,0	279	95,2	238	81,2
SI	51	9,0	14	4,8	37	12,6
NS/NC	0	0			0	0,0
Nº Hospitalizaciones*						
Una vez	43	7,5	13	4,3	30	10,2
Más de una vez	8	1,5	1	0,3	7	2,4
NS/NC					0	0,0
Total	51	9,0	14	4,8	27	9,2
Motivo hospitalización*						
Intervención Quirúrgica	16	2,8	5	1,8	11	3,8
Estudio médico diagnóstico	1	0,1	1	0,3	0	0,0
Tratamiento médico sin IQ	27	4,8	8	2,7	19	6,5
Parto (incluye cesárea)	7	1,3	0	0	7	2,4
Otros motivos	0	0	0	0	0	0,0
NS/NC	0	0	0	0	0	0,0
Total	51	9,0	14	4,8	27	9,2

(*) N° y Motivo de hospitalización calculado sobre el total de hospitalizaciones en el en el último año (n=51).

Gráfico 24. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica. Dimensiones e índices de salud en ambos sexos. Área de Salud de Lorca 2007.




Gráfico 25. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica. Área de Salud de Lorca 2007.




Gráfico 26. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Índices de salud por edad (años) y sexo. Área de Salud de Lorca 2007.



Las pirámides de población adulta de la Región y del Área de Salud del Noroeste se representan en el gráfico 27. La media de edad de los encuestados fue de 47,4 años (DE=19,0; mediana=44,0). El 50,4 % eran hombres, el 35,1% tenían estudios primarios, la mayoría estaban casados (65,9%) y con actividad económica trabajando el 54,4% (tabla 23).

Algo menos de la mitad de los encuestados afirmó no haber fumado nunca (47,0% en ambos sexos y el 63,7% de las mujeres). El 42,5% consumía alcohol, pero no diariamente. Más de la mitad realizaban una actividad laboral que no requería esfuerzo físico. Un 48,2% declaró no practicar actividad física en su tiempo de ocio (tabla 24).

El 60,4% de los encuestados declaró tener alguna condición médica crónica, de éstos un 13,7% padecía 4 ó más (tabla 25). La condición crónica más prevalente fue la artrosis y los problemas reumáticos (29,5%), sobre todo en mujeres (tabla 26).


Un 37,5% de los ciudadanos dijo haber consultado con un médico (de AP o AE) por algún problema de salud en el último mes. Las especialidades más consultadas después de Medicina Familiar y Comunitaria, fueron Ginecología, Traumatología y Psiquiatría (tabla 27). El motivo de consulta mas frecuente fue para realizar una revisión. Un 8,4 % de los ciudadanos declaró haber estado hospitalizado en el último año, destacando la hospitalización para intervención quirúrgica (tabla 28).

Las puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud, para ambos sexos y según la presencia o no de alguna condición médica crónica, se muestran en el gráfico 28. La “Vitalidad” fue la dimensión mejor valorada en todos los casos, independientemente de la presencia o no de alguna condición médica crónica. Para los que no presentaron ninguna condición médica crónica, esta dimensión se encuentra por encima de los valores medios poblaciones regionales del ISF y del ISM. La “Salud General”, sin embargo, es la peor valorada estando por debajo de los valores medios poblacionales de ambos

índices. Los valores medios de los ISF e ISM, son inferiores a los valores medios de población general, sobre todo para el segundo de éstos (tabla A.54). Las dimensiones e índices de salud en función del sexo se representan en el gráfico 29 y se detallan en las tablas A.55, A.56, A.60, A.61 y A.62. Para toda la población y de forma general, se observan diferencias estadísticamente significativas ($p<0,05$) entre las medias de hombres y mujeres en los Índices de Salud y en todas las dimensiones. Los índices de salud por edad y sexo están representados en el gráfico 30 y detallados en las tablas A.57, A.58 y A.59, mostrando una tendencia descendente con la edad para el Índice Físico y mantenido para el Mental en hombres, pero no en mujeres, que cae paulatinamente al aumentar la edad.

Las condiciones médicas crónicas con valoración de CVRS (tabla A.63) más frecuentes en el área del Noroeste fueron la “Artrosis y problemas reumáticos”, la “Hipertensión arterial”, la “Alergia”, la “Depresión” y la “Diabetes mellitus”. El peor ISF medio fue para los ciudadanos que padecían “Enfermedades del corazón” seguido de los sufrieron un “Tumor maligno en los 5 últimos años”. El peor ISM se dio en los que tenían “Depresión”.

Gráfico 27 Pirámides de población general y del Área de Salud del Noroeste 2007.



Resultados expresados en porcentaje sobre el total de población. Fuente: encuesta de salud en población general. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Región de Murcia 2007.

Tabla 23. Encuesta de salud en población general. Características sociodemográficas. Área de Salud de Noroeste 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	560	–	282	50,4	278	49,6
Grupos de edad						
18-24	61	11,0	31	11,1	30	10,8
25-34	112	20,1	59	20,9	53	19,1
35-44	109	19,6	57	20,3	52	18,7
45-54	87	15,5	44	15,7	43	15,5
55-64	65	11,6	32	11,4	33	11,9
65-74	62	11,0	29	10,2	33	11,9
≥ 75	64	11,3	29	10,3	35	12,6
Educación						
No saber leer ni escribir	28	5,1	9	3,1	19	6,8
Sabe leer y escribir	104	18,6	48	17,0	56	20,1
Estudios primarios	197	35,1	104	37,1	93	33,5
Estudios secundarios	110	19,7	66	23,4	44	15,8
Estudios superiores	114	20,3	51	18,2	63	22,7
NS/NC	7	1,2	3	1,2	4	1,4
Estado civil						
Soltero	139	24,8	83	29,6	56	20,1
Casado	369	65,9	187	66,3	182	65,5
Viudo	37	6,6	8	2,7	29	10,4
Separado/Divorciado	10	1,8	2	0,7	8	2,9
NS/NC	5	0,9	2	0,8	3	1,1
Vivir en pareja						
NO	162	28,9	78	27,8	84	30,2
SI	392	70,1	200	71,1	192	69,1
NS/NC	6	1,1	3	1,0	3	1,1
Actividad económica						
Trabajando	305	54,4	181	64,4	124	44,6
Baja de ≥ 3 meses	7	1,2	6	2,0	1	0,4
En desempleo	23	4,0	9	3,2	14	5,0
Jubilado/Pensionista	122	21,8	74	26,3	48	17,3
Estudiante	23	4,1	11	3,8	12	4,3
Labores del hogar	80	14,4	0	0	80	28,8
NS/NC	1	0,1	0		1	0,4

Tabla 24. Encuesta de salud en población general. Hábitos de vida. Área de Salud de Noroeste 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	560	–	282	50,4	278	49,6
Consumo tabaco						
Diariamente	161	28,8	90	32,1	71	25,5
No diariamente	31	5,5	25	8,8	6	2,2
No actualmente, pero sí antes	104	18,6	79	28,1	25	9,0
No fuma, ni ha fumado nunca	263	47,0	86	30,7	177	63,7
NS/NC	1	0,1	1	0,2	0	0,0
Consumo alcohol						
Diariamente	146	26,1	113	40,1	33	11,9
No diariamente	238	42,5	110	39,2	128	46,0
No actualmente, pero sí antes	19	3,5	14	4,9	5	1,8
No nunca	154	27,6	42	15,1	112	40,3
NS/NC	2	0,3	2	0,7	0	0,0
Actividad física laboral						
Sentado	191	34,1	101	36,0	90	32,4
De pie	273	48,7	114	40,3	159	57,2
Caminando	73	13,0	46	16,3	27	9,7
Gran esfuerzo	22	4,0	19	6,8	3	1,1
NS/NC	1	0,3	1	0,5	0	0,0
Actividad física tiempo ocio						
No realiza	270	48,2	118	41,8	152	54,7
≥ 1 vez al mes	68	12,2	38	13,4	30	10,8
Varias veces a la semana	222	39,6	126	44,8	96	34,5
NS/NC	0	0	0	0	0	0,0

Tabla 25. Encuesta de salud en población general. Presencia de condiciones médicas crónicas. Área de Salud de Noroeste 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	560	–	282	50,4	278	49,6
Sin condición médica crónica	222	39,6	116	41,1	106	38,1
Con alguna condición médica crónica	338	60,4	166	58,9	172	61,9
1 condición médica crónica	116	20,8	62	22,2	54	19,4
2 condiciones médicas crónicas	75	13,4	40	14,0	35	12,6
3 condiciones médicas crónicas	70	12,6	36	12,7	34	12,2
≥ 4 condiciones médicas crónicas	77	13,7	28	9,9	49	17,6

Tabla 26. Encuesta de salud en población general. Tipo de condición médica crónica declarada. Área de Salud de Noroeste 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	560	–	282	50,4	278	49,6
Hipertensión arterial	117	20,9	54	19,1	63	22,7
Diabetes mellitus	60	10,8	30	10,5	30	10,8
Asma, bronquitis crónica, enfisema	53	9,5	28	9,9	25	9,0
Enfermedad del corazón	36	6,4	22	7,8	14	5,0
Alergia	93	16,5	47	16,7	46	16,5
Depresión	78	13,9	23	8,3	55	19,8
Artrosis y problemas reumáticos	165	29,5	68	24,2	97	34,9
Tumor maligno (5 últimos años)	7	1,3	3	1,2	4	1,4
Enfermedades del aparato digestivo	10	1,8	7	2,5	3	1,1
Enfermedades del aparato urinario y genital (masculino y femenino)	7	1,3	1	0,2	6	2,2
Osteopatías, condropatías y deformidades adquiridas						
músculo-esqueléticas	4	0,7	3	1,0	1	0,4
Otras enfermedades mentales	5	1,0	3	1,2	2	0,7
Otras enfermedades pulmonares	2	0,3	1	0,3	1	0,4
Enfermedades de otorrinolaringología y otras del aparato respiratorio	5	0,8	4	1,3	1	0,4
Enfermedades endocrino-metabólicas (excepto DM)	9	1,6	4	1,6	5	1,8
Enfermedades vasculares	10	1,8	5	1,6	5	1,8
Enfermedades neurológicas	18	3,2	4	1,4	14	5,0
Enfermedades renales	3	0,6	1	0,5	2	0,7
Enfermedades hematológicas	3	0,6	1	0,4	2	0,7
Enfermedades oculares	4	0,8	4	1,2	0	0,0
Enfermedades dermatológicas	2	0,3	2	0,6	0	0,0
Dorsopatías	6	1,1	4	1,4	2	0,7
Colesterol alto	33	5,8	9	3,4	24	8,6

Tabla 27. Encuesta de salud en población general. Tiempo desde la última visita médica y utilización de servicios sanitarios en las cuatro últimas semanas. Área de Salud de Noroeste 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	560	–	282	50,4	278	49,6
Tiempo desde la última visita a (AP o AE)						
≤ 4 semanas	210	37,5	88	31,1	122	43,9
> 4 semanas y < 1 año	278	49,6	150	53,4	128	46,0
≥ 1 año	71	12,7	43	15,1	28	10,1
NS/NC	1	0,2	1	0,3	0	0,0
Especialidad médica últimas 4 semanas					0	0,0
Medicina de Familia	159	28,4	65	23,2	94	33,8
Ginecología	9	1,6	0	0	9	3,2
Traumatología	8	1,5	6	2,0	2	0,7
Psiquiatría	6	1,1	0	0	6	2,2
Cardiología	5	0,8	3	1,0	2	0,7
Otras especialidades	23	4,1	14	4,9	9	3,2
NS/NC	0	0			0	0,0
Total	210	37,5	88	31,1	122	43,9
Lugar de consulta					0	0,0
Centro salud/consultorio	133	23,8	52	18,5	81	29,1
Ambulatorio/CEP	17	3,0	6	2,3	11	4,0
Consulta externas de hospital	34	6,1	18	6,4	16	5,8
Urgencias de ambulatorio	3	0,5	1	0,4	2	0,7
Urgencias de hospital	5	0,8	2	0,7	3	1,1
Consulta médico particular	7	1,2	2	0,7	5	1,8
Consulta médico de una sociedad	10	1,7	5	1,7	5	1,8
Empresa o lugar de trabajo	0	0	0	0	0	0,0
Domicilio del sujeto de entrevista	2	0,4	1	0,4	1	0,4
Otro lugar	0	0			0	0,0
NS/NC	0	0				
Total	210	37,5	88	31,1	122	43,9
Motivo consulta					0	0,0
Diagnóstico	79	14,0	26	9,2	53	19,1
Accidentes o agresión	1	0,1	1	0,2	0	0,0
Revisión	69	12,3	33	11,8	36	12,9
Sólo dispensación de recetas	54	9,6	23	8,1	31	11,2
Parte de baja, confirmación o alta	3	0,5	3	1,0	0	0,0
Otros motivos	5	1,0	2	0,7	3	1,1
NS/NC	0	0	0	0	0	0,0
Total	210	37,5	88	31,1	122	43,9

Tabla 28. Encuesta de salud en población general. Utilización de servicios sanitarios hospitalarios en el último año. Área de Salud de Noroeste 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	560	–	282	50,4	278	49,6
Hospitalización en el último año						
NO	513	91,6	258	91,5	255	91,7
SI	47	8,4	24	8,5	23	8,3
NS/NC	0	0				
Nº Hospitalizaciones*						
Una vez	41	7,3	19	6,9	22	7,9
Más de una vez	6	1,1	4	1,6	2	0,7
NS/NC	0	0			0	0,0
Total	47	8,4	24	8,5	23	8,3
Motivo hospitalización*						
Intervención Quirúrgica	19	3,4	11	3,8	8	2,9
Estudio médico diagnóstico	3	0,5	2	0,7	1	0,4
Tratamiento médico sin IQ	18	3,1	11	4,0	7	2,5
Parto (incluye cesárea)	8	1,4	0	0	8	2,9
Otros motivos	0	0	0	0	0	0,0
NS/NC	0	0	0	0	0	0,0
Total	47	8,4	24	8,5	23	8,3

(*) N° y Motivo de hospitalización calculado sobre el total de hospitalizaciones en el en el último año (n=47).

Gráfico 28. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica. Dimensiones e índices de salud en ambos sexos. Área de Salud del Noroeste 2007.




Gráfico 29. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica. Dimensiones e índices de salud por sexo. Área de Salud del Noroeste 2007.








Gráfico 30. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Índices de salud por edad (años) y sexo. Área de Salud del Noroeste 2007.



ÁREA DE SALUD DEL ALTIPLANO

Las pirámides de población adulta de la Región y del Área de Salud del Altiplano se representan en el gráfico 31. La media de edad de los encuestados fue de 44,7 años (DE=18,4; mediana=40,0). El 50,8 % eran hombres; tenían estudios primarios el 43,7%, la mayoría estaban casados (66,3%) y con actividad económica trabajando un 59,9% (tabla 29).

Casi la mitad de los encuestados afirmó no haber fumado nunca (49,7% en ambos sexos y el 61,5 % de las mujeres). El 44,1% consumía alcohol, pero no diariamente. Más de la mitad realizaban una actividad laboral que no requería esfuerzo físico. Un 54,9% declaró no practicar actividad física en su tiempo de ocio (tabla 30).

El 56,9% de los encuestados declaró tener alguna condición médica crónica, de éstos un 9,5% padecía 4 ó más (tabla 31). La condición crónica más prevalente fue la artrosis y los problemas reumáticos (23,9%), sobre todo en mujeres (tabla 32).


Un 33,0% de los ciudadanos dijo haber consultado con un médico (de AP o AE) por algún problema de salud en el último mes. Las especialidades más consultadas después de Medicina Familiar y Comunitaria, fueron Traumatología, Ginecología y Oftalmología (tabla 33). El motivo de consulta más frecuente fue para la realización de un diagnóstico. Un 6,9 % de los ciudadanos declaró haber estado hospitalizado en el último año, destacando la hospitalización para intervención quirúrgica (tabla 34).

Las puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud, para ambos sexos y según la presencia o no de alguna condición médica crónica, se muestran en el gráfico 32. La “Vitalidad” fue la dimensión mejor valorada en todos los casos, independientemente de la presencia o no de alguna condición médica crónica. Para los que no presentaron ninguna condición médica crónica, esta dimensión se encuentra por encima de los valores medios poblaciones regionales del ISF y del ISM. La “Salud General”, sin embargo, es la peor valorada estando por debajo de los valores medios poblacionales de am-

bos índices. Los valores medios de los ISF e ISM, fueron similares a los valores medios de población general respecto al primero de éstos y superiores respecto al segundo (tabla A.64). Las dimensiones e índices de salud en función del sexo se representan en el gráfico 33 y se detallan en las tablas A.65, A.66, A.70, A.71 y A.72. Para toda la población y de forma general, se observan diferencias estadísticamente significativas ($p<0,05$) entre las medias en hombres y mujeres para el ISM y para todas las dimensiones, excepto para la “Salud General” y la “Función Social”. Los índices de salud por edad y sexo están representados en el gráfico 34 y detallados en las tablas A.67, A.68 y A.69, mostrando una tendencia descendente con la edad para el Índice Físico y mantenido para el Mental.

Las condiciones médicas crónicas con valoración de CVRS (tabla A.73) más frecuentes en el área del Altiplano fueron la “Artrosis y problemas reumáticos”, la “Hipertensión arterial”, la “Alergia, y la “Depresión”. El peor ISF medio fue para los ciudadanos que padecían “Diabetes mellitus”, seguido de los que tenían artrosis y problemas reumáticos. El peor ISM se dio en los que tenían “Depresión”, seguido de los que tenían alguna “Enfermedad del corazón”.

Gráfico 31. Pirámides de población general y del área de salud del Altiplano 2007.



Resultados expresados en porcentaje sobre el total de población. Fuente: encuesta de salud en población general. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Región de Murcia 2007.

Tabla 29. Encuesta de salud en población general. Características sociodemográficas. Área de Salud del Altiplano 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	565	–	287	50,8	278	49,2
Grupos de edad						
18-24	69	12,3	36	12,5	33	11,9
25-34	137	24,2	73	25,5	64	23,0
35-44	114	20,1	60	21,0	54	19,4
45-54	87	15,5	45	15,7	42	15,1
55-64	60	10,5	30	10,4	30	10,8
65-74	47	8,3	22	7,6	25	9,0
≥ 75	51	9,1	21	7,4	30	10,8
Educación						
No saber leer ni escribir	13	2,3	2	0,8	11	4,0
Sabe leer y escribir	63	11,1	23	8,0	40	14,4
Estudios primarios	247	43,7	141	48,9	106	38,1
Estudios secundarios	145	25,6	71	24,8	74	26,6
Estudios superiores	94	16,7	47	16,5	47	16,9
NS/NC	4	0,6	3	0,9	1	0,4
Estado civil						
Soltero	142	25,1	81	28,1	61	21,9
Casado	375	66,3	195	67,8	180	64,7
Viudo	28	5,0	2	0,7	26	9,4
Separado/Divorciado	19	3,3	9	3,2	10	3,6
NS/NC	2	0,3	1	0,2	1	0,4
Vivir en pareja						
NO	157	27,8	80	27,7	77	27,7
SI	407	72,0	207	72,1	200	71,9
NS/NC	2	0,3	1	0,2	1	0,4
Actividad económica						
Trabajando	339	59,9	209	72,7	130	46,8
Baja de ≥ 3 meses	12	2,1	9	3,0	3	1,1
En desempleo	21	3,8	8	2,8	13	4,7
Jubilado/Pensionista	88	15,5	51	17,6	37	13,3
Estudiante	18	3,1	8	2,9	10	3,6
Labores del hogar	84	14,9	0	0	84	30,2
NS/NC	4	0,6	3	0,9	1	0,4

Tabla 30. Encuesta de salud en población general. Hábitos de vida. Área de Salud del Altiplano 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	565	–	287	50,8	278	49,2
Consumo tabaco						
Diariamente	162	28,7	90	31,2	72	25,9
No diariamente	23	4,0	21	7,3	2	0,7
No actualmente, pero sí antes	99	17,5	67	23,4	32	11,5
No fuma, ni ha fumado nunca	281	49,7	110	38,1	171	61,5
NS/NC	1	0,1	0	0,0	1	0,4
Consumo alcohol						
Diariamente	131	23,2	96	33,3	35	12,6
No diariamente	249	44,1	125	43,4	124	44,6
No actualmente, pero sí antes	20	3,6	12	4,2	8	2,9
No nunca	164	29,0	54	18,7	110	39,6
NS/NC	1	0,2	1	0,3	0	0,0
Actividad física laboral						
Sentado	163	28,9	73	25,5	90	32,4
De pie	331	58,5	165	57,3	166	59,7
Caminando	53	9,3	34	11,8	19	6,8
Gran esfuerzo	17	3,1	16	5,4	1	0,4
NS/NC	1	0,2	0	0,0	1	0,4
Actividad física tiempo ocio						
No realiza	310	54,9	135	47,1	175	62,9
≥ 1 vez al mes	66	11,7	41	14,4	25	9,0
Varias veces a la semana	188	33,3	111	38,5	77	27,7
NS/NC	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Tabla 31. Encuesta de salud en población general. Presencia de condiciones médicas crónicas. Área de Salud del Altiplano 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	565	–	287	50,8	278	49,2
Sin condición médica crónica	244	43,1	111	38,4	133	47,8
Con alguna condición médica crónica	321	56,9	177	61,6	144	51,8
1 condición médica crónica	137	24,3	86	30,0	51	18,3
2 condiciones médicas crónicas	80	14,1	45	15,6	35	12,6
3 condiciones médicas crónicas	51	9,0	23	8,1	28	10,1
≥ 4 condiciones médicas crónicas	54	9,5	23	7,9	31	11,2

Tabla 32. Encuesta de salud en población general. Tipo de condición médica crónica declarada. Área de Salud del Altiplano 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	565	–	287	50,8	278	49,2
Hipertensión arterial	106	18,8	48	16,9	58	20,9
Diabetes mellitus	34	6,0	18	6,1	16	5,8
Asma, bronquitis crónica, enfisema	50	8,9	27	9,5	23	8,3
Enfermedad del corazón	37	6,6	20	6,9	17	6,1
Alergia	101	17,8	56	19,6	45	16,2
Depresión	52	9,1	19	6,5	33	11,9
Artrosis y problemas reumáticos	135	23,9	53	18,5	82	29,5
Tumor maligno (5 últimos años)	7	1,3	3	1,0	4	1,4
Enfermedades del aparato digestivo	8	1,5	6	2,1	2	0,7
Enfermedades del aparatomurinario y genital (masculino y femenino)	2	0,3	1	0,3	1	0,4
Osteopatías, condropatías y deformidades adquiridas						
músculo-esqueléticas	7	1,2	2	0,8	5	1,8
Otras enfermedades mentales	3	0,5	1	0,2	2	0,7
Otras enfermedades pulmonares	2	0,3	0	0	2	0,7
Enfermedades de otorrinolaringología y otras del aparato respiratorio	6	1,0	5	1,7	1	0,4
Enfermedades endocrino-metabólicas (excepto DM)	9	1,6	4	1,4	5	1,8
Enfermedades vasculares	6	1,0	1	0,3	5	1,8
Enfermedades neurológicas	11	1,9	9	3,1	2	0,7
Enfermedades renales	7	1,2	3	1,1	4	1,4
Enfermedades hematológicas	3	0,6	2	0,6	1	0,4
Enfermedades oculares	7	1,3	4	1,4	3	1,1
Enfermedades dermatológicas	3	0,5	1	0,4	2	0,7
Dorsopatías	8	1,3	6	2,0	2	0,7
Colesterol alto	13	2,3	8	2,8	5	1,8

Tabla 33. Encuesta de salud en población general. Tiempo desde la última visita médica y utilización de servicios sanitarios en las cuatro últimas semanas. Área de Salud del Altiplano 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	565	–	287	50,8	278	49,2
Tiempo desde la última visita a (AP o AE)						
≤ 4 semanas	186	33,0	82	28,6	104	37,4
> 4 semanas y < 1 año	300	53,2	153	53,3	147	52,9
≥ 1 año	76	13,4	50	17,3	26	9,4
NS/NC	2	0,4	2	0,9	0	0,0
Especialidad médica últimas 4 semanas					0	0,0
Medicina de Familia	143	25,3	60	20,7	83	29,9
Traumatología	9	1,5	6	2,1	3	1,1
Ginecología	5	1,0	0	0	5	1,8
Oftalmología	4	0,7	2	0,8	2	0,7
Otras especialidades	26	5	14	5,0	12	4,3
NS/NC	0	0			0	0,0
Total	186	33,0	82	28,6	104	37,4
Lugar de consulta						
Centro salud/consultorio	131	23,2	50	17,3	81	29,1
Ambulatorio/CEP	6	1,1	4	1,3	2	0,7
Consulta externas de hospital	25	4,5	15	5,1	10	3,6
Urgencias de ambulatorio	5	0,9	5	1,8	0	0,0
Urgencias de hospital	3	0,5	0	0,2	3	1,1
Consulta médico particular	2	0,3	2	0,6	0	0,0
Consulta médico de una sociedad	12	2,2	7	2,3	5	1,8
Empresa o lugar de trabajo	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Domicilio del sujeto de entrevista	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Otro lugar	2	0,3	0	0,0	2	0,7
NS/NC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	186	33,0	82	28,6	104	37,4
Motivo consulta						
Diagnóstico	78	13,8	33	11,6	45	16,2
Accidentes o agresión	3	0,5	3	0,9	0	0,0
Revisión	55	9,7	27	9,3	28	10,1
Sólo dispensación de recetas	42	7,4	17	6,1	25	9,0
Parte de baja, confirmación o alta	3	0,5	1	0,3	2	0,7
Otros motivos	6	1,1	1	0,3	5	1,8
NS/NC	0	0	0	0,0	0	0,0
Total	186	33,0	82	28,6	104	37,4

Tabla 34. Encuesta de salud en población general. Utilización de servicios sanitarios hospitalarios en el último año. Área de Salud del Altiplano 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	565	–	287	50,8	278	49,2
Hospitalización en el último año						
NO	525	92,9	269	93,7	256	92,1
SI	38	6,8	16	5,7	22	7,9
NS/NC	2	0,3	2	0,6	0	0,0
Nº Hospitalizaciones*						
Una vez	34	6,0	13	4,3	21	7,6
Más de una vez	4	0,7	3	1,1	1	0,4
NS/NC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	38	6,8	16	5,7	22	8,0
Motivo hospitalización*						
Intervención Quirúrgica	18	3,3	6	2,1	12	4,3
Estudio médico diagnóstico	4	0,7	2	0,9	2	0,7
Tratamiento médico sin IQ	9	1,7	8	2,8	1	0,4
Parto (incluye cesárea)	6	1,1	0	0,0	6	2,2
Otros motivos	0	0,0	0	0,0	0	0,0
NS/NC	4	0,7	0	0,0	4	1,4
Total	38	6,8	16	5,7	22	8,0

(*) N° y Motivo de hospitalización calculado sobre el total de hospitalizaciones en el en el último año (n=38).

Gráfico 32. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica. Dimensiones e índices de salud en ambos sexos. Área de Salud del Altiplano 2007.




Gráfico 33. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica. Dimensiones e índices de salud por sexo. Área de Salud del Altiplano 2007.








Gráfico 34. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Índices de salud por edad (años) y sexo. Área de Salud del Altiplano, 2007.



Las pirámides de población adulta de la Región y del Área de Salud de la Vega del Segura se representan en el gráfico 35. La media de edad de los encuestados fue de 44,5 años (DE=17,8; mediana=41,00). El 50,6% eran hombres; el 28,9% tenían estudios primarios, la mayoría estaban casados (66,6%) y con actividad económica trabajando el 60,3% (tabla 35).

La mitad de los encuestados afirmó no haber fumado nunca (50,0% en ambos sexos y el 64,6% de las mujeres). El 35,9% consumía alcohol, pero no diariamente. Más de la mitad realizaban una actividad laboral que no requería esfuerzo físico. Un 50,2% declaró no practicaba actividad física en su tiempo de ocio (tabla 36).

El 61,1% de los encuestados declaró tener alguna condición médica crónica, de éstos un 12,7% padecía 4 ó más (tabla 37). La condición crónica más prevalente fue la artrosis y los problemas reumáticos (31,5%), sobre todo en mujeres (tabla 38).


Un 39,2% de los ciudadanos dijo haber consultado con un médico (de AP o AE) por algún problema de salud en el último mes. Las especialidades más consultadas después de Medicina Familiar y Comunitaria, fueron Ginecología, Cardiología, Oftalmología (tabla 39). El motivo de consulta más frecuente fue para la búsqueda de un diagnóstico. Un 8,1 % de los ciudadanos declaró haber estado hospitalizado en el último año, destacando la hospitalización para intervención quirúrgica (tabla 40).

Las puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud, para ambos sexos y según la presencia o no de alguna condición médica crónica, se muestran en el gráfico 36. La “Vitalidad” fue la dimensión mejor valorada en todos los casos, independientemente de la presencia o no de alguna condición médica crónica. Para los que no presentaron ninguna condición médica crónica, esta dimensión se encuentra por encima de los valores medios poblaciones regionales del ISF y del ISM. La “Salud General”, sin embargo, es la peor valorada estando por debajo de los valores medios poblacionales de ambos

índices. Los valores medios de los ISF e ISM, fueron superiores a los valores medios de población general (tabla A.74). Las dimensiones e índices de salud en función del sexo se representan en el gráfico 37 y se detallan en las tablas A.75, A.76, A.80, A.81 y A.82. Para toda la población y de forma general, se observan diferencias estadísticamente significativas ($p<0,05$) entre las medias de hombres y mujeres en los Índices de Salud y todas las dimensiones. Los índices de salud por edad y sexo están representados en el gráfico 38 y detallados en las tablas A.77, A.78 y A.79, mostrando una tendencia descendente con la edad para el Índice Físico y mantenido para el Mental para el hombre, y fluctuante para la mujer.

Las condiciones médicas crónicas con valoración de CVRS (tabla A.83) más frecuentes en el área de la Vega del Segura fueron la “Artrosis y problemas reumáticos”, la “Hipertensión arterial”, la “Alergia, la “Depresión” y el “Ama, bronquitis o enfisema”. El peor ISF medio fue para los ciudadanos que padecían “Enfermedad del corazón”, seguido de los que tenían “Asma, bronquitis o enfisema”. El peor ISM se dio en los que tenían “Depresión”, seguido de los que habían padecido algún “Tumor maligno en los 5 últimos años”.

Gráfico 35. Pirámides de población general y del Área de Salud de la Vega del Segura 2007.



Resultados expresados en porcentaje sobre el total de población. Fuente: encuesta de salud en población general. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Región de Murcia 2007.

Tabla 35. Encuesta de salud en población general. Características sociodemográficas. Área de Salud Vega del Segura 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	567	–	287	50,6	280	49,4
Grupos de edad						
18-24	69	12,2	36	12,4	33	11,8
25-34	135	23,8	72	25,1	63	22,5
35-44	121	21,3	63	22,0	58	20,7
45-54	85	15,1	44	15,3	41	14,6
55-64	62	11,0	31	10,7	31	11,1
65-74	50	8,8	24	8,2	26	9,3
≥ 75	45	7,9	18	6,2	27	9,6
Educación						
No saber leer ni escribir	39	6,9	11	3,9	28	10,0
Sabe leer y escribir	88	15,5	39	13,7	49	17,5
Estudios primarios	164	28,9	90	31,2	74	26,4
Estudios secundarios	161	28,3	95	33,1	66	23,6
Estudios superiores	112	19,8	51	17,6	61	21,8
NS/NC	3	0,5	1	0,4	2	0,7
Estado civil						
Soltero	151	26,6	83	28,8	68	24,3
Casado	377	66,6	198	68,9	179	63,9
Viudo	30	5,3	4	1,6	26	9,3
Separado/Divorciado	7	1,2	2	0,7	5	1,8
NS/NC	2	0,3	0	0	2	0,7
Vivir en pareja						
NO	153	27,0	76	26,3	77	27,5
SI	412	72,7	212	73,7	200	71,4
NS/NC	2	0,3	0	0	1	0,4
Actividad económica						
Trabajando	342	60,3	206	71,6	136	48,6
Baja de ≥ 3 meses	8	1,4	5	1,7	3	1,1
En desempleo	14	2,5	8	2,8	6	2,1
Jubilado/Pensionista	94	16,5	56	19,5	38	13,6
Estudiante	25	4,3	13	4,5	12	4,3
Labores del hogar	83	14,6	0	0	83	29,6
NS/NC	2	0,3	0	0	2	0,7

Tabla 36. Encuesta de salud en población general. Hábitos de vida. Área de Salud de la Vega del Segura 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	567	–	287	50,6	280	49,4
Consumo tabaco						
Diariamente	136	24,0	81	28,1	55	19,6
No diariamente	24	4,2	19	6,5	5	1,8
No actualmente, pero sí antes	124	21,8	85	29,7	39	13,9
No fuma, ni ha fumado nunca	283	50,0	102	35,6	181	64,6
NS/NC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Consumo alcohol	7					
Diariamente	180	31,8	125	43,7	55	19,6
No diariamente	204	35,9	99	34,4	105	37,5
No actualmente, pero sí antes	21	3,7	12	4,1	9	3,2
No nunca	162	28,6	51	17,8	111	39,6
NS/NC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Actividad física laboral						
Sentado	154	27,1	85	29,6	69	24,6
De pie	358	63,1	168	58,4	190	67,9
Caminando	43	7,6	22	7,5	21	7,5
Gran esfuerzo	13	2,2	13	4,4	0	0,0
NS/NC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Actividad física tiempo ocio						
No realiza	285	50,2	138	48,2	147	52,5
≥ 1 vez al mes	50	8,8	32	11,3	18	6,4
Varias veces a la semana	233	41,0	116	40,5	117	41,8
NS/NC	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Tabla 37. Encuesta de salud en población general. Presencia de condiciones médicas crónicas. Área de Salud de la Vega del Segura 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	567	–	287	50,6	280	49,4
Sin condición médica crónica	220	38,9	125	43,5	95	34,2
Con alguna condición médica crónica	347	61,1	162	56,5	185	66,5
1 condición médica crónica	139	24,4	72	25,2	67	24,1
2 condiciones médicas crónicas	80	14,1	35	12,1	45	16,2
3 condiciones médicas crónicas	56	9,9	28	9,7	28	10,1
≥ 4 condiciones médicas crónicas	72	12,7	27	9,5	45	16,2

Tabla 38. Encuesta de salud en población general. Tipo de condición médica crónica declarada. Área de Salud de la Vega del Segura 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	567	–	287	50,6	280	49,4
Hipertensión arterial	128	22,6	53	18,4	75	27,0
Diabetes mellitus	36	6,4	19	6,5	17	6,1
Asma, bronquitis crónica, enfisema	50	8,8	26	9,1	24	8,6
Enfermedad del corazón	44	7,7	21	7,4	23	8,3
Alergia	119	21,0	64	22,4	55	19,8
Depresión	62	11,0	15	5,3	47	16,9
Artrosis y problemas reumáticos	179	31,5	69	24,1	110	39,6
Tumor maligno (5 últimos años)	9	1,7	5	1,6	4	1,4
Enfermedades del aparato digestivo	13	2,3	4	1,5	9	3,2
Enfermedades del aparato urinario y genital (masculino y femenino)	7	1,2	3	1,2	4	1,4
Osteopatías, condropatías y deformidades adquiridas músculoesqueléticas	4	0,8	4	1,2	0	0,0
Otras enfermedades mentales	0	0	0	0	0	0,0
Otras enfermedades pulmonares	1	0,2	1	0,3	0	0,0
Enfermedades de otorrinolaringología y otras del aparato respiratorio	4	0,8	3	1,0	1	0,4
Enfermedades endocrino-metabólicas (excepto DM)	5	0,9	2	0,6	3	1,1
Enfermedades vasculares	5	0,9	2	0,6	3	1,1
Enfermedades neurológicas	5	0,9	2	0,8	3	1,1
Enfermedades renales	7	1,2	3	1,0	4	1,4
Enfermedades hematológicas	2	0,3	0	0	2	0,7
Enfermedades oculares	10	1,8	3	1,2	7	2,5
Enfermedades dermatológicas	13	2,3	0	0	13	4,7
Dorsopatías	15	2,6	7	2,6	8	2,9
Colesterol alto	13	2,3	9	3,3	4	1,4

Tabla 39. Encuesta de salud en población general. Tiempo desde la última visita médica y utilización de servicios sanitarios en las cuatro últimas semanas. Área de Salud de la Vega del Segura 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	567	–	287	50,6	280	49,4
Tiempo desde la última visita a (AP o AE)						
≤ 4 semanas	222	39,2	100	34,8	122	43,9
> 4 semanas y < 1 año	291	51,4	145	50,6	146	52,5
≥ 1 año	52	9,2	42	14,6	10	3,6
NS/NC	1	0,1	0	0,0	1	0,4
Especialidad médica últimas 4 semanas						
Medicina de Familia	183	32,3	80	28,0	103	37,1
Ginecología	8	1,4	0	0	8	2,9
Cardiología	5	0,8	3	1,1	2	0,7
Oftalmología	5	0,9	2	0,7	3	1,1
Traumatología	4	0,7	2	0,8	2	0,7
Otras especialidades	17	3,0	12	4,1	5	1,8
NS/NC	0	0	0	0	0	0,0
Total	222	39,2	100	34,8	122	43,9
Lugar de consulta						
Centro salud/consultorio	181	32,0	77	26,9	104	37,4
Ambulatorio/CEP	4	0,7	2	0,8	2	0,7
Consulta externas de hospital	29	5,1	15	5,2	14	5,0
Urgencias de ambulatorio	0	0	0	0	0	0,0
Urgencias de hospital	1	0,1	1	0,3	0	0,0
Consulta médico particular	1	0,1	1	0,2	0	0,0
Consulta médico de una sociedad	7	1,2	4	1,3	3	1,1
Empresa o lugar de trabajo	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Domicilio del sujeto de entrevista	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Otro lugar	0	0,0	0	0,0	0	0,0
NS/NC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	222	39,2	100	34,8	122	43,9
Motivo consulta						
Diagnóstico	90	16,0	41	14,4	49	17,6
Accidentes o agresión	2	0,4	0	0,0	2	0,7
Revisión	73	12,8	40	13,8	33	11,9
Sólo dispensación de recetas	55	9,8	18	6,3	37	13,3
Parte de baja, confirmación o alta	1	0,1	1	0,2	0	0,0
Otros motivos	1	0,1	0	0,0	1	0,4
NS/NC	0	0	0	0,0	0	0,0
Total	222	39,2	100	34,8	122	43,9

Tabla 40. Encuesta de salud en población general. Utilización de servicios sanitarios hospitalarios en el último año. Área de Salud de la Vega del Segura 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	567	–	287	50,6	280	49,4
Hospitalización en el último año						
NO	521	91,9	266	92,6	255	91,7
SI	46	8,1	21	7,4	25	9,0
NS/NC	0	0	0	0	0	0,0
Nº Hospitalizaciones*						
Una vez	42	7,2	17	5,9	25	9,0
Más de una vez	4	0,6	3	1,2	1	0,4
NS/NC	0	0	0	0	0	0,0
Total	46	8,1	21	7,4	25	9,0
Motivo hospitalización*						
Intervención Quirúrgica	22	3,9	12	4,3	10	3,6
Estudio médico diagnóstico	3	0,6	2	0,6	1	0,4
Tratamiento médico sin IQ	14	2,5	7	2,4	7	2,5
Parto (incluye cesárea)	6	1,0	0	0	6	2,2
Otros motivos	0	0	0	0	0	0,0
NS/NC	0	0	0	0	0	0,0
Total	46	8,1	21	7,4	25	9,0

(*) N° y Motivo de hospitalización calculado sobre el total de hospitalizaciones en el en el último año (n=46).

Gráfico 36. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica. Área de Salud de la Vega del Segura 2007.




Gráfico 37. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general y en presencia o no, de condición médica crónica. Dimensiones e índices de salud por sexo. Área de Salud de la Vega del Segura 2007.





Gráfico 38. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general. Índices de salud por edad (años) y sexo. Área de Salud de la Vega del Segura 2007.



DISCUSIÓN

La participación de los encuestados fue muy elevada, lo que está directamente relacionado con el medio de contacto y metodología elegidos. Por un lado, la administración telefónica, que ocasiona una mayor tasa de no contactos que las entrevistas realizadas cara a cara, pero un mayor grado de cooperación⁴²; por otro, la utilización de suplentes, muy elevada (más de la mitad de los contactos realizados), pero similar al obtenido en otros estudios^{43,44}. Este hecho esperable fue la razón para predeterminar 5 suplentes por persona seleccionada, que en ningún caso llegaron a agotarse. Dado que la selección de éstos se hizo de manera aleatoria entre personas de la misma edad, sexo y área de salud (zona de residencia) se considera mantenida la representatividad de la muestra. Siguiendo con la representación de la muestra, merece la pena mencionar que la búsqueda activa de teléfonos permitió aumentar, en un 7%, la población accesible del estudio, hasta alcanzar un 93%.

La Encuesta de Salud de la RM (ESaRM: Anexo C) se construyó a partir de instrumentos utilizados previamente en España (adaptación del cuestionario para adultos y hogar de la Encuesta Nacional de Salud 2006 y la versión en castellano del SF-12v2), para evitar el complejo proceso que supone el diseño y la validación de nuevos instrumentos de medición de la salud. Una de las variables recogidas en la ESaRM, la ocupación de los encuestados según la Clasificación Nacional de Ocupaciones (CNO), no se analiza en este documento. El objeto de su recogida era disponer de uno de los indicadores de clase social más utilizados en estudios empíricos sociológicos, pero el tratamiento de esta variable resultó ser bastante complejo. Por esta razón, se optó por utilizar como indicador de clase social el nivel de estudios, sin por ello descartar el análisis del CNO en estudios derivados de éste. En relación con la población diana, aunque la ENS dispone de un cuestionario dirigido a menores y el SF-12v2, puede aplicarse a partir de los 14 años, se optó por entrevistar sólo a mayores de edad, para evitar problemas éticos de autorización que pudieran interferir en el desarrollo del trabajo.

Se utilizó la **versión 2** del cuestionario porque actualmente es la recomendada, tanto por los autores originales como por los autores españoles³⁷. La construcción de las dimensiones e índices de salud de esta versión ha requerido la aplicación del método estándar, referido a datos y pesos obtenidos en EE.UU, por ser hasta el momento el único válido y disponible en España. La ventaja del método estándar sobre el específico, es que permite realizar comparaciones internacionales^{45,46}, y así lo sugieren los diferentes estudios que han comparado este método con el espe-

cífico en distintos países^{47,48}, entre ellos España⁴⁹. No obstante, y a pesar de disponer de un método estándar válido para el análisis de la CVRS, a partir de ahora se dispone de medias y DE de población de la Región para crear un método específico de análisis (basado en datos de la RM).

Hasta el momento, los estudios previos realizados en España han utilizado la versión 1 del cuestionario SF-12, con la que sólo se obtienen los índices resumen^{50,49}. Dado que aún no se ha establecido la forma de comparar directamente los resultados entre distintas versiones, las comparaciones que se realizan en este trabajo son sólo aproximadas, en función del sentido de una mejor o peor CVRS.

La RM no es la única Comunidad Autónoma que ha incorporado la “familia SF” a sus estadísticas sanitarias. A nivel nacional el SF-36v1 forma parte de la Encuesta Vasca de Salud desde el año 1997; el INE, en la ENS 2006 ha incorporado el cuestionario KINDSCREEN⁹ (CVRS en niños relacionado con “la familia SF”), lo que podría suponer una tendencia. A nivel internacional, países como Canadá, Italia, Chile y, sobre todo, Estados Unidos, país en el que se ha desarrollado el contenido del instrumento, la utilizan habitualmente. Este último detalle es uno de los puntos débiles de la familia “SF”, ya que, aun habiendo sido sometidos a rigurosas adaptaciones lingüísticas, el contexto cultural inicial, ha sido (y sigue siendo) el de Estados Unidos⁵¹.

Como se mencionó anteriormente, este estudio ofrece como resultados de CVRS el perfil de salud, descrito a través de las 8 dimensiones, así como los índices de salud a nivel regional y de área de salud. Es sabido, que el manejo estadístico del perfil de salud es complejo. Por eso, el análisis estadístico multivariante se ha realizado sólo para los índices resumen (ISF e ISM), por proporcionar una información sintética (del perfil de salud) y de fácil manejo. Sobre aspectos estadísticos de cómo analizar los datos de la familia SF no hay un patrón claro y definido a seguir³⁹. Lo que sí está bastante claro es la necesidad de utilizar modelos estadísticos y sistemas de ajuste, para evitar dar valores sesgados de CVRS⁵². Esto ha sido el fin último del análisis del presente trabajo, dar resultados de CVRS ajustados por aquellos factores susceptibles de confusión, que se discutirán más adelante. Se decidió utilizar la regresión logística, por coherencia con una línea de análisis previa⁴⁴. Este tipo de análisis requiere que la variable respuesta, en este caso los índices de salud físico y mental, sea dicotómica para lo que sería preciso utilizar un punto de corte. El ámbito médico está muy familiarizado en

el manejo de puntos de corte de técnicas diagnósticas. En este caso, el punto de corte elegido fue la puntuación media²⁰, para cada índice de salud, de la población general de la Región de Murcia. Se podría haber elegido otro punto de corte como la mediana, que para ambos índices resultó estar por encima de la media, [ISF= (mediana=52,4 versus media= 48,6; ISM= (mediana=57,3 versus media= 53,6)]. Por lo tanto, si se hubiera elegido ésta, la proporción de población considerada en buena calidad de vida aunque hubiera sido inferior [ISF= (mediana=56,5% versus media=68,7%; ISM= (mediana=51,4% versus media= 66,0%)], probablemente no hubiera generado resultados muy diferentes. Por último, y a favor del uso de la media como punto de corte, se muestra la comparación de las proporciones en buena salud con las de la ENS 2006 correspondiente a la RM⁵³. La ENS recoge una pregunta sobre la salud general de la población. Según ésta, la proporción de la población general de la RM que manifestó tener una muy buena o buena salud fue de un 67,0%, cifra cercana a las proporciones obtenidas con la media para ambos índices de salud.

Como resultados del análisis multivariante, el **sexo** aparece como un factor asociado tanto con el Índice de Salud Físico como con el Mental. De forma general, el hombre presenta mejor CVRS que la mujer, la magnitud del efecto del sexo es similar en ambos índices (ISF e ISM). El que las mujeres obtengan una peor CVRS que los hombres está en consonancia con los resultados obtenidos en otros trabajos similares^{54,55,49} y se ha asociado a que las mujeres suelen valorar su estado de salud peor que los hombres. Se detectó una interacción entre el sexo y la edad (Figura 3).

En relación con la **edad**, todos los ciudadanos con edades situadas en estratos diferentes al de 75 años ó más, presentan mejor ISF que el estrato mencionado. En lo que se refiere al ISM, sólo el estrato de menor edad presenta mejor CVRS que el de 75 años ó más. En estudios previos que han utilizado la familia "SF" han mostrado en sus resultados la escasa influencia de la edad sobre el componente mental de la CVRS, ocurriendo el fenómeno contrario en lo que al ISF se refiere⁵⁶, donde a mayor edad peor ISF. Siguiendo con el ISM, un estudio focalizado sólo en mayores de 75 años⁵⁷, detectó cambios pronunciados a partir de esta edad no sólo para el ISF, también para el ISM.

Las **condiciones médicas crónicas** como "Artrosis y problemas reumático" o bien aquellos que habían padecido un "Tumor maligno en los 5 últimos años" tuvieron una afectación negativa del ISF que aquellos que no las sufrían o sufrieron. La primera de és-

tas, junto con la "Depresión", "Enfermedades del corazón" y "Asma, bronquitis o EPOC", fueron las que provocaron peor ISM que los que no las sufrían. Hay que tener en cuenta que las condiciones médicas crónicas fueron autoinformadas, con el consiguiente sesgo de información que puede llevar asociado. El estudio EPISER, realizado en el año 2000 en población española mediante el SF-12v1, puso de manifiesto que las patologías crónicas con peor ISF fueron las malformaciones congénitas, las enfermedades del corazón, la DM, el cáncer, las enfermedades pulmonares, las enfermedades neurológicas y las reumáticas. En relación al ISM, las que peor CVRS resultaron provocar fueron los trastornos mentales, las enfermedades neurológicas, las enfermedades pulmonares, las enfermedades reumáticas y los trastornos digestivos. Según resultados del proyecto IQOLA⁵⁸, la enfermedad que mayor impacto sobre la salud provoca en la población general, es la artritis. También otros autores⁵⁹ han llegado a conclusiones similares. Además, teniendo en cuenta los resultados para la RM de la ENS 2006, el dolor crónico de espalda junto con la artrosis, artritis o reumatismos, son las enfermedades crónicas más frecuentes en mayores de 15 años⁵³.

La **carga de enfermedad**, es decir, el número de condiciones crónicas concomitantes también parece afectar la CVRS, ya que, cuanto menor es el número de éstas mayor es la magnitud del efecto de un mejor ISF e ISM, sobre todo en el caso del ISF. El efecto de la carga de enfermedad sobre la CVRS fue objeto de estudio en el proyecto IQOLA⁵⁸, en el que se observó que su impacto sobre la CVRS era proporcional al número de condiciones crónicas y similar en todos los países estudiados.

La **utilización de servicios** sanitarios muestra mejor ISF e ISM en aquellos que menos frecuentan los servicios sanitarios y peor ISF en aquellos que fueron hospitalizados en el último año. La asociación entre hospitalización y calidad de vida ha sido establecida en varios estudios⁶⁰⁻⁶⁴ que manifiestan la utilidad de los Índices de Salud Físico y Mental, como predictores de riesgo de ser hospitalizado, de sufrir reingresos, del gasto sanitario o del riesgo de muerte.

La **clase social**, analizada mediante el nivel de estudios, sólo parece afectar al ISF, los ciudadanos con cierto nivel de estudios tienen mejor ISF que aquellos que no saben leer ni escribir. Son numerosos los autores que relacionan un alto nivel de estudios con mejores valores de CVRS, independientemente del cuestionario utilizado; justificando estos hallazgos con el hecho de que las personas con un mayor nivel edu-

cativo, tienen hábitos de vida más saludables (no fuman, realizan más actividad física y se alimentan de forma más sana), además de poseer un mayor conocimiento sobre su enfermedad, mayor habilidad para relacionarse con sus proveedores de salud, de elegir y adherirse al tratamiento^{65,34,43}.

Las personas que llevan más de tres meses de baja laboral presentan peor ISF e ISM que las que están trabajando. Al seguir comparando con la actividad económica en activo, los jubilados/pensionistas presentan peor ISF y los estudiantes peor ISM. Por tanto, la **actividad económica** parece ser un factor asociado tanto al ISF como al ISM. Tomando como referencia la categoría “estar trabajando”, el resto de categorías presentan en general peor CVRS. Esta variable se ha empleado como factor de ajuste en otros estudios^{66,67,34,43} con el objeto de determinar si ambos índices servían para predecir mortalidad, hospitalización y utilización de servicios sanitarios. Hubiera sido interesante preguntar por el nivel de ingresos, ya que pertenecer a una clase social baja no siempre implica un bajo nivel de ingresos monetarios. De hecho se ha estudiado la sensibilidad del SF-12 para detectar diferencias de CVRS, con respecto a la población general, en aquellas personas con ingresos bajos o no ingresos^{68,69}.

La **práctica de ejercicio físico en el tiempo de ocio** proporciona mejores valores de CVRS tanto en el ISF como en el ISM que los que no la practican. Una revisión sistemática sobre el nivel de actividad física y calidad de vida relacionada con la salud en población adulta, ha mostrado la consistencia de esta asociación positiva entre ambas a partir de estudios transversales; no así con otro tipo de estudios (de cohortes y ensayos controlados aleatorios)⁷⁰. En población española de 60 años y más, un estudio expuso que la actividad física ligera, en el tiempo de ocio, se asociaba a mejor CVRS que la no actividad. Concluyeron que dado que esta relación, no se modificaba al ajustar por las principales variables sociodemográficas y clínicas, la población adulta mayor podría mejorar su CVRS realizando, al menos, actividad física ligera en su tiempo libre⁷¹.

El **estado civil** parece influir en el ISM, de tal manera que quienes están casados presentan mejor ISM que los que están solteros. El estado civil se recoge en la mayoría de los estudios descriptivos de CVRS citados en este trabajo^{49,58,72}.

Un resultado a priori paradójico es la asociación entre consumo de **alcohol** y mejor CVRS, al no conocerse la cantidad ingerida no pueden extraerse más conclusiones.

El poder explicativo de los modelos de regresión logística realizados, para el modelo de la ISF, el coeficiente de determinación es de un 46,3% y para el ISM de un 25,3%. Según estos valores, habría otros muchos factores no estudiados que explicarían la CVRS de la población general de la RM, sobre todo en lo que a la salud mental se refiere.

Una de las limitaciones de este estudio está en el hecho de utilizar un cuestionario, como instrumento, y ser el ciudadano el sujeto informante de su situación, esta investigación podría estar afectada por el sesgo de inaceptabilidad⁷³ (participantes que se inhiben más acerca de ciertas cuestiones o intenten encubrir las se intuyen que no son “socialmente aceptadas, ej.: tabaco, alcohol) y el sesgo obsequiosidad (una persona sobrevalora su exposición a factores considerados socialmente como aceptables, ej.: realización de ejercicio físico). El sesgo anamnésico o de recuerdo, podría darse en variables de utilización de servicios sanitarios y de padecimiento de condiciones médicas crónicas. Por esta razón, las condiciones médicas crónicas especificadas del apartado “otras situaciones”, no se incluyeron en el análisis multivariante, aunque sí se tuvieron en cuenta en la carga de enfermedad.

Esta encuesta de salud constituye en sí misma un **sistema de información sanitaria**, que permite estimar las características y distribución de la CVRS de los ciudadanos de la Región, la utilización de servicios sanitarios, las características y distribución de ciertos comportamientos y hábitos de vida relacionados con la salud. Por otro lado permite detectar factores asociados a la CVRS y, por tanto, desigualdades relacionadas con ésta. Como sistema de información sanitaria, requiere una cierta periodicidad en su realización para valorar la evolución en el tiempo de diferentes situaciones y problemas. Además, el hecho de detectar desigualdades en salud lo hace idóneo para elaborar programas sanitarios y estrategias de salud⁷⁴, ya que facilita la identificación de posibles poblaciones vulnerables⁷⁵, a confirmar con posteriores investigaciones. De forma complementaria, los resultados de esta encuesta pueden relacionarse con la información de diversos registros sanitarios, y obtener variables clínicas, de comorbilidad, de financiación, etc que permitan realizar estudios exploratorios más detallados con unos costes aceptables.

CONCLUSIONES

- De forma general, la valoración de la CVRS es un parámetro importante a conocer y monitorizar como indicador de resultados. Parece un proceso idóneo para la identificación y monitorización de desigualdades en salud y de utilidad en la elaboración de programas sanitarios y estrategias de salud, ya que facilita la identificación de poblaciones vulnerables.
- Se refuerza la evidencia de que la encuesta telefónica es un medio de alta utilidad y factibilidad para realizar investigación en resultados de salud a costes aceptables, sobre todo en entornos con poca población.
- A partir de las medias y desviaciones estándar de la población de la RM y de los pesos españoles se ha creado el método específico para la construcción del perfil de salud y de los índices de salud de los distintos problemas de salud de la RM. La aplicación de este método, permitiría situar a una población, con una determinada característica o patología, en referencia a la población global de la Región, de una manera fácil y altamente intuitiva (sólo observando si la puntuación obtenida es superior o inferior al valor medio de la población general). Por ello, además del método específico para el cálculo de la CVRS en la RM, se dispone de los valores poblacionales de referencia regionales para el SF-12v2.
- Las condiciones sociodemográficas y económicas ejercen influencia sobre la calidad de vida de la población, provocando desigualdades en su estado de salud según la actividad económica, el nivel de estudios y el estado civil. Además, la incorporación de la perspectiva de género en el análisis de la investigación ha permitido detectar desigualdades en cuanto al estado de salud entre hombres y mujeres.
- No se han detectado desigualdades en el estado de salud de las personas en función del área de salud (referencia geográfica de residencia) en la que se presta su asistencia sanitaria.
- Entre los estilos de vida investigados se ha identificado uno, el ejercicio físico, como un factor relacionado con una mejor calidad de vida relacionada con la salud.
- De las condiciones médicas crónicas incluidas en el estudio, la “Artrosis y problemas reumáticos”, no sólo es la condición médica crónica más frecuente declarada sino la que más afecta de forma conjunta a la esfera de la CVRS. Otros problemas, menos frecuentes, pero que afectan de manera importante la CVRS son los “Tumores malignos”, las “Enfermedades del corazón”, la “Depresión” y el grupo de “Asma, bronquitis o EPOC”.
- Como era de esperar, la utilización de servicios sanitarios, y la hospitalización, están relacionadas con el estado de salud de los ciudadanos.
- Este trabajo muestra una foto fija sobre el estado de salud de la población de la Región. Para conocer la evolución de éste es necesario hacer un seguimiento periódico que muestre el cambio de la foto con el paso del tiempo.

BIBLIOGRAFÍA

- 1 Departamento de Salud de Cataluña. Encuesta de Salud 2006 [consultado 15-10-2008]. Disponible en: <http://www.gencat.net/salut/depsalut/html/ca/plasalut/doc11898.html>.
- 2 Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. Encuesta de Salud 2002 [consultado 10-05-2007]. Disponible en: http://www.osasun.ejgv.euskadi.net/r52-478/es/contenidos/informacion/encuesta_salud/es_4044/encues_salud.html.
- 3 Guyatt GH, Feeny DH, Patrick DL. Measuring health-related quality of life. *Ann Intern Med* 1993; 118(8): 622-9.
- 4 Ferrans CE. Definitions and conceptual models of quality of life. En: Lipscomb J, Gotay CC, Snyder C, eds. *Outcomes Assessment in Cancer*. Cambridge, NY: Cambridge University Press; 2005.
- 5 Patrick DL, Erickson P. Health status and health policy: quality of life in health care evaluation and resource allocation. Oxford University Press. New York, 1993.
- 6 Rajmil L, Estrada M D, Herdman M, Serra V, Alonso J. Calidad de vida relacionada con salud (CVRS) en la infancia y la adolescencia: revisión de la bibliografía y de los instrumentos adaptados en España. *Gac Sanit* 2001; 15(Supl.4): 34-43.
- 7 Amouretti M, Nalet B, Robaszkievicz M, Wainsten JP, de la Loge C, Benmedjahed K, Dias-Barbosa C, Brin S, Schatz B. Validation of the short-form REFLUX-QUAL (RQS), a gastro-esophageal reflux disease (GERD) specific quality of life questionnaire. *Gastroenterol Clin Biol* 2005 ;29(8-9):793-801.
- 8 Martinez FJ, Raczek AE, Seifer FD, Conoscenti CS, Curtice TG, D'Eletto T, Cote C, Hawkins C, Phillips AL; COPD-PS Clinician Working Group. Development and initial validation of a self-scored COPD Population Screener Questionnaire (COPD-PS). *COPD* 2008;5(2):85-95.
- 9 Rajmil L y cols. Desarrollo de la versión española del Kidscreen, un cuestionario de calidad de vida para población infantil y adolescente. *Gac Sanit* 2005; 19 (2): 93-102.
- 10 Herdman M, Rajmil L, Ferre M, Serra-Sutton, Robitail S, Simeón MC, Aymerich M. Fiabilidad y validez del cuestionario de salud y calidad de vida para adolescentes Vecú et Santé Perçue de l'Adolescent (VSP-A). *Aten Primaria* 2006; 37:203-8.
- 11 Power M, Quinn K, Schmidt S; WHOQOL-OLD Group. Development of the WHOQOL-old module. *Qual Life Res* 2005;14(10):2197-214.
- 12 Larizgoitia A y cos. *Rev Gerontol* 1999; 6: 224-31
- 13 Lizan L, Reig A. Adaptación transcultural de una medida de la calidad de vida relacionada con la salud: la versión española de las viñetas COOP/WONCA. *Aten Primaria* 1999; 24:75-82.
- 14 Ramón González MJ. Fiabilidad y validez de un cuestionario de satisfacción del paciente en Guadalajara. *Semergen* 2000; 26: 525-9.
- 15 Badia X, Monserrat S, Roset M, Herdman M. Feasibility, validity and test-retest reliability of scaling methods for health states: the visual analogue scale and the time trade-off. *Qual Life Res* 1999; 8:303-10.
- 16 Ruiz M, Rejas J, Soto J, Pardo A, Rebollo I. Adaptación y validación del Health Utilities Index Mark 3 al castellano y baremos de corrección en la población española. *Med Clin (Barc)* 2003; 120: 89-96.
- 17 Fernández-López JA, Siegrist J, Hernández-Mejía R, Broer, M, Cueto-Espinar, A: Evaluación de la equivalencia transcultural de la versión española del Perfil de Calidad de Vida para Enfermos Crónicos ("PECVEC"). *Med Clin (Barc)* 1997;109: 245-50.
- 18 Alonso J, Antó JM, Moreno C. Spanish Version of the Nottingham Health Profile: Translation and Preliminary Validity *Am J Public Health* 1990; 80: 704-8.
- 19 Ware JE Jr, Kosinski M, Keller SD. A 12-Item Short-Form Health Survey: construction of scales and preliminary tests of reliability and validity. *Med Care* 1996; 34:220-33.
- 20 Ware JE, Kosinski M., Turner-Bowker DM, Gandek B. How to Score Version 2 of the SF-12® Health Survey (With a Supplement Documenting Version 1). Lincoln, RI: QualityMetric Incorporated, 2002.
- 21 Alonso J, Prieto L, Antó JM. La versión española del SF-36 Health Survey (Cuestionario de Salud SF-36): un instrumento para la medida de los resultados clínicos . *Med Clin (Barc)* 1995; 104: 771-6.
- 22 Badia X, Alonso J. Re-scaling the spanish version of the sickness impact profile: an opportunity for the assessment of cross-cultural equivalence. *J Clin Epidemiol* 1995; 48:949-57.
- 23 Ruiz MA, Baca E. Design and validation of the «Quality of Life Questionnaire»: a generic health-related perceived quality of life instrument. *Eur J Psychol Assess* 1993; 9: 19-32.
- 24 Rebollo P. Utilización del «grupo SF» de los cuestionarios de calidad de vida (SF-36, SF-12 y SF-6D) en el marco de ensayos clínicos y en la práctica clínica habitual. *Med Clin (Barc)* 2008;130:740-1.
- 25 Sanders C, Egger M, Donovan J, Tallon D, Frankel S. Reporting on quality of life in randomised controlled trials: bibliographic study. *BMJ* 1998;317(7167):1191-4.
- 26 Domingo-Salvany A, Lamarca R, Ferrer M, Garcia-Aymerich J, Alonso J, Felez M et al. Health-related quality of life and mortality in male patients with chronic obstructive pulmonary disease. *Am J Respir Crit Care Med* 2002; 166(5):680-5.
- 27 Almagro P, Calbo E, Ochoa dE, Barreiro B, Quintana S, Heredia JL et al. Mortality after hospitalization for COPD. *Chest* 2002; 121(5):1441-8.
- 28 Osman LM, Godden DJ, Friend JA, Legge JS, Douglas JG. Quality of life and hospital readmission in patients with chronic obstructive pulmonary disease. *Thorax* 1997; 52(1):67-71.

- 29 Soler JJ, Sanchez L, Roman P, Martinez MA, Perpina M. Risk factors of emergency care and admissions in COPD patients with high consumption of health resources. *Respir Med* 2004; 98(4):318-29.
- 30 Vega Reyes JA, Montero Perez-Barquero M, Sanchez GP. [Assessing COPD-associated morbidity: factors of prognosis]. *Med Clin (Barc)* 2004; 122(8):293-7.
- 31 Ferrer M, Alonso J, Morera J, Marrades R, Khalaf A, Aguar MC et al. Chronic obstructive pulmonary disease stage and health-related quality of life. The Quality of Life of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Study Group. *Ann Intern Med* 1997; 127(12):1072-9.
- 32 Patrick DL, Bergner M. Measurement of health status in the 1990s. *Annu Rev Public Health* 1990; 11:165-83.
- 33 Alonso J, Regidor E, Barrio G, Prieto L, Rodríguez C, de la Fuente L. Population reference values of the Spanish version of the Health Questionnaire SF-36. *Med Clin (Barc)* 1998;111(11):410-6.
- 34 Burdine JN, Felix MR, Abel AL, Wiltraut CJ, Musselman YJ. The SF-12 as a population health measure: an exploratory examination of potential for application. *Health Serv Res* 2000; 35(4): 885-904.
- 35 Hanmer J, Lawrence WF, Anderson JP, Kaplan RM, Fryback DG. Report of nationally representative values for the noninstitutionalized US adult population for 7 health-related quality-of-life scores. *Med Decis Making* 2006 ;26(4):391-400.
- 36 Costa G, Marinacci C, Caiazzo A, Spadea T. Individual and contextual determinants of inequalities in health: the Italian case. *Int J Health Serv* 2003 ;33(4):635-67.
- 37 Cuestionario de Calidad de Vida relacionada con la Salud. Barcelona: Instituto Municipal de Investigación Médica [consultado 02-02-2007]. Disponible en: <http://iryss.imim.es/iryss/BiblioPRO.asp>
- 38 Arostegui I, Nuñez-Antón V. Aspectos estadísticos del Cuestionario de Calidad de vida relacionada con la salud SF-36. *Estadística española* 2008; 50(167): 147-92.
- 39 Orden de 28 de julio de 2004 de la Consejería de Hacienda, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros con datos de carácter personal gestionados por la Consejería de Sanidad. N° 210 (9 septiembre 2004).
- 40 García MM, Jiménez ML, Martínez E. Políticas de investigación en salud. Guía de recomendaciones para la incorporación de la perspectiva de género. Escuela Andaluza de Salud para el Observatorio de Salud de la Mujer, Dirección General de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud [consultado 7-09-2006]. Disponible en: http://www.msc.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/propuesta_de_guia_nivel_politicas_de_investigacion_en_salud.pdf.
- 41 Orden de 12 de mayo de 2005, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba el Mapa Sanitario de la Región de Murcia. L.N.º 130/2005 (8 junio 2005).
- 42 Galán I, Rodríguez-Artalejo F, Zorrilla B. Comparación entre encuestas telefónicas y encuestas «cara a cara» domiciliarias en la estimación de hábitos de salud y prácticas preventivas. *Gac Sanit.* [online]. 2004, vol. 18, no. 6 [citado 2007-08-27], pp. 440-50. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-91112004000800005&lng=es&nrm=iso. ISSN 0213-9111.
- 43 Rober Koch Institute. Telephone Health Surveys [consultado 16-10-2008]. Disponible en: http://www.rki.de/cln_100/nn_216266/EN/Content/Health_Reporting/NationalPhoneSurvey/NationalPhoneSurvey__node.html?__nnn=true
- 44 Monteagudo-Piqueras O, Hernando-Arizaleta L, Palomar-Rodríguez JA. Calidad de vida y salud en la Región de Murcia: diabetes mellitus 2006. Murcia: Consejería de Sanidad, 2007. Disponible en: http://www.murciasalud.es/publicaciones/calidad_vida_diabetes.pdf.
- 45 Ware JE, Kosinski M., Turner-Bowker DM, Gandek B. How to Score Version 2 of the SF-12® Health Survey (With a Supplement Documenting Version 1). Lincoln, RI: QualityMetric Incorporated, 2002.
- 46 Monteagudo-Piqueras O, Hernando L, Palomar JA. Investigación en resultados de salud y poblaciones de referencia. *Med Clin (Barc)* 2008; 130(4):156.
- 47 Jenkinson C. Comparison of UK and US methods for weighting and scoring the SF-36 summary measures. *J Public Health Med* 1999; 21(4):372-6.
- 48 Kurth BM. Methodological views on the SF-36 summary scores based on the adult German population. *Bundesgesundheitsblatt Gesundheitsforschung Gesundheitsschutz* 2004; 47(11):1027-32.
- 49 Valderas JM, Ferrer M, Garin O, López-García E, Alonso J. Interpretation of SF-36 and SF-12 questionnaires in Spain: physical and mental components. *Med Clin* 2008; 24;130(19):726-35.
- 50 Loza E, Abásolo L, Jover JA, Carmona L; EPISER Study Group. Burden of disease across chronic diseases: a health survey that measured prevalence, function, and quality of life. *J Rheumatol* 2008; 35:159-65.
- 51 Herdman M.J. Reflexiones sobre la medición de la calidad de vida relacionada con la salud en España *Gaceta san* 2005;19 (2):91-2.
- 52 Ware JE Jr. The status of health assessment 1994. *Annu Rev Public Health* 1995;16:327-54.
- 53 Encuesta Resultados de Adultos 2006. Resultados de Adultos. Comparativa España- Región de Murcia. Resultados principales. [consultado 16-10-2008]. Disponible en: <http://www.murciasalud.es/recursos/publicaciones/ENS2006Adultos/ENSE-2006-ESP-CARM-0-INICIO.xls>.
- 54 López-García E, Banegas JR, Graciani A, Gutiérrez-Fisac JL, Alonso J, Rodríguez-Artalejo F. Valores de refe-

rencia de la versión española del cuestionario de salud SF-36 en población adulta de más de 60 años. *Med Clin* 2003; 120: 568-73.

- 55 Kontodimopoulos N, Pappa E, Niakas D, Tountas Y. Validity of SF-12 summary scores in a Greek general population. *Health Qual Life Outcomes* 2007;28;5:55.
- 56 Hanmer J, Lawrence WF, Anderson JP, Kaplan RM, Fryback DG. Report of nationally representative values for the noninstitutionalized US adult population for 7 health-related quality-of-life scores. *Med Decis Making* 2006; 26:391-400.
- 57 Jakobsson U. Using the 12-item Short Form health survey (SF-12) to measure quality of life among older people. *Aging Clin Exp Res* 2007;19(6):457-64.
- 58 Alonso J, Ferrer M, Gandek B, Ware JE Jr, Aaronson NK, Mosconi P, Rasmussen NK, Bullinger M, Fukuhara S, Kaasa S, Lepège A; IQOLA Project Group. Health-related quality of life associated with chronic conditions in eight countries: results from the International Quality of Life Assessment (IQOLA) Project. *Qual Life Res* 2004;13(2):283-98.
- 59 Veale DJ, Woolf AD, Carr AJ. Chronic musculoskeletal pain and arthritis: impact, attitudes and perceptions. *Ir Med J* 2008;101(7):208-10.
- 60 Sprenkle MD, Niewoehner DE, Nelson DB, Nichol KL. The Veterans Short Form 36 questionnaire is predictive of mortality and health-care utilization in a population of veterans with a self-reported diagnosis of asthma or COPD. *Chest* 2004; 126:81-9.
- 61 Dorr DA, Jones SS, Burns L, Donnelly SM, Brunner CP, Wilcox A, Clayton PD. Use of health-related, quality-of-life metrics to predict mortality and hospitalizations in community-dwelling seniors. *J Am Geriatr Soc* 2006; 54: 667-73.
- 62 Mapes DL, Lopes AA, Satayathum S, McCullough KP, Goodkin DA, Locatelli F, Fukuhara S, Young EW, Kurokawa K, Saito A, Bommer J, Wolfe RA, Held PJ, Port FK. Health-related quality of life as a predictor of mortality and hospitalization: the Dialysis Outcomes and Practice Patterns Study (DOPPS). *Kidney Int* 2003; 6: 339-49.
- 63 Fleishman JA, Cohen JW, Manning WG, Kosinski M. Using the SF-12 health status measure to improve predictions of medical expenditures. *Med Care* 2006; 44(5 Suppl):I54-63.
- 64 Rodríguez Artalejo F, Guallar-Castillón P, Montoto Otero C, Conde Herrera M, Carreño Ochoa C, Tabuenca Martín AI, Olcoz Chiva M, Conthe P, Banegas JR, Rodríguez Pascual C. Self-care behavior and patients' knowledge about self-care predict rehospitalization among older adults with heart failure. *Rev Clin Esp* 2008; 208(6):269-75.
- 65 Brown AF, Ettner SL, Piette J, Weinberger M, Gregg E, Shapiro MF, Karter AJ, Safford M, Waitzfelder B, Prata PA, Beckles GL. Socioeconomic position and health among persons with diabetes mellitus: a conceptual framework and review of the literature. *Epidemiol Rev* 2004; 26: 63-77.
- 66 Sprenkle MD, Niewoehner DE, Nelson DB, Nichol KL. The Veterans Short Form 36 questionnaire is predictive of mortality and health-care utilization in a population of veterans with a self-reported diagnosis of asthma or COPD. *Chest* 2004; 126:81-9.
- 67 Dorr DA, Jones SS, Burns L, Donnelly SM, Brunner CP, Wilcox A, Clayton PD. Use of health-related, quality-of-life metrics to predict mortality and hospitalizations in community-dwelling seniors. *J Am Geriatr Soc* 2006; 54: 667-73.
- 68 Larson CO, Schlundt D, Patel K, Beard K, Hargreaves M. Validity of the SF-12 for use in a low-income African American community-based research initiative (REACH 2010). *Prev Chronic Dis* 2008; 5(2):1-14.
- 69 Larson CO. Use of the SF-12 instrument for measuring the health of homeless persons. *Health Serv Res* 2002;37(3):733-50.
- 70 Bize R, Johnson JA, Plotnikoff RC. Physical activity level and health-related quality of life in the general adult population: A systematic review. *Prev Med* 2007; 9: 820-34.
- 71 Guallar-Castillón P, Santa-Olalla Peralta P, Banegas JR, López E, Rodríguez-Artalejo F. Actividad física y calidad de vida de la población adulta mayor en España. *Med Clin (Barc)* 2004; 123: 606-10.
- 72 López-García E, Banegas JR, Graciani A, Gutiérrez-Fisac JL, Alonso J, Rodríguez-Artalejo F. Valores de referencia de la versión española del cuestionario de salud SF-36 en población adulta de más de 60 años. *Med Clin (Barc)* 2003; 120: 568-73.
- 73 Irala-Estévez J, Martínez-González MA, Seguí-Gómez M. *Epidemiología aplicada. Ariel Ciencias de la Información*. 1ª edición: enero 2004.
- 74 McCollum M, Hansen LS, Lu L, Sullivan PW. Gender differences in diabetes mellitus and effect on self-care activity. *Gender Med* 2005; 2: 246-54.
- 75 Borrell C, Artazcoz L. Las políticas para disminuir la desigualdades en salud. *Gac Sanit* 2008; 22(5):465-73.

ANEXO A

TABLAS DE RESULTADOS DE CALIDAD DE VIDA POBLACIÓN

1. Tabla de frecuencia de respuestas del cuestionario SF-12v2.
2. Tablas de calidad de vida índices resumen y dimensiones regionales:
 - 2.1. Tablas de características sociodemográficas.
 - 2.2. Tablas de hábitos de vida.
 - 2.3. Tablas según presencia de condición médica crónica.
 - 2.4. Tablas de utilización de servicios sanitarios.
3. Calidad de vida relacionada con la salud por áreas de salud: índices resumen y dimensiones.
 - 3.1. Área de Salud de Murcia.
 - 3.2. Área de Salud de Cartagena.
 - 3.3. Área de Salud de Lorca.
 - 3.4. Área de Salud del Noroeste.
 - 3.5. Área de Salud del Altiplano.
 - 3.6. Área de Salud de la Vega del Segura.

1. Tabla de frecuencia de respuestas del cuestionario SF-12v2

TABLA A1. Encuesta de salud en población general. Frecuencias de las repuestas al cuestionario SF-12v2 (muestra reconstruida). Región de Murcia y áreas de salud 2007.

	REGIÓN		MURCIA		CARTAGENA		LORCA		NOROESTE		ALTIPLANO		V. SEGURA	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
1 Salud general														
Excelente	84	2,5	13	2,3	8	1,3	18	3,1	15	2,7	17	2,9	25	4,4
Muy buena	427	12,6	46	8,2	83	14,8	98	17,2	89	15,9	98	17,3	79	13,9
Buena	1994	59,0	361	64,2	327	58,5	305	53,6	307	54,8	315	55,7	299	52,7
Regular	720	21,3	112	20,0	116	20,8	129	22,7	125	22,4	114	20,2	139	24,5
Mala	137	4,0	24	4,3	22	4,0	19	3,3	24	4,2	22	3,8	23	4,1
<i>Total</i>	3362	99,4	556	99,0	556	99,5	568	100,0	560	100,0	565	100,0	565	99,7
No contesta	19	0,6	6	1,0	3	0,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	0,3
2 Esfuerzos moderados														
Sí, me limita mucho	305	9,0	50	8,9	52	9,3	52	9,2	56	9,9	53	9,4	47	8,3
Sí, me limita algo	373	11,0	52	9,2	63	11,2	65	11,5	92	16,5	71	12,5	72	12,8
No, no me limita	2691	79,6	456	81,2	443	79,2	451	79,3	412	73,6	441	78,1	448	79,0
<i>Total</i>	3369	99,6	558	99,3	557	99,7	568	100,0	560	100,0	565	100,0	567	100,0
No contesta	12	0,4	4	0,7	2	0,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3 Subir varios pisos por la escalera														
Sí, me limita mucho	391	11,6	65	11,6	73	13,1	60	10,5	61	10,8	67	11,9	55	9,6
Sí, me limita algo	364	10,8	47	8,4	57	10,3	71	12,5	88	15,7	73	12,9	81	14,2
No, no me limita	2609	77,2	444	79,0	426	76,1	437	77,0	411	73,4	423	74,9	432	76,1
<i>Total</i>	3364	99,5	557	99,0	557	99,6	568	100,0	560	100,0	563	99,7	567	100,0
No contesta	17	0,5	5	1,0	2	0,4	0	0,0	0	0,0	2	0,3	0	0,0
4 Hizo menos de lo que quisiera														
Siempre	196	5,8	34	6,0	43	7,8	28	5,0	31	5,6	22	3,9	16	2,7
Casi siempre	201	6,0	37	6,5	28	5,0	30	5,2	42	7,6	29	5,1	37	6,5
Alguna vez	266	7,9	39	7,0	47	8,3	39	6,8	46	8,3	37	6,5	60	10,7
Solo alguna vez	217	6,4	33	5,9	35	6,2	43	7,7	38	6,7	44	7,8	38	6,6
Nunca	2490	73,6	416	74,1	404	72,3	427	75,3	401	71,6	433	76,7	416	73,4
<i>Total</i>	3371	99,7	560	99,6	557	99,6	568	100,0	559	99,8	565	100,0	566	99,9
No contesta	10	0,3	2	0,4	2	0,4	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	0,1
5 Tuvo que dejar de hacer tareas														
Siempre	198	5,9	35	6,3	42	7,6	29	5,1	30	5,4	23	4,0	16	2,9
Casi siempre	197	5,8	35	6,2	29	5,2	28	4,9	42	7,6	28	5,0	36	6,3
Algunas veces	258	7,6	37	6,6	47	8,4	38	6,7	44	7,9	33	5,8	59	10,4
Solo alguna vez	216	6,4	33	5,9	35	6,2	39	6,9	39	6,9	43	7,6	40	7,1
Nunca	2499	73,9	419	74,6	402	72,0	434	76,5	404	72,1	438	77,5	415	73,2
<i>Total</i>	3369	99,6	560	99,6	556	99,4	568	100,0	559	99,8	565	100,0	566	99,9
No contesta	12	0,4	2	0,4	3	0,6	0	0,0	1	0,2	0	0,0	1	0,1
6 Hizo menos por problema emocional														
Siempre	71	2,1	10	1,8	16	2,8	15	2,6	23	4,1	8	1,4	3	,5
Casi siempre	158	4,7	28	5,0	26	4,7	20	3,5	34	6,1	28	4,9	23	4,1
Algunas veces	363	10,7	70	12,5	57	10,2	44	7,7	79	14,0	33	5,9	56	9,9
Solo alguna vez	255	7,5	49	8,7	49	8,7	27	4,7	34	6,0	42	7,4	30	5,3
Nunca	2520	74,5	402	71,5	407	72,9	462	81,4	390	69,6	453	80,2	455	80,2
<i>Total</i>	3368	99,6	560	99,6	555	99,2	568	100,0	559	99,8	564	99,8	567	100,0
No contesta	13	0,4	2	0,4	4	0,8	0	0,0	1	0,2	1	0,2	0	0,0

TABLA A1. Encuesta de salud en población general. Frecuencias de las repuestas al cuestionario SF-12v2 (muestra reconstruida). Región de Murcia y áreas de salud 2007. (Continuación)

	REGIÓN		MURCIA		CARTAGENA		LORCA		NOROESTE		ALTIPLANO		V. SEGURA	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
7 Hizo su trabajo menos cuidadosamente														
Siempre	73	2,1	11	2,0	15	2,6	16	2,9	24	4,4	8	1,4	3	,5
Casi siempre	151	4,5	26	4,7	26	4,7	17	3,0	28	4,9	26	4,7	25	4,4
Algunas veces	356	10,5	69	12,3	57	10,2	42	7,4	77	13,7	29	5,2	54	9,5
Solo alguna vez	254	7,5	49	8,7	49	8,9	23	4,1	34	6,0	39	6,9	31	5,4
Nunca	2535	75,0	405	72,0	407	72,9	469	82,6	397	70,8	462	81,7	454	80,1
Total	3368	99,6	560	99,6	555	99,2	568	100,0	559	99,8	564	99,8	567	100,0
No contesta	13	0,4	2	0,4	4	0,8	0	0,0	1	0,2	1	0,2	0	0,0
8 El dolor ha dificultado su trabajo														
Nada	2310	68,3	391	69,6	375	67,1	413	72,7	325	58,0	387	68,5	381	67,3
Un poco	429	12,7	77	13,8	70	12,5	49	8,6	82	14,7	68	12,0	73	12,9
Regular	220	6,5	32	5,8	34	6,1	30	5,3	62	11,1	47	8,4	46	8,1
Bastante	300	8,9	39	7,0	61	10,9	54	9,6	45	8,0	38	6,7	61	10,7
Mucho	107	3,2	20	3,5	13	2,4	22	3,9	45	8,0	25	4,3	6	1,1
Total	3367	99,6	560	99,6	554	99,1	568	100,0	559	99,8	564	99,8	567	100,0
No contesta	14	4	2	4	5	0,9	0	0,0	1	0,2	1	0,2	0	0,0
9 Se sintió calmado y tranquilo														
Siempre	907	26,8	139	24,8	155	27,7	183	32,2	226	40,4	203	35,9	104	18,3
Casi siempre	1367	40,4	263	46,7	231	41,4	170	29,9	141	25,1	173	30,6	221	39,0
Algunas veces	669	19,8	76	13,5	100	17,8	167	29,4	103	18,5	109	19,2	188	33,1
Solo alguna vez	268	7,9	54	9,6	38	6,8	27	4,7	59	10,5	52	9,2	38	6,8
Nunca	149	4,4	26	4,7	28	5,1	21	3,8	30	5,4	26	4,6	15	2,6
Total	3360	99,4	558	99,3	552	98,8	568	100,0	559	99,8	563	99,6	566	99,9
No contesta	21	0,6	4	0,7	7	1,2	0	0,0	1	0,2	2	0,4	1	0,1
10 Tuvo mucha energía														
Siempre	1199	35,5	172	30,5	188	33,6	265	46,7	257	45,9	292	51,6	194	34,3
Casi siempre	1188	35,2	219	38,9	176	31,6	178	31,3	135	24,0	152	26,9	235	41,4
Algunas veces	575	17,0	97	17,3	108	19,3	83	14,6	74	13,3	67	11,9	96	17,0
Solo alguna vez	247	7,3	44	7,9	44	7,8	34	6,0	49	8,8	34	6,0	32	5,7
Nunca	142	4,2	25	4,4	37	6,6	8	1,5	40	7,1	17	3,0	5	,9
Total	3353	99,2	557	99,1	552	98,8	568	100,0	555	99,2	562	99,5	563	99,3
No contesta	28	0,8	5	0,9	7	1,2	0	0,0	5	0,8	3	0,5	4	0,7
11 Se sintió desanimado y deprimido														
Siempre	80	2,4	7	1,3	16	2,8	27	4,7	31	5,6	20	3,5	5	1,0
Casi siempre	167	5,0	32	5,8	26	4,7	18	3,1	41	7,2	24	4,3	23	4,1
Algunas veces	472	13,9	83	14,7	65	11,6	77	13,5	92	16,5	52	9,2	97	17,1
Solo alguna vez	335	9,9	55	9,8	62	11,1	52	9,2	61	11,0	87	15,4	38	6,8
Nunca	2301	68,0	379	67,4	383	68,5	395	69,6	332	59,2	381	67,5	403	71,0
Total	3355	99,2	556	99,0	552	98,7	568	100,0	557	99,5	564	99,8	567	99,9
No contesta	26	0,8	6	1,0	7	1,3	0	0,0	3	0,5	1	0,2	0	0,1
12 Tuvo dificultades en las actividades sociales														
Nada	108	3,2	5	1,0	20	3,6	16	2,9	118	21,0	21	3,7	11	1,9
Un poco	123	3,6	17	3,1	24	4,3	17	3,0	23	4,1	26	4,6	23	4,1
Regular	229	6,8	46	8,2	34	6,1	33	5,8	39	7,1	12	2,2	35	6,2
Bastante	175	5,2	25	4,5	29	5,1	38	6,7	25	4,4	27	4,7	36	6,4
Mucho	2725	80,6	463	82,5	446	79,9	464	81,7	354	63,3	478	84,6	461	81,4
Total	3361	99,4	558	99,2	553	99,0	568	100,0	559	99,8	564	99,8	567	100,0
No contesta	20	0,6	4	0,8	6	1,0	0	0,0	1	0,2	1	0,2	11	1,9

2. Tablas de calidad de vida índices resumen y dimensiones regionales

2.1. TABLAS DE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Tabla A.2. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general por sexo. Región de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Ambos sexos										
Media	51,0	51,4	50,8	42,3	56,9	52,3	50,4	53,3	48,6	53,6
DE	10,8	11,1	11,5	9,6	11,0	10,0	11,1	10,9	10,6	10,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	15,8	4,3	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	29,7	37,7	26,3	22,5	28,0	24,0	30,2
Percentil 25	56,5	48,0	47,3	29,7	47,8	56,6	50,5	46,3	45,4	50,0
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,5	52,4	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,5	55,1	60,1
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	63,9
Nº encuestas	3364	3369	3367	3362	3353	3361	3368	3354	3326	3326
Hombres										
Media	52,1	52,7	52,6	43,4	58,7	53,3	51,7	55,2	49,8	55,3
DE	9,8	9,9	9,9	9,2	10,3	8,9	9,7	9,8	9,7	9,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	15,8	4,3	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	78,3
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	29,7	37,7	26,3	30,8	34,1	26,9	33,7
Percentil 25	56,5	57,2	50,1	44,7	57,8	56,6	56,1	52,4	47,5	52,3
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,5	53,2	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	62,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,6	64,3
Nº encuestas	1702	1701	1698	1699	1688	1697	1699	1690	1682	1682
Mujeres										
Media	50,0	50,0	49,0	41,1	55,1	51,2	49,0	51,4	47,5	52,0
DE	11,6	12,0	12,7	9,8	11,4	11,0	12,2	11,6	11,4	11,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	15,8	8,2	9,7
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,8	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	18,9	27,6	26,3	22,5	28,0	23,0	27,0
Percentil 25	47,9	48,0	47,3	29,7	47,8	56,6	44,9	46,3	42,3	46,9
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,4	52,4	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,5	54,8	59,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,8	63,4
Nº encuestas	1662	1668	1669	1663	1665	1664	1669	1664	1644	1644
p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tabla A.3. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general por grupos de edad en ambos sexos. Región de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
18-24 años										
Media	55,6	54,8	54,6	46,1	61,3	54,7	53,1	56,8	52,7	56,3
DE	4,0	7,0	7,3	8,3	9,0	6,8	7,6	8,5	6,1	8,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	15,8	21,9	9,7
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,8	70,2
Percentil 5	47,9	38,8	37,1	29,7	37,7	36,4	33,7	40,2	39,9	39,1
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,4	52,4	54,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,5	53,8	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	55,9	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	61,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,7	62,8
Nº encuestas	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
25-34 años										
Media	55,3	54,0	53,9	44,6	59,0	53,8	52,3	54,3	52,4	54,2
DE	4,7	7,9	7,8	8,4	9,3	8,2	8,9	9,9	6,8	9,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	15,8	15,2	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	69,6
Percentil 5	47,9	29,5	37,1	29,7	37,7	36,4	33,7	34,1	39,7	30,8
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,4	51,0	51,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,5	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,5	55,9	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,7	62,7
Nº encuestas	797	797	795	793	789	795	797	795	785	785
35-44 años										
Media	54,1	53,7	53,4	44,1	58,4	54,2	51,9	54,4	51,5	54,4
DE	7,8	8,4	9,0	8,1	9,9	8,1	9,5	9,4	7,8	9,2
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	15,8	11,4	14,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,6	76,1
Percentil 5	39,3	29,5	26,9	29,7	37,7	36,4	33,7	34,1	33,8	33,9
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,4	50,5	51,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,5	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,5	55,1	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,5	62,9
Nº encuestas	702	704	704	703	703	703	704	699	694	694
45-54 años										
Media	52,3	52,3	51,6	42,0	57,0	53,3	51,2	53,3	49,5	53,7
DE	9,1	9,9	11,1	9,1	10,2	8,7	9,9	10,7	9,6	10,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	15,8	11,4	14,4
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	75,3
Percentil 5	30,7	29,5	26,9	29,7	37,7	36,4	22,5	28,0	28,9	31,3
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	29,7	47,8	56,6	56,1	46,3	46,7	50,3
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,5	53,1	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,5	54,8	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,0	63,7
Nº encuestas	505	508	508	508	504	505	506	504	501	501

Tabla A.3. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general por grupos de edad en ambos sexos. Región de Murcia 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
55-64 años										
Media	46,9	47,8	47,0	38,6	53,8	49,8	47,6	50,8	44,6	51,7
DE	12,9	13,4	13,8	10,7	12,3	12,2	13,8	13,2	12,5	13,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	15,8	4,3	12,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,0	78,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	21,9	19,1	23,9
Percentil 25	39,3	38,8	37,1	29,7	47,8	46,5	40,2	40,2	36,5	44,1
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,5	50,2	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,5	53,5	60,0
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,0	65,1
Nº encuestas	377	378	378	376	378	376	378	377	372	372
65-74 años										
Media	41,9	46,5	44,9	37,0	52,7	48,8	46,2	50,8	41,3	52,0
DE	13,6	13,8	13,6	10,1	11,8	11,7	13,3	11,8	12,4	12,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	15,8	9,8	15,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	67,2	76,2
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	26,3	22,5	28,0	21,1	26,9
Percentil 25	30,7	34,1	37,1	29,7	47,8	46,5	33,7	40,2	29,7	43,9
Percentil 50	39,3	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,4	43,8	56,5
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,5	52,4	60,9
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,2	65,8
Nº encuestas	312	312	312	311	311	312	312	310	308	308
≥ 75 años										
Media	37,7	41,1	39,8	36,6	49,5	44,7	43,6	48,7	36,6	50,2
DE	13,7	15,0	14,9	10,4	13,4	14,3	14,9	13,2	13,2	13,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	15,8	5,8	14,1
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	28,0	15,5	23,6
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,7	37,7	36,4	33,7	40,2	25,0	41,5
Percentil 50	39,3	38,8	37,1	29,7	47,8	56,6	56,1	52,4	36,8	53,2
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,5	48,4	61,8
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	55,9	68,4
Nº encuestas	271	270	269	271	269	270	270	269	267	267
<i>p</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tabla A.4. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres por grupo de edad. Región de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
18-24 años										
Media	56,0	56,0	55,9	47,4	63,3	55,0	53,7	57,9	53,8	57,3
DE	3,3	4,8	5,5	7,9	8,0	6,5	6,4	7,4	4,7	6,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	29,7	27,6	16,2	11,4	28,0	21,9	25,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,8	68,2
Percentil 5	56,5	48,0	47,3	29,7	47,8	46,5	33,7	40,2	46,4	41,6
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,4	52,4	54,7
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,5	53,8	58,8
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,2	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,0	62,7
Nº encuestas	208	208	208	208	208	208	208	208	208	208
25-34 años										
Media	55,7	54,3	54,7	45,9	60,5	54,4	52,6	55,5	52,9	55,3
DE	3,9	7,4	6,4	8,1	8,8	7,8	8,9	9,7	6,5	9,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	15,8	15,2	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	69,6
Percentil 5	47,9	29,5	37,1	29,7	47,8	36,4	33,7	34,1	40,5	33,4
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,4	52,4	53,5
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,5	53,8	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,2	62,2
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	62,1	63,0
Nº encuestas	430	430	428	430	422	428	430	428	422	422
35-44 años										
Media	53,8	54,3	53,8	44,6	59,7	54,3	52,7	55,4	51,5	55,5
DE	8,1	7,9	8,5	7,8	9,2	7,6	8,2	9,4	7,8	8,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	15,8	11,4	14,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,6	76,1
Percentil 5	35,3	38,8	26,9	29,7	45,5	36,4	33,7	40,2	33,8	35,8
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,4	50,2	52,0
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,5	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,5	61,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,7	64,0
Nº encuestas	371	369	369	369	367	367	369	364	364	364
45-54 años										
Media	52,1	52,6	51,6	41,8	57,8	53,1	51,8	54,4	49,2	54,8
DE	9,6	9,6	10,9	9,0	10,3	8,9	9,4	10,0	9,6	9,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	15,8	14,2	14,4
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	65,0	75,3
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	29,7	37,7	36,4	22,5	34,1	27,2	32,6
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	29,7	57,8	56,6	56,1	52,4	46,5	51,9
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,5	52,4	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,5	54,8	60,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,9	65,1
Nº encuestas	255	255	255	255	254	255	254	254	254	254

Tabla A.4. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres por grupo de edad. Región de Murcia 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
55-64 años										
Media	48,6	50,4	50,4	39,9	55,6	52,2	50,1	54,5	46,3	54,5
DE	12,1	12,5	12,2	10,2	11,5	10,2	12,5	11,0	11,7	11,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	15,8	4,3	15,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	61,8	78,3
Percentil 5	22,1	20,3	26,8	18,9	27,6	26,3	22,5	28,7	18,7	29,8
Percentil 25	39,3	48,0	47,3	29,7	47,8	56,6	56,1	52,4	42,0	53,5
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,5	51,8	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	53,5	61,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,5	65,7
Nº encuestas	185	185	185	185	184	185	185	184	184	184
65-74 años										
Media	44,2	48,3	48,2	38,7	54,6	50,8	49,2	54,2	43,0	54,9
DE	13,0	13,3	12,4	10,1	11,3	10,5	11,1	10,1	12,2	10,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	21,9	9,8	20,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	61,9	76,2
Percentil 5	22,1	20,3	21,8	18,9	27,6	26,3	22,5	34,1	21,7	31,7
Percentil 25	30,7	38,8	37,1	29,7	47,8	46,5	44,9	51,2	33,9	49,7
Percentil 50	47,9	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,5	46,7	57,9
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	52,4	62,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,0	66,8
Nº encuestas	145	145	145	143	145	145	145	145	143	143
≥ 75 años										
Media	41,0	45,1	44,9	38,3	51,7	48,4	47,4	52,4	40,0	53,3
DE	13,8	14,4	13,7	10,4	12,9	12,9	13,3	11,1	12,9	12,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	21,9	5,8	17,6
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	76,9
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	28,5	16,8	30,1
Percentil 25	26,9	29,5	37,1	29,7	47,5	37,6	33,7	43,1	31,0	46,4
Percentil 50	39,3	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	58,5	42,2	56,9
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	61,3	52,0	62,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,8	68,7
Nº encuestas	109	109	108	109	108	109	109	108	107	107
p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,016

Tabla A.5. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres por grupo edad. Región de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
18-24 años										
Media	55,1	53,6	53,2	44,5	59,2	54,3	52,5	55,6	51,6	55,3
DE	4,6	8,6	8,7	8,5	9,6	7,1	8,7	9,4	7,2	9,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	37,7	16,2	11,4	15,8	25,8	9,7
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,8	70,2
Percentil 5	39,3	29,5	26,9	29,7	37,7	36,4	33,7	34,1	34,1	33,2
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,4	51,2	53,5
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,5	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	62,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,8	63,6
Nº encuestas	192	192	192	192	192	192	192	192	192	192
25-34 años										
Media	54,9	53,6	52,9	43,1	57,3	53,1	52,1	52,8	51,7	53,0
DE	5,5	8,4	9,1	8,5	9,7	8,6	8,9	10,0	7,1	9,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	15,8	19,9	18,7
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,3	68,9
Percentil 5	39,3	29,5	26,9	29,7	37,7	26,3	33,7	28,0	35,9	26,8
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	47,8	56,6	56,1	46,3	50,1	50,6
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,5	53,5	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,5	55,7	58,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,6	62,7
Nº encuestas	367	367	367	363	367	367	367	367	363	363
35-44 años										
Media	54,4	53,1	52,9	43,6	57,0	54,1	51,1	53,3	51,5	53,2
DE	7,4	8,8	9,4	8,3	10,5	8,6	10,7	9,3	7,7	9,5
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	15,8	23,0	19,1
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	65,2	74,9
Percentil 5	39,3	29,5	26,9	29,7	37,7	34,4	24,3	34,1	33,9	31,2
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	47,8	56,6	56,1	46,3	50,6	50,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,5	53,5	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,5	55,1	59,2
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,6	62,7
Nº encuestas	332	336	336	334	336	336	336	336	330	330
45-54 años										
Media	52,5	51,9	51,7	42,2	56,1	53,4	50,6	52,2	49,8	52,7
DE	8,6	10,3	11,3	9,2	10,0	8,5	10,5	11,3	9,6	10,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	15,8	11,4	15,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	67,9
Percentil 5	30,7	20,3	26,9	29,7	37,7	36,4	29,7	28,0	30,8	30,9
Percentil 25	56,5	48,0	47,3	44,7	47,8	56,6	44,9	46,3	48,1	48,3
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,5	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,5	55,1	59,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,5	62,7
Nº encuestas	250	253	253	253	250	250	253	250	247	247

Tabla A.5. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres por grupo edad. Región de Murcia 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
55-64 años										
Media	45,4	45,4	43,6	37,4	52,0	47,6	45,1	47,3	42,9	48,9
DE	13,4	13,8	14,5	11,0	12,7	13,5	14,6	14,2	13,1	14,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	15,8	9,0	12,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,0	75,4
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	18,2	19,3	17,7
Percentil 25	39,3	30,9	26,9	29,7	47,8	36,4	33,7	40,2	31,2	38,6
Percentil 50	56,5	53,4	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,4	47,8	54,4
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,5	53,5	58,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,2	64,2
Nº encuestas	192	194	194	192	193	192	194	193	187	187
65-74 años										
Media	39,8	44,9	42,0	35,5	51,0	47,0	43,5	47,9	39,8	49,5
DE	13,7	14,1	14,0	9,9	12,0	12,4	14,6	12,5	12,5	12,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	15,8	14,1	15,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	67,2	72,5
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	24,2	20,9	24,6
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,7	47,8	36,4	33,7	40,2	28,4	39,8
Percentil 50	39,3	54,2	47,3	29,7	47,8	56,6	50,1	52,4	39,7	51,9
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,5	51,8	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	56,3	65,6
Nº encuestas	167	167	167	167	166	167	167	166	165	165
≥ 75 años										
Media	35,6	38,3	36,3	35,4	48,1	42,2	41,0	46,2	34,3	48,1
DE	13,2	14,9	14,8	10,3	13,6	14,7	15,4	13,8	12,9	14,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	15,8	8,2	14,1
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	58,1	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,4	21,9	14,3	21,4
Percentil 25	22,1	20,3	26,9	29,7	37,7	26,3	33,7	40,2	23,4	38,4
Percentil 50	39,3	38,8	37,1	29,7	47,8	46,5	44,9	46,3	34,8	48,1
Percentil 75	47,9	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	58,5	45,1	60,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	55,2	68,3
Nº encuestas	162	161	161	162	161	161	161	161	161	161
<i>p</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

TABLA A.6. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según área de salud de pertenencia. Región de Murcia 2007.

	MURCIA		CARTAGENA		LORCA		NOROESTE		ALTIPLANO		V. SEGURA		p
	Media	DE	Media	DE	Media	DE	Media	DE	Media	DE	Media	DE	
Función Física	51,4	10,7	50,7	11,0	51,0	10,7	50,1	10,8	50,6	10,9	51,1	10,4	0,619
Rol Físico	51,3	11,2	50,8	11,7	52,0	10,5	50,9	11,2	52,5	9,9	51,8	9,9	0,291
Dolor Corporal	51,3	11,1	50,5	11,6	51,0	12,0	48,0	13,5	50,7	11,7	50,8	11,0	0,017
Salud General	41,9	9,1	42,4	9,5	42,9	10,0	42,5	10,1	43,1	9,9	42,2	10,3	0,442
Vitalidad	56,2	10,9	55,7	11,9	59,4	9,9	57,2	12,8	59,7	10,7	58,1	9,2	0,000
Función Social	53,1	8,4	52,0	10,4	52,7	9,5	44,9	16,8	52,7	10,2	52,6	9,3	0,000
Rol Emocional	49,8	11,2	50,0	11,5	51,6	10,7	48,6	12,8	51,8	10,0	51,6	9,7	0,000
Salud Mental	53,3	10,8	53,6	11,2	53,5	10,9	52,1	12,6	53,8	11,2	52,8	9,7	0,509
Índice Salud Físico	48,9	10,7	48,2	11,0	48,9	10,1	48,0	10,8	48,8	9,8	48,8	10,3	0,663
Índice Salud Mental	53,3	10,7	53,5	11,5	54,8	9,4	50,9	12,3	55,3	10,3	54,2	8,9	0,000
Nº encuestas	1266		874		404		176		140		466		-

Nota: los valores detallados de cada área de salud se encuentran en el apartado de este anexo que hace referencia expresa a cada una de ellas.

Tabla A.7. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según actividad económica. Región de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Trabajando										
Media	54,7	54,2	53,5	44,4	59,4	54,5	52,8	55,0	51,7	55,2
DE	6,1	7,7	8,8	8,2	9,0	7,3	8,1	9,1	7,2	8,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	11,3	7,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,8	74,6
Percentil 5	39,3	38,7	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	34,1	37,0	36,6
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	50,5	52,6
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	60,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	62,7
Nº encuestas	1949	1951	1949	1947	1937	1943	1950	1940	1924	1924
Desempleo										
Media	52,1	52,2	51,7	42,6	56,7	52,0	48,8	52,6	50,1	52,1
DE	9,6	10,1	10,0	10,5	12,1	9,6	11,5	12,3	10,4	13,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	9,0	15,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,6	76,0
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	18,9	27,6	26,3	22,5	28,0	21,2	25,9
Percentil 25	56,5	53,5	47,3	29,6	47,7	56,6	33,7	46,3	48,6	41,6
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,7	62,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,7	68,8
Nº encuestas	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148
Jubilado/Pensionista										
Media	40,4	43,5	43,2	36,9	51,1	47,1	45,4	50,1	39,3	51,4
DE	14,0	14,5	14,3	10,6	12,9	13,1	14,3	12,6	13,2	13,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	13,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	28,0	17,0	24,9
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	40,2	28,4	42,1
Percentil 50	39,3	48,0	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	39,3	55,5
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,0	61,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,9	67,8
Nº encuestas	525	526	526	525	524	526	526	523	526	523

Tabla A.7. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según actividad económica. Región de Murcia 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Labores del hogar										
Media	47,2	49,3	47,8	39,4	53,6	50,2	47,3	50,6	45,7	51,1
DE	12,9	12,6	13,6	9,7	12,1	11,8	13,4	12,4	12,1	12,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	10,3	14,1
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	67,2	78,9
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	28,0	21,2	24,9
Percentil 25	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	33,7	40,2	38,2	44,2
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	51,5	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	64,0	56,6	56,1	58,4	53,6	59,2
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,1	63,3
Nº encuestas	477	478	479	477	479	479	479	478	471	471
Estudiante										
Media	55,5	55,3	54,4	45,9	60,0	53,6	52,0	54,6	53,4	54,1
DE	4,8	6,7	7,1	8,1	9,0	8,3	8,5	10,1	5,6	9,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	37,7	16,2	11,3	15,8	28,4	16,4
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	65,6	67,4
Percentil 5	49,7	46,4	37,1	29,6	37,7	26,3	33,7	34,1	43,3	26,8
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	51,9
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,7	57,1
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,3	56,1	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,7	62,7
Nº encuestas	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181
Baja laboral (≥ 3 meses)										
Media	42,9	34,6	40,4	33,4	47,8	40,5	38,2	44,2	38,0	43,7
DE	15,0	12,9	13,7	10,0	13,0	15,4	17,0	16,1	13,6	18,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	11,8	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	77,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	19,5	14,9
Percentil 25	22,1	26,9	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	28,0	26,0	27,4
Percentil 50	52,4	29,5	47,3	29,6	47,7	36,4	33,7	46,3	36,5	48,9
Percentil 75	56,5	38,7	52,5	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	47,7	58,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	63,0	68,5
Nº encuestas	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
<i>p</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tabla A.8. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según estado civil. Región de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Soltero										
Media	54,4	53,2	53,4	44,9	59,0	53,6	51,7	54,7	51,7	54,4
DE	6,6	9,0	8,7	8,7	9,8	8,3	9,3	9,7	8,0	9,5
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	13,8	7,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,8	72,1
Percentil 5	39,3	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	34,1	33,8	33,4
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	50,7	51,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,9	60,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,0	62,7
Nº encuestas	971	971	969	971	965	966	971	966	965	965
Casado										
Media	50,6	51,3	50,5	41,6	56,7	52,4	50,7	53,4	48,1	54,0
DE	11,0	11,1	11,8	9,5	11,0	9,9	10,9	10,8	10,8	10,5
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	78,9
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	28,0	23,8	30,7
Percentil 25	47,9	48,0	47,3	29,6	47,7	56,6	56,1	46,3	44,6	50,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	54,5	60,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,8	64,2
Nº encuestas	2074	2078	2079	2070	2069	2075	2077	2074	2049	2049
Viudo										
Media	39,1	42,0	41,1	36,2	49,1	44,3	41,2	46,7	38,9	47,4
DE	14,1	15,3	14,9	10,5	13,3	14,2	15,3	13,9	13,6	14,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	8,2	13,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	65,7	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	17,9	18,9
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	40,2	26,7	36,8
Percentil 50	39,3	43,4	37,1	29,6	47,7	46,5	44,9	46,3	39,7	48,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	51,8	59,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,1	66,9
Nº encuestas	194	193	193	194	193	193	193	192	191	191
Separado/divorciado										
Media	50,7	52,2	50,6	41,4	55,9	52,2	47,8	50,2	49,6	51,1
DE	11,5	10,1	10,5	10,9	10,6	10,1	12,7	12,6	10,2	11,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	20,4	18,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	64,1	65,9
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	18,9	37,7	19,8	22,5	25,1	25,9	25,2
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	29,6	47,7	56,6	33,7	40,2	46,2	46,0
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	53,5	55,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,9	58,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	62,2	64,0
Nº encuestas	115	117	117	117	117	117	117	114	112	112
p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tabla A.9. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según convivencia. Región de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sí										
Media	50,8	51,3	50,6	41,9	56,8	52,5	50,7	53,5	48,3	53,9
DE	11,0	11,1	11,7	9,5	11,0	9,9	10,8	10,6	10,7	10,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	78,9
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	28,0	24,0	30,9
Percentil 25	47,9	48,0	47,3	29,6	47,7	56,6	56,1	46,3	44,9	50,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	54,8	60,2
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,1	64,1
Nº encuestas	2287	2291	2292	2283	2281	2288	2290	2285	2259	2259
No										
Media	51,6	51,5	51,1	43,1	57,3	51,9	49,6	53,0	49,4	53,0
DE	10,3	11,0	11,1	9,7	11,0	10,3	11,7	11,4	10,3	11,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	8,2	7,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,8	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	28,0	25,7	28,3
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	47,7	56,6	44,9	46,3	47,0	48,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	60,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,9	63,5
Nº encuestas	1065	1065	1063	1066	1060	1061	1065	1058	1056	1056
<i>p</i>	0,073	0,292	0,496	0,000	0,041	0,151	0,035	0,837	0,003	0,019

Tabla A.10. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según país de nacimiento. Región de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Foráneo										
Media	54,2	53,1	52,6	41,8	58,5	52,6	50,6	54,0	50,8	53,2
DE	6,1	8,5	9,4	9,5	10,3	8,8	9,8	9,2	8,1	9,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	22,9	16,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,6	70,2
Percentil 5	39,3	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	34,1	32,8	33,0
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	29,6	47,7	56,6	44,9	52,3	48,6	47,6
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,4	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,8	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,9	62,9
Nº encuestas	275	278	278	278	270	273	278	270	264	264
España										
Media	50,8	51,2	50,7	42,3	56,8	52,2	50,3	53,2	48,5	53,6
DE	11,0	11,2	11,7	9,6	11,1	10,1	11,2	11,0	10,8	10,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	28,0	23,8	30,2
Percentil 25	47,9	48,0	47,3	39,6	47,7	56,6	56,1	46,3	45,3	50,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	60,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,1	64,0
Nº encuestas	3085	3088	3086	3081	3079	3085	3087	3081	3059	3059
<i>p</i>	0,000	0,306	0,058	0,101	0,066	0,681	0,643	0,916	0,001	0,558

Tabla A.11. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según nivel de estudios. Región de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
No saber leer ni escribir										
Media	38,2	40,8	39,3	33,6	49,2	42,5	42,2	45,6	36,9	47,3
DE	13,5	14,6	14,1	10,0	13,8	14,9	15,1	13,8	12,5	14,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	9,0	15,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,5	77,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	15,1	21,5
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	26,3	33,7	34,1	26,9	35,0
Percentil 50	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	44,9	46,3	36,8	50,2
Percentil 75	55,3	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	48,0	57,9
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	54,8	66,7
Nº encuestas	115	115	115	115	115	115	115	115	114	114
Sabe leer y escribir										
Media	40,7	43,8	42,5	36,3	51,6	47,0	45,0	49,5	39,3	51,0
DE	14,1	14,8	14,7	10,4	12,7	13,2	14,6	13,2	13,4	13,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	5,8	13,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	67,2	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	17,0	24,2
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	40,2	28,1	41,6
Percentil 50	39,3	48,0	47,3	29,6	57,8	56,6	56,1	52,3	40,6	55,8
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	61,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,2	68,2
Nº encuestas	364	360	361	362	358	361	361	358	355	355
Estudios primarios										
Media	50,9	51,4	50,9	41,5	57,0	52,5	50,4	53,2	48,4	53,7
DE	10,7	10,8	11,4	9,5	10,9	9,8	11,0	11,0	10,3	10,5
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	11,4	9,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,6	78,3
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	28,0	24,1	31,4
Percentil 25	47,9	48,0	47,3	29,6	47,7	56,6	50,5	46,3	45,1	49,5
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	54,8	60,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,8	64,2
Nº encuestas	1161	1169	1167	1166	1165	1165	1169	1165	1154	1154
Estudios secundarios										
Media	54,0	53,5	53,2	44,1	58,6	53,6	51,3	54,6	51,4	54,3
DE	7,3	8,8	9,4	8,5	10,1	8,3	10,0	9,5	8,5	9,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	72,1
Percentil 5	39,3	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	34,1	34,0	31,1
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	50,3	51,9
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,6	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,2	62,7
Nº encuestas	896	896	896	895	893	896	896	893	887	887
Estudios superiores										
Media	54,3	53,9	53,4	45,1	58,4	54,1	52,6	54,8	51,7	54,8
DE	6,9	8,4	8,7	8,3	9,6	7,9	8,6	9,6	7,5	9,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	16,7	14,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,3	69,6
Percentil 5	39,3	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	34,1	33,9	33,4
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	50,6	52,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	60,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,7	62,9
Nº encuestas	814	814	814	810	808	809	812	810	802	802
p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

2.2. TABLAS DE HÁBITOS DE VIDA

Tabla A.12. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general por consumo de tabaco. Región de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Diariamente										
Media	53,6	53,3	52,9	43,6	57,9	53,1	50,5	53,2	51,4	53,1
DE	8,0	9,2	9,5	8,7	10,5	9,0	10,7	10,3	8,2	10,5
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	9,7
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,8	76,0
Percentil 5	39,3	29,5	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	34,1	34,1	30,3
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	50,5	46,3	49,8	49,5
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,2
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	56,1	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,0	62,7
Nº encuestas	964	962	960	960	958	956	962	957	954	954
Si pero no diario										
Media	53,3	52,4	51,1	42,5	58,9	53,0	52,9	53,7	49,6	55,2
DE	8,1	9,3	10,6	9,1	9,5	9,6	7,3	10,7	9,5	9,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	19,9	15,6
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	64,1	69,6
Percentil 5	30,7	29,5	26,9	28,4	37,7	26,3	33,7	28,0	25,4	36,9
Percentil 25	56,5	56,1	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	46,3	48,6	51,6
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,9	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,0	62,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	68,1
Nº encuestas	117	117	117	117	112	117	117	117	112	112
No pero ha fumado										
Media	50,1	50,9	50,4	41,5	56,9	52,4	51,3	54,3	47,3	54,9
DE	11,4	11,5	11,3	9,2	10,6	9,9	10,3	10,2	11,0	10,2
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	5,8	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	78,9
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	34,1	24,0	31,6
Percentil 25	47,9	48,0	47,3	29,6	47,7	56,6	56,1	52,3	41,8	52,0
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,7	62,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,0	64,9
Nº encuestas	748	748	748	748	744	745	748	745	744	744
No nunca										
Media	49,7	50,3	49,6	41,8	56,1	51,6	49,6	52,8	47,5	53,2
DE	11,8	11,8	12,6	10,2	11,6	10,6	11,9	11,6	11,5	11,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	8,2	7,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,6	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	18,9	27,6	26,3	22,5	28,0	22,8	28,1
Percentil 25	47,9	48,0	47,3	29,6	47,7	56,6	44,9	46,3	42,9	49,0
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	54,8	60,0
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,8	64,1
Nº encuestas	1531	1539	1539	1532	1535	1539	1537	1532	1514	1514
p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,000	0,066	0,000	0,001

Tabla A.13. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general por consumo de alcohol. Región de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Diariamente										
Media	50,6	52,1	51,1	42,4	57,4	52,8	51,3	54,3	48,5	54,8
DE	10,9	10,5	11,1	9,4	10,4	9,2	10,2	10,0	10,5	9,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	12,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	78,3
Percentil 5	22,1	25,0	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	34,1	24,3	32,5
Percentil 25	47,9	57,2	47,3	44,7	47,7	56,6	56,1	52,3	45,4	52,0
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	54,8	61,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	64,9
Nº encuestas	808	812	812	810	808	810	811	808	801	801
Si pero no diario										
Media	53,1	52,9	52,3	43,7	57,7	53,2	51,3	54,1	50,5	54,0
DE	8,5	9,4	10,0	8,8	10,5	8,9	9,8	10,1	9,0	9,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	5,8	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	79,3
Percentil 5	30,7	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	34,1	28,9	32,3
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	47,7	56,6	56,1	52,3	49,6	51,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	59,8
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	62,9
Nº encuestas	1536	1539	1537	1536	1529	1532	1539	1531	1518	1518
No pero ha bebido										
Media	46,2	45,3	44,2	37,8	53,1	48,0	44,2	47,4	43,6	48,4
DE	12,8	14,2	13,9	11,5	13,2	12,1	13,9	13,2	13,0	13,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	11,8	7,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	64,9	77,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	26,3	22,5	28,0	19,3	25,7
Percentil 25	39,3	29,5	30,7	29,6	47,7	36,4	33,7	40,2	34,1	38,8
Percentil 50	56,5	55,6	47,3	29,6	56,1	56,6	56,1	46,3	45,2	51,4
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,0	57,9
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	65,4
Nº encuestas	65	65	65	65	63	65	65	65	63	63
No nunca										
Media	48,3	48,7	48,5	40,2	55,5	50,5	48,4	51,5	46,0	52,3
DE	12,8	12,9	13,3	10,3	12,0	11,9	13,1	12,2	12,3	12,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	9,0	9,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,6	78,9
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	28,0	20,3	24,8
Percentil 25	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	44,9	40,2	38,6	47,2
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	51,8	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,7	59,9
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	64,4
Nº encuestas	946	946	946	942	945	946	946	943	937	937
p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tabla A.14. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según actividad física laboral. Región de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sentado										
Media	48,5	48,6	48,6	41,2	54,6	50,0	48,1	51,7	46,4	51,9
DE	12,9	13,4	13,3	10,7	12,8	12,2	13,3	12,1	12,6	12,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	28,0	20,3	25,2
Percentil 25	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	44,9	46,3	38,8	46,0
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,1	64,1
Nº encuestas	1124	1125	1125	1121	1118	1121	1125	1121	1108	1108
De pie										
Media	52,0	52,6	51,8	42,6	57,7	53,3	51,3	53,9	49,6	54,3
DE	9,6	9,5	10,4	8,9	9,9	8,6	9,9	10,1	9,6	9,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	9,0	9,7
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,8	78,3
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	34,1	26,5	32,3
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	47,7	56,6	56,1	52,3	47,4	51,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,2	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	59,9
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	63,8
Nº encuestas	1992	1997	1997	1993	1992	1995	1995	1989	1977	1977
Caminando										
Media	54,3	53,5	52,2	43,9	60,7	53,8	53,4	55,9	50,6	56,3
DE	6,3	8,8	10,3	9,2	8,4	8,8	7,5	10,3	7,2	8,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	13,6	12,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	61,8	70,8
Percentil 5	39,3	29,5	26,9	29,6	47,7	36,4	33,7	40,2	35,6	39,2
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	49,0	52,6
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	59,6	56,6	56,1	58,4	52,4	57,9
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	54,8	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,8	63,9
Nº encuestas	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176
Gran esfuerzo										
Media	55,9	54,7	53,9	45,2	62,5	56,0	53,2	55,7	52,8	56,3
DE	2,5	4,9	7,0	8,0	7,8	4,5	6,6	9,4	5,4	6,6
Mínimo	39,3	29,5	16,7	18,9	37,7	16,2	33,7	28,0	23,0	40,1
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	62,1	67,9
Percentil 5	47,9	48,0	37,1	29,6	47,7	56,6	33,7	28,0	46,0	41,4
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	50,2	53,6
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,5	58,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	47,2	67,9	56,6	56,1	58,4	55,6	61,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	62,1	63,6
Nº encuestas	56	56	53	56	51	53	56	53	51	51
<i>p</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tabla A.15. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según actividad física de ocio. Región de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
No										
Media	49,5	50,3	49,3	40,7	55,7	51,3	49,4	51,8	47,2	52,6
DE	12,1	12,0	12,5	9,8	11,3	11,0	12,0	11,3	11,5	11,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	7,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	18,9	37,7	26,3	22,5	28,0	22,8	28,1
Percentil 25	47,9	48,0	47,3	29,6	47,7	56,6	44,9	46,3	42,2	47,6
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	54,8	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,6	64,0
Nº encuestas	1708	1714	1712	1709	1703	1710	1714	1705	1683	1683
Una o más veces al mes										
Media	52,3	51,9	51,6	42,0	57,8	52,0	49,8	52,6	49,8	52,8
DE	9,4	10,6	10,3	8,7	10,0	10,1	11,3	11,3	9,8	11,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	11,6	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	76,2
Percentil 5	22,1	25,1	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	28,0	29,3	27,9
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	29,6	47,7	56,6	44,9	46,3	45,5	49,0
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,6	63,9
Nº encuestas	371	371	371	371	371	369	371	371	369	369
Varias veces a la semana										
Media	52,7	52,6	52,6	44,4	58,3	53,6	51,8	55,5	50,2	55,2
DE	8,8	9,6	10,0	9,2	10,7	8,3	9,6	9,8	9,4	9,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	9,8	9,7
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,8	78,3
Percentil 5	30,7	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	34,1	27,8	33,7
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	49,3	53,2
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	62,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,6	63,8
Nº encuestas	1275	1275	1275	1272	1270	1272	1274	1270	1265	1265
<i>p</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

2.3. TABLAS SEGÚN CONDICIÓN MÉDICA CRÓNICA

Tabla A.16. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condiciones médicas crónicas, ambos sexos. Región de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sin condición médica crónica										
Media	55,7	54,9	54,8	46,1	60,5	54,7	53,4	56,4	52,9	56,0
DE	4,0	6,9	7,3	7,6	8,5	6,7	7,3	8,0	6,0	7,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	14,4	9,7
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,8	74,9
Percentil 5	56,5	38,7	37,1	29,6	47,7	36,4	33,7	40,2	41,6	38,9
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	54,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,9	61,8
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,6	62,7
Nº encuestas	1314	1313	1312	1308	1304	1308	1312	1304	1296	1296
Con alguna condición médica crónica										
Media	48,1	49,1	48,2	39,8	54,6	50,7	48,4	51,3	45,9	52,1
DE	12,5	12,5	12,9	9,9	11,8	11,4	12,6	12,0	12,0	11,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	18,9	27,6	26,3	22,5	28,0	21,3	26,8
Percentil 25	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	44,9	46,3	38,6	46,7
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	50,9	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,7	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,8	64,9
Nº encuestas	2050	2056	2054	2054	2049	2053	2056	2050	2030	2030
p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1 condición médica crónica										
Media	53,5	54,0	53,3	43,8	58,1	54,2	52,2	55,0	51,1	54,8
DE	7,5	8,0	8,5	8,0	9,9	7,6	9,1	9,4	7,8	9,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	9,8	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	74,3
Percentil 5	39,3	38,7	37,1	29,6	37,7	36,4	33,7	34,1	34,9	33,8
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	49,7	53,0
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	63,6
Nº encuestas	804	808	807	808	808	806	808	807	801	801
2 condiciones médicas crónicas										
Media	49,8	50,3	49,4	40,0	55,7	52,2	50,0	52,2	47,0	53,2
DE	11,2	11,3	11,9	8,8	10,4	9,6	10,9	11,0	10,9	10,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	10,3	7,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	65,0	77,3
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	28,0	22,8	29,8
Percentil 25	47,9	48,0	47,3	29,6	47,7	56,6	44,9	46,3	42,4	48,7
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	51,2	56,8
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,7	59,9
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,6	65,0
Nº encuestas	538	541	541	540	538	541	540	539	534	534



Tabla A.16. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condiciones médicas crónicas, ambos sexos. Región de Murcia 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
3 condiciones médicas crónicas										
Media	44,3	45,9	44,6	38,2	52,4	48,5	46,2	49,4	42,6	50,8
DE	13,4	14,0	13,7	10,0	12,8	12,7	13,7	12,7	12,6	12,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	10,6	12,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	78,9
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	18,9	27,6	16,2	19,2	28,0	20,2	23,9
Percentil 25	30,7	34,1	26,9	29,6	47,7	36,4	33,7	40,2	32,9	42,3
Percentil 50	47,9	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	46,2	54,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,9	60,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,8	66,7
Nº encuestas	356	356	357	356	356	357	357	355	350	350
≥ 4 condiciones médicas crónicas										
Media	36,8	39,2	38,3	31,9	47,1	42,7	39,6	43,5	35,7	45,3
DE	14,1	14,4	15,0	10,4	13,0	14,8	15,8	13,7	13,5	14,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	13,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	15,9	20,9
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	34,1	24,6	34,4
Percentil 50	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	39,6	40,2	34,0	44,8
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	47,3	57,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	58,0	65,6
Nº encuestas	351	352	350	350	347	350	352	349	346	346
p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tabla A.17. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condiciones médicas crónicas, hombres. Región de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sin condición médica crónica										
Media	55,7	55,1	55,0	46,5	61,1	54,9	53,5	57,0	53,0	56,6
DE	3,8	6,6	6,9	7,8	8,5	6,2	7,2	7,8	6,0	7,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	14,4	17,4
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	65,0	73,0
Percentil 5	56,5	38,7	37,1	29,6	47,7	43,7	33,7	40,2	41,3	39,1
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	54,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,5	57,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,1	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,9	62,8
Nº encuestas	708	706	706	706	701	704	706	701	698	698
Con alguna condición médica crónica										
Media	49,5	51,0	50,8	41,3	56,9	52,2	50,4	53,9	47,5	54,3
DE	11,7	11,4	11,2	9,5	11,1	10,2	11,0	10,8	11,1	10,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	78,3
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	32,7	22,7	30,9
Percentil 25	39,3	48,0	47,3	29,6	47,7	56,6	50,5	46,3	42,9	50,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	54,5	61,9
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	65,1
Nº encuestas	994	994	991	993	987	992	993	989	984	984
p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tabla A.18. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condiciones médicas crónicas, mujeres. Región de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sin condición médica crónica										
Media	55,6	54,7	54,7	45,7	59,8	54,4	53,2	55,7	52,8	55,4
DE	4,3	7,2	7,7	7,2	8,4	7,3	7,5	8,3	6,1	7,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	19,9	9,7
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,8	74,9
Percentil 5	53,1	38,7	37,1	29,6	47,7	36,4	33,7	40,2	41,8	37,0
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	52,9
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,6	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,5	62,7
Nº encuestas	606	606	606	602	603	603	606	603	598	598
Con alguna condición médica crónica										
Media	46,7	47,3	45,7	38,4	52,5	49,3	46,5	48,9	44,4	50,0
DE	13,1	13,2	13,8	10,1	12,0	12,2	13,7	12,5	12,5	12,5
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	8,2	12,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	67,2	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	16,9	28,0	20,3	25,3
Percentil 25	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	33,7	40,2	35,8	42,0
Percentil 50	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	49,7	54,4
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	58,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,5	64,1
Nº encuestas	1056	1062	1063	1061	1062	1061	1063	1061	1046	1046
<i>p</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tabla A.19. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según el tipo de condiciones médicas crónicas. Región de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Hipertensión arterial										
Media	43,9	46,5	45,7	36,8	53,0	48,6	46,6	49,9	42,3	51,3
DE	14,2	13,7	14,5	10,3	12,6	13,0	13,7	12,7	13,0	12,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	12,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	67,2	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,9	28,0	18,5	26,0
Percentil 25	30,7	36,7	26,9	29,6	47,7	46,5	33,7	40,2	32,2	42,9
Percentil 50	47,9	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	46,5	55,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,5	60,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,3	65,6
Nº encuestas	669	668	669	669	665	669	669	667	663	663
p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Diabetes mellitus										
Media	40,3	43,1	42,2	34,4	50,3	46,1	44,1	48,5	38,6	49,7
DE	14,5	14,6	15,4	10,4	13,6	14,5	15,2	13,8	13,6	14,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	13,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	65,0	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	15,5	23,7
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	40,2	26,6	38,1
Percentil 50	39,3	48,0	47,3	29,6	47,7	56,6	56,1	52,3	40,2	54,8
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	51,8	61,0
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,7	66,5
Nº encuestas	280	280	280	278	278	280	280	280	276	276
p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Asma, bronquitis, enfisema										
Media	43,3	45,6	46,5	35,4	51,2	47,0	45,4	48,1	42,3	49,1
DE	14,3	13,6	14,1	10,4	12,7	13,9	13,8	13,3	13,7	13,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	5,8	12,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,6	76,9
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	21,9	18,3	25,2
Percentil 25	30,7	29,9	37,1	29,6	37,7	36,4	33,7	40,2	31,3	41,5
Percentil 50	47,9	57,2	57,4	29,6	47,7	56,6	56,1	52,3	44,7	51,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	59,8
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,1	65,4
Nº encuestas	247	247	246	246	247	247	247	246	245	245
p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Enfermedades del corazón										
Media	37,1	40,8	39,3	33,8	48,4	44,3	41,7	46,1	36,4	47,9
DE	14,4	14,3	15,1	10,8	12,8	14,3	15,7	13,3	13,4	14,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	11,4	7,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	67,3	78,9
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	16,5	22,4
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	28,1	40,2	24,8	35,7
Percentil 50	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	44,9	46,3	35,8	50,2
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	48,7	59,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,2	67,8
Nº encuestas	213	212	212	213	212	212	212	212	212	212
p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Alergia										
Media	51,2	50,8	50,6	41,7	56,1	52,6	50,0	52,6	48,6	53,0
DE	10,7	11,4	11,7	9,8	11,3	9,6	11,2	11,7	10,9	11,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	8,2	12,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	28,0	24,0	26,8

Tabla A.19. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según el tipo de condiciones médicas crónicas. Región de Murcia 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Percentil 25	56,5	48,0	47,3	29,6	47,7	56,6	44,9	46,3	46,0	47,9
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	64,1
Nº encuestas	705	708	706	707	703	704	706	704	695	695
p	0,796	0,034	0,728	0,059	0,026	0,414	0,120	0,279	0,814	0,102
Depresión										
Media	41,6	42,2	40,7	33,9	47,0	43,4	37,5	40,8	41,2	41,6
DE	14,6	14,8	15,0	10,6	12,9	14,4	16,1	13,1	14,0	14,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	10,6	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	72,4
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	19,0	18,3
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	22,5	28,0	28,4	31,0
Percentil 50	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	33,7	40,2	41,3	42,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	53,5	54,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	62,1	62,5
Nº encuestas	428	428	426	426	424	426	427	423	417	417
p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Artrosis y problemas reumáticos										
Media	41,9	44,1	41,7	36,1	51,3	47,2	44,9	48,2	39,9	50,1
DE	14,0	14,2	14,4	10,3	12,6	13,3	14,4	13,1	13,1	13,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	13,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	17,3	23,8
Percentil 25	30,7	29,5	26,9	29,6	38,0	36,4	33,7	40,2	28,7	41,4
Percentil 50	39,3	48,0	47,3	29,6	57,8	56,6	56,1	52,3	41,7	53,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,1	60,1
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,3	66,8
Nº encuestas	883	883	882	880	878	882	884	879	869	869
p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Tumor maligno (últimos 5 años)										
Media	39,3	40,1	41,1	32,9	48,8	43,1	39,1	44,3	38,0	45,5
DE	14,4	14,6	14,5	10,2	12,5	14,7	16,7	13,1	12,6	15,5
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	8,2	17,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,8	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	15,6	21,0
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	34,1	27,6	31,0
Percentil 50	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	33,7	40,2	37,8	47,1
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	47,8	59,9
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	57,3	65,7
Nº encuestas	87	88	86	88	86	86	88	86	85	85
p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Otras situaciones										
Media	45,9	46,2	45,7	38,3	53,3	48,8	46,9	49,7	43,5	50,8
DE	13,2	14,1	13,7	10,6	12,2	12,7	13,7	12,5	12,8	12,5
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	13,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	77,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	18,2	28,0	19,0	24,8
Percentil 25	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	33,7	40,2	33,9	42,7
Percentil 50	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	47,6	54,5
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	63,6	56,6	56,1	58,4	53,5	59,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,6	64,9
Nº encuestas	530	533	533	531	530	533	533	533	526	526
p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tabla A.20. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general especificando la respuesta abierta “otras situaciones” médicas crónicas declaradas. Región de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Colesterol										
Media	48,5	49,5	49,9	39,6	55,2	50,3	49,3	52,0	46,5	52,4
DE	12,9	13,2	12,2	9,7	10,9	11,3	10,9	10,9	12,2	9,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	9,0	18,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	62,2	77,3
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	18,9	37,7	22,5	33,7	28,0	19,0	34,8
Percentil 25	39,3	48,0	47,3	29,6	47,7	46,5	43,1	46,3	41,8	46,0
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,1	54,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	54,8	59,0
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,4	63,9
Nº encuestas	97	97	97	97	95	97	97	97	95	95
Vasculares										
Media	42,6	45,5	43,5	36,3	54,4	47,7	45,2	47,0	41,3	49,0
DE	13,3	16,0	15,6	10,2	12,3	12,7	14,6	12,4	15,7	11,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	11,3	25,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,9	66,9
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	37,7	16,2	17,6	28,0	11,3	30,7
Percentil 25	30,7	27,3	26,9	29,6	47,7	36,4	33,7	38,5	26,5	38,2
Percentil 50	47,9	57,2	47,3	44,7	49,8	56,6	56,1	46,3	49,1	53,8
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,1	59,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	45,0	67,9	56,6	56,1	64,5	61,7	65,8
Nº encuestas	43	46	46	46	45	46	46	46	43	43
Uro-Genital										
Media	47,2	44,7	44,5	39,3	54,7	51,0	49,1	52,8	42,2	54,4
DE	13,5	14,6	13,4	9,7	12,6	11,7	11,8	10,3	13,7	10,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	28,0	5,8	23,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	77,3
Percentil 5	22,1	20,3	25,2	18,9	27,6	20,5	28,3	34,1	15,2	34,1
Percentil 25	37,5	33,5	36,9	29,6	47,7	53,6	33,7	40,2	35,1	50,8
Percentil 50	56,5	55,5	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	44,2	57,2
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,5	60,2
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	50,8	67,9	56,6	56,1	64,5	59,3	71,6
Nº encuestas	38	39	39	39	39	39	39	39	38	38
Renal										
Media	39,6	45,2	46,1	37,7	51,5	48,7	45,2	48,7	40,9	50,8
DE	14,3	14,8	13,9	11,3	11,7	15,2	17,1	15,8	11,2	16,5
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	23,9	15,1
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	63,1	72,0
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	24,0	15,6
Percentil 25	22,1	30,5	37,1	29,6	47,7	48,4	33,7	40,2	33,4	41,5
Percentil 50	39,3	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	40,8	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	64,5	52,2	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	63,1	65,4
Nº encuestas	25	26	26	26	26	26	26	26	25	25
Otras mentales										
Media	43,4	33,3	40,6	29,7	47,0	47,4	45,3	38,3	36,7	45,7
DE	14,6	11,3	15,1	8,3	7,9	11,0	12,7	13,9	15,7	14,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	37,7	26,3	22,5	21,9	11,3	18,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	61,2	60,8
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	37,7	28,6	22,5	21,9	11,3	24,2
Percentil 25	22,1	25,3	23,7	24,7	37,7	36,4	33,7	28,0	28,3	31,6
Percentil 50	47,9	29,5	47,3	29,6	47,7	56,6	56,1	34,1	41,0	55,0
Percentil 75	56,5	38,7	47,3	29,6	55,3	56,6	56,1	58,4	44,0	58,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	52,0	56,1	58,4	61,2	57,6
Nº encuestas	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13

Tabla A.20. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general especificando la respuesta abierta “otras situaciones” médicas crónicas declaradas. Región de Murcia 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Otras pulmonares										
Media	43,0	45,2	44,7	38,2	52,4	46,1	43,4	53,9	41,3	51,6
DE	15,7	17,3	15,7	14,2	11,4	17,0	15,1	10,1	18,4	10,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	4,3	28,6
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	57,2	70,0
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	29,4	4,3	31,2
Percentil 25	22,1	20,3	36,0	29,6	47,9	31,8	33,7	49,1	22,2	44,0
Percentil 50	49,0	57,2	47,3	37,2	57,8	56,6	49,9	58,4	50,1	52,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,1	57,8	56,6	56,1	58,4	56,0	57,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	62,0	57,2	66,7
Nº encuestas	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Osteopatías										
Media	48,1	48,0	47,7	40,1	54,1	49,5	51,4	52,7	44,6	53,8
DE	11,5	13,6	11,8	8,1	8,2	10,7	9,3	9,1	10,5	8,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	17,1	18,6
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,4	72,1
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	23,3	37,7	26,3	33,7	38,7	18,8	38,5
Percentil 25	39,3	38,7	47,3	29,6	47,7	36,4	56,0	46,3	39,7	47,5
Percentil 50	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	47,9	55,8
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,2	58,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	56,7	63,6
Nº encuestas	44	45	45	45	45	45	45	45	44	44
ORL										
Media	49,8	52,2	50,4	44,9	55,0	51,1	48,1	53,5	49,8	51,9
DE	10,3	10,8	10,3	12,6	14,6	9,9	12,7	13,5	9,3	14,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	29,6	27,6	16,2	22,5	21,9	16,4	21,4
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	64,1	69,4
Percentil 5	24,0	20,3	25,2	29,6	27,6	27,2	22,5	21,9	29,2	21,4
Percentil 25	39,3	53,0	47,3	29,6	43,5	46,5	33,7	45,0	46,1	43,3
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,3	62,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,7	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	64,1	68,9
Nº encuestas	20	20	20	20	19	20	20	20	19	19
Oculares										
Media	39,9	37,4	38,5	35,2	51,3	43,3	40,1	43,3	37,4	46,2
DE	13,7	14,6	14,4	11,5	14,0	15,6	17,7	16,2	12,4	17,2
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	9,0	16,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	54,8	72,1
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	14,8	20,5
Percentil 25	22,1	20,3	26,9	29,6	37,7	26,6	22,5	28,0	28,3	25,9
Percentil 50	39,3	38,7	37,1	33,4	55,4	53,6	44,9	46,3	38,3	50,4
Percentil 75	56,5	55,9	50,0	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	50,2	57,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	53,5	67,9	56,6	56,1	64,5	54,8	72,1
Nº encuestas	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Neurológicas										
Media	37,0	37,0	41,2	31,6	47,4	41,1	38,9	42,6	36,3	44,3
DE	15,0	15,3	15,5	10,6	14,6	15,4	15,5	13,2	11,5	13,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	14,2	16,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	55,8	66,8
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	22,5	19,6	21,0
Percentil 25	22,1	20,3	26,9	18,9	31,2	26,3	30,0	34,1	24,8	35,1
Percentil 50	30,7	29,5	38,6	29,6	47,7	36,4	33,7	40,2	35,9	43,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	53,9	45,1	55,0
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	54,3	63,9
Nº encuestas	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45



Tabla A.20. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general especificando la respuesta abierta “otras situaciones” médicas crónicas declaradas. Región de Murcia 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Hematológicas										
Media	52,1	52,9	48,7	42,4	51,5	55,2	45,6	49,7	50,5	49,1
DE	9,5	8,2	9,3	9,1	9,4	3,5	11,8	11,2	10,1	9,6
Mínimo	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	46,5	22,5	28,0	23,0	31,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,6	62,8
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	46,5	22,5	28,0	23,0	31,8
Percentil 25	55,4	48,0	47,2	29,6	39,3	56,6	33,7	40,2	45,3	39,9
Percentil 50	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	53,5	52,3	54,5	51,8
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	57,2	58,8
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	66,9	56,6	56,1	64,5	58,6	62,8
Nº encuestas	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Endocrino-Metabólicas (excepto DM)										
Media	48,6	48,7	47,0	40,9	52,0	51,5	48,2	51,5	45,8	51,8
DE	11,3	12,1	11,7	8,4	15,1	10,5	11,3	11,2	11,4	12,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	21,9	17,6	13,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	63,0	73,8
Percentil 5	22,1	23,0	26,9	29,6	27,6	26,3	24,7	24,4	24,5	19,4
Percentil 25	39,3	38,7	37,1	29,6	37,7	56,6	33,7	46,3	35,9	43,4
Percentil 50	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	48,3	55,5
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	62,4	66,4
Nº encuestas	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Dorsopatías										
Media	46,8	46,6	41,9	36,7	55,4	50,9	49,0	51,3	41,8	53,7
DE	11,4	11,3	13,8	9,7	9,7	10,9	11,9	11,2	12,5	12,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	16,4	19,1
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	63,4	76,0
Percentil 5	22,1	24,1	26,9	18,9	37,7	16,2	22,5	28,0	17,9	29,1
Percentil 25	39,3	38,7	26,9	29,6	47,7	46,5	44,9	46,3	31,1	48,5
Percentil 50	52,3	48,0	47,3	29,6	57,8	56,6	56,1	52,3	46,4	54,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,5	60,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,1	76,0
Nº encuestas	58	58	58	56	58	58	58	58	56	56
Digestivas										
Media	44,6	44,1	43,4	36,6	51,4	47,1	44,1	46,3	42,3	48,0
DE	14,2	15,9	15,2	10,8	13,8	14,7	17,0	14,1	13,4	14,2
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	17,1	14,4
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,4	66,5
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	19,4	15,8
Percentil 25	35,6	29,5	26,9	29,6	46,5	36,4	30,9	40,2	29,0	41,1
Percentil 50	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	47,9	52,2
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,4	62,9
Nº encuestas	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57
Dermatológicas										
Media	54,2	54,5	54,3	49,2	58,8	53,3	50,9	51,5	54,2	52,2
DE	6,8	7,0	7,6	12,0	9,0	8,1	9,7	6,3	9,7	7,8
Mínimo	22,1	29,5	26,9	18,9	37,7	16,2	22,5	28,0	24,6	30,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,4	63,4
Percentil 5	31,1	34,4	32,2	24,5	43,0	26,8	28,4	37,6	28,1	35,5
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	47,7	56,6	46,9	47,3	54,3	45,2
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	54,5	57,8	56,6	56,1	52,3	57,3	53,4
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	59,7	67,9	56,6	56,1	52,3	59,4	58,3
Percentil 95	47,4	47,5	52,1	58,6	62,6	51,3	50,2	56,7	59,9	61,8
Nº encuestas	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13

2.4. TABLAS DE UTILIZACIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS

Tabla A.21. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según tiempo pasado desde la última consulta médica realizada. Región de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
≤ 4 semanas										
Media	47,1	46,5	46,1	39,1	53,4	49,0	47,1	50,5	44,2	51,2
DE	13,0	13,4	14,0	10,5	12,6	12,6	13,6	12,5	12,5	12,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	28,0	19,8	26,0
Percentil 25	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	33,7	40,2	35,7	42,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	48,6	55,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,5	59,9
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,1	64,9
Nº encuestas	1185	1189	1189	1188	1184	1186	1188	1184	1177	1177
> 4 semanas y < 1 año										
Media	52,8	53,7	53,0	43,5	58,6	53,9	52,1	54,8	50,6	55,0
DE	9,0	8,8	9,3	8,4	9,6	7,9	9,2	9,6	8,8	9,2
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	5,8	9,7
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,8	78,9
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	34,1	28,9	34,9
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	49,7	52,2
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	60,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	63,6
Nº encuestas	1834	1836	1834	1832	1829	1833	1837	1829	1811	1811
≥ 1 año										
Media	55,3	56,0	55,2	46,5	60,2	54,7	52,5	55,1	53,9	54,8
DE	4,7	4,6	6,3	8,7	8,9	7,1	8,1	9,3	4,8	8,2
Mínimo	22,1	20,3	16,7	29,6	27,6	16,2	11,3	15,8	23,6	7,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,6	64,6
Percentil 5	47,9	48,0	37,1	29,6	47,7	36,4	33,7	34,1	44,0	37,1
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	51,9
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	54,8	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,4	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,5	62,7
Nº encuestas	340	338	337	336	335	336	338	335	332	332
p	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Tabla A.22. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según hospitalización en el último año. Región de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
No										
Media	51,7	52,1	51,3	42,7	57,3	52,8	50,7	53,6	49,3	53,8
DE	10,1	10,2	11,0	9,4	10,7	9,4	10,7	10,7	10,1	10,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	79,3
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	28,0	25,8	30,9
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	47,7	56,6	56,1	46,3	46,6	50,7
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,2	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	60,1
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	63,8
Nº encuestas	3081	3086	3084	3083	3070	3078	3085	3071	3048	3048
Sí										
Media	44,1	43,1	45,1	37,9	53,1	46,8	46,7	50,4	41,0	51,4
DE	14,7	15,3	14,5	10,8	13,1	14,1	14,8	12,7	13,3	13,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	5,8	14,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,9	76,9
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	28,0	17,1	24,6
Percentil 25	30,7	29,5	26,9	29,6	47,7	36,4	33,7	40,2	29,3	43,0
Percentil 50	56,5	48,0	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	44,8	56,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,2	61,8
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,7	65,9
Nº encuestas	281	281	281	277	281	281	281	281	277	277
<i>p</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002

Tabla A.23. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según número de hospitalizaciones. Región de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Ninguna vez										
Media	51,6	52,1	51,3	42,6	57,2	52,7	50,6	53,5	49,3	53,8
DE	10,1	10,3	11,1	9,4	10,8	9,5	10,7	10,7	10,1	10,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	79,3
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	28,0	25,8	30,7
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	47,7	56,6	56,1	46,3	46,5	50,6
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,2	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	60,1
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	63,8
Nº encuestas	3089	3094	3091	3091	3078	3086	3093	3079	3056	3056
Una vez										
Media	45,5	44,5	46,0	38,9	53,7	48,5	47,9	51,4	42,1	52,4
DE	14,3	15,1	14,4	10,5	12,9	13,4	14,2	12,2	13,2	12,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	10,3	14,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,9	76,9
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	28,0	17,0	24,6
Percentil 25	30,7	29,5	37,1	29,6	47,7	46,5	33,7	42,7	31,9	46,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	47,0	56,8
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,5	62,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,7	65,9
Nº encuestas	253	253	253	249	253	253	253	253	249	249
Más de una vez										
Media	32,3	30,8	38,2	29,9	48,6	34,5	37,4	42,4	31,5	44,0
DE	12,4	11,4	13,3	9,5	12,8	10,3	14,9	14,1	10,6	13,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	5,8	26,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	49,0	73,1
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	18,9	11,3	21,9	18,0	26,8
Percentil 25	22,1	20,3	26,9	18,9	38,3	26,3	22,8	28,0	23,6	31,6
Percentil 50	30,7	29,5	37,1	29,6	47,7	36,4	33,7	43,2	28,2	42,7
Percentil 75	39,3	38,7	47,3	32,7	57,8	39,0	56,1	58,4	44,5	58,9
Percentil 95	56,5	54,6	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	49,0	73,0
Nº encuestas	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
<i>p</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3. Calidad de vida relacionada con la salud por áreas de salud: índices resumen y dimensiones

3.1. ÁREA DE SALUD DE MURCIA

Tabla A.24. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos. Área de Salud de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Ambos sexos										
Media	51,4	51,3	51,3	41,9	56,2	53,1	49,8	53,3	48,9	53,3
DE	10,7	11,2	11,2	9,1	10,9	8,4	11,3	10,8	10,7	10,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	8,2	13,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	29,6	37,7	36,4	22,5	28,0	23,9	30,9
Percentil 25	56,5	48,0	47,3	44,7	47,7	56,6	44,9	46,3	46,4	48,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,1	64,0
Nº encuestas	557	560	560	556	557	558	560	556	548	548

Tabla A.25. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres. Área de Salud de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Hombres										
Media	52,4	52,5	52,9	43,0	58,3	54,4	51,2	55,2	49,9	55,2
DE	9,6	10,0	9,3	8,9	10,1	6,6	9,8	10,0	9,8	9,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	9,8	20,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	76,0
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	33,3	34,1	27,4	34,4
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	47,5	51,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	62,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,6	64,7
Nº encuestas	278	278	278	277	276	278	278	276	274	274

Tabla A.26. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres. Área de Salud de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Mujeres										
Media	50,4	50,1	49,7	40,8	54,1	51,8	48,5	51,5	47,9	51,4
DE	11,6	12,2	12,5	9,3	11,3	9,8	12,4	11,3	11,6	11,5
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	8,2	13,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	26,3	22,5	28,0	22,2	26,8
Percentil 25	47,9	48,0	47,3	29,6	47,7	56,6	44,9	46,3	43,7	43,6
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,4	56,9
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	54,8	58,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,5	62,8
Nº encuestas	279	282	282	279	281	280	282	280	274	274

Tabla A.27. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos por grupo de edad. Área de Salud de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
18-24 años										
Media	55,7	55,4	55,2	45,0	61,2	54,8	52,1	56,0	53,3	55,4
DE	3,1	6,1	6,5	7,5	9,0	5,7	8,9	9,0	4,6	8,5
Mínimo	39,3	20,3	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	28,0	35,5	24,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,1	63,8
Percentil 5	47,9	39,5	37,1	29,6	37,7	36,4	32,6	39,5	43,4	35,5
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	53,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,2	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	56,1	67,9	56,6	56,1	64,5	60,4	62,7
Nº encuestas	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
25-34 años										
Media	56,0	53,7	53,8	44,6	59,4	54,3	51,6	53,6	52,8	53,7
DE	2,3	8,7	7,3	8,0	8,9	7,0	9,2	10,6	6,0	10,4
Mínimo	39,3	20,3	16,7	29,6	27,6	26,3	22,5	21,9	26,5	20,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	64,9	68,1
Percentil 5	56,5	29,5	40,7	29,6	37,7	36,4	33,7	28,0	41,3	26,8
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	50,2	49,0
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,7	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	56,1	60,1
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	60,3	67,9	56,6	56,1	64,5	61,1	63,7
Nº encuestas	134	134	134	132	132	134	134	134	131	131
35-44 años										
Media	54,2	54,4	54,5	43,4	57,0	55,0	51,4	55,2	51,8	54,2
DE	7,8	7,5	7,7	7,0	10,0	6,5	10,1	9,4	7,6	10,2
Mínimo	22,1	20,3	26,9	18,9	27,6	16,2	11,3	28,0	17,9	21,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	65,2	76,0
Percentil 5	28,8	38,7	27,4	29,6	37,7	41,2	33,7	34,1	34,0	33,4
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	47,7	56,6	56,1	52,3	50,4	52,0
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	60,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	62,2	63,2
Nº encuestas	119	121	121	121	121	121	121	119	118	118
45-54 años										
Media	52,0	51,5	52,1	41,8	55,2	54,8	51,6	53,7	48,9	54,2
DE	9,9	10,5	10,6	9,2	10,4	5,6	9,4	10,0	10,6	9,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	36,4	22,5	21,9	11,3	25,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	69,7
Percentil 5	22,1	28,8	26,9	27,9	37,7	36,4	22,5	28,0	24,3	34,1
Percentil 25	56,5	48,0	47,3	36,0	47,7	56,6	56,1	46,3	43,6	50,1
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	54,8	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,0	65,0
Nº encuestas	83	84	84	84	83	83	84	83	82	82

Tabla A.27. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos por grupo de edad. Área de Salud de Murcia 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
55-64 años										
Media	48,3	48,7	48,2	38,0	52,5	49,6	46,3	50,4	46,0	49,9
DE	13,0	12,8	13,6	10,4	11,9	12,0	14,9	14,0	11,6	13,5
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	15,0	13,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,0	63,4
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	22,5	11,3	15,8	22,9	17,8
Percentil 25	47,9	38,7	47,3	29,6	47,7	36,4	33,7	40,2	40,3	38,7
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	51,8	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	59,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	46,1	67,9	56,6	56,1	64,5	58,0	62,7
Nº encuestas	61	61	61	60	61	60	61	61	59	59
65-74 años										
Media	40,8	42,8	43,8	36,6	52,0	48,2	43,5	49,5	40,1	50,5
DE	14,5	15,7	14,2	11,0	12,2	11,4	14,0	11,9	14,4	12,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	9,8	22,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	65,0	73,2
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	26,3	16,1	28,0	14,9	26,8
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,6	47,7	36,4	33,7	40,2	27,6	40,1
Percentil 50	39,3	51,7	47,3	44,7	55,1	56,6	44,9	52,3	39,8	54,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,3	70,4
Nº encuestas	50	50	50	50	50	50	50	50	49	49
≥ 75 años										
Media	38,4	42,5	40,3	36,4	48,8	48,8	45,5	50,3	36,7	52,3
DE	13,6	15,2	15,6	9,5	12,6	10,4	12,6	11,0	14,0	11,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	26,3	11,3	28,0	8,2	23,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	26,3	22,5	28,2	14,1	31,9
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	36,8	33,7	40,2	23,7	43,6
Percentil 50	39,3	48,0	37,1	33,1	47,7	56,6	56,1	52,3	37,1	54,5
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	48,8	61,9
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	57,7	70,6
Nº encuestas	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44

Tabla A.28. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres por grupo de edad. Área de Salud de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
18-24 años										
Media	56,1	56,5	56,2	45,9	64,0	55,6	53,4	57,3	53,9	57,1
DE	2,7	3,2	4,6	7,4	6,7	3,7	6,5	7,8	4,1	6,6
Mínimo	39,3	38,7	37,1	29,6	37,7	36,4	33,7	40,2	35,5	35,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,1	63,8
Percentil 5	55,5	49,2	38,7	29,6	49,1	45,9	33,7	40,2	48,7	39,5
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	54,2
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,6	57,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	56,0	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	61,1	67,9	56,6	56,1	64,5	61,4	63,0
Nº encuestas	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
25-34 años										
Media	56,1	53,1	53,8	45,7	60,0	55,9	51,4	55,1	52,6	55,2
DE	2,5	8,5	6,8	8,2	8,4	3,3	9,5	10,7	7,1	10,1
Mínimo	39,3	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	22,5	28,0	26,5	20,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	64,9	68,1
Percentil 5	56,5	29,5	37,1	29,6	42,8	52,3	29,0	28,0	38,4	28,3
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	51,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,6	58,4
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	56,4	62,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	62,7	64,6
Nº encuestas	71	71	71	71	70	71	71	71	70	70
35-44 años										
Media	53,1	54,7	54,3	43,9	59,1	54,9	52,6	56,2	51,1	56,0
DE	9,1	7,3	7,9	6,9	9,6	6,0	7,3	9,4	8,5	9,0
Mínimo	22,1	20,3	26,9	29,6	27,6	26,3	33,7	28,0	17,9	33,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	64,8	76,0
Percentil 5	22,1	38,7	32,7	29,6	37,7	36,4	33,7	37,1	33,2	35,5
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	50,2	52,0
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	59,1
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	62,4	64,5
Nº encuestas	62	62	62	62	62	62	62	61	61	61
45-54 años										
Media	52,0	51,9	52,3	41,8	56,1	54,5	52,4	54,6	48,8	55,2
DE	10,5	10,2	10,1	9,3	10,9	6,1	8,5	9,5	10,5	8,9
Mínimo	22,1	24,9	26,9	18,9	27,6	36,4	22,5	21,9	15,4	25,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,7	69,7
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	23,1	34,4	25,1	34,9
Percentil 25	56,5	53,7	49,8	29,6	47,7	56,6	56,1	47,8	43,6	51,0
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,5
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,0	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,4	65,9
Nº encuestas	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41

Tabla A.28. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres por grupo de edad. Área de Salud de Murcia 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
55-64 años										
Media	51,1	52,7	53,4	39,8	56,4	53,5	49,8	55,2	49,0	54,2
DE	10,7	10,8	10,0	8,9	10,0	7,8	13,3	11,1	9,1	10,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	37,7	26,3	11,3	15,8	16,6	23,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,8	62,9
Percentil 5	22,1	21,7	25,2	20,5	37,7	34,7	13,0	28,9	24,9	31,2
Percentil 25	47,9	57,2	57,4	29,6	47,7	56,6	56,1	52,8	46,6	55,0
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,1	53,5	59,9
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	53,9	67,9	56,6	56,1	64,5	57,8	62,7
Nº encuestas	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
65-74 años										
Media	43,6	43,6	46,7	38,0	53,6	49,4	46,1	53,0	41,4	53,0
DE	13,8	15,8	13,5	11,1	12,6	10,8	12,5	10,2	14,5	12,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	28,0	9,8	22,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	73,2
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	22,1	17,9	31,6	14,3	26,2
Percentil 25	30,7	29,5	37,1	29,6	47,7	46,5	33,7	46,3	28,9	47,0
Percentil 50	47,9	57,2	52,3	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	46,5	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	62,3	56,6	56,1	58,4	53,5	62,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,2	72,6
Nº encuestas	23	23	23	22	23	23	23	23	22	22
≥ 75 años										
Media	42,2	47,7	46,4	37,5	52,8	51,3	47,0	51,4	42,0	53,0
DE	13,5	14,2	14,1	10,0	12,3	10,3	14,0	11,2	12,8	11,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	26,3	11,3	28,0	14,4	23,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	70,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	26,3	16,4	28,0	18,0	30,2
Percentil 25	30,7	38,7	37,1	29,6	42,5	46,7	34,0	40,2	35,1	46,5
Percentil 50	39,7	57,2	52,3	44,7	57,8	56,6	56,1	58,1	46,3	57,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,5	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	51,0	64,5	58,0	68,7
Nº encuestas	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17

Tabla A.29. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres por grupo de edad. Área de Salud de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
18-24 años										
Media	55,4	54,1	54,0	44,0	58,1	54,0	50,6	54,7	52,5	53,5
DE	3,5	8,0	7,9	7,5	10,2	7,2	10,9	10,2	5,1	9,9
Mínimo	39,3	20,3	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	28,0	35,7	24,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	62,2	62,7
Percentil 5	46,4	29,6	27,0	29,6	37,7	34,6	22,5	28,0	40,0	28,4
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	47,7	56,6	54,5	46,5	52,4	50,9
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	59,3	55,1	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	56,9	67,9	56,6	56,1	64,5	60,6	62,7
Nº encuestas	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
25-34 años										
Media	56,0	54,5	53,8	43,2	58,7	52,4	51,8	52,0	53,1	52,0
DE	2,0	8,9	7,8	7,5	9,3	9,3	9,1	10,2	4,5	10,6
Mínimo	47,9	20,3	16,7	29,6	27,6	26,3	22,5	21,9	41,2	26,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,1	67,0
Percentil 5	47,9	29,5	47,3	29,6	37,7	26,3	33,7	28,0	42,1	26,8
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	46,3	50,2	46,2
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	54,5	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,7	58,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,5	62,9
Nº encuestas	63	63	63	61	63	63	63	63	61	61
35-44 años										
Media	55,4	54,1	54,7	42,8	54,9	55,1	50,2	54,1	52,6	52,3
DE	5,9	7,7	7,6	7,1	10,0	7,0	12,3	9,3	6,5	11,0
Mínimo	22,1	20,3	26,9	18,9	27,6	16,2	11,3	28,0	32,9	21,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	65,2	62,7
Percentil 5	56,5	38,7	26,9	29,6	27,6	46,5	11,3	34,1	36,0	21,9
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	47,7	56,6	56,1	52,3	50,6	51,9
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	55,1	58,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,0	62,7
Nº encuestas	57	58	58	58	58	58	58	58	57	57
45-54 años										
Media	52,0	51,2	51,8	41,9	54,4	55,1	50,8	52,9	48,9	53,2
DE	9,4	10,9	11,3	9,1	10,0	5,0	10,2	10,5	10,8	9,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	36,4	22,5	28,0	11,3	28,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	62,7
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	37,2	36,4	22,5	28,0	21,5	31,8
Percentil 25	56,5	48,0	47,3	44,7	47,7	56,6	47,7	46,3	43,5	48,0
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	58,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,0	62,5
Nº encuestas	42	43	43	43	42	42	43	42	41	41

Tabla A.29. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres por grupo de edad. Área de Salud de Murcia 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
55-64 años										
Media	45,7	45,0	43,3	36,2	48,8	45,9	43,0	45,9	43,1	45,7
DE	14,5	13,6	14,8	11,6	12,4	14,1	15,8	15,1	13,2	15,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	15,0	13,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,0	63,4
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	18,7	15,3
Percentil 25	29,4	34,4	26,9	29,6	37,7	36,4	28,4	34,1	32,1	35,2
Percentil 50	56,5	48,5	47,3	44,7	47,7	56,6	55,0	46,3	50,0	54,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,3	58,1
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	49,6	67,9	56,6	56,1	64,5	59,7	62,9
Nº encuestas	31	31	31	31	31	31	31	31	30	30
65-74 años										
Media	38,4	42,2	41,4	35,5	50,8	47,2	41,4	46,6	39,0	48,5
DE	15,0	15,8	14,5	11,0	12,0	12,0	15,1	12,7	14,5	12,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	14,1	23,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	65,0	72,4
Percentil 5	22,1	20,3	17,2	18,9	27,6	23,7	11,8	22,0	15,0	26,8
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,6	47,2	36,4	33,1	40,2	27,4	39,2
Percentil 50	39,3	48,0	37,1	29,6	47,7	56,6	44,9	46,3	37,7	50,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	59,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,0	67,9	56,6	56,1	64,5	62,8	70,4
Nº encuestas	28	28	28	28	28	28	28	27	27	27
≥ 75 años										
Media	35,9	39,1	36,3	35,7	46,3	47,2	44,5	49,7	33,3	52,0
DE	13,2	15,2	15,5	9,2	12,3	10,3	11,8	11,0	13,9	11,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	26,3	11,3	28,0	8,2	23,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,1	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	26,3	28,6	28,5	12,7	33,0
Percentil 25	22,1	23,3	20,9	29,6	37,7	36,4	33,7	40,2	21,7	42,4
Percentil 50	37,8	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	44,9	52,3	34,4	51,7
Percentil 75	47,9	57,2	53,2	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	46,4	62,2
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	49,2	67,0	56,6	56,1	64,5	56,3	75,5
Nº encuestas	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27

Tabla A.30. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica en ambos sexos. Área de Salud de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sin condiciones médicas										
Media	55,8	54,4	54,9	45,1	60,0	54,9	52,5	56,3	52,7	55,6
DE	3,5	7,9	7,3	6,7	8,7	5,7	8,2	8,2	6,2	8,5
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	26,3	22,5	28,0	14,4	20,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	64,9	68,1
Percentil 5	56,5	29,5	37,1	29,6	47,7	36,4	33,7	40,2	40,7	35,5
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	53,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	62,0
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,5	63,1
Nº encuestas	213	213	213	211	210	211	213	210	207	207
Con condiciones médicas										
Media	48,7	49,4	49,1	39,9	53,9	52,0	48,2	51,5	46,6	51,9
DE	12,6	12,5	12,5	9,8	11,5	9,6	12,5	11,8	12,2	11,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	8,2	13,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	23,8	18,9	27,6	26,3	22,5	28,0	21,1	26,8
Percentil 25	39,3	38,7	47,3	29,6	47,7	56,6	44,2	40,2	39,9	44,2
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,1	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	54,3	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	64,2
Nº encuestas	344	347	347	346	347	346	347	346	341	341

Tabla A.31. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, hombres. Área de Salud de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sin enfermedades crónicas										
Media	55,6	53,8	54,4	44,7	60,4	55,3	52,5	56,5	52,0	56,2
DE	4,2	8,5	7,7	7,5	8,9	4,6	7,9	8,2	7,6	8,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	37,7	36,4	22,5	28,0	14,4	20,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	64,9	68,1
Percentil 5	56,0	29,5	37,1	29,6	37,7	41,8	33,7	40,2	34,8	35,8
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	54,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	62,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	62,1	63,9
Nº encuestas	112	112	112	112	110	112	112	111	109	109
Con enfermedades crónicas										
Media	50,2	51,7	51,9	41,9	57,0	53,8	50,3	54,2	48,5	54,5
DE	11,5	10,9	10,2	9,5	10,7	7,6	10,9	10,9	10,8	10,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	9,8	22,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	76,0
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	29,6	37,7	36,4	22,5	28,8	23,8	32,9
Percentil 25	47,9	57,2	47,3	29,6	47,7	56,6	44,9	46,3	45,4	49,5
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	62,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,9	65,1
Nº encuestas	166	166	166	165	166	166	166	166	165	165

Tabla A.32. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, mujeres. Área de Salud de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sin enfermedades crónicas										
Media	56,0	55,1	55,5	45,5	59,6	54,6	52,5	56,0	53,4	54,9
DE	2,6	7,2	6,8	5,8	8,5	6,7	8,6	8,3	4,3	8,6
Mínimo	39,3	20,3	16,7	29,6	27,6	26,3	22,5	28,0	32,0	24,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	62,2	67,0
Percentil 5	56,5	39,3	47,3	29,6	47,7	36,4	33,7	38,8	42,1	33,1
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	52,1
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,6	62,7
Nº encuestas	101	101	101	99	100	100	101	100	98	98
Con enfermedades crónicas										
Media	47,2	47,4	46,5	38,2	51,1	50,3	46,3	49,0	44,9	49,4
DE	13,4	13,5	13,8	9,8	11,5	10,9	13,6	12,0	13,1	12,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	8,2	13,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	26,3	19,9	28,0	17,8	25,9
Percentil 25	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	33,7	40,2	36,1	41,2
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	50,2	54,4
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,8
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	58,8	63,3
Nº encuestas	178	181	181	180	181	180	181	180	176	176

Tabla A.33. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según el tipo condición médica crónica, ambos sexos. Área de Salud de Murcia 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Hipertensión arterial										
Media	44,2	46,9	47,2	36,9	51,5	50,0	46,3	50,4	43,2	51,1
DE	14,6	13,7	14,7	10,2	12,6	11,7	13,4	12,3	13,6	12,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	8,2	16,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	24,0	15,0	28,0	17,1	26,6
Percentil 25	30,7	35,3	37,1	29,6	46,5	46,5	33,7	40,2	32,5	41,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	49,9	54,9
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	60,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	51,7	67,9	56,6	56,1	64,5	58,0	64,8
Nº encuestas	107	107	107	107	107	107	107	106	106	106
Diabetes mellitus										
Media	42,1	43,3	43,1	33,5	50,6	47,2	45,0	49,0	39,3	50,2
DE	14,5	14,7	15,8	9,8	13,9	12,8	14,9	13,7	14,4	14,2
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	8,2	16,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	61,8	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	24,0	12,3	25,2	14,1	24,1
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	36,5	25,3	36,9
Percentil 50	44,2	48,0	47,3	29,6	51,7	56,6	56,1	52,3	44,6	56,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	58,4	56,6	56,1	58,4	52,4	62,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	56,4	65,6
Nº encuestas	47	47	47	46	47	47	47	47	46	46
Asma, bronquitis, enfisema										
Media	46,4	46,4	49,7	35,5	51,3	49,4	44,8	48,5	45,1	48,5
DE	14,0	13,1	12,0	9,4	11,8	11,3	12,6	13,8	13,5	12,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	15,4	22,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	62,8	69,7
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	18,9	27,6	26,3	22,5	21,9	16,6	25,6
Percentil 25	39,3	38,7	37,1	29,6	39,0	45,4	33,7	34,1	35,2	41,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	29,6	47,7	56,6	44,9	52,3	48,7	47,9
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	56,5	60,0
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	61,8	64,4
Nº encuestas	38	38	38	37	38	38	38	38	37	37
Enfermedades del corazón										
Media	36,7	39,4	38,7	33,0	46,9	45,8	41,4	45,5	35,4	47,9
DE	15,1	14,4	15,7	11,6	10,8	11,3	14,9	12,1	14,2	12,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	26,3	11,3	15,8	14,1	23,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	65,0	72,4
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	26,3	11,3	23,5	15,2	25,2
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	26,5	37,7	36,4	31,6	39,4	23,3	38,0
Percentil 50	30,7	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	44,9	46,3	33,9	50,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	57,6	48,7	57,9
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	61,9	56,6	56,1	64,5	58,5	69,0
Nº encuestas	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Alergia										
Media	51,4	50,7	50,8	41,7	55,2	52,9	49,1	52,4	48,8	52,3
DE	11,2	11,9	11,6	10,0	11,5	8,7	12,0	12,7	11,4	12,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	8,2	16,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	18,9	27,6	36,4	22,5	22,7	22,4	26,8
Percentil 25	56,5	48,0	47,3	29,6	47,7	56,6	44,9	46,3	46,6	44,2

Tabla A.33. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según el tipo condición médica crónica, ambos sexos. Área de Salud de Murcia 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,2	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,6	59,8
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,1	63,9
Nº encuestas	131	33	133	132	133	132	133	133	129	129
Depresión										
Media	40,2	40,5	41,2	33,5	46,4	45,1	36,9	41,7	40,2	42,4
DE	15,3	15,0	15,5	11,0	12,7	12,8	16,0	13,1	15,0	14,2
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	11,3	13,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	72,4
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	16,2	21,0
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	22,3	37,7	36,4	22,5	34,1	26,9	31,5
Percentil 50	39,3	38,7	40,4	29,6	47,7	46,5	33,7	40,2	38,4	42,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	53,5	57,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	64,4	62,7
Nº encuestas	75	75	75	74	75	75	75	74	74	74
Artrosis y problemas reumáticos										
Media	41,1	43,8	42,1	35,7	49,8	48,1	44,3	48,0	39,7	49,7
DE	14,5	14,7	14,8	10,1	12,3	11,8	14,4	12,7	13,9	13,5
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	8,2	13,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	26,3	11,3	25,9	16,6	23,7
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	40,2	27,9	40,2
Percentil 50	39,3	48,0	47,3	29,6	47,7	56,6	56,1	52,3	40,4	52,2
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	59,9
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	58,5	67,0
Nº encuestas	135	135	135	133	135	135	135	134	132	132
Tumor maligno (últimos 5 años)										
Media	37,0	39,5	42,3	32,7	48,3	46,2	40,7	46,3	36,6	48,1
DE	13,5	15,8	15,6	10,4	12,7	13,7	17,1	10,8	13,2	15,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	28,0	8,2	21,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	57,4	79,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	29,3	10,7	21,0
Percentil 25	22,1	20,3	26,9	25,0	37,7	36,4	28,0	40,2	31,1	37,1
Percentil 50	39,3	38,7	47,3	29,6	47,7	55,2	44,9	42,3	36,2	49,4
Percentil 75	50,9	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	45,9	60,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	63,2	57,3	79,3
Nº encuestas	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
Otras situaciones										
Media	46,7	46,5	46,5	38,8	53,2	49,4	45,8	49,2	44,6	49,8
DE	13,4	14,6	13,3	10,6	11,2	11,5	14,0	12,3	12,8	12,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	11,3	13,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,6	76,0
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	26,3	13,1	28,0	19,0	23,8
Percentil 25	39,3	37,2	37,1	29,6	47,7	36,4	33,7	40,2	35,1	41,4
Percentil 50	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	50,2	54,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,8
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,6	64,2
Nº encuestas	88	89	89	88	89	89	89	89	87	87

3.2. ÁREA DE SALUD DE CARTAGENA

Tabla A.34. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos. Área de Salud de Cartagena 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Ambos sexos										
Media	50,7	50,8	50,5	42,4	55,7	52,0	50,0	53,6	48,2	53,5
DE	11,0	11,7	11,6	9,5	11,9	10,4	11,5	11,2	11,1	11,5
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	78,9
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	29,6	27,6	26,3	22,5	28,0	23,7	28,0
Percentil 25	47,9	48,0	47,3	39,1	47,7	56,6	44,9	49,6	44,8	50,5
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	60,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	63,6
Nº encuestas	557	556	554	556	552	553	555	552	551	551

Tabla A.35. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres. Área de Salud de Cartagena 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Hombres										
Media	51,7	52,2	52,1	43,6	57,1	52,4	50,8	54,9	49,5	54,3
DE	10,2	10,9	10,5	9,3	11,6	10,0	10,9	10,0	10,6	11,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	78,3
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	29,6	27,6	26,3	22,5	34,1	23,8	29,5
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	47,7	56,6	56,1	52,3	47,0	52,1
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,8	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	61,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,3	63,6
Nº encuestas	285	283	282	283	280	281	282	279	279	279

Tabla A.36. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres. Área de Salud de Cartagena 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Mujeres										
Media	49,8	49,3	48,9	41,1	54,2	51,6	49,1	52,3	46,9	52,7
DE	11,7	12,3	12,5	9,6	12,1	10,8	12,2	12,2	11,4	11,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	10,3	13,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,0	78,9
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	18,9	27,6	26,3	22,5	28,0	23,5	26,8
Percentil 25	47,9	38,7	38,4	29,6	47,7	56,6	44,9	46,3	42,2	49,0
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,1	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	54,8	60,1
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,5	63,7
Nº encuestas	272	272	272	273	272	272	272	272	271	271

Tabla A.37. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos por edad. Área de Salud de Cartagena 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
18-24 años										
Media	55,1	54,1	55,0	46,0	60,4	54,9	53,7	59,2	51,7	57,8
DE	5,6	8,3	6,2	8,0	9,9	6,9	5,8	6,5	7,7	7,2
Mínimo	22,1	20,3	26,9	29,6	27,6	16,2	33,7	40,2	21,9	26,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,8	67,9
Percentil 5	39,3	29,5	44,3	29,6	37,7	38,3	36,1	40,2	27,8	44,7
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,1	54,9
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,5	59,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	56,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,5	65,4
Nº encuestas	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66
25-34 años										
Media	54,9	53,5	53,3	44,4	57,3	54,0	52,5	55,1	51,5	54,5
DE	5,8	8,0	9,0	8,6	10,3	8,1	8,9	9,1	8,3	10,2
Mínimo	22,1	20,3	26,9	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	15,2	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	68,9
Percentil 5	39,3	38,7	26,9	29,6	37,7	26,3	33,7	34,1	35,7	30,1
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	47,7	56,6	56,1	52,3	49,7	53,3
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,9	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,9	62,7
Nº encuestas	129	129	128	129	128	128	129	128	128	128
35-44 años										
Media	54,0	51,8	52,6	44,8	58,3	53,6	51,3	53,6	51,0	53,9
DE	8,1	10,5	9,6	7,7	11,0	8,9	10,0	9,5	7,9	9,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	25,9	14,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	64,2	65,9
Percentil 5	22,1	23,6	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	34,1	31,2	31,0
Percentil 25	56,5	48,0	47,3	44,7	47,7	56,6	56,1	52,3	50,6	50,6
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	59,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	62,7
Nº encuestas	115	114	114	114	113	113	114	113	113	113
45-54 años										
Media	53,3	54,1	52,4	43,3	56,9	52,6	51,2	53,9	51,1	53,4
DE	7,7	8,1	10,5	8,1	10,0	8,8	9,7	10,7	8,2	10,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	28,0	14,2	21,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	64,2	72,1
Percentil 5	31,3	33,8	26,9	29,6	37,7	36,4	27,2	28,0	31,4	28,4
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	47,7	56,6	56,1	46,3	49,4	48,7
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	61,6	55,1	59,8
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	63,0	62,7
Nº encuestas	85	85	85	85	84	85	84	84	84	84



Tabla A.37. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos por edad. Área de Salud de Cartagena 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
55-64 años										
Media	46,0	45,9	46,3	38,3	52,2	49,0	46,9	51,3	43,1	51,9
DE	13,4	14,9	14,2	10,8	13,8	13,7	14,7	14,1	14,1	15,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	13,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	62,1	78,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	18,6	21,3
Percentil 25	39,3	29,5	26,9	29,6	45,6	46,5	41,8	44,9	31,3	41,5
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	49,2	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,6	56,6	56,1	64,5	53,5	61,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,6	73,0
Nº encuestas	66	67	67	67	67	67	67	67	66	66
65-74 años										
Media	41,2	47,8	45,7	36,0	50,4	48,9	44,7	50,4	41,6	50,6
DE	12,6	13,4	12,7	9,7	11,6	12,0	14,1	12,5	11,3	13,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	17,1	16,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	62,8	68,6
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	18,9	27,6	17,0	18,1	26,1	23,2	21,3
Percentil 25	30,7	38,7	37,1	29,6	44,1	46,5	33,7	40,2	30,4	41,9
Percentil 50	39,3	57,2	47,3	29,6	52,9	56,6	56,1	52,3	44,8	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	49,8	60,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	53,6	67,9	56,6	56,1	64,5	56,4	65,8
Nº encuestas	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
≥ 75 años										
Media	36,7	39,1	38,4	37,0	46,1	44,9	41,7	47,5	35,4	48,6
DE	14,3	16,4	14,8	11,1	14,6	14,7	16,2	15,9	13,8	16,2
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	10,3	14,1
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	58,8	78,9
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	14,5	16,0
Percentil 25	22,1	20,3	26,9	29,6	28,4	36,4	33,7	34,1	23,7	37,6
Percentil 50	39,3	38,7	37,1	43,1	47,7	56,6	44,9	52,3	36,1	54,4
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	64,5	47,6	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,1	70,1
Nº encuestas	42	41	41	42	41	41	41	41	41	41

Tabla A.38. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres por grupo de edad. Área de Salud de Cartagena 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
18-24 años										
Media	55,7	54,8	55,9	47,7	61,5	54,0	53,0	59,4	53,1	57,2
DE	5,0	6,8	5,2	7,4	10,6	8,8	6,9	6,6	6,2	7,6
Mínimo	22,1	20,3	26,9	29,6	27,6	16,2	33,7	40,2	21,9	26,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,8	63,8
Percentil 5	56,5	38,7	47,3	29,6	37,7	24,6	33,7	42,0	41,5	42,5
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	54,5
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	59,3	53,7	59,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,0	62,7
Percentil 95	55,7	54,8	55,9	47,7	61,5	54,0	53,0	59,4	53,1	57,2
Nº encuestas	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
25-34 años										
Media	54,8	54,6	55,3	46,2	58,6	53,1	51,9	55,4	53,1	54,1
DE	5,8	7,5	6,2	7,8	10,5	9,5	10,5	9,5	7,9	11,8
Mínimo	22,1	20,3	26,9	29,6	27,6	16,2	11,3	15,8	15,2	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	63,6
Percentil 5	39,3	38,0	37,1	29,6	36,2	26,3	22,5	37,5	39,6	26,9
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	54,0
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,7	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	58,4	56,4	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	64,8	62,7
Nº encuestas	71	71	70	71	70	70	71	70	70	70
35-44 años										
Media	54,6	53,0	53,6	45,6	59,0	53,7	51,5	53,9	52,1	53,9
DE	7,1	10,1	8,9	8,0	10,3	8,2	10,0	10,0	7,3	9,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	29,6	27,6	16,2	11,3	15,8	29,9	14,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	64,2	65,9
Percentil 5	35,1	20,3	26,9	29,6	34,1	32,7	30,4	31,9	32,6	30,8
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	51,4	51,1	51,3
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	58,4	56,4	59,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,9	62,7
Nº encuestas	61	60	60	60	59	59	60	59	59	59
45-54 años										
Media	52,6	52,8	50,4	41,6	57,6	51,9	50,7	53,3	49,7	53,4
DE	8,9	10,2	12,3	7,6	10,3	10,2	10,9	10,6	9,8	11,2
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	28,0	14,2	21,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	64,2	72,1
Percentil 5	24,7	21,7	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	29,4	26,7	28,1
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	46,3	47,7	49,6
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,5	59,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	52,4	67,9	56,6	56,1	64,5	63,8	62,9
Nº encuestas	43	43	43	43	42	43	42	42	42	42



Tabla A.38. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres por grupo de edad. Área de Salud de Cartagena 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
55-64 años										
Media	47,2	48,5	48,5	39,5	53,3	50,0	49,4	54,6	44,4	53,9
DE	13,0	14,3	13,3	11,5	13,5	13,1	13,4	11,0	14,4	14,2
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	28,0	4,3	23,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,7	78,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,7	11,9	33,2	11,6	24,1
Percentil 25	39,3	38,7	47,3	29,6	47,7	56,6	47,7	46,3	38,3	46,0
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	50,2	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	65,4	56,6	56,1	64,5	54,4	62,2
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,6	77,5
Nº encuestas	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
65-74 años										
Media	42,6	50,7	48,7	37,7	53,9	51,6	49,0	53,8	43,1	54,7
DE	12,4	12,5	11,6	10,1	10,6	10,9	11,2	11,1	10,6	11,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	21,9	17,1	23,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,7	68,6
Percentil 5	22,1	20,3	23,8	18,9	28,4	17,5	22,5	28,8	22,5	28,4
Percentil 25	30,7	48,0	41,2	29,6	47,7	56,6	44,9	46,3	37,8	49,3
Percentil 50	47,9	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	46,1	58,8
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	64,5	51,4	62,2
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,8	67,2
Nº encuestas	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
≥ 75 años										
Media	38,3	42,1	41,1	38,3	45,8	49,3	44,9	52,5	36,4	52,4
DE	14,7	16,6	14,7	11,2	14,8	11,4	14,6	11,7	14,2	12,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	14,0	21,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,8	71,4
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	20,8	11,3	27,1	14,9	28,3
Percentil 25	22,1	20,3	26,9	29,6	27,6	38,9	33,7	46,3	23,9	44,1
Percentil 50	39,3	48,3	37,1	44,7	47,7	56,6	56,1	52,3	37,3	55,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	64,5	51,6	62,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	52,0	56,1	59,3	56,3	69,0
Nº encuestas	17	17	16	17	17	17	17	16	16	16

Tabla A.39. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres por grupo de edad. Área de Salud de Cartagena 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
18-24 años										
Media	54,4	53,3	54,0	44,2	59,3	56,0	54,6	59,0	50,2	58,4
DE	6,1	9,8	7,1	8,4	9,1	3,5	4,3	6,5	9,0	6,9
Mínimo	30,7	20,3	26,9	29,6	37,7	36,4	39,3	40,2	25,8	33,4
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,6	67,9
Percentil 5	36,4	26,5	34,0	29,6	37,7	49,9	43,0	40,2	26,1	41,4
Percentil 25	56,5	57,2	52,2	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	50,5	55,5
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,4	60,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	57,8	67,9	56,6	56,1	64,5	58,8	67,6
Nº encuestas	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
25-34 años										
Media	54,9	52,2	50,9	42,1	55,7	55,1	53,3	54,7	49,6	55,1
DE	5,7	8,4	11,1	9,2	9,9	5,9	6,5	8,7	8,6	7,9
Mínimo	30,7	29,5	26,9	18,9	27,6	26,3	33,7	28,0	19,9	26,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,5	68,9
Percentil 5	38,3	37,6	26,9	28,4	36,5	44,1	33,7	33,3	29,8	38,4
Percentil 25	56,5	48,0	47,3	33,4	47,7	56,6	56,1	52,3	47,0	52,1
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	65,4	56,6	56,1	58,4	55,0	59,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,9	63,4
Nº encuestas	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
35-44 años										
Media	53,2	50,5	51,5	43,8	57,5	53,4	51,1	53,2	49,7	53,8
DE	9,2	10,9	10,3	7,3	11,8	9,7	10,1	9,1	8,4	8,8
Mínimo	22,1	20,3	26,9	18,9	27,6	16,2	22,5	28,0	25,9	27,1
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	63,4
Percentil 5	22,1	28,5	26,9	28,4	36,5	25,1	22,5	33,3	25,9	30,7
Percentil 25	56,5	48,0	47,3	44,7	47,7	56,6	52,9	52,3	49,5	50,1
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,9	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	54,1	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	56,3	67,9	56,6	56,1	64,5	57,5	62,7
Nº encuestas	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
45-54 años										
Media	54,0	55,4	54,5	44,9	56,2	53,3	51,7	54,5	52,6	53,4
DE	6,3	5,0	7,9	8,4	9,7	7,1	8,5	10,8	6,0	10,5
Mínimo	30,7	38,7	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	28,0	34,9	28,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,0	62,7
Percentil 5	37,5	38,7	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	28,0	40,3	30,3
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	47,7	56,6	56,1	46,3	49,7	48,7
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	56,1	60,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	56,9	67,9	56,6	56,1	64,5	61,9	62,7
Nº encuestas	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42



Tabla A.39. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres por grupo de edad. Área de Salud de Cartagena 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
55-64 años										
Media	44,7	43,5	44,1	37,1	51,1	48,0	44,6	48,1	41,9	50,0
DE	13,9	15,3	14,8	10,1	14,1	14,4	15,7	16,0	14,0	15,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	19,1	13,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	62,1	72,9
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	20,0	16,0
Percentil 25	30,7	29,5	26,9	29,6	37,7	45,5	33,7	39,0	25,8	37,7
Percentil 50	56,5	48,5	47,9	44,7	57,2	56,6	56,1	52,3	46,9	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,6	56,6	56,1	59,0	53,5	60,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	46,2	67,9	56,6	56,1	64,5	60,8	69,3
Nº encuestas	33	34	34	34	34	34	34	34	33	33
65-74 años										
Media	39,9	45,2	42,9	34,5	47,2	46,5	41,0	47,3	40,2	47,0
DE	12,9	13,8	13,1	9,4	11,7	12,6	15,4	13,0	11,9	13,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	21,3	16,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	62,8	65,9
Percentil 5	22,1	20,3	24,5	18,9	27,6	16,7	11,3	22,2	23,2	20,8
Percentil 25	30,4	31,8	26,9	29,6	37,7	36,4	33,4	40,2	27,8	38,5
Percentil 50	39,3	48,0	47,3	29,6	47,7	51,5	44,9	46,3	44,0	50,2
Percentil 75	48,2	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	49,9	59,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	48,2	61,1	56,6	56,1	64,5	59,1	65,3
Nº encuestas	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
≥ 75 años										
Media	35,7	37,1	36,6	36,2	46,3	41,9	39,6	44,2	34,7	46,1
DE	14,2	16,3	14,9	11,2	14,8	16,1	17,1	17,6	13,8	18,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	10,3	14,1
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	56,5	78,9
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	13,9	15,2
Percentil 25	22,1	20,3	26,9	29,6	33,1	26,3	28,6	28,0	23,6	31,1
Percentil 50	30,7	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	39,3	46,3	36,4	47,3
Percentil 75	50,6	57,2	51,9	44,7	57,8	56,6	56,1	64,5	47,1	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	58,6	67,9	56,6	56,1	64,5	56,3	74,8
Nº encuestas	25	24	24	25	24	24	24	24	24	24

Tabla A.40. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica en ambos sexos. Área de Salud de Cartagena 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sin condiciones crónicas										
Media	55,5	55,0	54,9	46,3	60,1	55,2	53,5	56,9	52,8	56,4
DE	4,6	6,3	7,0	7,5	9,0	5,3	6,9	8,1	6,2	7,6
Mínimo	22,1	20,3	26,9	18,9	27,6	16,2	22,5	28,0	19,9	26,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	64,3	68,9
Percentil 5	47,9	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	33,7	40,2	41,7	40,4
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	54,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,7	57,9
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	55,9	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,3	62,7
Nº encuestas	216	215	215	215	214	214	215	214	214	214
Con condiciones crónicas										
Media	47,7	48,1	47,7	39,9	52,9	50,0	47,7	51,5	45,3	51,6
DE	12,7	13,5	13,0	9,8	12,7	12,2	13,2	12,3	12,4	13,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	78,9
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	18,9	27,6	16,2	22,5	28,0	20,7	23,9
Percentil 25	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	41,8	46,3	36,9	46,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	49,8	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	64,5	56,6	56,1	58,4	53,5	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	65,9
Nº encuestas	340	340	339	341	338	339	340	338	337	337

Tabla A.41. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, hombres. Área de Salud de Cartagena 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sin enfermedades crónicas										
Media	55,8	55,5	55,3	47,6	60,2	54,9	53,2	57,0	53,5	56,0
DE	3,1	5,2	6,0	7,7	9,7	5,6	8,1	7,8	5,0	8,2
Mínimo	30,7	29,5	26,9	29,6	27,6	16,2	22,5	28,0	33,7	26,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	64,3	65,9
Percentil 5	47,9	38,7	37,6	29,6	47,7	36,4	33,7	40,2	42,6	32,0
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	54,9
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,7	58,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,2	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,3	62,7
Nº encuestas	117	116	116	116	114	114	116	114	114	114
Con condiciones crónicas										
Media	48,8	49,9	49,9	40,8	54,9	50,7	49,1	53,4	46,7	53,0
DE	12,3	13,0	12,2	9,3	12,4	11,9	12,2	11,1	12,4	12,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	78,3
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	19,5	27,6	24,6	22,5	28,0	18,6	26,3
Percentil 25	39,3	48,0	47,3	29,6	47,7	56,6	44,9	46,3	41,6	49,3
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	51,8	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	54,5	60,2
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,4	65,8
Nº encuestas	168	168	166	168	165	166	167	165	165	165

Tabla A.42. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, mujeres. Área de Salud de Cartagena 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sin enfermedades crónicas										
Media	55,2	54,3	54,6	44,8	60,0	55,6	53,9	56,8	51,8	56,8
DE	6,0	7,3	8,0	7,1	8,3	4,8	5,2	8,4	7,3	6,8
Mínimo	22,1	20,3	26,9	18,9	37,7	26,3	33,7	28,0	19,9	28,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,0	68,9
Percentil 5	47,9	38,7	26,9	29,6	47,7	51,4	44,9	35,7	36,7	46,1
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,3	54,2
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,9
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,5	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,7	62,7
<i>Nº encuestas</i>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Con enfermedades crónicas										
Media	46,7	46,4	45,7	39,0	50,9	49,3	46,4	49,7	44,0	50,3
DE	13,0	13,7	13,4	10,2	12,7	12,5	14,1	13,2	12,3	13,5
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	10,3	13,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	62,8	78,9
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	21,5	22,0
Percentil 25	39,3	38,7	37,1	29,6	37,7	46,5	33,7	40,2	34,6	41,8
Percentil 50	56,5	57,2	47,3	44,7	47,7	56,6	56,1	52,3	49,1	55,2
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	59,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,8	66,8
<i>Nº encuestas</i>	172	173	173	173	173	173	173	173	172	172

Tabla A.43. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según el tipo de condición médica crónica, ambos sexos. Área de Salud de Cartagena 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Hipertensión arterial										
Media	44,2	46,5	45,9	37,2	52,5	48,8	46,8	50,2	42,5	51,3
DE	14,1	14,9	14,2	10,7	13,2	13,6	14,2	13,3	13,6	13,5
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	13,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	62,8	72,9
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	18,8	21,3
Percentil 25	30,7	29,5	26,9	29,6	47,7	46,5	33,7	40,2	30,3	43,4
Percentil 50	47,9	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	47,5	57,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,5	60,1
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	68,5
Nº encuestas	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Diabetes mellitus										
Media	38,1	40,8	40,4	33,6	46,8	44,2	41,0	46,7	37,0	47,2
DE	14,4	15,9	15,7	11,0	13,8	16,6	16,5	15,1	13,4	16,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	13,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,8	78,9
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	14,7	16,0
Percentil 25	22,1	22,1	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	34,1	25,9	34,7
Percentil 50	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	56,6	44,9	46,3	36,7	49,4
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	49,5	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	53,0	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	69,5
Nº encuestas	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Asma, bronquitis, enfisema										
Media	42,7	45,0	45,6	36,4	48,8	45,4	44,1	48,0	41,7	47,8
DE	15,0	15,5	15,6	11,5	12,6	15,7	15,7	13,2	14,9	13,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	15,0	13,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,7	68,5
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	18,3	16,0
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	40,2	24,5	39,9
Percentil 50	49,8	57,2	57,4	40,0	47,7	56,6	56,1	52,3	48,0	50,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,0	68,0
Nº encuestas	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Enfermedades del corazón										
Media	35,3	39,5	37,7	36,0	45,2	41,1	37,9	44,3	36,2	44,6
DE	14,1	15,9	14,8	11,3	14,6	16,8	17,6	15,3	14,4	18,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	11,4	9,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	67,3	78,9
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	14,5	12,9
Percentil 25	22,1	20,3	26,9	29,6	27,6	26,3	22,5	32,8	24,7	31,1
Percentil 50	30,7	38,7	37,1	31,5	47,7	46,5	33,8	40,2	35,0	42,1
Percentil 75	47,9	57,2	47,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	48,9	61,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	62,2	77,1
Nº encuestas	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
Alergia										
Media	51,1	49,9	50,6	41,3	55,0	52,5	50,6	53,6	47,6	53,7
DE	10,5	11,9	11,8	9,3	11,4	9,5	10,1	10,1	11,1	9,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	15,2	16,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,7	71,4
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	29,6	29,5	26,3	22,5	28,9	23,8	31,8
Percentil 25	47,9	48,0	47,3	29,6	47,7	56,6	44,9	52,3	43,9	51,8

Tabla A.43. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según el tipo de condición médica crónica, ambos sexos. Área de Salud de Cartagena 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	57,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	54,2	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,4	64,1
Nº encuestas	106	105	104	106	103	104	104	103	103	103
Depresión										
Media	42,4	42,4	40,1	34,9	44,4	40,5	36,5	40,6	41,5	39,8
DE	15,1	15,5	14,8	10,6	13,0	15,7	16,8	13,6	14,2	14,5
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	17,1	4,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	71,1	63,1
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	22,1	15,9
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	28,0	26,7	30,3
Percentil 50	47,9	48,0	37,1	29,6	38,7	36,4	33,7	40,2	44,6	39,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	53,5	54,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,8	61,8	60,1
Nº encuestas	75	76	74	76	73	74	75	73	73	73
Artrosis y problemas reumáticos										
Media	42,1	42,9	40,9	36,7	49,4	46,5	43,5	48,6	39,4	49,4
DE	14,1	15,2	14,3	11,0	13,9	14,5	15,4	14,3	13,3	14,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	13,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,5	78,9
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	17,1	20,9
Percentil 25	28,4	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	40,2	26,8	38,0
Percentil 50	39,3	48,0	37,1	29,6	47,7	56,6	56,1	52,3	42,2	54,9
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	51,8	59,8
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,4	68,4
Nº encuestas	142	142	141	143	141	141	142	141	140	140
Tumor maligno (últimos 5 años)										
Media	37,0	38,3	34,4	30,5	43,0	33,1	32,5	35,5	35,6	35,9
DE	16,0	12,5	11,4	9,4	10,5	13,9	14,2	13,0	11,9	13,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	16,5	21,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	56,5	65,8
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	17,9	21,0
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	20,7	37,7	26,3	22,5	28,0	25,5	26,8
Percentil 50	34,0	38,7	27,5	29,6	43,0	26,3	33,3	32,3	35,2	31,5
Percentil 75	56,5	48,2	45,3	37,6	47,7	46,5	44,9	41,2	47,3	46,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,5	65,8
Nº encuestas	15	16	15	16	15	15	16	15	14	14
Otras situaciones										
Media	45,1	45,6	45,2	38,5	51,3	49,0	46,5	50,6	42,6	51,1
DE	13,5	14,7	13,6	11,1	13,2	13,2	14,3	12,9	13,7	13,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	4,3	14,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	64,1	77,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	17,1	21,4
Percentil 25	39,3	31,2	37,1	29,6	45,2	46,5	33,7	40,2	31,1	43,6
Percentil 50	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	46,8	54,9
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,7	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,9	67,2
Nº encuestas	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97

3.3. ÁREA DE SALUD DE LORCA

Tabla A.44. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos. Área de Salud de Lorca 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Ambos sexos										
Media	51,0	52,0	51,0	42,9	59,4	52,7	51,6	53,5	48,9	54,8
DE	10,7	10,4	12,0	10,0	9,9	9,5	10,6	10,9	10,1	9,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	5,8	15,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	65,0	77,3
Percentil 5	22,1	23,2	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	28,0	24,2	33,3
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	29,6	57,8	56,6	56,1	46,3	45,4	51,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	57,1
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	62,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,1	64,4
Nº encuestas	568	568	568	568	568	568	568	568	568	568

Tabla A.45. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres. Área de Salud de Lorca 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Hombres										
Media	52,2	53,6	53,1	44,2	60,5	54,0	52,9	55,6	50,2	56,4
DE	9,7	9,0	9,8	9,5	8,9	7,4	8,9	9,4	8,9	8,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	5,8	21,4
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	65,0	77,3
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	29,6	47,7	36,4	33,7	40,2	30,0	39,6
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	49,2	54,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,6	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,8	63,8
Nº encuestas	293	293	293	293	293	293	293	293	293	293

Tabla A.46. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres. Área de Salud de Lorca 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Mujeres										
Media	49,7	50,3	48,7	41,4	58,2	51,2	50,2	51,2	47,4	53,2
DE	11,6	11,6	13,6	10,3	10,7	11,1	12,1	11,9	11,1	10,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	13,6	15,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,6	70,2
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	29,6	37,7	20,2	22,5	28,0	22,9	28,5
Percentil 25	39,3	48,0	37,1	29,6	47,7	56,6	56,1	46,3	40,6	49,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	56,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	54,8	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,5	64,9
Nº encuestas	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275

Tabla A.47. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos por edad por grupos de edad. Área de Salud de Lorca 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
18-24 años										
Media	55,6	54,1	54,0	47,7	62,7	55,7	54,3	56,1	52,7	57,2
DE	3,6	7,6	9,1	9,5	8,4	3,7	6,6	9,4	6,5	7,8
Mínimo	39,3	20,3	26,9	18,9	37,7	36,4	22,5	15,8	29,8	24,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,4	70,2
Percentil 5	45,9	38,7	26,9	29,6	47,7	46,5	33,7	40,2	35,6	42,6
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,2	56,6
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	57,9
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,4	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,0	62,9
Nº encuestas	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68
25-34 años										
Media	55,2	54,5	54,4	45,6	60,9	54,7	54,2	55,0	52,5	56,0
DE	4,7	7,2	8,1	8,8	8,6	5,6	6,5	9,4	6,4	6,7
Mínimo	30,7	20,3	16,7	18,9	37,7	26,3	22,5	28,0	22,9	27,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,9	64,9
Percentil 5	39,3	35,9	34,0	29,6	37,7	43,4	41,5	34,1	38,7	42,7
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,2	53,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	52,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,1	60,1
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	59,4	67,9	56,6	56,1	64,5	58,1	62,7
Nº encuestas	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141
35-44 años										
Media	54,2	54,2	52,6	44,8	60,3	55,0	52,6	53,6	51,8	55,0
DE	6,8	7,7	9,6	9,1	9,1	5,2	9,0	9,8	7,9	7,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	29,6	27,6	26,3	11,3	21,9	23,0	24,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	65,0	64,9
Percentil 5	39,3	38,7	26,9	29,6	47,7	38,8	33,7	30,9	36,7	41,6
Percentil 25	56,5	57,2	49,0	44,7	57,8	56,6	56,1	46,3	49,9	51,1
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	53,5	56,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	63,0	56,4	61,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,8	63,7
Nº encuestas	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
45-54 años										
Media	51,7	52,5	50,7	39,9	59,9	52,6	51,1	51,0	49,1	53,4
DE	9,5	9,9	13,2	9,1	9,2	9,9	10,8	12,4	9,1	10,2
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	13,6	15,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,5	67,5
Percentil 5	24,8	29,5	16,7	29,6	37,7	26,3	22,5	19,6	30,1	32,4
Percentil 25	56,5	57,2	55,6	29,6	57,8	56,6	56,1	40,5	44,3	49,3
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	54,8	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,6	62,7
Nº encuestas	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81

Tabla A.47. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos por edad por grupos de edad. Área de Salud de Lorca 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
55-64 años										
Media	47,7	49,9	47,2	40,2	57,9	51,8	50,0	53,0	45,2	54,7
DE	12,4	12,6	14,6	9,6	10,1	9,7	11,5	10,3	12,0	9,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	11,8	26,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,5	77,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	21,7	37,7	26,3	22,6	28,0	18,5	35,2
Percentil 25	39,3	48,0	37,1	29,6	47,7	48,3	45,0	46,3	39,1	49,9
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	51,1	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	62,1	53,5	62,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,3	66,9
Nº encuestas	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
65-74 años										
Media	42,3	51,0	47,9	38,4	57,4	51,4	51,4	54,9	42,4	57,1
DE	14,5	10,5	13,9	9,5	10,5	9,6	9,9	10,0	11,3	8,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	17,3	25,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,9	69,0
Percentil 5	22,1	29,5	16,7	18,9	37,7	34,5	29,0	35,8	20,7	38,7
Percentil 25	22,5	48,0	37,1	29,6	47,7	46,5	56,1	52,3	34,5	54,4
Percentil 50	47,9	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	45,2	59,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	52,4	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	67,2
Nº encuestas	51	51	51	51	51	51	51	51	51	51
≥ 75 años										
Media	37,0	39,2	41,6	36,5	51,4	39,2	40,6	48,1	37,0	47,8
DE	14,3	15,1	15,0	11,5	12,5	16,9	18,6	15,2	11,9	16,2
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	5,8	17,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,3	76,9
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	18,0	18,4
Percentil 25	22,1	21,5	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	40,2	27,8	32,3
Percentil 50	39,3	38,7	47,3	29,6	47,7	38,2	56,1	52,3	37,2	52,8
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	64,7	56,6	56,1	64,5	48,4	62,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	54,4	68,8
Nº encuestas	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48

Tabla A.48. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres por grupo de edad. Área de Salud de Lorca 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
18-24 años										
Media	56,0	55,9	56,0	50,1	64,5	56,0	54,2	58,6	54,2	58,3
DE	2,7	5,2	6,1	8,3	7,5	3,1	7,2	8,0	4,5	7,7
Mínimo	39,3	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	22,5	28,0	32,5	26,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	58,8	68,1
Percentil 5	51,7	38,7	39,5	29,6	47,7	51,0	29,5	40,2	44,1	36,6
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	52,3	52,5	56,6
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	63,7	55,1	60,5
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,7	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	57,8	62,7
Nº encuestas	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
25-34 años										
Media	56,5	56,2	55,8	47,0	63,0	55,8	55,2	55,9	54,0	57,0
DE	0,0	5,2	6,4	8,4	6,0	3,2	4,7	8,7	3,3	6,2
Mínimo	56,5	20,3	16,7	18,9	47,7	36,4	22,5	28,0	40,5	27,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,9	64,5
Percentil 5	56,5	48,0	47,3	29,6	47,7	46,5	50,5	34,1	48,6	47,9
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	54,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,7	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,4	62,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,1	62,7
Nº encuestas	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
35-44 años										
Media	53,9	54,5	54,3	44,7	60,7	55,5	53,7	55,3	51,7	56,4
DE	7,3	7,1	7,5	8,1	7,1	4,6	8,7	8,8	6,9	6,8
Mínimo	22,1	20,3	26,9	29,6	47,7	26,3	11,3	21,9	23,4	24,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	65,0	64,6
Percentil 5	38,6	38,0	36,3	29,6	47,7	46,5	42,3	40,2	37,1	45,9
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	50,3	53,1
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,2	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	63,0	55,1	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,2	63,5
Nº encuestas	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
45-54 años										
Media	51,0	53,5	51,0	40,5	58,9	53,3	51,3	53,7	48,8	54,7
DE	10,3	7,9	11,7	8,8	9,4	7,8	9,8	9,9	8,7	8,3
Mínimo	22,1	29,5	16,7	29,6	27,6	26,3	22,5	15,8	20,6	21,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	66,6
Percentil 5	22,1	33,3	26,9	29,6	37,7	32,5	22,5	37,8	29,2	37,3
Percentil 25	48,4	57,2	47,3	29,6	57,8	56,6	55,1	51,3	44,7	52,3
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	57,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,2	54,8	60,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	58,0	67,9	56,6	56,1	64,5	57,0	62,8
Nº encuestas	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42

Tabla A.48. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres por grupo de edad. Área de Salud de Lorca 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
55-64 años										
Media	48,2	50,4	49,9	40,8	57,6	53,8	50,6	54,3	46,2	55,7
DE	12,5	13,0	12,9	10,0	11,5	7,2	11,4	10,9	11,1	9,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	26,3	11,3	21,9	11,8	26,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,5	77,3
Percentil 5	22,1	20,3	19,6	18,9	27,6	36,0	17,7	27,7	22,1	32,5
Percentil 25	39,3	48,5	37,9	29,6	47,7	56,6	50,9	52,3	39,3	50,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	51,6	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	53,5	62,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,9	67,9	56,6	56,1	64,5	57,9	68,2
Nº encuestas	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
65-74 años										
Media	44,3	51,6	50,8	39,8	58,5	51,3	52,4	56,6	44,2	57,8
DE	14,2	10,1	12,5	9,5	9,9	9,8	8,3	9,4	11,3	8,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	37,7	16,2	22,5	28,0	17,3	33,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,9	67,7
Percentil 5	22,1	27,1	18,8	18,9	37,7	28,4	30,7	32,4	20,0	37,5
Percentil 25	30,7	48,0	47,3	29,6	47,7	46,5	56,1	52,3	35,5	54,4
Percentil 50	52,2	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	49,1	61,5
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	52,4	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,2	67,1
Nº encuestas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
≥ 75 años										
Media	42,0	43,1	45,5	38,4	53,1	43,5	46,4	54,4	39,7	52,9
DE	14,9	14,6	13,4	10,7	12,0	15,4	14,3	11,6	13,2	13,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	28,0	5,8	21,4
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,3	76,9
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	18,0	31,6	15,4	28,0
Percentil 25	23,4	29,5	37,1	29,6	47,7	27,8	35,7	46,0	30,4	45,7
Percentil 50	42,4	45,2	47,3	44,7	57,8	49,5	56,1	58,4	41,9	58,8
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	58,2	56,6	56,1	64,5	52,1	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,1	76,9
Nº encuestas	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

Tabla A.49. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres por grupo de edad. Área de Salud de Lorca 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
18-24 años										
Media	55,1	52,0	51,7	45,0	60,6	55,3	54,3	53,3	50,9	55,9
DE	4,4	9,3	11,3	10,2	8,9	4,3	5,8	10,2	7,9	7,8
Mínimo	39,3	20,3	26,9	18,9	37,7	36,4	33,7	15,8	29,8	24,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,4	70,2
Percentil 5	39,3	32,1	26,9	25,8	44,1	42,8	33,7	31,4	32,7	36,7
Percentil 25	56,5	48,0	49,8	44,7	57,8	56,6	56,1	47,8	48,5	53,9
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	52,3	53,3	56,9
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	58,4	55,9	59,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,8	66,1
Nº encuestas	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
25-34 años										
Media	53,7	52,4	52,6	43,9	58,2	53,3	52,9	53,8	50,5	54,7
DE	6,8	8,8	9,7	9,0	10,5	7,5	8,1	10,2	8,4	7,1
Mínimo	30,7	29,5	26,9	18,9	37,7	26,3	22,5	28,0	22,9	34,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	58,3	64,9
Percentil 5	36,5	29,5	26,9	26,2	37,7	33,1	30,1	32,1	29,2	40,1
Percentil 25	56,5	48,0	56,2	44,7	47,7	56,6	56,1	46,3	50,9	51,3
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	58,1
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	57,6	67,9	56,6	56,1	64,5	58,0	63,4
Nº encuestas	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
35-44 años										
Media	54,7	53,9	50,6	44,8	59,9	54,5	51,4	51,6	51,9	53,4
DE	6,1	8,3	11,4	10,3	11,0	5,9	9,2	10,6	9,0	8,5
Mínimo	30,7	20,3	16,7	29,6	27,6	36,4	33,7	28,0	23,0	25,7
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,6	64,9
Percentil 5	34,9	29,4	21,7	29,6	32,6	36,4	33,7	28,0	29,7	33,5
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	33,4	57,8	56,6	56,1	46,3	49,4	48,6
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	52,3	54,8	54,4
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	63,0	57,8	60,0
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	58,8	67,9	56,6	56,1	64,5	62,1	64,3
Nº encuestas	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
45-54 años										
Media	52,5	51,5	50,4	39,2	60,9	51,9	50,9	48,1	49,5	51,9
DE	8,8	11,6	14,8	9,3	8,8	11,8	11,9	14,1	9,5	11,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	37,7	16,2	11,3	15,8	13,6	15,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,5	67,5
Percentil 5	30,8	20,3	16,7	24,3	42,8	16,2	17,0	15,8	24,5	23,9
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	29,6	57,8	56,6	56,1	40,2	43,8	44,9
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	52,3	52,9	55,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	54,8	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	53,3	67,9	56,6	56,1	64,5	59,1	65,0
Nº encuestas	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Tabla A.49. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres por grupo de edad. Área de Salud de Lorca 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
55-64 años										
Media	47,1	49,3	44,6	39,6	58,1	49,7	49,3	51,6	44,2	53,8
DE	12,4	12,4	15,9	9,3	8,8	11,3	11,8	9,7	13,0	8,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	37,7	16,2	11,3	21,9	15,8	27,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,8	68,9
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	26,5	37,7	23,3	19,8	26,5	16,1	34,1
Percentil 25	39,3	45,4	26,9	29,6	55,0	46,5	43,3	46,3	38,4	48,6
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	50,1	55,5
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,6	58,8
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,7	67,5
Nº encuestas	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
65-74 años										
Media	40,5	50,5	45,3	37,2	56,4	51,5	50,5	53,4	40,8	56,6
DE	14,8	11,0	14,9	9,6	11,1	9,5	11,2	10,4	11,4	9,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	20,5	25,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	69,0
Percentil 5	22,1	26,4	16,7	18,9	34,2	29,4	21,0	31,8	20,6	37,0
Percentil 25	22,1	48,0	26,9	29,6	47,7	46,5	47,7	47,8	30,6	52,9
Percentil 50	39,3	57,2	52,3	37,2	57,8	56,6	56,1	52,3	43,7	58,4
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	63,0	52,3	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	54,8	68,2
Nº encuestas	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
≥ 75 años										
Media	33,6	36,7	38,9	35,1	50,2	36,4	36,6	43,9	35,2	44,3
DE	13,0	15,2	15,6	11,9	12,9	17,5	20,2	16,0	10,8	16,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	17,6	17,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	55,6	69,4
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	33,8	16,2	11,3	15,8	17,9	17,9
Percentil 25	22,1	20,3	26,9	29,6	37,7	16,2	11,3	30,8	27,4	27,8
Percentil 50	30,1	38,1	36,4	29,6	47,7	35,7	35,2	40,6	33,3	46,6
Percentil 75	39,3	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	44,6	58,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	53,8	67,2
Nº encuestas	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29

Tabla A.50. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica en ambos sexos. Área de Salud de Lorca 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sin condiciones médicas										
Media	55,3	54,7	54,2	47,4	61,0	54,8	54,3	56,4	52,6	56,7
DE	4,9	7,5	8,9	7,9	8,3	5,5	6,7	7,5	6,7	6,2
Mínimo	22,1	20,3	16,7	29,6	27,6	26,3	11,3	28,0	22,9	21,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	65,0	70,2
Percentil 5	43,9	34,3	26,9	29,6	47,7	46,5	33,7	40,2	38,7	44,4
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	54,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	60,5	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,1	61,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	58,9	62,7
Nº encuestas	232	232	232	232	232	232	232	232	232	232
Con condiciones médicas										
Media	48,1	50,1	48,8	39,7	58,3	51,1	49,7	51,4	46,2	53,5
DE	12,5	11,7	13,3	10,1	10,7	11,2	12,4	12,3	11,2	10,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	5,8	15,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,9	77,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	37,7	21,1	22,5	28,0	21,9	27,3
Percentil 25	39,3	48,0	38,5	29,6	47,7	56,6	48,4	46,3	39,6	49,2
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	51,8	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	53,7	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,8	64,9
Nº encuestas	336	336	336	336	336	336	336	336	336	336

Tabla.51. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, hombres. Área de Salud de Lorca 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sin enfermedades crónicas										
Media	55,8	56,2	55,2	48,3	62,5	55,5	54,9	57,5	53,6	57,6
DE	4,3	5,0	7,3	7,3	7,2	4,5	5,7	7,2	5,0	6,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	29,6	27,6	26,3	11,3	28,0	23,4	21,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	65,0	68,1
Percentil 5	56,5	52,4	37,1	29,6	47,7	46,5	45,7	42,0	45,2	48,6
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	56,6
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	54,1	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,4	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	58,1	62,7
Nº encuestas	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
Con enfermedades crónicas										
Media	49,2	51,3	51,3	40,6	58,9	52,7	51,2	53,9	47,3	55,3
DE	11,8	10,8	11,2	9,7	9,8	9,0	10,6	10,6	10,3	9,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	5,8	21,4
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,9	77,3
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	28,8	37,7	32,1	22,5	34,1	24,2	33,3
Percentil 25	39,3	48,0	47,3	29,6	54,0	56,6	56,1	46,3	41,6	51,1
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,1	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	53,7	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,8	64,8
Nº encuestas	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158

Tabla A.52. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, mujeres. Área de Salud de Lorca 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sin enfermedades crónicas										
Media	54,5	52,7	52,7	46,0	59,0	53,9	53,3	54,8	51,3	55,4
DE	5,7	9,7	10,7	8,4	9,3	6,7	7,8	7,7	8,4	6,1
Mínimo	30,7	20,3	16,7	29,6	37,7	26,3	22,5	40,2	22,9	34,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,5	70,2
Percentil 5	39,3	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	40,2	24,1	41,8
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	46,3	51,2	53,1
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	53,5	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	55,5	58,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,1	62,7
Nº encuestas	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
Con enfermedades crónicas										
Media	47,1	49,0	46,5	38,9	57,7	49,8	48,4	49,2	45,3	52,0
DE	13,1	12,4	14,5	10,5	11,4	12,7	13,6	13,2	11,8	12,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	13,6	15,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,6	69,4
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	37,7	16,2	11,3	21,9	20,6	25,6
Percentil 25	39,3	38,7	33,6	29,6	47,7	46,5	44,9	40,2	38,2	46,1
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	50,6	55,5
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	54,2	60,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,0	65,0
Nº encuestas	178	178	178	178	178	178	178	178	178	178

Tabla A.53. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según el tipo de condición médica crónica, ambos sexos. Área de Salud de Lorca 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Hipertensión arterial										
Media	43,3	47,3	45,1	36,4	56,1	48,2	46,1	48,9	42,4	51,3
DE	14,1	13,4	14,6	9,9	11,0	13,3	14,4	12,9	11,4	12,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	11,8	17,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	61,3	77,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	37,7	16,2	11,3	27,1	20,6	25,8
Percentil 25	30,7	38,7	26,9	29,6	47,7	36,4	33,7	40,2	33,4	43,5
Percentil 50	47,9	57,2	57,4	29,6	57,8	56,6	56,1	52,3	45,2	54,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	52,4	61,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,6	64,8
Nº encuestas	118	118	118	118	118	118	118	118	118	118
Diabetes mellitus										
Media	41,1	47,2	45,0	37,1	54,9	48,1	46,6	51,6	40,9	53,0
DE	15,6	13,4	14,9	10,3	11,1	13,9	15,1	12,2	12,8	12,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	5,8	18,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,3	74,6
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	34,5	16,2	11,3	21,8	19,3	25,4
Percentil 25	22,1	35,7	26,9	29,6	47,7	36,4	33,7	46,3	28,6	46,9
Percentil 50	39,3	57,2	50,8	29,6	57,8	56,6	56,1	52,3	44,3	57,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	52,4	62,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	65,5
Nº encuestas	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
Asma, bronquitis, enfisema										
Media	41,6	47,8	47,2	35,7	53,6	47,0	47,4	48,7	42,1	51,0
DE	13,7	12,2	13,9	9,5	12,8	14,4	13,5	13,9	12,6	13,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	5,8	18,4
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	63,6	76,9
Percentil 5	22,1	24,0	16,7	18,9	27,6	16,2	21,5	15,8	19,9	22,9
Percentil 25	30,7	38,7	37,1	29,6	47,7	36,4	33,7	40,2	33,0	43,7
Percentil 50	39,3	57,2	57,4	29,6	57,8	56,6	56,1	52,3	43,0	55,8
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	52,4	62,1
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	52,4	67,9	56,6	56,1	64,5	63,0	66,6
Nº encuestas	49	49	49	49	49	49	49	49	49	49
Enfermedades del corazón										
Media	38,0	42,9	43,7	34,4	54,0	47,1	42,3	47,8	38,6	50,3
DE	14,7	13,8	15,3	9,8	12,5	13,6	16,3	14,4	12,4	14,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	16,3	15,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	63,9	69,4
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	28,4	16,2	11,3	15,8	17,8	16,9
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,6	47,7	36,4	33,7	40,2	29,4	43,4
Percentil 50	39,3	41,6	47,3	29,6	57,8	56,6	56,1	52,3	36,7	54,4
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	51,8	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,8	65,8
Nº encuestas	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39
Alergia										
Media	51,2	51,6	50,7	42,0	60,1	52,3	50,4	52,8	48,9	54,1
DE	10,3	9,9	12,4	10,2	10,5	10,4	11,6	12,0	9,9	10,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	15,8	15,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,6	69,0
Percentil 5	22,1	29,5	16,7	27,6	37,7	26,3	22,5	28,0	28,3	29,0
Percentil 25	56,5	48,0	47,3	29,6	57,8	56,6	56,1	46,3	45,8	50,0

Tabla A.53. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según el tipo de condición médica crónica, ambos sexos. Área de Salud de Lorca 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	52,3	52,4	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,0	64,9
Nº encuestas	113	113	113	113	113	113	113	113	113	113
Depresión										
Media	42,5	45,4	44,1	34,2	53,0	45,6	40,7	39,6	43,6	43,6
DE	13,9	14,3	14,5	10,8	12,9	15,1	17,3	14,2	12,7	13,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	18,1	15,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,9	68,9
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	20,2	18,4
Percentil 25	30,7	37,5	26,9	29,6	47,7	36,4	26,1	28,0	32,2	32,2
Percentil 50	39,3	57,2	47,3	29,6	57,8	56,6	44,9	40,2	46,2	46,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	52,3	53,7	54,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	49,4	67,9	56,6	56,1	62,4	63,6	62,9
Nº encuestas	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
Artrosis y problemas reumáticos										
Media	42,0	45,4	43,4	36,3	55,6	47,0	46,3	49,0	40,6	51,7
DE	14,1	14,0	15,1	10,0	11,0	14,0	14,5	13,3	12,5	12,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	5,8	15,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,3	77,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	37,7	16,2	11,3	20,5	18,7	25,3
Percentil 25	27,5	29,5	26,9	29,6	47,7	36,4	33,7	40,2	30,7	45,6
Percentil 50	39,3	56,4	47,3	29,6	57,8	56,6	56,1	52,3	42,1	54,4
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	52,4	62,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,5	67,5
Nº encuestas	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158
Tumor maligno (últimos 5 años)										
Media	47,7	45,7	50,3	36,9	56,2	51,3	45,7	51,4	45,0	51,9
DE	13,2	16,2	12,1	8,8	12,6	11,5	17,6	13,2	11,7	13,7
Mínimo	22,1	20,3	26,9	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	18,1	17,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	57,8	74,6
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	21,6	17,2
Percentil 25	39,3	29,5	41,0	29,6	47,7	53,1	31,3	40,2	34,6	48,1
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	42,0	57,8	56,6	56,1	52,3	52,1	54,4
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	54,3	61,1
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,8	74,6
Nº encuestas	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Otras situaciones										
Media	48,6	50,5	48,8	38,4	59,0	52,0	50,6	51,3	46,1	54,1
DE	12,3	12,4	13,4	9,1	10,7	10,4	11,8	11,7	11,4	10,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	5,8	20,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,9	77,3
Percentil 5	22,1	20,3	24,0	18,9	37,7	26,3	19,3	28,0	20,4	27,3
Percentil 25	39,3	45,5	37,1	29,6	53,7	56,6	56,1	40,5	40,0	50,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	51,0	55,8
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,8	61,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	57,9	65,8
Nº encuestas	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59

3.4. ÁREA DE SALUD DEL NOROESTE

Tabla A.54. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos. Área de Salud del Noroeste 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Ambos sexos										
Media	50,1	50,9	48,0	42,5	57,2	44,9	48,6	52,1	48,0	50,9
DE	10,8	11,2	13,4	10,0	12,7	16,7	12,8	12,6	10,8	12,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	11,4	9,7
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,8	75,5
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	29,6	27,6	16,2	22,5	28,0	24,0	25,5
Percentil 25	47,9	48,0	37,1	29,6	47,7	26,3	44,9	46,3	42,5	44,7
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	53,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	60,1
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	64,0
Nº encuestas	560	559	559	560	555	559	559	557	554	554

Tabla A.55. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres. Área de Salud del Noroeste 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Hombres										
Media	51,5	52,8	50,8	44,0	59,6	46,4	51,1	55,9	49,3	53,9
DE	9,7	9,4	11,2	9,4	11,1	16,7	10,5	10,3	9,6	11,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	11,4	14,4
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	65,1	75,5
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	16,2	22,5	34,1	28,4	29,6
Percentil 25	47,9	57,2	47,3	44,7	57,8	36,4	56,1	52,3	46,1	49,9
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	52,4	57,2
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,2	65,9
Nº encuestas	282	282	282	282	280	282	282	280	279	279

Tabla A.56. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres. Área de Salud del Noroeste 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Mujeres										
Media	48,7	49,0	45,1	40,9	54,6	43,5	46,0	48,4	46,7	47,8
DE	11,7	12,5	14,9	10,4	13,8	16,7	14,4	13,5	11,7	12,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	15,7	9,7
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,8	68,5
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	22,4	20,1
Percentil 25	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	26,3	33,7	40,2	40,3	39,3
Percentil 50	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	51,0	51,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	57,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,5	62,7
Nº encuestas	278	277	277	278	275	277	277	277	275	275

Tabla A.57. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos por grupo de edad. Área de Salud del Noroeste 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
18-24 años										
Media	55,0	55,4	51,9	47,6	61,8	48,9	52,1	54,8	52,9	53,7
DE	5,2	6,2	10,0	8,1	9,6	15,5	10,2	11,6	6,5	11,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	29,6	27,6	16,2	11,3	15,8	28,4	9,7
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,8	63,7
Percentil 5	44,5	38,7	26,9	29,6	37,7	16,2	28,5	28,0	40,3	31,0
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	47,9	52,0	50,5
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	54,3	57,2
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,1	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	59,4	67,9	56,6	56,1	64,5	61,4	62,7
Nº encuestas	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
25-34 años										
Media	55,7	55,3	54,0	46,7	61,0	44,6	52,7	55,4	53,4	52,6
DE	3,4	6,4	8,3	7,7	9,9	18,1	8,4	10,9	4,3	10,1
Mínimo	39,3	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	33,4	20,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	62,7	64,8
Percentil 5	47,9	43,0	37,1	29,6	37,7	16,2	33,7	34,1	48,6	26,3
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	16,2	56,1	52,3	52,4	51,1
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,7	54,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	55,6	59,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,6	62,7
Nº encuestas	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
35-44 años										
Media	54,4	54,3	51,0	44,2	60,6	46,4	51,5	53,5	51,5	52,3
DE	5,7	7,2	11,0	9,0	9,3	17,2	10,5	11,3	7,9	11,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	29,6	27,6	16,2	11,3	15,8	11,4	18,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	65,1	74,3
Percentil 5	39,3	38,7	26,9	29,6	37,7	16,2	22,5	28,0	35,9	21,1
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	26,3	56,1	46,3	49,6	49,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	52,7	55,8
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	56,1	60,1
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,7	64,0
Nº encuestas	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
45-54 años										
Media	53,6	52,0	51,2	43,0	57,5	45,6	48,7	53,3	50,7	50,5
DE	6,7	10,3	11,1	8,2	12,9	16,6	11,9	12,7	8,4	12,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	16,9	15,8	21,1	14,4
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	65,7	75,3
Percentil 5	39,3	22,2	26,9	29,6	27,6	16,2	22,5	21,9	34,4	26,2
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	47,7	36,4	39,3	46,3	46,3	41,3
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	53,8
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,4	60,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	62,4	66,3
Nº encuestas	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87

Tabla A.57. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos por grupo de edad. Área de Salud del Noroeste 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
55-64 años										
Media	44,0	46,7	41,7	37,3	53,8	46,0	46,0	48,9	41,7	50,2
DE	12,4	13,1	15,0	10,1	12,7	14,7	14,4	13,0	11,9	12,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	14,9	15,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	72,0
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	12,2	21,9	18,4	19,5
Percentil 25	36,9	36,0	26,9	29,6	43,2	36,4	33,7	40,2	33,9	41,7
Percentil 50	47,9	57,2	47,3	31,9	57,8	56,6	56,1	52,3	42,2	52,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	52,9	61,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,7	65,2
Nº encuestas	65	65	65	65	64	65	65	64	65	65
65-74 años										
Media	44,0	46,0	41,4	39,0	51,1	44,0	45,1	49,5	41,8	49,1
DE	12,0	13,3	14,1	9,7	14,3	16,3	14,7	14,2	11,1	13,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	16,7	15,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	67,2	73,1
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	23,1	18,4
Percentil 25	39,3	38,7	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	40,2	33,1	39,6
Percentil 50	47,9	50,2	47,3	44,7	54,7	56,6	56,1	52,3	42,0	52,8
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	52,0	60,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,7	68,5
Nº encuestas	62	61	61	62	59	61	61	61	59	59
≥ 75 años										
Media	35,8	40,6	36,3	35,1	48,3	38,4	38,4	45,8	35,8	45,1
DE	13,1	14,4	16,1	12,0	16,0	16,0	15,8	13,0	12,9	13,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	15,1	17,6
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,0	75,5
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	27,8	15,8	22,4
Percentil 25	22,1	29,5	16,7	29,6	27,6	26,3	33,7	34,1	24,7	36,3
Percentil 50	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	36,4	33,7	45,1	33,9	43,2
Percentil 75	47,9	57,2	49,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	45,9	56,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,6	66,3
Nº encuestas	64	64	64	64	62	64	64	64	62	62

Tabla A.58. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres por grupo de edad. Área de Salud del Noroeste 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
18-24 años										
Media	55,9	54,8	52,3	48,3	62,4	49,5	52,6	57,0	52,8	55,2
DE	2,2	7,7	10,5	9,0	8,7	15,0	8,8	9,2	5,9	9,4
Mínimo	47,9	20,3	16,7	29,6	27,6	16,2	11,3	28,0	28,4	25,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	61,0	63,7
Percentil 5	47,9	31,9	20,5	29,6	46,4	16,2	32,3	39,4	40,3	32,1
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	51,6
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	54,3	57,2
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,1	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,3	63,4
Nº encuestas	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
25-34 años										
Media	56,1	55,6	55,1	47,5	63,8	41,5	52,6	58,7	53,6	53,8
DE	1,7	4,8	5,3	6,3	8,3	19,5	9,3	8,1	3,9	9,9
Mínimo	47,9	29,5	37,1	29,6	37,7	16,2	11,3	34,1	36,5	20,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	62,7	64,8
Percentil 5	52,1	48,0	42,0	37,0	42,6	16,2	30,9	40,2	47,2	27,1
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	16,2	56,1	58,4	52,4	51,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	53,7	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,2	62,8
Nº encuestas	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59
35-44 años										
Media	53,7	54,8	51,7	44,7	60,9	47,0	52,3	54,1	51,4	53,2
DE	6,9	7,1	10,2	7,7	9,0	16,8	9,0	10,7	8,8	11,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	29,6	27,6	16,2	22,5	21,9	11,4	18,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	65,1	74,3
Percentil 5	39,3	38,5	26,6	29,6	47,5	16,2	22,5	28,0	32,0	25,2
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	36,5	56,1	46,3	50,0	49,2
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	52,6	57,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	56,2	61,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	62,1	67,6
Nº encuestas	57	57	57	57	57	57	57	56	56	56
45-54 años										
Media	53,6	53,8	53,8	43,9	60,0	49,4	51,5	56,9	51,0	54,6
DE	7,0	8,8	9,0	9,5	11,0	14,5	10,4	10,3	8,1	11,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	21,9	21,1	14,4
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	65,0	75,3
Percentil 5	39,3	29,5	26,9	29,6	34,5	16,2	22,5	32,4	33,0	27,0
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	49,2	51,7
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	52,7	57,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	57,6	67,9	56,6	56,1	64,5	59,9	69,1
Nº encuestas	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44

Tabla A.58. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres por grupo de edad. Área de Salud del Noroeste 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
55-64 años										
Media	45,6	48,5	45,0	40,0	55,6	49,1	48,1	54,0	43,4	53,8
DE	13,0	12,6	14,7	10,4	11,4	14,2	13,3	11,7	11,2	10,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	14,9	15,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	57,5	72,0
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	29,6	37,5	16,2	15,5	27,8	19,9	34,1
Percentil 25	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	40,1	46,3	35,5	46,9
Percentil 50	56,5	57,2	52,3	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	44,7	56,9
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	53,5	62,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,2	66,8
Nº encuestas	32	32	32	32	31	32	32	31	31	31
65-74 años										
Media	47,3	50,6	46,6	39,9	55,7	48,8	50,5	56,5	44,1	55,4
DE	11,7	11,1	12,7	9,7	13,5	14,9	11,1	9,9	11,3	11,2
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	28,0	16,7	20,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	61,5	73,1
Percentil 5	22,1	20,3	25,6	21,7	27,6	16,2	21,2	35,7	19,5	27,4
Percentil 25	39,3	48,0	37,1	29,6	47,7	47,4	46,0	46,8	38,5	52,2
Percentil 50	54,8	57,2	49,2	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	47,1	57,4
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	52,6	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	56,8	67,9	56,6	56,1	64,5	57,7	71,4
Nº encuestas	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
≥ 75 años										
Media	40,8	46,7	44,5	39,3	53,3	41,4	47,1	52,2	40,9	51,1
DE	13,2	12,7	13,5	11,7	14,4	17,9	12,3	12,5	11,5	13,5
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	15,1	17,6
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,0	75,5
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,3	27,8	17,4	26,1
Percentil 25	28,7	37,7	37,1	29,6	37,7	18,7	33,7	41,7	33,6	39,5
Percentil 50	39,3	52,6	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	40,2	54,2
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	52,4	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,8	67,9	56,6	56,1	64,5	57,8	71,5
Nº encuestas	29	29	29	29	28	29	29	29	28	28

Tabla A.59. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres por grupo de edad. Área de Salud del Noroeste 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
18-24 años										
Media	54,1	56,2	51,5	46,8	61,2	48,2	51,6	52,5	53,0	52,2
DE	7,0	4,3	9,6	7,2	10,5	16,3	11,6	13,5	7,3	12,4
Mínimo	22,1	38,7	26,9	29,6	37,7	16,2	11,3	15,8	28,5	9,7
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	68,8	63,7
Percentil 5	34,5	38,7	26,9	29,6	37,7	16,2	11,3	21,0	36,6	15,5
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	41,7	51,1	47,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	54,4	55,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,3	62,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	66,7	63,0
Nº encuestas	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
25-34 años										
Media	55,2	55,0	52,9	45,7	57,8	48,0	52,8	51,7	53,1	51,3
DE	4,5	7,7	10,6	8,9	10,7	15,9	7,4	12,5	4,8	10,3
Mínimo	39,3	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	33,7	15,8	33,4	21,4
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	58,8	62,9
Percentil 5	39,3	34,0	24,2	26,9	35,1	16,2	33,7	24,8	44,7	25,0
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	46,5	56,1	46,3	51,0	50,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	53,5	54,4
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	58,4	56,1	57,2
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	57,2	67,9	56,6	56,1	64,5	58,7	62,7
Nº encuestas	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
35-44 años										
Media	55,1	53,9	50,1	43,6	60,2	45,7	50,7	52,8	51,5	51,4
DE	4,0	7,4	11,8	10,3	9,7	17,8	12,0	12,1	6,8	11,7
Mínimo	39,3	29,5	16,7	29,6	37,7	16,2	11,3	15,8	31,0	19,1
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,7	63,5
Percentil 5	44,2	34,8	22,5	29,6	37,7	16,2	17,8	22,8	37,0	19,3
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	29,6	57,8	24,0	56,1	46,3	49,5	50,0
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,2	55,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	47,2	67,9	56,6	56,1	59,8	56,1	57,9
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,0	63,0
Nº encuestas	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
45-54 años										
Media	53,7	50,2	48,5	42,2	55,0	41,6	45,8	49,4	50,3	46,2
DE	6,4	11,6	12,5	6,7	14,3	17,8	12,8	14,0	8,8	12,7
Mínimo	30,7	20,3	16,7	29,6	27,6	16,2	16,9	15,8	32,2	25,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	65,7	67,9
Percentil 5	34,8	20,3	21,5	29,6	27,6	16,2	19,6	18,7	34,1	25,8
Percentil 25	56,5	38,7	43,9	44,7	47,7	16,2	33,7	40,2	43,9	35,3
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	50,1
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	57,5	55,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	50,4	67,9	56,6	56,1	64,5	64,4	65,8
Nº encuestas	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42

Tabla A.59. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres por grupo de edad. Área de Salud del Noroeste 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
55-64 años										
Media	42,3	45,0	38,6	34,6	52,2	42,9	43,9	44,1	40,1	46,8
DE	11,8	13,5	14,9	9,3	13,8	14,7	15,4	12,5	12,5	13,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	16,5	18,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	65,1
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	20,2	17,8	18,7
Percentil 25	30,7	29,5	26,9	29,6	37,7	33,7	33,7	38,5	29,3	36,7
Percentil 50	39,3	48,0	37,1	29,6	57,8	46,5	56,1	40,2	41,1	47,9
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	52,3	52,4	58,2
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	58,5	64,6
Nº encuestas	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
65-74 años										
Media	41,2	41,7	36,7	38,1	46,7	39,6	40,2	43,1	39,6	43,0
DE	11,7	13,8	13,8	9,7	13,8	16,6	15,9	14,6	10,6	13,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	23,0	15,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	67,2	68,5
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	19,5	23,5	15,8
Percentil 25	30,7	29,5	26,9	29,6	37,7	16,2	33,7	28,0	29,7	33,8
Percentil 50	39,3	43,4	37,1	44,7	47,7	36,4	44,9	46,3	40,6	45,0
Percentil 75	54,3	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	48,7	52,8
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,2	65,5
Nº encuestas	33	32	32	33	30	32	32	32	30	30
≥ 75 años										
Media	31,6	35,5	29,4	31,5	44,2	35,9	31,2	40,5	31,6	40,4
DE	11,7	14,0	14,9	11,2	16,2	13,9	14,8	11,0	12,5	11,2
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	15,7	19,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,6	62,5
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	22,2	15,7	19,3
Percentil 25	22,1	22,6	16,7	18,9	27,6	26,3	14,1	34,1	22,1	30,8
Percentil 50	22,1	29,5	21,8	29,6	42,7	36,4	33,7	40,2	27,8	40,9
Percentil 75	39,3	52,6	44,7	44,7	57,8	46,5	37,9	50,8	41,2	48,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,0	67,9	56,6	56,1	64,2	56,5	62,3
Nº encuestas	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

Tabla A.60. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica en ambos sexos. Área de Salud del Noroeste 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sin condiciones médicas										
Media	55,8	55,9	53,7	47,4	62,4	46,7	53,3	56,2	53,4	54,1
DE	3,4	4,8	7,8	7,5	8,2	16,9	7,6	10,0	4,8	9,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	29,6	27,6	16,2	11,3	15,8	25,7	9,7
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,8	73,0
Percentil 5	48,2	48,0	37,1	29,6	47,7	16,2	33,7	40,2	43,6	35,8
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	36,4	56,1	52,3	52,4	51,3
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,8	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,1	62,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	60,9	67,9	56,6	56,1	64,5	59,1	62,7
Nº encuestas	222	222	222	222	222	222	222	221	221	221
Con condiciones médicas										
Media	46,4	47,7	44,2	39,2	53,6	43,8	45,4	49,5	44,3	48,7
DE	12,3	12,9	14,9	10,1	14,0	16,5	14,5	13,4	12,1	13,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	11,4	14,4
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	67,2	75,5
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	21,8	20,3
Percentil 25	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	26,3	33,7	40,2	36,0	39,4
Percentil 50	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	48,3	51,8
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,5	59,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,0	65,6
Nº encuestas	338	337	337	338	333	337	337	336	333	333

Tabla A.61. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, hombres. Área de Salud del Noroeste 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sin enfermedades crónicas										
Media	55,7	55,9	54,4	47,7	62,7	47,2	53,3	58,1	53,2	55,2
DE	3,3	5,3	7,3	7,4	8,1	16,8	7,5	9,1	4,8	8,8
Mínimo	39,3	20,3	16,7	29,6	27,6	16,2	11,3	21,9	25,7	17,4
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	62,0	73,0
Percentil 5	47,9	48,0	37,1	29,6	47,7	16,2	33,7	40,2	42,4	35,9
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	54,9	56,1	56,6	52,4	51,7
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	53,7	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	55,9	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,9	62,7
Nº encuestas	116	116	116	116	116	116	116	115	115	115
Con enfermedades crónicas										
Media	48,7	50,7	48,3	41,4	57,5	45,8	49,5	54,3	46,5	52,9
DE	11,5	10,9	12,6	9,8	12,3	16,7	11,9	10,9	11,1	12,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	11,4	14,4
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	65,1	75,5
Percentil 5	22,1	27,3	16,7	29,6	27,6	16,2	22,5	28,0	23,0	25,2
Percentil 25	39,3	48,0	37,1	29,6	47,7	36,4	44,9	46,3	39,2	47,9
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	50,5	56,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	54,0	62,0
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,9	67,6
Nº encuestas	166	166	166	166	164	166	166	165	164	164

Tabla A.62. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, mujeres. Área de Salud del Noroeste 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sin enfermedades crónicas										
Media	55,9	56,0	53,0	47,2	62,1	46,1	53,3	54,2	53,7	52,9
DE	3,6	4,1	8,2	7,6	8,2	17,1	7,7	10,6	4,8	9,8
Mínimo	22,1	38,7	26,9	29,6	37,7	16,2	11,3	15,8	28,5	9,7
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,8	63,7
Percentil 5	56,5	46,6	37,1	29,6	37,7	16,2	33,7	34,1	44,4	29,0
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	36,4	56,1	46,3	52,4	51,2
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,8	55,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,1	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,2	62,7
Nº encuestas	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106
Con enfermedades crónicas										
Media	44,3	44,7	40,1	37,0	49,9	41,9	41,4	44,8	42,3	44,6
DE	12,7	14,0	15,9	10,1	14,5	16,2	15,6	13,9	12,7	13,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	15,7	15,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	67,2	68,5
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,0	20,9	19,1
Percentil 25	39,3	29,5	26,9	29,6	37,7	26,3	33,7	34,1	32,2	35,9
Percentil 50	47,9	51,9	47,3	44,7	47,7	46,5	44,9	46,3	43,3	45,9
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	52,7	55,0
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,5	63,0
Nº encuestas	172	171	171	172	169	171	171	171	169	169

Tabla A.63. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según el tipo de condición médica crónica, ambos sexos. Área de Salud del Noroeste 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Hipertensión arterial										
Media	42,3	43,8	39,9	36,1	49,8	43,2	41,7	47,6	40,1	46,9
DE	14,0	14,1	16,2	10,5	15,0	15,6	15,9	13,2	13,7	13,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	15,7	14,4
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	67,2	75,5
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	24,3	18,1	19,4
Percentil 25	30,7	29,5	26,9	29,6	37,7	26,3	33,7	40,2	27,2	37,3
Percentil 50	39,3	48,0	42,0	29,6	47,7	46,5	44,9	46,3	41,6	48,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	52,3	57,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,5	67,9
Nº encuestas	117	11	117	117	114	117	117	116	114	114
Diabetes mellitus										
Media	39,7	42,4	39,8	35,1	49,5	42,1	42,6	46,8	38,0	47,3
DE	13,4	13,3	14,9	10,1	14,9	15,7	14,5	12,8	13,3	13,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	15,1	15,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	65,0	75,5
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	23,8	17,0	19,0
Percentil 25	27,8	29,5	26,9	29,6	37,7	26,3	33,7	39,2	27,1	37,7
Percentil 50	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	44,9	46,3	37,8	48,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	52,2	57,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	58,7	68,4
Nº encuestas	60	60	60	60	59	60	60	60	59	59
Asma, bronquitis, enfisema										
Media	41,0	44,9	40,8	34,8	49,1	41,9	43,5	47,3	39,8	47,4
DE	14,7	14,4	16,8	11,4	14,6	16,4	15,0	12,2	14,3	12,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	15,1	16,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	63,1	75,5
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	24,5	15,7	21,1
Percentil 25	22,1	29,5	26,7	29,6	37,7	26,3	33,7	40,2	28,7	37,8
Percentil 50	39,3	49,0	47,3	29,6	47,7	46,5	56,1	52,3	43,0	49,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,8	51,8	56,8
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,9	66,4
Nº encuestas	53	53	53	53	52	53	53	53	52	52
Enfermedades del corazón										
Media	37,1	41,4	40,1	34,5	47,6	40,3	40,7	47,8	36,5	47,1
DE	14,1	15,1	16,1	11,5	15,0	17,7	15,6	13,3	12,4	14,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	14,9	15,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,7	75,5
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	26,6	17,8	22,2
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	16,2	33,7	40,2	26,9	38,0
Percentil 50	39,3	38,7	47,3	29,6	47,7	46,5	40,8	46,3	35,2	47,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	58,1	56,6	56,1	58,9	47,6	60,2
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,1	68,7
Nº encuestas	36	35	35	36	35	35	35	35	35	35
Alergia										
Media	50,9	52,5	50,6	42,2	55,2	48,0	49,6	51,7	49,3	50,9
DE	10,4	9,6	11,7	8,9	12,4	15,2	11,0	11,4	9,7	11,2
Mínimo	22,1	20,3	16,7	29,6	27,6	16,2	11,3	21,9	14,9	18,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	65,1	75,5
Percentil 5	22,1	29,5	26,4	29,6	27,6	16,2	23,3	28,0	24,9	24,3
Percentil 25	47,9	48,0	47,3	29,6	47,7	46,5	44,9	46,3	46,4	45,0

Tabla A.63. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según el tipo de condición médica crónica, ambos sexos. Área de Salud del Noroeste 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	53,4
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,4	58,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,6	64,8
Nº encuestas	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
Depresión										
Media	42,8	41,6	36,9	34,7	46,4	38,7	34,9	39,5	41,5	38,6
DE	12,7	14,5	16,6	9,5	14,8	15,9	16,4	14,9	12,8	15,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	15,8	14,4
Máximo	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	65,7	69,4
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	19,5	17,3
Percentil 25	32,6	29,5	16,7	29,6	33,1	26,3	22,5	28,0	32,9	25,5
Percentil 50	39,3	40,8	37,1	29,6	47,7	36,4	33,7	39,6	41,4	37,8
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,3	52,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	60,5	63,5
Nº encuestas	78	78	78	78	77	78	78	78	77	77
Artrosis y problemas reumáticos										
Media	40,7	42,5	36,9	35,1	49,6	43,3	41,7	46,3	38,0	47,1
DE	12,6	13,5	14,8	9,6	14,1	15,5	15,3	13,7	11,8	14,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	11,4	14,4
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	62,8	75,5
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	18,4	21,5
Percentil 25	30,7	29,5	26,9	29,6	37,7	26,3	33,7	35,3	29,2	37,1
Percentil 50	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	54,1	44,9	46,3	37,4	48,5
Percentil 75	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	48,1	58,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	56,6	67,9
Nº encuestas	165	165	165	165	162	165	165	165	162	162
Tumor maligno (últimos 5 años)										
Media	39,5	40,5	39,7	35,0	55,9	46,9	44,3	48,5	36,8	52,2
DE	16,5	14,2	17,1	7,8	10,3	14,5	12,0	15,8	13,7	10,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	29,6	37,7	16,2	33,7	28,0	14,9	37,1
Máximo	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	52,4	64,7
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	29,6	37,7	16,2	33,7	28,0	14,9	37,1
Percentil 25	22,1	29,5	21,8	29,6	47,7	46,5	33,7	34,1	22,2	45,5
Percentil 50	41,9	40,5	44,2	29,6	57,8	49,6	40,6	50,0	40,3	52,2
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	50,0	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	52,4	64,7
Nº encuestas	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Otras situaciones										
Media	44,0	44,2	41,2	37,3	50,7	41,5	44,4	46,9	41,5	47,1
DE	12,8	14,0	15,6	10,3	14,8	17,0	15,0	14,8	12,1	14,5
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	15,1	14,4
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	61,5	75,3
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	20,8	19,5	18,8
Percentil 25	39,3	29,5	26,9	29,6	37,7	26,3	33,7	34,1	33,2	37,9
Percentil 50	47,9	48,0	47,3	44,7	47,7	46,5	56,1	52,3	42,5	50,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	52,2	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,1	66,2
Nº encuestas	117	117	117	117	116	117	117	117	116	116

3.5. ÁREA DE SALUD DEL ALTIPLANO

Tabla A.64. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos. Área de Salud del Altiplano 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Ambos sexos										
Media	50,6	52,5	50,7	43,1	59,7	52,7	51,8	53,8	48,8	55,3
DE	10,8	9,9	11,7	9,9	10,6	10,1	9,9	11,2	9,7	10,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	9,0	7,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,6	76,2
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	28,0	26,6	32,6
Percentil 25	47,9	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	46,3	45,6	52,3
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	52,4	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,2	65,7
Nº encuestas	563	565	564	565	562	564	564	563	561	561

Tabla A.65. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres. Área de Salud del Altiplano 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Hombres										
Media	51,9	53,7	51,9	43,4	61,5	53,5	52,9	56,2	49,5	57,0
DE	9,4	8,4	10,3	9,3	9,4	9,4	8,7	10,0	8,4	9,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	17,9	7,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,6	76,2
Percentil 5	24,2	29,5	26,9	29,6	37,7	26,3	33,7	34,1	29,6	37,9
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	46,6	54,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	52,4	59,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	54,8	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,8	65,4
Nº encuestas	287	287	287	287	286	287	287	286	286	286

Tabla A.66. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres. Área de Salud del Altiplano 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Mujeres										
Media	49,3	51,2	49,4	42,7	57,8	51,9	50,7	51,3	48,1	53,5
DE	12,0	11,1	12,9	10,5	11,6	10,8	11,0	11,8	10,9	11,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	9,0	12,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	62,1	75,4
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	37,7	26,3	22,5	28,0	23,8	28,1
Percentil 25	47,9	48,0	47,3	29,6	47,7	56,6	54,4	46,3	43,1	49,0
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	60,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,5	66,2
Nº encuestas	276	278	277	278	276	277	277	277	274	274

Tabla A.67. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos por grupo de edad. Área de Salud del Altiplano 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
18-24 años										
Media	56,1	55,3	54,1	46,2	63,3	54,5	52,5	56,7	53,2	56,3
DE	2,2	5,5	8,8	9,2	7,5	7,2	8,1	8,6	4,2	7,9
Mínimo	39,3	29,5	16,7	18,9	37,7	16,2	22,5	28,0	42,1	27,1
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	62,1	64,9
Percentil 5	56,5	38,7	26,9	29,6	47,7	36,4	33,7	40,2	43,5	36,3
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	51,9	53,9
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,6	59,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,1	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	62,7
Nº encuestas	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
25-34 años										
Media	54,4	54,2	53,1	45,9	61,6	53,1	52,0	54,6	52,2	54,9
DE	6,9	7,3	8,8	8,8	9,6	9,8	10,0	10,8	6,8	10,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	24,9	7,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	64,9	69,6
Percentil 5	39,3	38,7	37,1	29,6	37,7	26,3	22,5	28,0	36,7	25,3
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	50,5	53,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,7	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	55,8	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,1	63,3
Nº encuestas	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137
35-44 años										
Media	54,0	54,4	52,7	45,0	61,9	54,9	54,2	56,2	51,0	57,3
DE	7,4	8,7	9,4	8,3	8,2	6,6	6,4	8,8	7,0	7,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	37,7	16,2	22,5	21,9	27,6	16,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,6	74,9
Percentil 5	39,3	29,5	26,9	29,6	47,7	42,4	33,7	34,2	35,4	40,7
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	49,7	54,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,2	58,4
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,4	65,2
Nº encuestas	114	114	114	114	114	114	114	114	114	114
45-54 años										
Media	50,8	51,8	51,9	43,0	58,1	53,1	51,5	52,2	49,3	54,0
DE	10,3	10,7	10,6	10,2	11,6	9,9	10,3	11,8	9,2	10,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	20,8	17,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,1	72,1
Percentil 5	22,1	26,8	26,9	18,9	34,7	26,3	22,5	21,9	28,8	28,9
Percentil 25	47,9	48,0	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	46,3	45,3	49,9
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,3	61,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,9	66,0
Nº encuestas	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87

Tabla A.67. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos por grupo de edad. Área de Salud del Altiplano 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
55-64 años										
Media	45,1	48,5	44,6	38,8	56,1	52,3	50,8	50,5	43,3	54,6
DE	13,6	12,9	15,3	9,7	11,2	11,3	10,8	13,5	13,5	11,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	9,0	12,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,0	75,4
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	19,8	27,6	16,2	22,5	18,5	13,1	30,6
Percentil 25	39,3	38,7	26,9	29,6	47,7	56,6	50,5	44,2	35,1	50,4
Percentil 50	47,9	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	53,8	48,7	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,5	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,4	70,6
Nº encuestas	59	60	60	60	58	60	60	59	57	57
65-74 años										
Media	42,1	49,4	45,3	37,2	56,2	50,3	49,5	52,2	41,8	54,9
DE	13,7	11,6	15,2	10,4	12,6	12,1	11,6	12,6	11,7	11,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	16,7	24,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	57,8	76,2
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,2	27,6	19,7	26,2
Percentil 25	30,7	38,7	26,9	29,6	47,7	46,5	44,9	45,9	32,1	48,8
Percentil 50	47,9	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	55,5	45,0	59,2
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	52,3	63,0
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,4	68,8
Nº encuestas	46	47	47	47	47	47	47	47	46	46
≥ 75 años										
Media	39,6	48,2	45,0	37,4	54,7	46,5	48,7	50,5	40,4	53,4
DE	12,8	12,3	14,2	10,2	13,3	14,5	13,6	12,9	10,3	12,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	17,6	22,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,1	73,8
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	14,0	21,9	21,5	30,0
Percentil 25	29,4	38,7	37,1	29,6	47,7	36,4	44,9	46,3	32,9	45,7
Percentil 50	39,3	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	42,0	56,2
Percentil 75	51,8	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	48,8	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	68,5
Nº encuestas	51	51	51	51	50	51	51	50	50	50

Tabla A.68. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres por grupo de edad. Área de Salud del Altiplano 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
18-24 años										
Media	55,9	56,1	55,7	46,2	63,8	54,2	54,1	58,3	53,3	57,6
DE	2,8	3,5	6,5	9,2	6,9	8,8	5,9	7,2	3,3	6,5
Mínimo	39,3	38,7	16,7	29,6	47,7	16,2	33,7	40,2	43,5	35,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,7	64,9
Percentil 5	50,6	48,0	47,3	29,6	47,7	24,6	33,7	42,1	45,5	41,5
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	51,8	56,5
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,4	59,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,8	63,4
Nº encuestas	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
25-34 años										
Media	54,0	53,9	51,9	43,8	63,1	52,8	52,2	55,4	50,9	55,9
DE	7,4	7,9	10,0	9,6	9,4	10,2	8,9	11,3	8,2	11,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	15,8	24,9	7,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	64,9	69,6
Percentil 5	35,2	34,4	26,9	29,6	37,7	26,3	28,4	28,3	26,5	30,8
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	49,2	53,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,5	59,5
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	58,6	67,9	56,6	56,1	64,5	59,8	64,9
Nº encuestas	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
35-44 años										
Media	55,0	55,4	52,1	44,2	62,9	54,3	53,4	57,0	51,4	57,1
DE	5,5	6,7	10,1	8,2	7,3	8,3	7,8	8,7	6,3	8,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	37,7	16,2	22,5	21,9	31,4	16,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,6	64,7
Percentil 5	46,1	36,8	26,9	29,6	47,7	32,1	31,4	38,9	35,5	37,0
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	49,3	55,7
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	52,4	59,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	54,2	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,9	64,0
Nº encuestas	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
45-54 años										
Media	50,8	53,4	51,7	44,0	61,4	54,3	53,2	57,0	48,7	58,0
DE	10,4	9,1	10,7	9,5	9,7	8,2	8,4	9,5	8,9	8,5
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	15,8	23,1	29,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,1	72,1
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	24,3	37,7	26,3	28,1	37,1	27,4	34,0
Percentil 25	47,9	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	44,8	56,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	52,4	59,8
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	54,9	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	58,7	67,9	56,6	56,1	64,5	57,9	69,4
Nº encuestas	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45

Tabla A.68. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres por grupo de edad. Área de Salud del Altiplano 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
55-64 años										
Media	49,8	52,0	50,6	40,8	58,5	54,7	53,3	54,3	47,4	56,7
DE	10,3	9,9	11,5	9,0	10,4	7,7	9,7	12,2	9,3	9,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	20,0	15,6
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,8	73,1
Percentil 5	22,1	23,1	19,7	22,1	32,0	31,1	21,6	23,5	26,8	32,1
Percentil 25	47,9	48,0	47,3	29,6	54,9	56,6	56,1	52,3	45,0	54,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,3	58,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	53,5	62,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,7	69,7
Nº encuestas	30	30	30	30	29	30	30	29	29	29
65-74 años										
Media	44,2	52,4	50,0	40,5	59,0	54,3	53,5	56,1	44,2	58,9
DE	12,6	9,1	12,8	10,1	10,4	7,3	6,4	9,5	11,1	7,5
Mínimo	22,1	29,5	16,7	18,9	27,6	16,2	33,7	28,0	17,9	38,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	57,8	76,2
Percentil 5	22,1	29,5	18,2	25,9	34,2	37,9	33,7	35,0	20,3	43,9
Percentil 25	32,8	48,0	39,6	29,6	57,8	56,6	56,1	52,3	38,6	54,1
Percentil 50	47,9	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	48,6	61,1
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	52,5	64,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	61,0	67,9	56,6	56,1	64,5	57,5	74,0
Nº encuestas	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
≥ 75 años										
Media	42,6	48,4	49,6	40,1	55,0	48,3	50,2	54,2	43,2	55,4
DE	12,6	12,9	11,5	8,8	11,4	14,5	13,9	10,9	9,2	11,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	26,2	22,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,1	68,3
Percentil 5	22,1	20,3	18,2	25,7	28,9	16,2	11,3	23,4	27,1	25,7
Percentil 25	32,8	38,7	47,3	29,6	47,7	46,5	56,1	52,3	35,8	52,4
Percentil 50	39,3	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	44,0	57,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	66,6	56,6	56,1	63,8	52,4	63,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,0	67,9
Nº encuestas	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21

Tabla A.69. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres por grupo de edad. Área de Salud del Altiplano 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
18-24 años										
Media	56,2	54,4	52,3	46,1	62,8	54,9	50,8	54,9	53,0	54,9
DE	1,4	6,9	10,5	9,4	8,2	5,1	9,8	9,7	5,1	9,1
Mínimo	47,9	29,5	16,7	18,9	37,7	36,4	22,5	28,0	42,1	27,1
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	62,1	64,9
Percentil 5	54,7	36,8	24,8	27,4	45,7	36,4	22,5	28,0	42,8	32,1
Percentil 25	56,5	57,2	49,8	44,7	57,8	56,6	44,9	52,3	51,9	51,5
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,9	57,9
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,4	60,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	57,0	67,9	56,6	56,1	64,5	61,6	63,2
Nº encuestas	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
25-34 años										
Media	54,9	54,6	54,6	48,2	60,0	53,4	51,9	53,7	53,8	53,8
DE	6,3	6,7	6,9	7,0	9,7	9,3	11,2	10,2	4,3	10,7
Mínimo	22,1	29,5	37,1	29,6	37,7	16,2	11,3	21,9	36,8	18,7
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,9	62,7
Percentil 5	47,9	38,7	37,1	44,7	37,7	26,3	22,5	28,0	46,7	25,3
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	52,8
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	62,8	56,6	56,1	55,4	54,9	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	58,4	56,3	59,9
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,1	62,7
Nº encuestas	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64
35-44 años										
Media	52,9	53,3	53,5	45,9	60,7	55,6	55,0	55,3	50,6	57,4
DE	9,0	10,5	8,5	8,5	9,0	4,0	4,4	8,8	7,7	6,8
Mínimo	22,1	20,3	26,9	18,9	37,7	36,4	33,7	34,1	27,6	40,7
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	58,5	74,9
Percentil 5	22,1	20,3	37,0	29,6	47,7	46,4	44,8	34,1	31,6	43,1
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	49,8	54,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,8	66,9
Nº encuestas	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
45-54 años										
Media	50,7	50,1	52,0	42,0	54,5	51,9	49,7	47,1	49,8	49,8
DE	10,4	12,0	10,6	11,0	12,4	11,4	11,9	12,0	9,6	11,2
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	20,8	17,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,1	63,5
Percentil 5	22,1	20,3	24,4	18,9	27,6	23,8	19,8	21,9	27,7	24,2
Percentil 25	47,9	48,0	47,3	29,6	47,7	56,6	44,9	46,0	46,5	44,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	49,3	53,5	53,1
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	45,2	67,9	56,6	56,1	52,6	55,9	57,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,1	62,9
Nº encuestas	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42

Tabla A.69. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres por grupo de edad. Área de Salud del Altiplano 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
55-64 años										
Media	40,3	45,1	38,5	36,9	53,7	49,9	48,4	46,8	38,9	52,5
DE	15,0	14,6	16,5	10,0	11,7	13,7	11,4	13,9	15,8	13,2
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	15,8	9,0	12,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,0	75,4
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	15,8	10,1	25,4
Percentil 25	22,1	29,5	25,7	29,6	47,7	55,4	44,9	39,5	26,9	46,2
Percentil 50	39,3	56,5	37,8	29,6	57,8	56,6	56,1	52,3	42,5	55,4
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	61,1
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,3	73,1
Nº encuestas	29	30	30	30	29	30	30	30	29	29
65-74 años										
Media	40,3	46,8	41,1	34,3	53,8	46,8	46,0	48,7	39,7	51,2
DE	14,6	13,1	16,2	10,0	14,1	14,5	14,0	14,0	12,0	13,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	16,7	24,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	70,8
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	19,0	25,4
Percentil 25	22,1	38,7	26,9	29,6	45,5	46,5	34,5	38,8	28,3	42,8
Percentil 50	39,3	53,2	47,3	29,6	57,8	56,6	56,1	52,3	40,9	56,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	59,8	51,5	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	54,9	70,1
Nº encuestas	24	25	25	25	25	25	25	25	24	24
≥ 75 años										
Media	37,5	48,1	41,7	35,5	54,5	45,2	47,6	47,9	38,5	52,0
DE	12,7	12,2	15,1	10,7	14,6	14,7	13,4	13,8	10,7	12,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	17,6	23,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,1	73,8
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	18,4	19,6	19,6	29,8
Percentil 25	22,1	38,7	26,9	29,6	42,4	26,3	44,9	40,2	31,0	42,3
Percentil 50	39,3	57,2	37,6	29,6	57,8	56,6	56,1	46,3	39,7	54,8
Percentil 75	47,9	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	46,5	62,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,3	71,1
Nº encuestas	30	30	29	30	29	29	29	29	29	29

Tabla A.70. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica en ambos sexos. Área de Salud del Altiplano 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sin condiciones médicas										
Media	55,3	54,6	54,5	47,0	61,9	55,0	53,7	56,6	52,7	56,8
DE	5,0	8,0	7,6	8,0	8,3	6,4	7,1	7,0	5,9	6,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	34,1	21,7	25,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	62,1	74,9
Percentil 5	47,9	38,7	37,1	29,6	47,7	39,4	33,7	43,5	38,8	41,0
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	54,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,7	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,1	62,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,1	62,7
Nº encuestas	244	244	243	244	243	243	243	243	243	243
Con condiciones médicas										
Media	47,1	50,9	47,9	40,1	58,0	51,1	50,4	51,7	45,9	54,1
DE	12,6	10,8	13,4	10,1	11,9	12,0	11,5	13,1	11,0	12,2
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	9,0	7,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,6	76,2
Percentil 5	22,1	29,5	16,7	18,9	32,1	16,2	22,5	21,9	23,8	27,0
Percentil 25	39,3	48,0	37,1	29,6	47,7	56,6	50,5	46,3	39,7	49,9
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	49,9	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	53,7	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,7	66,9
Nº encuestas	320	321	321	321	320	321	321	320	318	318

Tabla A.71. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, hombres. Área de Salud del Altiplano 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sin enfermedades crónicas										
Media	55,3	55,2	54,7	46,9	63,1	55,0	53,8	57,6	52,7	57,5
DE	4,7	7,0	7,1	7,9	7,5	6,9	6,8	6,8	5,3	6,3
Mínimo	22,1	20,3	26,9	29,6	27,6	16,2	22,5	34,1	26,2	35,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	61,8	65,9
Percentil 5	43,0	38,7	37,1	29,6	47,7	42,8	33,7	46,3	41,3	42,5
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,2	55,7
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,5	59,4
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,1	62,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	58,8	63,7
Nº encuestas	111	111	111	111	111	111	111	111	111	111
Con enfermedades crónicas										
Media	49,9	52,7	50,2	41,2	60,5	52,6	52,4	55,3	47,5	56,7
DE	10,9	9,1	11,6	9,4	10,3	10,6	9,6	11,4	9,4	10,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	17,9	7,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,6	76,2
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	23,1	22,5	28,0	26,0	31,2
Percentil 25	47,9	55,6	47,3	29,6	57,8	56,6	56,1	52,3	43,7	54,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	51,3	59,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	53,7	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,9	66,7
Nº encuestas	177	177	177	176	177	177	176	177	176	176

Tabla A.72. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, mujeres. Área de Salud del Altiplano 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sin enfermedades crónicas										
Media	55,3	54,1	54,2	47,2	60,9	54,9	53,7	55,7	52,6	56,2
DE	5,2	8,6	8,0	8,1	8,9	6,0	7,3	7,1	6,4	7,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	26,3	11,3	40,2	21,7	25,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	62,1	74,9
Percentil 5	47,9	29,2	37,1	29,6	41,5	36,4	33,7	40,2	37,7	40,7
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	54,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	54,2	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	58,4	56,1	60,0
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	61,6	67,9	56,6	56,1	64,5	59,1	62,7
<i>Nº encuestas</i>	133	133	132	133	132	132	132	132	132	132
Con enfermedades crónicas										
Media	43,8	48,5	45,0	38,7	55,0	49,2	47,9	47,3	43,8	50,9
DE	13,8	12,3	14,8	10,8	13,0	13,3	13,0	13,8	12,4	13,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	9,0	12,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	61,0	75,4
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	21,9	19,0	25,9
Percentil 25	30,7	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	44,9	40,2	36,6	43,4
Percentil 50	47,9	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	47,9	53,1
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,9	60,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,0	68,5
<i>Nº encuestas</i>	143	145	145	145	144	145	145	145	142	142

Tabla A.73. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según el tipo de condición médica crónica, ambos sexos. Área de Salud del Altiplano 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Hipertensión arterial										
Media	42,5	47,9	43,3	35,9	55,8	47,7	47,7	49,4	41,5	52,2
DE	14,0	12,9	15,4	10,6	13,2	14,5	13,4	14,5	12,3	14,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	9,0	12,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	58,8	75,4
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	21,9	18,5	23,7
Percentil 25	27,3	38,7	26,9	29,6	47,7	46,5	44,9	40,2	33,2	44,7
Percentil 50	47,9	57,2	47,3	29,6	57,8	56,6	56,1	52,3	44,9	57,2
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	52,1	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	55,3	68,6
Nº encuestas	106	106	106	106	105	106	106	106	105	105
Diabetes mellitus										
Media	36,9	44,7	40,7	30,4	51,7	44,1	44,6	45,0	37,0	48,9
DE	14,1	13,6	15,4	9,9	13,9	16,5	15,2	15,2	11,8	15,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	9,0	15,6
Máximo	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	54,3	69,0
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	18,4	21,0	17,6	22,0
Percentil 25	22,1	32,4	26,9	18,9	42,4	26,3	26,6	34,1	26,5	34,4
Percentil 50	39,3	48,0	47,2	29,6	56,4	56,6	56,1	46,3	36,5	54,8
Percentil 75	47,9	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	48,0	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	53,7	68,6
Nº encuestas	34	34	34	34	33	34	34	33	33	33
Asma, bronquitis, enfisema										
Media	42,1	46,8	44,2	37,5	54,1	46,6	45,6	46,4	42,3	49,4
DE	13,2	12,4	15,2	11,2	13,8	14,6	15,2	16,1	11,4	15,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	13,5	12,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,3	76,2
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,3	21,9	20,0	22,0
Percentil 25	30,7	38,7	26,9	29,6	47,2	36,4	27,3	34,1	36,8	38,6
Percentil 50	47,2	50,1	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	46,3	44,1	53,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	63,1	52,4	62,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,0	68,8
Nº encuestas	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Enfermedades del corazón										
Media	40,6	45,7	42,7	33,1	54,6	43,1	41,4	45,3	41,2	46,7
DE	13,7	12,6	15,9	8,2	14,1	15,4	16,8	13,8	12,6	16,5
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	21,7	7,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	64,9	69,0
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	22,6	11,1
Percentil 25	27,2	36,3	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	34,1	29,0	36,6
Percentil 50	39,3	48,0	47,3	29,6	57,8	46,5	44,9	49,4	42,3	51,8
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	52,3	51,7	56,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	62,4	68,1
Nº encuestas	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Alergia										
Media	50,7	51,8	49,1	43,0	59,1	52,7	51,3	53,1	48,4	54,8
DE	11,0	10,8	14,1	10,0	11,8	11,2	10,3	12,9	10,7	11,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	12,8	12,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,0	75,4
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	29,6	37,7	16,2	22,5	21,9	23,8	29,5
Percentil 25	47,9	50,8	47,3	29,6	48,0	56,6	56,1	46,3	45,9	51,8

Tabla A.73. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según el tipo de condición médica crónica, ambos sexos. Área de Salud del Altiplano 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	52,4	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,1	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,5	66,1
Nº encuestas	100	101	101	101	100	101	101	100	99	99
Depresión										
Media	39,3	43,4	40,3	31,8	46,8	40,5	39,7	35,6	41,1	39,3
DE	14,2	14,2	16,6	11,0	13,3	16,1	16,5	13,4	14,1	14,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	10,6	7,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	68,6	71,0
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	17,9	15,9
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	22,9	37,7	26,3	22,5	21,9	29,3	28,6
Percentil 50	39,3	48,0	47,3	29,6	47,7	46,5	44,9	34,1	43,0	40,4
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	46,3	53,4	50,2
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	51,0	67,9	56,6	56,1	58,4	64,9	65,2
Nº encuestas	51	52	52	52	50	52	52	51	49	49
Artrosis y problemas reumáticos										
Media	40,4	46,4	41,1	35,1	54,8	47,8	47,6	47,8	39,4	52,2
DE	13,3	12,8	14,9	9,5	12,9	14,0	13,4	14,3	11,5	13,5
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	9,0	15,6
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,8	76,2
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	21,9	17,6	25,8
Percentil 25	22,1	38,7	26,9	29,6	47,7	46,5	44,9	40,2	31,2	44,4
Percentil 50	39,3	57,2	47,3	29,6	57,8	56,6	56,1	52,3	41,3	55,4
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	49,2	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	54,8	69,4
Nº encuestas	134	135	135	135	133	135	135	134	132	132
Tumor maligno (últimos 5 años)										
Media	40,8	42,6	44,3	35,7	54,8	46,7	41,3	49,5	40,1	50,1
DE	14,6	16,3	15,7	10,1	14,1	15,7	17,9	11,3	13,1	14,4
Mínimo	22,1	20,3	26,9	29,6	37,7	16,2	11,3	28,0	24,8	25,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,4	73,1
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	29,6	37,7	16,2	11,3	28,0	24,8	25,9
Percentil 25	26,4	28,7	26,9	29,6	37,7	27,1	22,8	42,7	30,0	38,2
Percentil 50	39,3	47,9	53,4	29,6	57,8	56,6	49,6	52,3	34,2	54,1
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	57,5	55,1	59,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,4	73,1
Nº encuestas	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Otras situaciones										
Media	43,6	46,8	44,8	38,7	54,4	49,1	48,7	49,9	42,5	52,7
DE	14,2	13,0	15,2	10,6	13,4	13,5	12,8	14,4	12,5	13,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	9,0	23,9
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,8	73,8
Percentil 5	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	21,9	20,0	26,1
Percentil 25	29,8	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	44,9	43,2	33,8	46,9
Percentil 50	47,9	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	45,9	57,2
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,5	62,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,4	69,5
Nº encuestas	86	87	87	87	86	87	87	87	84	84

3.6. ÁREA DE SALUD DE LA VEGA DEL SEGURA

Tabla A.74. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos. Área de Salud de la Vega del Segura 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Ambos sexos										
Media	51,1	51,8	50,8	42,2	58,1	52,6	51,6	52,8	48,8	54,2
DE	10,4	9,9	11,0	10,3	9,2	9,3	9,7	9,7	10,3	8,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	11,6	16,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,3	73,7
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	26,3	28,1	34,1	25,0	34,0
Percentil 25	47,9	48,0	47,3	29,6	57,8	56,6	56,1	46,3	45,1	51,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,8	57,1
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,1	63,7
Nº encuestas	567	566	567	565	563	567	567	566	559	559

Tabla A.75. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres. Área de Salud de la Vega del Segura 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Hombres										
Media	52,2	53,2	52,8	43,5	59,7	54,1	53,7	54,9	49,9	56,3
DE	9,6	8,7	9,5	9,8	8,9	7,6	7,0	8,8	9,1	7,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	15,8	11,6	16,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	61,5	72,9
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	40,2	28,5	41,7
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	47,5	54,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,4	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	60,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	56,4	67,9	56,6	56,1	64,5	58,8	64,0
Nº encuestas	287	287	287	287	283	287	287	287	283	283

Tabla A.76. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres. Área de Salud de la Vega del Segura 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Mujeres										
Media	49,9	50,4	48,7	40,9	56,5	51,2	49,5	50,5	47,6	52,2
DE	11,1	11,0	11,9	10,7	9,2	10,5	11,4	10,0	11,2	9,9
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	16,4	21,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,3	73,7
Percentil 5	22,1	29,0	26,9	23,1	37,7	26,3	22,5	28,0	23,0	28,2
Percentil 25	39,3	41,9	37,1	29,6	47,7	46,5	44,9	41,9	41,6	47,7
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	56,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,0	57,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,7	63,3
Nº encuestas	280	279	280	278	280	280	280	279	276	276

Tabla A.77. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos por grupo de edad. Área de Salud de la Vega del Segura 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
18-24 años										
Media	56,0	55,2	54,1	46,9	61,4	54,9	54,2	55,7	53,1	56,2
DE	2,8	6,6	8,1	9,5	8,1	5,6	6,3	7,4	6,3	7,1
Mínimo	39,3	20,3	26,9	18,9	37,7	26,3	22,5	28,0	26,7	21,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	62,9	66,0
Percentil 5	56,5	38,7	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	40,2	37,3	40,0
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,2	54,7
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	54,5	57,2
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	58,4	56,7	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,5	63,6
Nº encuestas	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
25-34 años										
Media	54,3	54,6	55,1	43,4	58,1	54,4	52,3	53,3	52,5	53,6
DE	6,5	6,3	6,0	8,7	8,6	6,1	9,3	9,2	6,9	9,4
Mínimo	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	28,0	20,4	22,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,3	64,9
Percentil 5	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	36,4	22,5	37,0	35,2	26,7
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	47,7	56,6	56,1	46,3	51,8	51,6
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	53,7	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	56,1	57,9
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,9	62,8
Nº encuestas	135	135	135	135	132	135	135	135	132	132
35-44 años										
Media	53,9	54,5	53,1	44,3	59,2	54,9	53,3	54,0	51,6	55,2
DE	8,4	6,7	9,4	9,9	8,5	6,3	7,6	8,2	8,0	6,5
Mínimo	22,1	29,5	16,7	18,9	37,7	26,3	22,5	28,0	19,7	31,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	61,5	69,0
Percentil 5	22,1	38,7	26,9	29,6	37,7	36,4	33,7	40,2	30,2	42,1
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,1	52,9
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	56,1	59,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	62,7
Nº encuestas	121	121	121	119	121	121	121	121	119	119
45-54 años										
Media	51,7	51,1	49,8	40,9	58,9	53,8	51,0	52,9	48,2	54,6
DE	9,5	10,8	11,6	10,3	7,9	7,8	10,3	10,1	9,9	9,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	37,7	16,2	11,3	21,9	16,7	16,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,4	66,5
Percentil 5	22,1	20,7	26,9	18,9	40,7	36,4	29,3	29,8	25,4	35,5
Percentil 25	56,5	48,0	47,3	29,6	57,8	56,6	56,1	52,3	44,5	54,2
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,1	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	54,8	60,1
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,5	63,9
Nº encuestas	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

Tabla A.77. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general de ambos sexos por grupo de edad. Área de Salud de la Vega del Segura 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
55-64 años										
Media	46,3	47,8	47,6	40,0	56,3	51,2	49,7	49,7	44,6	53,0
DE	12,0	12,6	12,1	12,4	10,9	10,3	10,8	11,7	11,8	10,2
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	26,3	22,5	15,8	11,6	27,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	62,2	73,7
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	18,9	37,4	26,3	22,5	28,0	19,7	29,8
Percentil 25	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	50,3	44,9	40,2	37,1	48,9
Percentil 50	55,1	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	48,1	55,5
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,5	59,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,5	64,9
Nº encuestas	62	62	62	62	62	62	62	61	61	61
65-74 años										
Media	44,7	49,6	45,0	37,7	55,0	49,5	51,5	52,1	42,3	54,7
DE	12,7	10,6	13,2	9,2	9,5	10,8	9,4	9,9	10,7	8,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	21,9	20,7	22,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,4	68,1
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	19,2	37,7	26,3	28,3	34,1	23,2	33,6
Percentil 25	34,9	38,7	32,9	29,6	47,7	36,4	56,1	41,9	35,5	49,9
Percentil 50	47,9	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	43,5	57,2
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	60,8
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	45,0	67,9	56,6	56,1	64,5	56,2	64,5
Nº encuestas	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
≥ 75 años										
Media	38,7	40,1	39,3	36,6	54,8	41,3	45,6	47,7	37,0	51,0
DE	13,6	12,8	13,0	10,5	11,1	16,1	13,9	11,6	12,6	12,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	11,6	23,6
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,5	72,9
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	18,9	30,8	16,2	19,8	28,0	16,6	27,0
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,6	47,7	26,3	33,7	40,2	27,1	41,9
Percentil 50	39,3	38,7	37,1	29,6	57,8	46,5	56,1	46,3	37,8	54,1
Percentil 75	55,5	57,2	53,0	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	46,8	61,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,2	66,4
Nº encuestas	45	44	45	45	44	45	45	45	43	43

Tabla A.78. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres por grupo de edad. Área de Salud de la Vega del Segura 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
18-24 años										
Media	56,5	57,0	56,4	48,7	64,0	56,4	55,4	56,6	54,8	57,6
DE	0,0	1,3	4,4	8,3	5,4	1,5	2,8	6,9	3,2	4,0
Mínimo	56,5	48,0	37,1	29,6	47,7	46,5	44,9	40,2	44,9	47,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,7	62,7
Percentil 5	56,5	57,2	41,3	29,6	57,8	56,6	44,9	42,1	48,3	50,3
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,5	56,2
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,1	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,9	62,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,5	62,7
Nº encuestas	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
25-34 años										
Media	55,6	54,9	56,2	44,7	61,2	55,5	54,5	55,5	53,2	56,2
DE	3,1	5,8	4,0	7,6	7,6	4,2	5,9	7,7	4,2	6,1
Mínimo	39,3	29,5	37,1	29,6	37,7	36,4	22,5	40,2	36,1	37,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,6	64,9
Percentil 5	47,9	38,7	47,3	29,6	47,7	43,6	41,7	40,2	45,6	43,6
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	53,6
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,7	57,2
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	56,0	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,2	64,3
Nº encuestas	72	72	72	72	69	72	72	72	69	69
35-44 años										
Media	54,1	55,0	53,6	44,9	60,4	55,2	54,1	55,9	51,5	56,6
DE	8,3	6,3	9,4	9,4	8,3	6,1	6,3	8,3	7,6	6,2
Mínimo	22,1	29,5	16,7	29,6	37,7	26,3	33,7	28,0	19,7	36,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	61,5	69,0
Percentil 5	22,1	35,8	26,9	29,6	44,6	40,1	33,7	38,2	32,1	43,9
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	50,2	54,3
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	58,4	56,1	60,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,2	63,7
Nº encuestas	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63
45-54 años										
Media	52,3	52,9	51,2	41,4	60,0	52,8	52,4	54,3	49,1	55,3
DE	8,8	8,5	10,6	10,9	8,6	9,9	8,3	10,4	8,2	9,6
Mínimo	22,1	29,5	16,7	18,9	37,7	16,2	22,5	21,9	24,0	16,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	64,6
Percentil 5	31,1	29,5	22,9	18,9	37,7	22,3	33,7	25,6	27,4	30,7
Percentil 25	56,5	52,7	47,3	29,6	57,8	56,6	56,1	52,3	46,4	54,9
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,1	58,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,7	60,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	58,6	67,9	56,6	56,1	64,5	58,9	63,5
Nº encuestas	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44



Tabla A.78. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, hombres por grupo de edad. Área de Salud de la Vega del Segura 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
55-64 años										
Media	45,6	48,6	49,1	39,4	55,6	52,3	51,7	52,5	44,0	55,3
DE	13,2	13,2	12,8	12,0	11,6	10,0	10,2	10,9	12,4	9,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	26,3	22,5	15,8	11,6	27,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	58,1	65,5
Percentil 5	22,1	20,3	25,8	18,9	29,8	26,3	22,5	26,7	17,8	29,0
Percentil 25	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	56,6	56,1	48,8	34,9	54,3
Percentil 50	55,1	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	57,5	49,1	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,5	62,1
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	56,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,8	64,8
Nº encuestas	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
65-74 años										
Media	47,3	51,1	48,8	40,8	54,0	52,5	53,6	54,4	45,0	56,1
DE	12,9	9,6	11,6	9,2	9,8	8,3	7,9	8,8	10,8	8,0
Mínimo	22,1	29,5	16,7	18,9	27,6	26,3	22,5	28,0	20,7	28,6
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,4	68,1
Percentil 5	22,1	29,5	23,9	20,8	29,4	28,1	29,1	36,6	22,6	36,2
Percentil 25	39,3	45,1	37,1	29,6	47,7	50,3	56,1	48,6	36,7	54,2
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	47,9	57,5
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	61,1
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	59,1	67,9	56,6	56,1	64,5	59,7	68,0
Nº encuestas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
≥ 75 años										
Media	40,8	43,3	45,4	38,9	56,4	48,3	53,1	52,6	39,6	57,0
DE	14,0	12,8	12,9	10,8	9,1	13,4	8,2	10,2	13,2	9,4
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	21,9	11,6	26,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,5	72,9
Percentil 5	22,1	20,3	22,3	18,9	34,0	16,2	28,7	34,9	13,5	35,3
Percentil 25	25,1	29,5	37,1	29,6	49,3	36,4	56,1	44,1	32,0	53,3
Percentil 50	39,3	38,7	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	55,4	41,5	60,1
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	58,4	56,6	56,1	58,4	52,4	62,6
Percentil 95	56,5	57,2	51,9	62,0	61,5	56,6	50,0	57,7	56,6	69,5
Nº encuestas	18	18	18	18	17	18	18	18	17	17

Tabla A.79. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres por grupo de edad. Área de Salud de la Vega del Segura 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
18-24 años										
Media	55,5	53,2	51,6	45,0	58,7	53,4	52,9	54,8	51,4	54,8
DE	4,0	9,0	10,3	10,5	9,6	7,7	8,4	7,9	8,1	9,2
Mínimo	39,3	20,3	26,9	18,9	37,7	26,3	22,5	28,0	26,7	21,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	62,9	66,0
Percentil 5	39,3	27,7	26,9	27,1	37,7	34,0	31,1	32,9	31,5	29,8
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	48,3	54,2
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,7	57,1
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	58,4	56,5	59,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	61,4	65,8
Nº encuestas	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
25-34 años										
Media	52,9	54,2	53,8	41,8	54,6	53,0	49,8	50,8	51,8	50,7
DE	8,7	6,8	7,6	9,5	8,3	7,6	11,7	10,1	9,0	11,4
Mínimo	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	26,3	22,5	28,0	20,4	22,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,3	62,4
Percentil 5	30,7	38,7	37,1	29,6	37,7	36,4	22,5	28,0	32,1	24,6
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	29,6	47,7	56,6	44,9	46,3	50,2	47,2
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	54,2	55,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	56,7	57,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	61,6	62,3
Nº encuestas	62	62	62	62	62	62	62	62	62	62
35-44 años										
Media	53,7	54,1	52,5	43,7	57,8	54,6	52,5	52,0	51,6	53,6
DE	8,6	7,2	9,4	10,5	8,6	6,6	8,8	7,6	8,5	6,5
Mínimo	22,1	29,5	26,9	18,9	37,7	26,3	22,5	34,1	23,0	31,0
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,7	62,5
Percentil 5	22,1	38,7	26,9	29,4	37,7	36,4	33,7	40,2	26,8	41,8
Percentil 25	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	46,3	53,2	49,0
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	53,5	56,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,9	57,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	58,4	59,4	59,8
Nº encuestas	57	57	57	56	57	57	57	57	56	56
45-54 años										
Media	51,1	49,1	48,3	40,4	57,8	54,8	49,5	51,5	47,2	53,8
DE	10,3	12,6	12,5	9,8	7,1	4,7	12,1	9,7	11,5	9,0
Mínimo	22,1	20,3	26,9	18,9	37,7	36,4	11,3	28,0	16,7	27,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	63,4	66,5
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	18,9	44,7	43,4	19,1	32,2	22,4	34,8
Percentil 25	49,7	38,7	37,1	29,6	57,8	56,6	44,9	46,3	40,5	49,3
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	56,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	54,8	59,8
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,5	64,8
Nº encuestas	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41



Tabla A.79. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general, mujeres por grupo de edad. Área de Salud de la Vega del Segura 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
55-64 años										
Media	47,0	47,1	46,2	40,5	57,0	50,2	47,7	46,9	45,2	50,7
DE	10,9	12,3	11,3	13,0	10,3	10,6	11,0	12,0	11,4	10,7
Mínimo	22,1	20,3	26,9	18,9	27,6	26,3	22,5	21,9	18,5	28,6
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	62,2	73,7
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	18,9	35,7	26,3	22,5	26,5	20,0	29,6
Percentil 25	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	33,7	40,2	37,8	41,3
Percentil 50	52,2	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	46,3	47,8	52,9
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	58,4	55,0	57,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	57,1	67,9	56,6	56,1	64,5	61,0	68,6
Nº encuestas	32	32	32	32	32	32	32	31	31	31
65-74 años										
Media	42,4	48,2	41,6	34,9	55,9	46,8	49,6	50,1	40,0	53,4
DE	12,4	11,3	13,7	8,4	9,3	12,2	10,5	10,5	10,3	9,2
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	37,7	16,2	22,5	21,9	22,6	22,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	56,1	64,5
Percentil 5	22,1	26,2	23,2	18,9	37,7	22,6	27,4	29,6	23,7	31,3
Percentil 25	30,7	38,7	26,9	29,6	47,7	36,4	44,7	40,2	28,8	48,8
Percentil 50	43,6	57,2	42,2	29,6	57,8	56,6	56,1	52,3	42,0	56,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	65,4	56,6	56,1	58,4	49,8	60,0
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	64,5	55,6	64,2
Nº encuestas	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
≥ 75 años										
Media	37,3	37,9	35,3	35,1	53,8	36,7	40,6	44,5	35,3	47,1
DE	13,4	12,7	11,5	10,2	12,3	16,2	14,8	11,5	12,2	12,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	16,4	23,6
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,3	66,2
Percentil 5	22,1	20,3	23,1	18,9	27,6	16,2	11,3	25,7	16,9	24,1
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,6	47,7	16,7	32,8	39,1	24,7	37,5
Percentil 50	39,3	38,7	26,9	29,6	56,7	36,4	35,0	46,3	37,4	49,3
Percentil 75	47,9	48,0	47,3	44,7	67,9	56,6	56,1	52,3	45,2	58,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	54,5	65,5
Nº encuestas	27	26	27	27	27	27	27	27	26	26

Tabla A.80. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica en ambos sexos. Área de Salud de la Vega del Segura 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sin condiciones médicas										
Media	56,0	56,0	55,7	46,7	61,1	55,8	54,6	55,6	53,8	56,3
DE	2,8	4,2	5,7	8,9	6,7	3,3	5,6	7,4	4,5	6,3
Mínimo	22,1	29,5	16,7	29,6	37,7	36,4	22,5	28,0	33,3	21,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,3	66,4
Percentil 5	56,5	48,0	47,3	29,6	47,7	46,5	44,9	40,2	44,4	41,9
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	54,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	54,5	57,2
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	58,4	56,4	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	59,4	62,7
Nº encuestas	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Con condiciones médicas										
Media	47,9	49,1	47,7	39,4	56,2	50,6	49,8	50,9	45,5	52,9
DE	12,2	11,5	12,3	10,2	10,0	11,1	11,1	10,5	11,5	10,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	11,6	16,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,4	73,7
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	18,9	37,7	26,3	22,5	28,0	21,7	29,8
Percentil 25	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	46,5	44,9	46,3	37,8	48,4
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	49,7	56,6
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,7	59,7
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,8	64,2
Nº encuestas	347	346	347	345	343	347	347	346	340	340

Tabla A.81. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, hombres. Área de Salud de la Vega del Segura 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sin enfermedades crónicas										
Media	55,8	56,3	56,1	46,6	62,4	56,3	55,4	56,8	53,5	57,6
DE	3,4	3,7	5,4	8,9	6,1	2,1	3,3	7,0	4,1	4,8
Mínimo	22,1	29,5	16,7	29,6	47,7	36,4	33,7	34,1	33,3	38,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,7	66,4
Percentil 5	48,7	48,0	47,3	29,6	47,7	56,6	52,8	40,2	44,9	46,3
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	52,4	56,6
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,7	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,1	61,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	57,9	62,7
Nº encuestas	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
Con enfermedades crónicas										
Media	49,4	50,8	50,3	41,1	57,6	52,4	52,4	53,5	47,0	55,2
DE	11,7	10,4	11,1	9,9	10,1	9,7	8,7	9,7	10,7	8,7
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	15,8	11,6	16,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	61,5	72,9
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	18,9	37,7	26,3	33,7	34,1	23,8	36,5
Percentil 25	39,3	48,0	47,3	29,6	47,7	56,6	56,1	46,3	42,7	52,3
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	51,5	57,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	53,7	60,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,1	64,9
Nº encuestas	162	162	162	162	159	162	162	162	158	158

Tabla A.82. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general en función de la presencia de condición médica crónica, mujeres. Área de Salud de la Vega del Segura 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Sin enfermedades crónicas										
Media	56,3	55,6	55,1	46,7	59,4	55,3	53,5	54,0	54,1	54,5
DE	1,7	4,8	6,1	9,0	7,2	4,4	7,5	7,5	5,0	7,6
Mínimo	39,3	29,5	26,9	29,6	37,7	36,4	22,5	28,0	34,0	21,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	66,3	66,0
Percentil 5	56,5	44,1	37,1	29,6	47,7	46,5	33,7	40,2	44,3	38,0
Percentil 25	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	53,2	54,2
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	54,8	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	58,4	56,7	57,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,8	62,4
Nº encuestas	96	96	96	96	96	96	96	95	95	95
Con enfermedades crónicas										
Media	46,6	47,7	45,3	37,9	55,0	49,0	47,4	48,7	44,2	50,9
DE	12,4	12,2	12,8	10,3	9,7	12,0	12,5	10,7	12,1	10,8
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	16,4	22,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,4	73,7
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	18,9	37,7	26,3	22,5	28,0	20,3	27,4
Percentil 25	39,3	38,7	36,0	29,6	47,7	46,5	33,7	40,2	36,3	44,7
Percentil 50	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	48,6	54,5
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	53,5	57,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,8	63,8
Nº encuestas	184	183	184	182	184	184	184	184	182	182

Tabla A.83. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según el tipo de condición médica crónica, ambos sexos. Área de Salud de la Vega del Segura 2007.

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Hipertensión arterial										
Media	43,9	45,7	44,7	36,3	55,4	47,7	48,8	49,9	41,1	52,8
DE	13,7	12,2	13,1	10,5	10,8	13,1	11,8	11,6	11,9	11,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	11,6	22,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,5	73,7
Percentil 5	22,1	20,4	26,9	18,9	37,7	16,2	22,5	28,0	18,5	29,8
Percentil 25	30,7	38,7	26,9	29,6	47,7	36,4	44,9	40,2	33,8	46,5
Percentil 50	47,9	48,0	47,3	29,6	57,8	56,6	56,1	52,3	43,3	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	51,7	61,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	55,6	64,9
Nº encuestas	128	127	128	128	125	128	128	128	125	125
Diabetes mellitus										
Media	40,8	45,0	42,9	37,6	55,3	49,0	48,4	51,0	39,6	53,9
DE	14,1	12,8	14,2	10,7	10,6	12,9	11,8	11,6	12,9	10,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	21,9	11,6	23,6
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	56,7	72,9
Percentil 5	22,1	20,3	26,3	18,9	36,2	16,2	22,5	23,5	16,7	30,9
Percentil 25	22,1	35,4	26,9	29,6	47,7	36,4	34,5	42,2	27,9	49,4
Percentil 50	39,3	48,0	39,3	44,7	57,8	56,6	56,1	52,3	40,6	57,0
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	51,6	61,0
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,5	68,2
Nº encuestas	36	36	36	36	34	36	36	36	34	34
Asma, bronquitis, enfisema										
Media	40,7	42,7	43,4	33,2	52,1	46,4	47,1	47,5	38,4	51,0
DE	14,6	13,5	13,5	11,2	13,6	14,5	13,3	11,8	13,7	12,1
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	15,8	11,6	24,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	58,1	66,5
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	18,9	27,6	16,2	22,5	28,0	16,9	24,6
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,6	37,7	30,5	33,7	40,2	26,6	43,5
Percentil 50	39,3	41,0	47,3	29,6	47,7	56,6	56,1	52,3	37,6	55,2
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	52,5	59,9
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,5	66,2
Nº encuestas	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Enfermedades del corazón										
Media	38,8	42,7	38,6	31,6	50,9	45,4	47,7	48,1	35,7	51,8
DE	14,2	12,5	14,1	9,9	11,3	14,7	12,3	11,3	12,0	11,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	21,9	15,9	22,8
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	60,5	66,5
Percentil 5	22,1	22,2	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	21,9	16,9	25,0
Percentil 25	22,1	29,5	26,9	29,6	42,9	36,4	33,7	40,2	25,4	48,7
Percentil 50	39,3	38,7	37,1	29,6	47,7	56,6	56,1	52,3	36,8	55,4
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	38,6	57,8	56,6	56,1	58,4	45,8	60,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	51,9	67,9	56,6	56,1	64,5	56,0	66,5
Nº encuestas	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44
Alergia										
Media	51,2	51,4	50,8	41,9	57,4	53,3	51,0	51,4	49,0	53,3
DE	10,2	10,4	11,3	9,8	9,8	8,9	10,0	10,5	10,6	10,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	21,9	12,8	16,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,4	69,0
Percentil 5	22,1	29,5	26,9	23,4	37,7	26,3	27,0	28,0	24,9	28,1
Percentil 25	51,9	48,0	47,3	29,6	47,7	56,6	56,1	46,3	45,1	49,0

Tabla A.83. Puntuaciones medias de calidad de vida relacionada con la salud en población general según el tipo de condición médica crónica, ambos sexos. Área de Salud de la Vega del Segura 2007. (Continuación)

	FF	RF	DC	SG	VT	FS	RE	SM	ISF	ISM
Percentil 50	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	57,8	53,5	56,7
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	55,9	59,5
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	59,6	64,8
Nº encuestas	119	119	119	119	117	119	119	119	117	117
Depresión										
Media	44,0	44,3	39,5	32,4	50,1	45,7	40,1	41,2	41,6	43,5
DE	12,5	12,9	12,7	10,2	11,0	13,5	13,3	10,0	11,6	11,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	22,5	21,9	17,8	16,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	60,2	62,5
Percentil 5	22,1	20,3	19,4	18,9	27,6	16,2	22,5	21,9	21,0	24,6
Percentil 25	39,3	38,7	26,9	29,6	40,8	36,4	29,6	34,1	32,7	33,9
Percentil 50	44,5	48,0	37,1	29,6	47,7	56,6	33,7	40,2	41,2	43,7
Percentil 75	56,5	57,2	47,3	44,7	57,8	56,6	56,1	46,3	51,4	51,4
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	51,4	67,9	56,6	56,1	58,8	59,0	62,3
Nº encuestas	62	61	62	60	62	62	62	62	60	60
Artrosis y problemas reumáticos										
Media	44,1	45,9	42,5	36,5	54,0	48,0	47,6	48,1	41,4	51,2
DE	13,0	12,4	12,6	10,3	10,1	12,9	12,1	11,1	12,3	11,0
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	11,6	16,2
Máximo	56,5	57,2	57,4	62,0	67,9	56,6	56,1	64,5	63,4	73,7
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	18,9	37,7	16,2	22,5	28,0	18,9	28,6
Percentil 25	39,3	38,7	26,9	29,6	47,7	36,4	33,7	40,2	31,9	43,8
Percentil 50	47,9	48,0	47,3	29,6	57,8	56,6	56,1	52,3	43,4	54,3
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	57,8	56,6	56,1	58,4	52,4	59,3
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	57,5	64,5
Nº encuestas	179	178	179	177	176	179	179	178	173	173
Tumor maligno (últimos 5 años)										
Media	44,7	39,7	40,9	34,4	53,8	43,4	40,4	47,4	41,4	46,5
DE	13,0	15,3	14,1	14,7	11,6	14,3	19,5	14,4	12,2	16,3
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	37,7	26,3	11,3	21,9	11,6	26,5
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	56,4	66,4
Percentil 5	22,1	20,3	17,9	18,9	37,7	26,3	11,3	22,6	11,6	26,6
Percentil 25	39,1	22,3	26,9	18,9	47,7	26,3	22,5	37,3	36,9	29,8
Percentil 50	47,9	38,7	37,1	30,8	47,7	49,3	54,2	48,6	46,5	52,5
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	49,5	62,1
Percentil 95	56,5	57,2	56,2	55,5	67,9	56,6	56,1	63,8	56,4	66,2
Nº encuestas	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Otras situaciones										
Media	45,6	45,3	45,0	36,9	55,4	48,3	49,4	49,8	42,1	52,5
DE	12,7	12,6	13,4	10,9	10,6	12,4	11,3	11,0	12,1	9,6
Mínimo	22,1	20,3	16,7	18,9	27,6	16,2	11,3	15,8	16,4	24,3
Máximo	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	63,4	69,0
Percentil 5	22,1	20,3	26,9	18,9	37,7	19,9	22,5	28,0	19,7	28,6
Percentil 25	39,3	38,7	26,9	29,6	47,7	46,5	44,9	46,3	32,7	48,3
Percentil 50	47,9	48,0	47,3	33,0	57,8	56,6	56,1	52,3	44,3	54,5
Percentil 75	56,5	57,2	57,4	44,7	67,9	56,6	56,1	58,4	52,4	58,6
Percentil 95	56,5	57,2	57,4	55,5	67,9	56,6	56,1	64,5	58,2	64,1
Nº encuestas	86	86	86	86	84	86	86	86	84	84

ANEXO B

TABLAS COMPLEMENTARIAS

Tabla B.1. Pesos (p) asignados a las áreas de salud, por edad y sexo, para la reconstrucción de la muestra.

Área de Salud	Sexo	Edad (años)						
		18-24	25-34	35-44	45-54	56-64	56-74	≥ 75
Altiplano	Hombres	0,20	0,37	0,29	0,22	0,16	0,13	0,12
	Mujeres	0,24	0,54	0,50	0,36	0,21	0,17	0,25
Cartagena	Hombres	1,14	2,41	2,01	1,35	1,03	0,89	0,74
	Mujeres	1,50	3,48	3,18	1,98	1,24	1,05	0,97
Lorca	Hombres	0,52	1,10	0,83	0,55	0,45	0,37	0,34
	Mujeres	0,72	1,94	1,72	1,10	0,67	0,54	0,71
Murcia	Hombres	1,74	3,50	3,07	2,08	1,53	1,29	1,24
	Mujeres	2,00	4,31	4,02	2,66	1,79	1,51	1,68
Noroeste	Hombres	0,21	0,35	0,31	0,24	0,20	0,19	0,18
	Mujeres	0,26	0,60	0,71	0,50	0,30	0,31	0,62
Vega del Segura	Hombres	0,62	1,13	0,98	0,68	0,53	0,44	0,37
	Mujeres	0,78	1,62	1,55	1,05	0,67	0,58	0,74

Fuente: Obtención de pesos a partir del Padrón 2007 Región de Murcia.

Tabla B.2. Encuesta de salud en población general. Características sociodemográficas. Región de Murcia 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Grupos de edad						
18-24	400	11,8	208	12,2	192	11,5
25-34	797	23,6	430	25,2	367	21,9
35-44	706	20,9	371	21,7	336	20,1
45-54	512	15,1	259	15,2	253	15,1
55-64	380	11,2	185	10,8	195	11,7
65-74	313	9,3	146	8,5	167	10,0
≥75	273	8,1	109	6,4	164	9,8
Educación						
No saber leer ni escribir	115	3,4	33	1,9	82	4,9
Sabe leer y escribir	366	10,8	156	9,1	211	12,6
Estudios primarios	1169	34,6	604	35,4	566	33,8
Estudios secundarios	896	26,5	475	27,8	421	25,2
Estudios superiores	814	24,1	426	24,9	388	23,2
NS/NC	20	0,6	14	0,8	6	0,4
Estado civil						
Soltero	971	28,7	552	32,3	419	25,0
Casado	2084	61,7	1067	62,5	1017	60,8
Viudo	196	5,8	25	1,5	170	10,2
Separado/Divorciado	118	3,5	59	3,4	59	3,5
NS/NC	12	0,4	4	0,2	8	0,5
Vivir en pareja						
Sí	2298	68,0	1197	70,1	1100	65,7
NO	1068	31,6	504	29,5	564	33,7
NS/NC	16	0,5	6	0,3	10	0,6
Actividad económica						
Trabajando	1953	57,8	1176	68,9	777	46,4
Baja de ≥ 3 meses	68	2,0	32	1,9	36	2,2
En desempleo	148	4,4	65	3,8	83	5,0
Estudiante	529	15,6	327	19,1	202	12,1
Jubilado/Pensionista	181	5,3	93	5,4	88	5,3
Labores del hogar	480	14,2	1	0,1	479	28,6
NS/NC	22	0,6	14	0,8	8	0,5

Tabla B.3. Encuesta de salud en población general. Hábitos de vida. Región de Murcia 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	3381	–	1707	50,5	1674	49,5
Consumo tabaco						
Diariamente	964	28,5	558	32,7	406	24,3
No diariamente	117	3,5	76	4,4	41	2,5
No actualmente, pero sí antes	750	22,2	487	28,5	263	15,7
No fuma, ni ha fumado nunca	1543	45,6	581	34,0	962	57,5
NS/NC	7	0,2	6	0,3	1	0,1
Consumo alcohol						
Diariamente	816	24,1	586	34,4	230	13,7
No diariamente	1539	45,5	759	44,4	781	46,6
No actualmente, pero sí antes	65	1,9	34	2,0	31	1,8
No nunca	948	28,0	318	18,6	630	37,6
NS/NC	13	0,4	10	0,6	3	0,2
Actividad física laboral						
Sentado	1127	33,3	623	36,5	503	30,1
De pie	2002	59,2	913	53,5	1088	65,0
Caminando	176	5,2	102	6,0	75	4,5
Gran esfuerzo	56	1,6	55	3,2	1	0,1
NS/NC	21	0,6	15	0,9	6	0,4
Actividad física tiempo ocio						
No realiza	1720	50,9	789	46,2	931	55,6
Una vez al mes	63	1,9	32	1,9	31	1,9
Varias veces al mes	307	9,1	187	11,0	120	7,2
Varias veces a la semana	1275	37,7	691	40,5	585	34,9
NS/NC	15	0,4	8	0,5	7	0,4

Tabla B.4. Encuesta de salud en población general. Presencia de condiciones médicas crónicas. Región de Murcia 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	3381	–	1707	50,5	1674	49,5
Sin condición médica crónica	1.318	39,0	711	41,7	606	36,2
Con alguna condición médica crónica	2.063	61,0	996	58,3	1067	63,8
1 condición médica crónica	810	24,0	423	24,8	387	23,1
2 condiciones médicas crónicas	544	16,1	258	15,1	287	17,1
3 condiciones médicas crónicas	357	10,6	166	9,7	192	11,4
≥ 4 condiciones médicas crónicas	352	10,4	149	8,8	202	12,1

Tabla B.5. Encuesta de salud en población general. Tipo de condición médica crónica declarada. Región de Murcia 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	3381	–	1707	50,5	1674	49,5
Hipertensión arterial	669	19,8	322	18,9	347	20,7
Diabetes mellitas	281	8,3	148	8,7	133	7,9
Asma, bronquitis crónica, enfisema	247	7,3	136	8,0	111	6,7
Enfermedad del corazón	213	6,3	106	6,2	107	6,4
Alergia	709	21,0	354	20,8	354	21,2
Depresión	429	12,7	139	8,1	291	17,4
Artrosis y problemas reumáticos	888	26,3	342	20,0	546	32,6
Tumor maligno (5 últimos años)	88	2,6	41	2,4	47	2,8
Enfermedades del aparato digestivo	57	1,7	36	2,1	21	1,3
Enfermedades del aparato urinario y genital (masculino y femenino)	39	1,1	19	1,1	20	1,2
Osteopatías, condropatías y deformidades adquiridas músculoesqueléticas	45	1,3	16	1,0	28	1,7
Otras enfermedades mentales	13	1,4	2	0,1	11	0,7
Otras enfermedades pulmonares	14	0,4	14	0,8	1	0,0
Enfermedades de otorrinolaringología y otras del aparato respiratorio	21	0,6	18	1,1	3	0,2
Enfermedades endocrino-metabólicas (excepto DM)	44	1,3	16	0,9	14	0,9
Enfermedades vasculares	46	1,3	10	0,6	36	2,2
Enfermedades neurológicas	45	1,3	19	1,1	29	1,7
Enfermedades renales	26	0,8	15	0,9	10	0,6
Enfermedades hematológicas	25	0,8	5	0,3	20	1,2
Enfermedades oculares	26	0,8	11	0,7	14	0,9
Enfermedades dermatológicas	13	0,4	9	0,5	4	0,2
Dorsopatías	58	1,7	30	1,8	28	1,7
Colesterol alto	97	2,9	60	3,5	37	2,2

Tabla B.6. Encuesta de salud en población general. Tiempo desde la última visita médica y utilización de servicios sanitarios en las *cuatro últimas semanas*. Región de Murcia 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	3381	–	1707	50,5	1674	49,5
Tiempo desde la última visita a (AP o AE)						
≤ 4 semanas	1189	35,2	499	29,3	690	41,2
> 4 semanas y < 1 año	1841	54,5	964	56,4	878	52,4
≥ 1 año	340	10,1	240	14,0	103	6,1
NS/NC	8	0,2	4	0,3	4	0,2
Especialidad médica últimas 4 semanas						
Medicina de Familia	895	26,3	381	22,3	514	30,7
Ginecología	53	1,6	0	0,0	53	3,2
Traumatología	27	0,8	16	0,9	11	0,7
Oftalmología	22	0,6	10	0,6	11	0,7
Cardiología	20	0,6	10	0,6	10	0,6
Otras especialidades	172	5,1	82	4,9	91	5,4
NS/NC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	1189	35,2	499	29,3	690	41,2
Lugar de consulta						
Centro salud/consultorio	846	25,0	342	20,0	504	30,1
Ambulatorio/CEP	40	1,2	19	1,1	21	1,3
Consulta externas de hospital	190	5,6	83	4,8	108	6,4
Urgencias de ambulatorio	14	0,4	8	0,5	6	0,4
Urgencias de hospital	27	0,8	13	0,8	13	0,8
Consulta médico particular	23	0,7	4	0,2	19	1,1
Consulta médico de una sociedad	42	1,2	26	1,6	15	0,9
Empresa o lugar de trabajo	3	0,1	3	0,2	0	0,0
Domicilio del sujeto de entrevista	3	0,1	0	0,0	2	0,1
Otro lugar	0	0,0	0	0,0	0	0,0
NS/NC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	1189	35,2	499	29,3	690	41,2
Motivo consulta						
Diagnóstico	483	14,3	217	12,7	266	15,9
Accidentes o agresión	11	0,3	4	0,3	7	0,4
Revisión	445	13,2	182	10,7	263	15,7
Sólo dispensación de recetas	205	6,1	79	4,6	126	7,5
Parte de baja, confirmación o alta	10	0,3	5	0,3	5	0,3
Otros motivos	34	1,0	10	0,6	23	1,4
NS/NC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	1189	35,2	499	29,3	690	41,2

Tabla B.7. Encuesta de salud en población general. Utilización de servicios sanitarios hospitalarios en el último año. Región de Murcia 2007.

	TOTAL		HOMBRES		MUJERES	
	n	%	n	%	n	%
Total	3381	–	1707	50,5	1674	49,5
Hospitalización en el último año						
Sí	281	8,3	128	7,5	153	9,1
NO	3096	91,6	1575	92,3	1521	90,9
NS/NC	4	0,1	4	0,2	0	0,0
Nº Hospitalizaciones*						
Una vez	253	7,5	119	6,9	134	8,0
Más de una vez	28	0,8	9	0,6	19	1,0
NS/NC	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Total	281	8,3	128	7,5	153	9,1
Motivo hospitalización*						
Intervención Quirúrgica	141	4,2	68	4,0	73	4,3
Estudio médico diagnóstico	29	0,9	12	,7	17	1,0
Tratamiento médico sin IQ	83	2,5	47	2,7	36	2,2
Parto (incluye cesárea)	27	0,8	0	0,0	27	1,6
Otros motivos	280	8,3	0	0,0	0	0,0
NS/NC	1	0,0	1	0,1	0	0,0
Total	281	8,3	128	7,5	153	9,1

(*) Nº y Motivo de hospitalización calculado sobre el total de hospitalizaciones en el en el último año (n=281).

Tabla B.8. Estandarización por el método directo, con la población muestral total, de los Índices de Salud Físico (ISF) y Mental (ISM) de las distintas Áreas de Salud. Región de Murcia 2007.

	ISF Estandarizado	ISF Bruto	Variación relativa (%)	ISM Estandarizado	ISM Bruto	Variación relativa (%)
Murcia	48,8	48,9	0,1	53,3	53,3	0,0
Cartagena	48,8	48,2	-1,3	53,5	53,5	0,1
Lorca	48,8	48,9	0,1	54,8	54,8	0,0
Noroeste	48,7	48,0	-1,4	51,4	50,9	-1,0
Altiplano	48,7	48,8	0,2	55,3	55,3	0,1
Vega Segura	48,7	48,8	0,3	52,3	54,2	3,6

Fuente: encuesta de salud en población general. Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria. Región de Murcia 2007.

ANEXO C

CUESTIONARIO

COD caso:

COD encuestador:

A.- PROBLEMAS DE SALUD

1.- ¿Le ha dicho su médico que padece alguna de las siguientes enfermedades?

	SI	NO		SI	NO
1. Tensión alta	①	②	6. Depresión	①	②
2. Diabetes	①	②	7. Artrosis y problemas reumáticos	①	②
3. Asma, bronquitis crónica, enfisema	①	②	8. Tumor maligno (en los últimos 5 años)	①	②
4. Enfermedad del corazón	①	②	9. Otras situaciones	①	②
5. Alergia	①	②	Especif:.....		

88. No sabe 99. No contesta

B.- UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

2.- ¿Cuánto tiempo hace que consultó a un médico por última vez, por algún problema, molestia o enfermedad suya?

- ① Hace 4 semanas o menos ② Hace más de 4 semanas y menos de 1 año ⑧ No sabe
 ③ Hace un año o más ⑨ No contesta

3.- La última consulta en estas cuatro semanas ¿A qué médico fue?

Respuesta:

4.- ¿Dónde tuvo lugar la última consulta realizada dentro de las cuatro últimas semanas?

Respuesta:

5.- ¿Cuál fue el motivo principal de esta última consulta?

Respuesta:

Las siguientes preguntas se van a referir a hospitalizaciones

6.- Durante los últimos doce meses ¿ha tenido que ingresar en un hospital como paciente al menos durante una noche?

- ① Si ② No ⑧ No sabe ⑨ No contesta

7.- ¿Cuántas veces ha estado hospitalizado/a en estos últimos doce meses?

Número de veces:

88. No sabe

99. No contesta

8.- En relación también a este último ingreso hospitalario ¿cuál fue el motivo de su ingreso en el hospital?

Respuesta:

C.- SALUD Y BIENESTAR

	Excelente	Muy buena	Buena	Regular	Mala	No sabe	No contesta
9. En general, usted diría que su salud es	①	②	③	④	⑤	⑧	⑨

Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría hacer en un día normal. SU SALUD ACTUAL, ¿LE LIMITA para hacer esas actividades o cosas? Si es así, ¿cuánto?

	Si, me limita mucho	Si, me limita un poco	No, no me limita nada	No sabe	No contesta
10.- <u>ESFUERZOS MODERADOS</u> , como mover una mesa, pasar la aspiradora, jugar a los bolos o caminar más de 1 hora.	①	②	③	⑧	⑨
11.- Subir <u>VARIOS</u> pisos por la escalera	①	②	③	⑧	⑨

Durante LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, A CAUSA DE SU SALUD FÍSICA?

	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Solo alguna vez	Nunca	No sabe	No contesta
12.- ¿ <u>HIZO MENOS</u> de lo que hubiera querido hacer?	①	②	③	④	⑤	⑧	⑨
13.- ¿Tuvo que <u>DEJAR DE HACER ALGUNAS TAREAS</u> en su trabajo o en sus actividades cotidianas?	①	②	③	④	⑤	⑧	⑨

Durante LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de ALGÚN PROBLEMA EMOCIONAL (como estar triste, deprimido, o nervioso)?

	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Solo alguna vez	Nunca	No sabe	No contesta
14.- ¿ <u>HIZO MENOS</u> de lo que hubiera querido hacer <u>POR ALGÚN PROBLEMA EMOCIONAL</u> ?	①	②	③	④	⑤	⑧	⑨
15.- ¿Hizo su trabajo o sus actividades cotidianas menos <u>CUIDADOSAMENTE</u> que de costumbre, <u>POR ALGÚN PROBLEMA EMOCIONAL</u> ?	①	②	③	④	⑤	⑧	⑨

	Nada	Un poco	Regular	Bastante	Mucho	No sabe	No contesta
16. Durante <u>LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS</u> , ¿hasta qué punto <u>EL DOLOR</u> le ha dificultado su trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)?	①	②	③	④	⑤	⑧	⑨

Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido las cosas durante LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS. En cada pregunta responda lo que se parezca más a cómo se ha sentido usted. DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS ¿con qué frecuencia...

	Siempre	Casi siempre	Algunas veces	Solo alguna vez	Nunca	No sabe	No contesta
17.- se sintió calmado y tranquilo?	①	②	③	④	⑤	⑧	⑨
18.- tuvo mucha energía?	①	②	③	④	⑤	⑧	⑨
19.- se sintió desanimado y deprimido?	①	②	③	④	⑤	⑧	⑨

	Siempre	Casi	Algunas	Solo	Nunca	No	No
--	---------	------	---------	------	-------	----	----

	siempre	veces	alguna vez		sabe	contesta
20. DURANTE LAS 4 ÚLTIMAS SEMANAS, ¿con qué frecuencia la salud física o los problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como visitar a los amigos o familiares)?	①	②	③	④	⑤	⑧ ⑨

D.- HÁBITOS DE VIDA

A continuación vamos a iniciar el segundo apartado de la encuesta, donde vamos a preguntarle sobre HÁBITOS DE VIDA. Para cada una de las preguntas, por favor diga la opción que mejor corresponda a su respuesta.

21.- ¿Podría decirme si actualmente fuma cigarrillos?

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| ① Sí, fuma diariamente | ③ No fuma actualmente, pero ha fumado antes | ⑧ No sabe |
| ② Sí fuma, pero no diariamente | ④ No fuma, ni ha fumado nunca | ⑨ No contesta |

22.- En relación al consumo de bebidas que contengan alcohol ¿podría decirme si ha consumido o no durante las últimas 4 semanas?

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------|
| ① Sí, diariamente | ③ No actualmente, pero sí antes | ⑧ No sabe |
| ② Sí, pero no diariamente | ④ No, nunca | ⑨ No contesta |

23.- ¿Cuál de estas posibilidades describe mejor su actividad principal en el centro de trabajo, centro de enseñanza, hogar (labores domésticas), etc.?

- | | |
|---|---------------|
| ① Sentado la mayor parte de la jornada | ⑧ No sabe |
| ② De pie la mayor parte de la jornada sin efectuar grandes desplazamientos o esfuerzos | ⑨ No contesta |
| ③ Caminando, llevando algún peso, efectuando desplazamientos frecuentes que no requieran gran esfuerzo físico | |
| ④ Realizando tareas que requieren gran esfuerzo físico | |

24.- ¿Cuál de estas posibilidades describe mejor la frecuencia con la que realiza alguna actividad física en su tiempo libre?

- | | |
|---|---------------|
| ① No realiza actividad física alguna | ⑧ No sabe |
| ② Realiza alguna actividad física o deportiva menos de una vez al mes | ⑨ No contesta |
| ③ Realiza alguna actividad física o deportiva una o varias veces al mes pero menos de una vez a la semana | |
| ④ Realiza alguna actividad física o deportiva una o varias veces a la semana | |

E.- DATOS DEMOGRÁFICOS

Por último, le vamos a preguntar sobre algunas circunstancias personales.

25.- ¿Cuál es su país de nacimiento? ¿Y su nacionalidad?

País:

Nacionalidad:

PAÍS:

NACIONALIDAD:

88. No sabe

99. No contesta

88. No sabe

99. No contesta

26.- ¿Cuál es su estado civil?

① Soltero

③ Viudo

⑤ Divorciado

⑧ No sabe

② Casado

④ Separado legalmente

⑨ No contesta

27.- ¿Convive actualmente en pareja?

① Sí

② No

⑧ No sabe

⑨ No contesta

28.- ¿Cuál es el nivel de estudios terminados?

Respuesta:

--	--

29.- En relación con la situación laboral, ¿en qué situación se encontraba la semana pasada? (Posible respuesta múltiple)

① Trabajando

④ Jubilado/Pensionista

⑦ Realizando sin remuneración
trabajo sociales o actividades benéficas

⑨ No contesta

② Trabajando con baja
de 3 meses o superior

⑤ Estudiante

⑧ Otras situaciones

⑩ No sabe

③ En desempleo

⑥ Dedicado principalmente
a las labores del hogar

30.- ¿Cuál es su ocupación, profesión u oficio actual o el último que ha tenido?

Ocupación:

CNO94:

--	--	--	--

888. No sabe

999. No contesta

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

