

Boletín Epidemiológico de Murcia



Región de Murcia
Consejería de Sanidad
Dirección General de Salud

Vol. 10 N° 446. Págs. 83-86
Datos correspondientes a las semanas n° 35 y 36
Periodo comprendido entre el 28 de agosto al 10 de septiembre de 1988
Sección de Epidemiología - Ronda Levante, 11. 30008-MURCIA - Telfs.: 24 52 12 / 23 08 50

SISTEMA DE INFORMACION SOBRE TOXICOMANIAS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA EN 1988

INTRODUCCION

Desde el primer trimestre del 87 en nuestra Región, y también a nivel Estatal, dentro del Plan Nacional de Drogas, se comenzó un sistema de notificación que mediante la recogida de indicadores indirectos nos permitiera conocer la evolución temporal y espacial del consumo de drogas y características demográficas de los consumidores.

Como objetivos generales hay que destacar: Conocer la evolución temporal de la magnitud del abuso a nivel de la Comunidad Autónoma; conocer las tendencias evolutivas en el tipo de drogas consumidas; conocer la evolución en el patrón de consumo en relación a variables demográficas básicas; proporcionar información para la planificación en el campo de las drogas y servir de fuente para generar hipótesis y como base de datos para realizar estudios epidemiológicos.

Este sistema está gestionado por la sección de Epidemiología y los indicadores son:

- Indicador tratamiento: número de personas que inician tratamiento ambulatorio por dependencia a opiáceos o cocaína.
- Indicador urgencias: número de urgencias hospitalarias por patologías provocadas o relacionadas con el abuso de opiáceos o cocaína.
- Indicador mortalidad: número de fallecidos por muerte aguda directamente relacionada con el consumo de opiáceos o cocaína.

Se presentan los datos del indicador tratamiento correspondientes a 1988.

MATERIAL Y METODOS

Población de referencia: el Sistema de Información Sanitaria sobre Toxicomanías en la Comunidad Autónoma de Murcia (SITCAM), comenzó en Enero de 1987 recogiendo datos de los centros que el Programa Regional de Intervención en Drogodependencias tenía en marcha (1). A lo largo del año se incorporaron el nuevo Centro de Lorca y en noviembre el Programa de Instituciones Penitenciarias. En Enero de 1988 se abrió el Centro de Salud Mental de Caravaca. En la actualidad notifican 6 centros, los cuales representan el 100% de los centros de tratamiento de nuestra comunidad.

Se trata de un estudio epidemiológico descriptivo. Las variables recogidas son: Sexo, Área de Salud de residencia, droga principal por la que inicia el tratamiento y edad en que inició el tratamiento. Las tasas por edad y sexo y por área, están calculadas solamente con los residentes. Se considera residente aquél que vive en la Región de Murcia al menos en los seis meses anteriores al inicio del tratamiento. Como denominador se utiliza el Padrón de habitantes de 1986.

Para la evaluación del funcionamiento del SITCAM se utiliza el indicador % de cobertura (n° de hojas-resumen semanales recibidas durante el año / n° de semanas del año o las transcurridas desde la apertura del centro x 100).

TABLA I

CARACTERISTICAS GENERALES DE LOS CASOS
QUE HAN INICIADO TRATAMIENTO POR CONSUMO
DE OPIACEOS Y COCAINA EN LA REGION DE MURCIA.
AÑO 1987 Y 1988

| | MURCIA | | ESPAÑA |
|--|--------|----------|----------|
| | 1987 | 1988 | 1987 |
| N° Inicios de tto. notificados..... | 355 | 634 | 9.727 |
| Primer Trimestre | 42 | 166 | 1.801 |
| Segundo Trimestre..... | 39 | 176 | 2.243 |
| Tercer Trimestre | 96 | 118 | 2.520 |
| Cuarto Trimestre | 178 | 174 | 3.163 |
| Drogas Primarias que inician tto. 1987 (%) | | 1988 (%) | 1987 (%) |
| Heroína | 96'6 | 95'74 | 97'0 |
| Cocaína | 1'1 | 3'47 | 1'9 |
| Metadona..... | 0'6 | 0'00 | 0'4 |
| Otros opiáceos..... | 1'7 | 0'78 | 0'7 |
| Edad Media (Años)..... | 1987 | 1988 | 1987 |
| | 23'87 | 24'16 | 24'8 |

Fuentes: — Registro SITCAM — Referencia 2 — Elaboración propia

(continúa en la página 86)

| Enfermedades (según lista de EDO) O. 26-11-1985 | Código C.I.E.-O.M.S. (1975) | Casos declarados semana 35 | | Casos acumulados semana 35 | | Mediana 80-87 | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
| | | 1988 | 1987 | 1988 | 1987 | Semana 35 | Acumul. |
| Fiebre tifoidea | 002 | 4 | 5 | 60 | 95 | 5 | 137 |
| 6 Disentería | 004 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 53 |
| 5 Toxi-infecc. alimentaria | 003-005 | 5 | 19 | 463 | 600 | 16 | 600 |
| 5 Procesos diarreicos | 006-009 | 2.181 | 2.088 | 58.984 | 61.891 | 1.787 | 54.503 |
| 5 I.R.A. inf. resp. | 460-466 | 5.999 | 4.646 | 415.415 | 359.905 | 3.727 | 267.915 |
| Gripe | 487 | 169 | 214 | 61.711 | 108.876 | 214 | 87.632 |
| 6 Neumonía | 480-486 | 20 | 25 | 2.380 | 2.100 | 6 | 350 |
| Tuberculosis respiratoria | 011,012 | 1 | 6 | 163 | 155 | 2 | 105 |
| Sarampión | 055 | 0 | 1 | 47 | 331 | 9 | 1.592 |
| Rubeola | 056,771.0 | 5 | 6 | 404 | 977 | 12 | 3.163 |
| Varicela | 052 | 35 | 38 | 11.659 | 13.466 | 24 | 10.306 |
| Escarlatina | 034 | 0 | 1 | 343 | 479 | 1 | 260 |
| Brucelosis | 023 | 1 | 4 | 62 | 81 | 4 | 161 |
| 6 Sífilis | 091 | 0 | 0 | 25 | 37 | 0 | 41 |
| 6 Infección Gonocócica | 098.0,098.1 | 2 | 5 | 101 | 163 | 15 | 506 |
| Infección meningocócica | 036 | 2 | 0 | 78 | 83 | 1 | 93 |
| Hepatitis | 070 | 3 | 2 | 186 | 349 | 8 | 383 |
| Parotiditis | 072 | 4 | 6 | 402 | 327 | 19 | 2.406 |
| Tosferina | 033 | 2 | 3 | 54 | 181 | 32 | 1.222 |
| * Otras meningitis | 047.9,320.8 | 1 | 0 | 93 | 50 | | |
| * Otras tuberculosis | 013-018 | 0 | 1 | 11 | 10 | | |
| * Otras E.T.S. | 099,131.0 | 15 | 17 | 676 | 621 | | |

* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana por ser de notificación posterior a 1982.

5/6 Número de años usados para cálculo de mediana (distinto al período especificado).

Distribución por Areas de Salud, de los casos de enfermedades de declaración obligatoria (semana 35 de 1988)

| Areas de Salud | Murcia | Cartagena | Lorca | Noroeste | Altiplano | Oriental | Mun. Murcia | Mun. Cartagena |
|-----------------------------|---------|-----------|---------|----------|-----------|----------|-------------|----------------|
| Población (censo 1986) | 387.626 | 249.598 | 119.467 | 65.497 | 47.643 | 144.364 | 309.504 | 168.809 |
| Tasa: 1 caso/100.000 h. | 0,25 | 0,40 | 0,83 | 1,52 | 2,09 | 0,69 | 0,32 | 0,59 |
| Cobertura semana | 67,3 | 68,9 | 88,2 | 71,9 | 84,0 | 96,2 | 59,6 | 53,3 |
| Enfermedades acumulación | 77,7 | 69,7 | 87,7 | 85,9 | 82,3 | 92,5 | 73,7 | 57,4 |
| Fiebre casos | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tifoidea acumulación | 13 | 12 | 13 | 12 | 2 | 8 | 10 | 9 |
| Disentería casos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| acumulación | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Toxi-infecc. casos | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alimentaria acumulación | 92 | 179 | 32 | 60 | 22 | 78 | 64 | 108 |
| Procesos casos | 657 | 467 | 215 | 195 | 245 | 402 | 504 | 187 |
| Diarreicos acumulación | 21.542 | 13.550 | 3.881 | 3.431 | 5.947 | 10.633 | 17.058 | 6.623 |
| I.R.A. casos | 1.684 | 1.652 | 536 | 355 | 510 | 1.262 | 1.047 | 595 |
| In. resp. aguda acumulación | 157.088 | 91.334 | 31.570 | 25.382 | 39.612 | 70.429 | 112.111 | 38.300 |
| Gripe casos | 66 | 32 | 19 | 14 | 0 | 38 | 59 | 5 |
| acumulación | 17.131 | 12.844 | 10.116 | 8.674 | 2.732 | 10.214 | 12.274 | 5.219 |
| Neumonía casos | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| acumulación | 982 | 239 | 122 | 248 | 238 | 551 | 786 | 131 |
| Tuberculosis casos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Respiratoria acumulación | 90 | 25 | 10 | 11 | 5 | 22 | 74 | 10 |
| Sarampión casos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| acumulación | 14 | 13 | 4 | 5 | 7 | 4 | 11 | 5 |
| Rubeola casos | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| acumulación | 190 | 66 | 32 | 38 | 0 | 78 | 129 | 17 |
| Varicela casos | 17 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 15 | 1 |
| acumulación | 3.556 | 3.201 | 833 | 988 | 1.448 | 1.633 | 2.616 | 1.762 |
| Escarlatina casos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| acumulación | 35 | 9 | 3 | 258 | 4 | 34 | 18 | 0 |
| Brucelosis casos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| acumulación | 10 | 10 | 12 | 20 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| Sífilis casos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| acumulación | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 |
| Infección casos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gonocócica acumulación | 25 | 34 | 16 | 11 | 0 | 15 | 19 | 20 |
| Infección casos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Meningocócica acumulación | 37 | 14 | 3 | 1 | 1 | 22 | 30 | 10 |
| Hepatitis casos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| acumulación | 70 | 73 | 18 | 5 | 2 | 18 | 48 | 44 |
| Parotiditis casos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| acumulación | 83 | 56 | 27 | 184 | 5 | 47 | 64 | 43 |
| Tosferina casos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| acumulación | 15 | 22 | 1 | 4 | 0 | 12 | 15 | 2 |
| Otras casos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meningitis acumulación | 43 | 6 | 5 | 1 | 2 | 36 | 36 | 4 |
| Otras casos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuberculosis acumulación | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Otras E.T.S. casos | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| acumulación | 161 | 220 | 18 | 59 | 13 | 205 | 135 | 114 |

Situación regional de las enfermedades de declaración obligatoria de baja incidencia, correspondiente a la semana 35 de 1988

| Enfermedades (según lista de EDO) O. 26-11-1985 | Código C.I.E.-O.M.S. (1975) | Casos declarados semana 35 | | Casos acumulados semana 35 | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|
| | | 1988 | 1987 | 1988 | 1987 |
| Carbunco | 022 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| Hidatidosis | 122 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Fiebre Exant. Mediterránea | 082.1 | 0 | 1 | 15 | 28 |
| Fiebre Reumática | 390-392 | 4 | 2 | 104 | 97 |
| Lepra | 030 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leishmaniasis | 085 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Paludismo | 084 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tétanos | 037,771.3 | 0 | 0 | 1 | 1 |

De las restantes enfermedades no se ha recibido ninguna notificación en este año

| Enfermedades (según lista de EDO) O. 26-11-1985 | Código C.I.E.-O.M.S. (1975) | Casos declarados semana 36 | | Casos acumulados semana 36 | | Mediana 80-87 | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|---------|---------------|---------|
| | | 1988 | 1987 | 1988 | 1987 | Semana 36 | Acumul. |
| Fiebre tifoidea | 002 | 1 | 5 | 61 | 100 | 4 | 141 |
| 6 Disenteria | 004 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 53 |
| 5 Toxi-infecc. alimentaria | 003-005 | 4 | 4 | 467 | 604 | 13 | 604 |
| 5 Procesos diarreicos | 006-009 | 1.885 | 2.200 | 60.869 | 64.091 | 1.936 | 56.439 |
| 5 I.R.A. inf. resp. | 460-466 | 6.712 | 6.164 | 422.127 | 366.069 | 4.379 | 272.294 |
| Gripe | 487 | 194 | 246 | 61.905 | 109.122 | 246 | 87.988 |
| 6 Neumonía | 480-486 | 32 | 42 | 2.412 | 2.142 | 4 | 355 |
| Tuberculosis respiratoria | 011,012 | 2 | 10 | 165 | 165 | 4 | 106 |
| Sarampión | 055 | 0 | 5 | 47 | 336 | 6 | 1.600 |
| Rubeola | 056,771.0 | 3 | 8 | 407 | 985 | 6 | 3.169 |
| Varicela | 052 | 26 | 39 | 11.685 | 13.505 | 27 | 10.333 |
| Escarlatina | 034 | 0 | 1 | 343 | 480 | 1 | 264 |
| Brucelosis | 023 | 1 | 2 | 63 | 83 | 3 | 166 |
| 6 Sífilis | 091 | 0 | 0 | 25 | 37 | 0 | 42 |
| 6 Infección Gonocócica | 098.0,098.1 | 3 | 7 | 104 | 170 | 17 | 526 |
| Infección meningocócica | 036 | 0 | 4 | 78 | 87 | 2 | 97 |
| Hepatitis | 070 | 6 | 11 | 192 | 360 | 9 | 388 |
| Parotiditis | 072 | 5 | 2 | 407 | 329 | 15 | 2.421 |
| Tosferina | 033 | 0 | 1 | 54 | 182 | 41 | 1.318 |
| * Otras meningitis | 047.9,320.8 | 2 | 0 | 95 | 50 | | |
| * Otras tuberculosis | 013-018 | 0 | 0 | 11 | 10 | | |
| * Otras E.T.S. | 099,131.0 | 18 | 247 | 694 | 645 | | |

* En estas enfermedades no se puede calcular la mediana por ser de notificación posterior a 1982.

5/6 Número de años usados para cálculo de mediana (distinto al período especificado).

Distribución por Areas de Salud, de los casos de enfermedades de declaración obligatoria (semana 36 de 1988)

| Areas de Salud | Murcia | Cartagena | Lorca | Noroeste | Altiplano | Oriental | Mun. Murcia | Mun. Cartagena |
|------------------------------------|---------|-----------|---------|----------|-----------|----------|-------------|----------------|
| Población (censo 1986) | 387.626 | 249.598 | 119.467 | 65.497 | 47.643 | 144.364 | 309.504 | 168.809 |
| Tasa: 1 caso/100.000 h. | 0,25 | 0,40 | 0,83 | 1,52 | 2,09 | 0,69 | 0,32 | 0,59 |
| Cobertura <i>semana</i> | 69,5 | 66,0 | 84,3 | 62,5 | 84,0 | 93,6 | 61,5 | 58,3 |
| Enfermedades <i>acumulación</i> | 77,1 | 69,6 | 87,6 | 85,2 | 82,3 | 92,5 | 73,4 | 57,4 |
| Fiebre <i>casos</i> | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tifoidea <i>acumulación</i> | 13 | 13 | 13 | 12 | 2 | 8 | 10 | 10 |
| Disenteria <i>casos</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>acumulación</i> | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| Toxi-infecc. <i>casos</i> | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Alimentaria <i>acumulación</i> | 94 | 180 | 32 | 60 | 23 | 78 | 64 | 109 |
| Procesos <i>casos</i> | 671 | 301 | 169 | 171 | 215 | 358 | 531 | 138 |
| Diarreicos <i>acumulación</i> | 22.213 | 13.851 | 4.050 | 3.602 | 6.162 | 10.991 | 17.589 | 6.761 |
| I.R.A. <i>casos</i> | 2.479 | 1.380 | 613 | 325 | 500 | 1.415 | 1.659 | 648 |
| In. resp. aguda <i>acumulación</i> | 159.567 | 92.714 | 32.183 | 25.707 | 40.112 | 71.844 | 113.770 | 38.948 |
| Gripe <i>casos</i> | 84 | 15 | 34 | 18 | 6 | 37 | 71 | 10 |
| <i>acumulación</i> | 17.215 | 12.859 | 10.150 | 8.692 | 2.738 | 10.251 | 12.345 | 5.229 |
| Neumonía <i>casos</i> | 15 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 14 | 0 |
| <i>acumulación</i> | 997 | 240 | 125 | 249 | 243 | 558 | 800 | 131 |
| Tuberculosis <i>casos</i> | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Respiratoria <i>acumulación</i> | 90 | 25 | 11 | 12 | 5 | 22 | 74 | 10 |
| Sarampión <i>casos</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>acumulación</i> | 14 | 13 | 4 | 5 | 7 | 4 | 11 | 5 |
| Rubeola <i>casos</i> | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| <i>acumulación</i> | 192 | 66 | 32 | 39 | 0 | 78 | 130 | 17 |
| Varicela <i>casos</i> | 8 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 |
| <i>acumulación</i> | 3.564 | 3.208 | 836 | 992 | 1.451 | 1.634 | 2.623 | 1.762 |
| Escarlatina <i>casos</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>acumulación</i> | 35 | 9 | 3 | 258 | 4 | 34 | 18 | 0 |
| Brucelosis <i>casos</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| <i>acumulación</i> | 10 | 10 | 12 | 20 | 1 | 10 | 5 | 4 |
| Sífilis <i>casos</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>acumulación</i> | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9 |
| Infección <i>casos</i> | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gonocócica <i>acumulación</i> | 25 | 36 | 16 | 12 | 0 | 15 | 19 | 21 |
| Infección <i>casos</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meningocócica <i>acumulación</i> | 37 | 14 | 3 | 1 | 1 | 22 | 30 | 10 |
| Hepatitis <i>casos</i> | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| <i>acumulación</i> | 70 | 77 | 19 | 5 | 2 | 19 | 48 | 48 |
| Parotiditis <i>casos</i> | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| <i>acumulación</i> | 87 | 57 | 27 | 184 | 5 | 47 | 66 | 43 |
| Tosferina <i>casos</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>acumulación</i> | 15 | 22 | 1 | 4 | 0 | 12 | 15 | 2 |
| Otras <i>casos</i> | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Meningitis <i>acumulación</i> | 43 | 6 | 7 | 1 | 2 | 36 | 36 | 4 |
| Otras <i>casos</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tuberculosis <i>acumulación</i> | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Otras E.T.S. <i>casos</i> | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 |
| <i>acumulación</i> | 166 | 223 | 18 | 59 | 13 | 215 | 139 | 116 |

Situación regional de las enfermedades de declaración obligatoria de baja incidencia, correspondiente a la semana 36 de 1988

| Enfermedades (según lista de EDO) O. 26-11-1985 | Código C.I.E.-O.M.S. (1975) | Casos declarados semana 36 | | Casos acumulados semana 36 | |
|---|-----------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------------|------|
| | | 1988 | 1987 | 1988 | 1987 |
| Carbunco | 022 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| Hidatidosis | 122 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Fiebre Exant. Mediterránea | 082.1 | 0 | 0 | 15 | 28 |
| Fiebre Reumática | 390-392 | 5 | 2 | 109 | 99 |
| Lepra | 030 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leishmaniasis | 085 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Paludismo | 084 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Tétanos | 037,771.3 | 0 | 0 | 1 | 1 |

De las restantes enfermedades no se ha recibido ninguna notificación en este año — 85 —

Porcentaje de declaración semanal (semana 35 de 1988)

Total Regional: 75'51

Municipios con cobertura inferior al 80%

| | | | |
|----------------|-------|-----------|-------|
| CAMPOS DEL RIO | 0,00 | JUMILLA | 66,67 |
| CARTAGENA | 53,33 | LORCA | 73,91 |
| CEHEGIN | 0,00 | MORATALLA | 57,14 |
| CEUTI | 33,33 | MURCIA | 59,63 |
| FUENTE ALAMO | 71,43 | | |

Porcentaje de declaración semanal (semana 36 de 1988)

Total Regional: 74'34

Municipios con cobertura inferior al 80%

| | | | |
|-----------|-------|------------|-------|
| CARTAGENA | 58,33 | LORCA | 65,22 |
| CEHEGIN | 0,00 | MORATALLA | 0,00 |
| CEUTI | 33,33 | MURCIA | 61,49 |
| FORTUNA | 0,00 | SAN JAVIER | 0,00 |
| JUMILLA | 66,67 | | |

RESULTADOS

El número total de inicios de tratamiento fue de 634. En relación al año anterior se produce un aumento importante. En la tabla I, se recoge el gran impacto que ha tenido la implantación del Programa de Instituciones Penitenciarias instaurado desde la semana 45 de 1987, con un incremento de 124 casos respecto al trimestre anterior.

De todos los Centros que se encuentran en funcionamiento, los que aportan un mayor número de pacientes son el CAD de Murcia (233) y el Programa de Prisiones (224), que atienden al 72'1% de todos los inicios de tratamiento. (Tabla II).

TABLA II

INICIOS DE TRATAMIENTO POR CENTRO Y PORCENTAJE MURCIA 1988

| CENTROS | 1. Trimestre | | 2. Trimestre | | 3. Trimestre | | 4. Trimestre | | Total | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | Nº casos | % | | |
| CAD Murcia | 54 | 32'5 | 66 | 37'5 | 51 | 43'2 | 62 | 35'6 | 233 | 36'8 |
| CAD Cartagena | 31 | 18'5 | 35 | 19'9 | 38 | 32'2 | 39 | 22'4 | 143 | 22'6 |
| CSM Lorca | 10 | 6'0 | 5 | 2'8 | 5 | 4'2 | — | — | 24 | 3'8 |
| CSM Caravaca | — | — | 3 | 1'7 | 1 | 0'8 | — | — | 4 | 0'6 |
| CSM Yecla | — | — | 3 | 1'7 | 1 | 0'8 | 2 | 1'1 | 6 | 0'9 |
| Prog. Prisiones | 71 | 42'8 | 63 | 35'8 | 22 | 18'6 | 67 | 38'5 | 224 | 35'3 |
| TOTAL | 166 | 100'0 | 175 | 100'0 | 118 | 100'0 | 174 | 100'0 | 634 | 100'0 |

La edad media de iniciación al tratamiento en 1988 se sitúa en 24'16 años con una desviación estándar (ST = 4'49) y un gran predominio del sexo masculino. La tasa por cien mil habitantes más elevada corresponde al grupo de 20 a 24 años, seguido por el de 25 a 29. (Tabla III).

TABLA III

INICIOS DE TRATAMIENTO SEGUN EDAD Y SEXO. TASA POR 10.000 HABITANTES. MURCIA 1988

| EDAD | VARONES | | MUJERES | | DESCONOCIDO | | TOTAL | |
|--------------|------------|-------------|-----------|-------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| | Nº | TASA | Nº | TASA | Nº | TASA | Nº | TASA |
| < 15 | 0 | 0'00 | 0 | 0'00 | 0 | 0'00 | 0 | 0'00 |
| 15-19 | 57 | 0'56 | 10 | 0'09 | 0 | 0'00 | 67 | 0'66 |
| 20-24 | 255 | 2'53 | 31 | 0'30 | 1 | 0'009 | 287 | 2'85 |
| 25-29 | 160 | 1'58 | 14 | 0'13 | 0 | 0'00 | 174 | 1'72 |
| 30-34 | 40 | 0'39 | 5 | 0'04 | 0 | 0'00 | 45 | 0'44 |
| 35-39 | 4 | 0'03 | 0 | 0'00 | 0 | 0'00 | 4 | 0'03 |
| 40-44 | 6 | 0'05 | 0 | 0'00 | 0 | 0'00 | 6 | 0'05 |
| 45-49 | 1 | 0'01 | 0 | 0'00 | 0 | 0'00 | 1 | 0'009 |
| TOTAL | 523 | 5'14 | 60 | 0'56 | 1 | 0'009 | 584 | 5'759 |

(continúa en el número siguiente)

BOLETIN QUINCENAL