



ADMINISTRACION NO SIMULTANEA DE VACUNAS*

Combinación de antígenos	Intervalo mínimo recomendado entre dosis
2 o más inactivadas	Ninguno. Pueden administrarse simultáneamente o con cualquier intervalo entre dosis
Vivas e inactivadas ⁽¹⁾	Ninguno. Pueden administrarse simultáneamente o con cualquier intervalo entre dosis
2 o más vivas parenterales ⁽²⁾	4 semanas, SIEMPRE que no se administren simultáneamente

*Modificado de Centers for Disease Control and Prevention. General recommendations on immunization: recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. Morb Mortal Wkly Rep 2006;55 (No. RR-15)

(1) La vacuna frente a la fiebre amarilla y la anticolérica inactivada deben administrarse con un intervalo de 3 semanas.

(2) Las vacunas vivas orales (VPO, rotavirus y Ty21a) pueden administrarse simultáneamente o con cualquier intervalo antes o después de las vacunas inactivadas o vivas parenterales. La vacuna de la fiebre amarilla puede administrarse en cualquier momento tras la antisarampionosa individual. Si las vacunas vivas parenterales (Triple Vírica y/o Varicela y/o Fiebre Amarilla) se administran con intervalos inferiores a 4 o menos semanas, la vacuna administrada en segundo lugar no contabiliza, debiendo repetirla a las 4 o más semanas de la dosis invalidada.