



Color

Administración sistemática



Rayado

Administración en personas susceptibles o no vacunadas con anterioridad

- 1 Completar vacunación hasta 5 dosis desde 15 a 64 años. No administrar dosis de recuerdo cada 10 años. Solo se administrará dosis de recuerdo a los 65 años.
- 2 En forma de tetravérica (TV + VVZ).
- 3 Se recomienda la vacunación en personas sin vacunación documentada nacidas en España a partir de 1970 (2 dosis separadas por 4 semanas).
- 4 Para nacidos a partir de 1 de enero 2015 y a partir de 11 años de edad en susceptibles (2 dosis separadas por 4 semanas o completar pauta si lleva solo 1 dosis previa). A partir de los 15 años, si susceptible o padecimiento incierto de enfermedad, realizar serología previa a la vacunación.
- 5 Se administrarán 4 dosis (0, 2, 4 y 11 meses para hijos de madre con AgHBs positivo en el embarazo). Primera dosis en primeras 24 h de vida junto con inmunoglobulina. En personas hasta 18 años no vacunadas con anterioridad comprobar la recepción de pauta completa de 3 dosis (0, 1 y 6 m).
- 6 Men B para nacidos a partir de 1 de enero 2023.
- 7 VACUNACIÓN ESCOLAR para nacidos en 2012.
- 8 No vacunados por encima de los 10 años nacidos en 2001 y años posteriores.
- 9 Varones no vacunados nacidos en 2011 y mujeres no vacunadas nacidas entre 2005 y 2011. 2 dosis separadas por 6 meses hasta los 14 años y 3 dosis (0, 2 y 6 meses) a partir de los 15 años.
- 10 VCN20 en personas de entre 65 y 80 años de edad no vacunados con anterioridad o vacunados previamente con una única dosis de VPN23 antes de los 65 años (intervalo entre esta dosis y la de VCN20 de, al menos, 5 años).
- 11 Herpes zóster para personas nacidas en 1958.

CALENDARIO DE VACUNACIÓN A LO LARGO DE TODA LA VIDA

2023

