

Bulletin d'information pour personnes vaccinées

1. Quels effets secondaires peut-on observer suite à l'administration du vaccin?

Les vaccins peuvent causer effets secondaires, comme tous les médicaments. La plupart sont légers et apparaissent quelques heures après l'administration du vaccin, durent un ou deux jours et sont parfois inexistantes.

Étant donné qu'il existe un risque de réactions allergiques graves très rare, vous devrez rester 15 minutes (30 minutes pour les personnes ayant des antécédents de réaction allergique grave pour toute autre cause) dans l'enceinte de vaccination pour une surveillance médicale et un traitement en cas de besoin.

Les effets aderses les plus communs après avoir reçu le vaccin sont l'inflammation de la zone d'administration du vaccin, la fatigue, le mal de tête, les douleurs musculaires, les frissons, les douleurs articulaires ou encore la fièvre.

2. Que faire en cas d'effets secondaires?

En cas d'effets secondaires légers, vous pouvez prendre du paracétamol 650 mg toutes les 6-8 heures si vous n'êtes pas allergique à ce médicament.

3. Que faut-il savoir concernant les événements thrombotiques associés au vaccin de Janssen?

Des cas très rares de phénomènes thrombotiques associés à la réduction des plaquettes ont été observés après son administration.

4. Quels symptômes faut-il surveiller après l'administration du vaccin?

Appelez le 112 si les symptômes suivants apparaissent dans les jours suivant l'administration du vaccin:

- Mal de tête intense qui s'aggrave ou insensible au traitement analgésique habituel.
- Mal de tête inhabituel qui s'aggrave lorsque vous vous couchez ou vous penchez, accompagné d'une vision floue, des nausées et des vomissements, difficulté pour parler, réduction de la force, somnolence ou convulsion.
- Hématomes ou saignement non expliqué.
- Difficulté à respirer, douleur dans la poitrine, douleur ou gonflement des jambes ou encore douleur abdominale persistente.