

وثيقة إعلام الأشخاص الملقّحين

1. ما هي الآثار الجانبية التي يمكن أن تشعرين بها بعد أخذ اللّقاح؟

كما هو الحال بالنسبة لجميع الأدوية، يمكن أن تسبب اللقاحات آثارًا جانبية. معظمها طفيفة، تظهر بعد بضعة ساعات من التلقيح، وتستمر ليوم أو يومين وليس من الضروري أن تظهر دائمًا. لمواجهة أي رد فعل تحسسي خطير، الذي نادرا ما يحدث، يجب أن تبقى أي 15 دقيقة (30 دقيقة للأشخاص الذين لديهم سوابق من ردود الفعل التحسسية الشديدة لأي سبب) في منطقة التلقيح للمراقبة الطبية والعلاج إذا لزم الأمر. الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا بعد التلقيح هي الالتهاب في المنطقة التي تم إعطاء اللقاح فيها، والتعب، والصداع، وآلام العضلات، والقشعريرة، وآلام المفاصل، أو الحمى.

2. كيف يجب علي التصرف في حال ظهور آثار جانبية؟

في حالة ظهرت عليك آثار جانبية طفيفة، يمكنك تناول الباراسيتامول 650 ملغ كل 6-8 ساعات إذا لم تكن لديك سوابق من الحساسية تجاهه.

3. ما يجب أن تعرفه|تعرفينه عن أحداث الجلطة المرتبطة بلقاح Janssen؟

بعد أخذ ذلك اللّقاح، تم تسجيل حدوث في حالات نادر للغاية ظاهرة التخثر المرتبطة بانخفاض عدد الصفائح الدموية.

4. ما هي العلامات التحذيرية التي يجب أن تنتبهين لها بعد التطعيم؟

يجب الاتصال بالرقم 112 في حالة ظهور في الأيام التالية للتطعيم:

- صداع شديد يتفاقم أو لا يستجيب للعلاج المعتاد بمسكنات الألم.
- صداع غير عادي يزداد سوءًا عند الاستلقاء أو الانحناء، أو يكون مصحوبًا بنشوش الرؤية، والغثيان والقيء، وصعوبة في الكلام، وانخفاض القوة، والنعاس، أو الاختلاجات.
- كدمات أو نزيف غير مبرر.
- ضيق في التنفس، ألم في الصدر، ألم في الساق أو تورم، أو مخص مستمر في البطن.

