

Recomendación sobre cómo completar la primovacunación en caso de administración previa de vacunas extranjeras

VACUNA	MECANISMO DE ACCIÓN	PAUTA COMPLETA	RECOMENDACIÓN SEGÚN PAUTA PREVIA
Covishield® (Institute of India)	Vector adenoviral de chimpancé con ácido nucleico proteína S de coronavirus	2 dosis separadas 4-12 semanas	<ul style="list-style-type: none"> - Pauta completa: No necesario administrar otra vacuna. - Una dosis: Administrar una dosis de vacuna de ARNm* 12 semanas tras 1ª.
Sputnik V® (Gam-COVID-Vac)	Vectores adenovirales tipos 26 y 5 con ácido nucleico proteína S de coronavirus	2 dosis separadas 3 semanas	<ul style="list-style-type: none"> - Pauta completa: Administrar una dosis de vacuna de ARNm*. - Una dosis: Administrar una dosis de vacuna de ARNm* 12 semanas tras 1ª.
Sinopharm®	Coronavirus inactivado	2 dosis (en algunos casos 3) separadas 3-4 semanas	<ul style="list-style-type: none"> - Pauta completa (2-3 dosis): No necesario administrar otra vacuna. - Una dosis: Administrar una dosis de vacuna de ARNm* 12 semanas tras 1ª.
Sinovac®	Coronavirus inactivado	2 dosis separadas 4 semanas	<ul style="list-style-type: none"> - Pauta completa: No necesario administrar otra vacuna. - Una dosis: Administrar una dosis de vacuna de ARNm* 12 semanas tras 1ª.
Convidecia® (CanSinoBio)	Vector adenoviral tipos 5 con ácido nucleico proteína S de coronavirus	1 dosis	<ul style="list-style-type: none"> - Administrar una dosis de vacuna de ARNm* 12 semanas tras 1ª.
Covaxin®	Coronavirus inactivado	2 dosis separadas 4 semanas	<ul style="list-style-type: none"> - Pauta completa: No necesario administrar otra vacuna. - Una dosis: Administrar una dosis de vacuna de ARNm* 12 semanas tras 1ª.
Abdala®	Proteína recombinante RBD	3 dosis separadas 14 días	<ul style="list-style-type: none"> - Pauta completa: Administrar una dosis de vacuna de ARNm*. - Una o dos dosis: Administrar una dosis de vacuna de ARNm* 12 semanas tras 1ª.

*Dado que se trata de una dosis para completar la primovacunación, en caso de administrar Spikevax® de Moderna, se administrará una dosis de 0,5 ml (100 mcg).

Recomendación sobre cómo continuar con la dosis de recuerdo en caso de administración previa de vacunas extranjeras

Cuando la persona haya completado la pauta de primovacunación según las indicaciones anteriores, a partir de los 5 meses se administrará una dosis de recuerdo de vacuna de ARNm.

La dosis recuerdo en caso de Comirnaty® de Pfizer es de 0,3 ml o 30 mcg. En caso de tratarse de Spikevax® de Moderna, la dosis de recuerdo será de 0,25 ml o 50 mcg; sin embargo, en personas con condiciones de grupo 7, la dosis adicional que se administra a partir de las 4 semanas (de manera recomendable a partir de las 8 semanas) será con dosis 0,5 ml o 100 mcg y, posteriormente, a partir de los 5 meses se administrará una dosis de recuerdo a este grupo de 0,25 ml o 50 mcg.